

Содержаніе «Орнитологическаго Вѣстника» за 1912 годъ.

(АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ).

	Стр.
Большая бѣлая синица (<i>Parus bokharensis</i> Licht.) и ея расы. <i>Н. А. Зарудный</i> и <i>С. И. Билькевичъ</i> . . .	132—150
Большой бакланъ (<i>Phalacrocorax carbo</i> Linn.) въ Смоленской губерніи. <i>Г. Л. Граве</i>	57
В. Б. Баньковский. Некрологъ. <i>Г. И. Поляковъ</i>	328
Гнѣздовья куличка-лопатня. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	54—56
Замѣтка о персидской горихвосткѣ (<i>Phoenicurus se- menovi</i> Zar.). <i>Н. А. Зарудный</i>	244—247
Замѣтка о южно-каспійскомъ королькѣ (<i>Regulus re- gulus hyrcanus</i> Zar.). <i>Н. А. Зарудный</i>	64
Замѣтки о Закавказскихъ птицахъ. (Продолженіе). <i>П. В. Нестеровъ</i>	151—156
Замѣтки по орнитологіи Томской губерніи. <i>Г. Э. Иоганзенъ</i>	287—296
Замѣтки по Орнитологіи Туркестана. (Продолженіе). <i>Н. А. Зарудный</i>	16—30, 111—123, 197—228
Изданія, присланныя въ редакцію	94, 193, 257, 329—330
Интересныя находки въ Тарскомъ уѣздѣ, Тобольской губерніи. <i>В. Е. Ушаковъ</i>	52—53
Краткія сообщенія: Орнитологическія изслѣдованія въ Черниговской губерніи.— Орнитологическія изслѣдованія въ Костромской губерніи.— Зимованіе грача въ Московской губерніи.—Послѣднія ра- боты русскихъ орнитологовъ.—Объ отмѣткѣ птицъ коль- цами. <i>Г. П.</i>	85—87

- Къ налету кедровокъ.—Изъ Змѣиногорскаго уѣзда, Томской губерніи.—Изъ села Алферова, Симбирской губерніи.—Орнитологическія изслѣдованія въ Нижегородской губерніи.—Орнитологическія изслѣдованія въ Калужской губерніи.—Орнитологическія изслѣдованія въ Тамбовской губерніи.—Экспедиція на Алтай.—Отмѣтка птицъ кольцами.—Засѣданіе Отдѣленія Орнитологіи и Кружка Любителей пѣвчей и другой вольной птицы. *Г. П.* 185—188
- Сообщеніе о птицахъ, отмѣченныхъ кольцами. *Г. П.*—Къ последнему налету копытки (*Syngnathes paradoxus* Pall.). *В. Ф. Комаръ*.—Орнитологическія экскурсіи, организованныя при содѣйствіи Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы въ 1912 году.—Къ орнитофаунѣ черноморскаго побережья Кавказа.—Къ орнитофаунѣ Айновскихъ острововъ.—Изслѣдованія въ Оренбургскомъ краѣ и Люблинской губерніи.—Экспедиція *В. А. Русанова* на Шпицбергенъ.—Изслѣдованіе орнитофауны Кольскаго полуострова. *Г. П.*—Къ орнитофаунѣ Закавказья. *В. Б. Банниковскій*.—Премія имени профессора *А. П. Богданова*.—Засѣданіе Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній.—Соединенное засѣданіе Отдѣленія Орнитологіи и Комиссіи для изслѣдованія фауны Московской губерніи. *Г. П.* 322—326
- Къ авифаунѣ Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи. *А. Н. Карамзинъ* 129—130
- Къ вопросу о высотѣ полета перелетныхъ птицъ. Проф. *Д. Н. Кайгородовъ* 165—166
- Къ вопросу о летѣ птицъ противъ вѣтра. *С. А. Бутурлинъ* 251—252
- Къ вопросу о распространеніи степного жаворонка въ Кіевской губерніи. *Э. В. Шарлеманъ* 306—307
- Къ налету бѣлокрылаго клеста (*Loxia bifasciata*) осенью 1911 года. *Б. Р. Отто* 249—250
- Къ орнитологической фаунѣ Московской губерніи. *Г. П.* *Поляковъ* 44—51
- Къ орнитофаунѣ Енисейской губерніи. *А. Я. Тугариновъ*. 124—128
- Къ орнитофаунѣ Тарбагатайскихъ горъ. *В. А. Хахловъ*. 131
- Къ систематическому положенію крымской пищухи. *В. Б. Банниковскій* 160—162
- Лѣтняя орнитофауна дельты Аму-Дарьи. *Л. А. Молчановъ* 261—286
- Малый лебедь (*Cygnus bewicki* Yarr.) и бѣлый журавль (*Grus leucogeranus* Pall.) на зимовьѣ въ восточномъ Закавказьѣ. *А. Н. Карамзинъ* 304—306

Мелкія замѣтки о птицахъ Закавказья. <i>К. А. Сатунинъ</i>	157—159
Наблюденія надъ прилетомъ и пролетомъ нѣкоторыхъ птицъ въ Смоленской губерніи весною 1911 года. <i>А. Г. Гржибовскій</i>	68—82
Наблюденія надъ птицами Бугурусланскаго уѣзда, Са- марской губерніи, за три года (съ 1907 г. до 1910 г.). (Окончаніе). <i>Е. П. Писловъ</i>	31—43
Новая для Россіи птица: кашмирская чечетка. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	248
Новая форма гаички. <i>В. А. Халловъ</i>	60—62
Новыя данныя къ распространенію птицъ въ русскомъ Алтаѣ и по Абакану. Проф. <i>П. П. Сушкинъ</i>	237—241
Нѣсколько словъ къ вопросу о стремленіи птицъ расши- рить свою гнѣздовую область. <i>Г. Л. Граве</i>	58—59
О нѣкоторыхъ птицахъ Минской губерніи. <i>А. В. Фе- дюшинъ</i>	297—303
Обзоръ иностранной литературы по орнитологін. (Про- долженіе). <i>С. А. Бутурлинъ</i>	88—90, 172—184
Обзоръ русской орнитологической литературы. (Про- долженіе). <i>С. А. Бутурлинъ</i>	170—171
Объ окольцовываніи птицъ. <i>Г. В. баронъ Лоудонъ</i>	167—169
Отъ редакціи	65—67
Перечень птицъ Кѣлецкой губерніи. <i>Е. Я. Катинъ</i>	229—236
По поводу „Замѣтокъ о Закавказскихъ птицахъ“. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	317—321
Поездка на озеро Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году. <i>Г. И. Поляковъ</i> . (Приложеніе къ №№ 3 и 4)	1—32, 33—92
Предварительная замѣтка о варакушкахъ (<i>Cyanecula</i>) Туркестана. <i>Н. А. Зарудный</i>	308—316
Сообщеніе о птицахъ, отмѣченныхъ кольцами. <i>Г. П.</i>	83—84
Туркестанская раса бородатой куропатки. <i>С. А. Бу- турлинъ</i>	63
Туркестанская рыжепоясничная ласточка. <i>С. А. Бу- турлинъ</i>	242—243
Ферганская сѣрая синица. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	163—164
Хроника	91—93, 189—192, 253—256, 327
Экспурсія въ южное Закавказье. <i>К. А. Сатунинъ</i> . 1—15, 99—110	

Inhalt der «Ornithologische Mitteilungen» des Jahres 1912.

(ALPHABETISCHES REGISTER).


	P.
Acanthis flavirostris stoliczkae Hart., new for Russia. By <i>S. A. Buturlin</i>	248
Bemerkungen über die Ankunft und den Zug einiger Vögel des Gouvernements Smolensk im Frühling des Jahres 1911. Von <i>A. G. Grzibowski</i>	68—82
Breeding grounds of <i>Eurynorhynchus pygmaeus</i> (Linn.). By <i>S. A. Buturlin</i>	54—56
<i>Cecropis rufula ferghanensis</i> subsp. nov. By <i>S. A. Buturlin</i>	242—243
Chronik 91—93, 189—192, 253—256, 327	
<i>Cygnus bewicki</i> Yarr. und <i>Grus leucogeranus</i> Pall. im Winterquartier am östlichen Transkaukasus. Von <i>A. N. Karamsin</i>	304—305
Éditions parvenus à la rédaction 94, 193, 257,	329—330
Einige Worte über das süd-kaspische Goldhänchen (<i>Regulus regulus hyrcanus</i> Zar.). Von <i>N. A. Sarudny</i>	64
Interessante Funde im Tarsker Kreise des Tobolschen Gouvernements. Von <i>W. E. Uschakow</i>	52—53
Kurze Mitteilungen 85—87, 185—188,	322—326
Kurze Mitteilungen über die Vogelwelt Transkaukasiens. Von <i>K. A. Satunin</i>	157—159
Mitteilungen über die Ornithologie des Gouvernements Tomsk. Von <i>Herm. Johansen</i>	287—296
Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan. (Fort- setzung). Von <i>N. A. Sarudny</i> . . 16—30, 111—123,	197—228
Mitteilungen über transkaukasische Vögel. (Fortsetzung). Von <i>P. W. Nesterow</i>	151—156
Mitteilung über die mittelst Ring gemerkten Vögel. Von <i>G. P.</i>	83—84
Mitteilung über <i>Phoenicurus semenovi</i> Zar. Von <i>N. A. Sarudny</i>	244—247

Neue Form des Baumläufers. Von <i>W. B. Banikowski</i> . . .	160—162
Neue Tatsachen der geographischen Verbreitung der Vögel im russischen Altai und am Abakan. Von Prof. <i>P. P. Suschkin</i>	237—241
Neues über die Vögel des Jenisseischen Gouvernements. Von <i>A. I. Tugarinow</i>	124—128
Observations faites sur les oiseaux du district Bougourous- lane du gouvernement Samara durant trois années (1907—1910). (Fin.). Par. <i>E. I. Ispolatoff</i>	31—43
On the flight of birds against the wind. By <i>S. A. Buturlin</i>	251—252
Ornithologische Excursion nach dem südlichen Transcau- casien. Von <i>K. A. Satunin</i>	1—15, 99—110
Ornithologischer Ausflug nach den Seen Saissan-nor und Marka-kul (in West-Sibirien) im Jahre 1909. Von <i>G. I. Poljakow</i> . №№ 3 und 4	1—32, 33—92
<i>Parus bokharensis</i> Licht. und ihre Rassien. Von <i>N. A. Sarudny</i> und <i>S. I. Bilkewitsch</i>	132—150
<i>Parus cinereus ferghanensis</i> Buturlin. By <i>S. A. Buturlin</i>	163—164
<i>Perdix daurica turcomana</i> Stolz. By <i>S. A. Buturlin</i>	63
<i>Phalacrocorax carbo</i> Linn. im Gouvernement Smo- lensk. Von <i>G. L. Graue</i>	57
Rewiew of the foreign ornithological Literature. (Conti- nued). By <i>S. A. Buturlin</i>	88—90, 172—184
Rewiew of the Russian ornithological Literature. (Conti- nued). By <i>S. A. Buturlin</i>	170—171
Ringanlage der Vögel. Von. <i>G. W. baron Loudon</i>	167—169
Some notes on Transcaucasian Birds. By <i>S. A. Buturlin</i>	317—321
Sommerornithofauna des Deltas von Amudarja. Von <i>L. A. Moltschanow</i>	261—286
Über eine neue mattköpfige Sumpfmiese. Von <i>W. A. Hachlow</i>	60—62
Über einige Vögel des Gouvernements Minsk. Von <i>A. W. Fedtschin</i>	297—303
Verzeichnis der Vögel des Kjelzer Gouvernements. Von <i>E. I. Katin</i>	229—236
Von der Redaktion	65—67
Vorläufige Notiez über die Blaukehlchen (<i>Cyanecula</i>) des Turkestan. Von <i>N. A. Sarudny</i>	308—316

	<i>P.</i>
W. Banikowski. Nachruf. Von <i>G. I. Poljakow</i>	328
Zum Herbstzuge des Weissbinden-Kreuzschnabels (<i>Loxia bifasciata</i>) im Jahre 1911. Von <i>B. R. Ottow</i> . .	249—250
Zur Avifauna des Buguruslanschen Kreises im Gouvernement Ssamara. Von <i>A. N. Karamsin</i>	129—130
Zur Frage über die Neigung der Vögel zur Erweiterung ihres Nistgebietes. Von <i>G. L. Graue</i>	58—59
Zur Frage über die Verbreitung der Kalandlerlerche (<i>Melanocorypha calandra</i> L.) im Gouvernement Kiew. Von <i>E. W. Scharleman</i>	306—307
Zur Frage über die Zugshöhe der Vögel. Von Prof. <i>D. N. Kaygorodow</i>	165—166
Zur Ornithofauna der Tarbagatai-Gebirge. Von <i>W. A. Hachlow</i>	131
Zur ornithologischen Fauna des Moskauer Gouvernements. Von <i>G. I. Poljakow</i>	44—51



3 4 5



О РНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE


ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN

№ 1

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

Troisième ANNÉE

1912 г.



Отъ Редакціи.

1. Редакція не принимаетъ на себя отвѣтственности за своевременную доставку журнала, если подписка не была адресована непосредственно на ея имя.

2. При сообщеніи адреса подписчиковъ просятъ разборчиво обозначать имя, отчество, фамилію, а также губернію, уѣздъ и ближайшее почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяются Редакціей только въ тѣхъ случаяхъ, если таковыя поступаютъ отъ подписчиковъ не позже получения ими слѣдующаго номера и съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы.

3. При заявленіи о неполученіи журнала и о перемѣнѣ адреса просятъ прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №. При заявленіи о перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4. Лицъ, обращающихся письменно въ Редакцію съ запросами, для полученія отвѣта просятъ прилагать почтовую марку. На вопросы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5. Наложеннымъ платежемъ выпуски журнала не высылаются.

6. Рукописи, присылаемыя въ Редакцію, должны быть четко написаны, обязательно за полной подписью автора и съ указаніемъ его точнаго адреса. При этомъ авторовъ просятъ писать на одной сторонѣ листа и оставлять поля. Желательно, чтобы названія статей снабжались кромѣ русскаго названіями на какомъ либо западно-европейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя названія птицъ въ работахъ были подчеркнуты авторами одинъ разъ. За номенклатуру въ научныхъ статьяхъ отвѣтственность лежитъ на авторахъ.

7. Непринятые рукописи возвращаются за счетъ авторовъ въ видѣ посылки или подъ заказной бандеролью.

8. Для библиографическихъ отзывовъ просятъ присылать по два экземпляра работъ.



MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Орнитологическій Вѣстникъ.

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Выходить четыре раза въ годъ: два №№ до и два — послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна за 1 г.— 4 руб., за 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу— 8 р., за 1/2 страницы—4 р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половинною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просить адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle) l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakov, Russie, Chemin de fer Moscou — Nijninovgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein) jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poliakov, Russland, Postabteilung «Obiralovka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

На годичномъ засѣданіи Императорскаго Московскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній 30 января 1912 г. Г. И. Полякову присуждена большая золотая медаль за „Орнитологическій Вѣстникъ“.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
1. Экскурсія въ южное Закавказье. К. А. Сатунинъ.....	1
2. Замѣтки по Орнитологіи Туркестана. (Продолженіе).	
Н. А. Зарудный.....	16

3. Наблюденія надъ птицами Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи, за три года (съ 1907 г. до 1910 г.). (Окончаніе). <i>Е. И. Исполатовъ</i>	31
4. Къ орнитологической фаунѣ Московской губерніи. <i>Г. И. Поляковъ</i>	44
5. Интересныя находки въ Тарскомъ уѣздѣ, Тобольской губерніи. <i>В. Е. Ушаковъ</i>	52
6. Гнѣздовья куличка-лопатня. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	54
7. Phalacrocorax carbo Linn. въ Смоленской губерніи. <i>Г. Л. Граве</i>	57
8. Нѣсколько словъ къ вопросу о стремленіи птицъ расширить свою гнѣздовую область. <i>Г. Л. Граве</i>	58
9. Новая форма ганчки. <i>В. А. Хазловъ</i>	60
10. Туркестанская раса бородастой куропатки. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	63
11. Замѣтка о южно-каспійскомъ королькѣ (<i>Regulus regulus hircanus</i> Zag.). <i>Н. А. Зарудный</i>	64
12. Отъ редакціи	65
13. Наблюденія надъ прилетомъ и пролетомъ нѣкоторыхъ птицъ въ Смоленской губерніи весною 1911 года. <i>А. Г. Гржибовскій</i>	68
14. Сообщение о птицахъ, отмѣченныхъ кольцами. <i>Г. И.</i>	83
15. Краткія сообщенія. <i>Г. И.</i>	85
16. Обзоръ иностранной литературы по орнитологіи. (Продолженіе). <i>С. А. Бутурлинъ</i>	88
17. Хроника	91
Изданія, присланныя въ редакцію.....	94
Объявленія	



SUJET.—INHALT.

1. Ornithologische Excursion nach dem Südlichen Transcaucasien. Von <i>K. A. Satunin</i>	1
2. Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan (Fortsetzung). Von <i>N. A. Sarudny</i>	16

3. Observations faites sur les oiseaux du district Bougourous-lane du gouvernement Samara durant trois années (1907—1910) (Fin). Par <i>E. I. Ispolatoff</i>	31
4. Zur ornithologischen Fauna des Moskauer Gouvernements. Von <i>G. I. Poljakow</i>	44
5. Interessante Funde im Tarsker Kreise des Tobolschen Gouvernements. Von <i>W. E. Uschakow</i>	52
6. Breeding grounds of <i>Eurynorhynchus pygmaeus</i> (Linn.). By <i>S. A. Buturlin</i>	54
7. <i>Phalacrocorax carbo</i> Linn. im Gouvernement Smolensk. Von <i>G. L. Grave</i>	57
8. Zur Frage über die Neigung der Vögel zur Erweiterung ihres Nistgebietes. Von <i>G. L. Grave</i>	58
9. Über eine neue mattköpfige Sumpfmiese. Von <i>W. A. Hachlow</i>	60
10. <i>Perdix daurica turcomana</i> Stolz. By <i>S. A. Buturlin</i>	63
11. Einige Worte über das Süd-Kaspische Goldhänchen (<i>Regulus regulus hyrcanus</i> Zar.). Von <i>N. A. Sarudny</i>	64
12. Von der Redaktion	65
13. Bemerkungen über die Ankunft und den Zug einiger Vögel des Gouvernements Smolensk im Frühling des Jahres 1911. Von <i>A. G. Grzibowski</i>	68
14. Mitteilung über die mittelst Ring gemerkten Vögel. Von <i>G. P.</i>	83
15. Kurze Mitteilungen. Von <i>G. P.</i>	85
16. Rewiew of the foreign ornithological Literature (Continued). By <i>S. A. Buturlin</i>	88
17. Chronik	91
Editions parvenus à la rédaction.....	94
Inserate.	



Экскурсія въ южное Закавказье.

К. А. Сатунинъ.

Ornithologische Excursion nach dem südlichen Transcaucasien.

Von K. A. Satunin.

Настоящей статьѣ я долженъ предпослать слѣдующее замѣчаніе. Весь собранный мною орнитологическій матеріалъ былъ отправленъ С. А. Бутурлину. Сергѣй Александровичъ опредѣлилъ весь мой сборъ (за весь сезонъ) и сдѣлалъ относительно нѣкоторыхъ птицъ замѣчанія, которыя я въ статьѣ привожу въ ковычкахъ и отмѣчаю буквою „В“.

Считаю своимъ пріятнымъ долгомъ высказать здѣсь глубокоуважаемому Сергѣю Александровичу мою искреннюю благодарность за его дружескую помощь.

Какъ въ орнитологическомъ, такъ и въ другихъ отношеніяхъ богатая и разнообразная природа Кавказскаго края изслѣдована чрезвычайно неравномѣрно. Тогда какъ однѣ мѣстности, прославившіяся богатствомъ своей фауны, притягиваютъ къ себѣ десятки изслѣдователей и имѣютъ по нѣскольку списковъ обитающихъ въ нихъ птицъ,—другія, съ научной точки зрѣнія не менѣе интересныя, до сихъ поръ еще не видѣли у себя ни одного натуралиста. Къ первой категоріи относится Талышъ, фауна котораго изслѣдовалась съ начала прошлаго столѣтія и до сихъ поръ привлекаетъ къ себѣ все новыхъ и новыхъ изслѣдователей. Я совершенно не понимаю тѣхъ орнитологовъ, которые и теперь стремятся въ то же избитое мѣсто, и не нахожу въ ихъ

отчетахъ ничего ни новаго, ни интереснаго. Мнѣ кажется, что это объясняется только отсутствіемъ инициативы и стремленіемъ идти лишь по проторенному слѣду. Что же касается богатства фауны, то у насъ здѣсь есть не мало мѣстъ не менѣе богатыхъ и притомъ еще совершенно не изслѣдованныхъ.

Къ числу такихъ интересныхъ и еще не изслѣдованныхъ мѣстностей принадлежала остававшаяся до сего времени совершенно неизвѣстною въ орнитологическомъ отношеніи мѣстность по среднему теченію Аракса въ предѣлахъ южной части Эриванской и Елисаветпольской губерній,—мѣстность, лежащая въ предѣлахъ установленной мною зоологической провинціи „Южное Закавказье“.

Это обстоятельство и побудило меня предпринять весною текущаго года экскурсію въ означенную мѣстность. Экскурсія продолжилась съ конца апрѣля по конецъ іюля и дала возможность бѣгло ознакомиться съ фауною части Нахичеванскаго и Зангезурскаго уѣздовъ.

Одновременно студентъ Московскаго Университета графъ Н. А. Бобринскій экскурсировалъ нѣсколько сѣвернѣе и западнѣе, въ предѣлахъ Сурмалинскаго и Нахичеванскаго уѣздовъ, и надѣюсь, что обработка собраннаго нами матеріала дастъ довольно полную картину авифауны этой страны.

25. IV. 1911 я выѣхалъ изъ Тифлиса и, послѣ исполненія необходимыхъ формальностей въ Эривани, 27. IV прибылъ въ первый намѣченный мною пунктъ Эриванской губерніи,—урочище Аралыхъ, лежащее у подножія Арарата.

Мѣстность эта впервые была посѣщена мною осенью 1900 года и тогда же обратила на себя мое особое вниманіе. На основаніи изученія здѣшней фауны млекопитающихъ я пришелъ къ убѣжденію, что здѣсь находится аванпостъ арало—каспійской фауны. Какъ увидитъ ниже читатель, изученіе орнитологической фауны только подтверждаетъ это предположеніе.

Мѣстечко, въ которомъ я поселился, состоитъ только изъ поста пограничной стражи и казармъ одной постоянно здѣсь стоящей сотни Полтавскаго казачьяго полка, который лѣтомъ выходитъ сюда въ лагерь весь. Во время нахожденія здѣсь въ лагерьъ казаковъ дѣйствуетъ и маркитанская лавочка. Жить здѣсь можно только пользуясь гостепріимствомъ или казаковъ, или пограничной стражи, такъ какъ помимо поста и казармъ никакихъ частныхъ жилищъ нѣтъ. Благодаря предписанію г. начальника Кавказскаго

Округа пограничной стражи генерала Орлова и рекомендательному письму дивизионного генерала Флейшера, я встрѣтилъ здѣсь самый радушный пріемъ.

Въ верстѣ отъ мѣстечка лежитъ татарское селеніе того же имени. Мѣстность, окружающая это мѣстечко, чрезвычайно удобна для зоологическихъ изслѣдованій, ибо соединяетъ въ себѣ всевозможныя здѣсь „станціи“. Съ восточной стороны протекаетъ рѣчка Карасу, притокъ Аракса, съ болотистыми, заросшими камышомъ берегами. За нею тянется обширный лугъ. Около самаго мѣстечка имѣется старый запущенный паркъ, привлекающій въ этой безлѣсной мѣстности множество птицъ. Съ юго-запада, запада и сѣверо-запада къ мѣстечку прилегаетъ обширная площадь песковъ, поросшихъ кустарникомъ „абуджилъ“ (*Calligonum polygonoides* Pall.), не встрѣчающимся нигдѣ болѣе на Кавказѣ, но очень характернымъ для песковъ Закаспійской области. Это песчаная равнина очень медленно и незамѣтно, но равномерно поднимается къ Арарату и безъ какой-либо рѣзкой границы переходитъ въ покрытые каменными осыпями склоны горы. Изъ всѣхъ этихъ станцій равнины (о горныхъ склонахъ мы будемъ говорить позже) наибольшимъ богатствомъ фауны отличается паркъ, въ которомъ и производилось большинство моихъ экскурсій.

Этотъ паркъ и сады селенія Аралыхъ представляютъ собою единственныя древесныя насажденія среди абсолютно безлѣсной степной мѣстности и служатъ единственнымъ пристанищемъ птицъ, ведущихъ лѣсной образъ жизни. Но сады мѣстныхъ жителей, въ которыхъ крупными деревьями являются только ветлы, да пирамидальные тополя, которыми они обсажены, представляютъ мало удобствъ для птицъ, и такимъ образомъ значеніе парка еще увеличивается. Не лишнимъ поэтому считаю въ немногихъ словахъ описать этотъ паркъ. Онъ былъ насаженъ лѣтъ 30 тому назадъ, когда здѣсь стоялъ Уманскій казачій полкъ. Но давно онъ уже совершенно заброшенъ и очищенные нѣкогда дорожки заросли травой. Теперь онъ представляетъ нѣсколько старыхъ аллей изъ ивъ и тополей, между которыми въ безпорядкѣ разбросаны группы тѣхъ же деревьевъ, а также туты, грушъ и т. д. Правильные ряды, которыми расположены деревья пшата (дикой маслины, *Eleagnus angustifolia*), такъ же указываютъ, что они были посажены. Повсюду поднимается молоднякъ, произошедшій, конечно, уже отъ самосѣва,

а по окраинѣ, на границѣ между паркомъ и песками, образовались порядочныя заросли абуджиля и гребенчука.

Къ сѣверо-востоку отъ мѣстечка около 1900 года была насажена небольшая роща изъ ветель. Эти деревья на влажной болотистой почвѣ принялись великолѣпно и теперь на томъ мѣстѣ, гдѣ я видѣлъ въ 1900 году голую степь, раскинулась роща, въ тѣни которой разбиваютъ палатки лагеря. Такъ какъ роща эта была переполнена людьми, то для зоологическихъ наблюденій она, конечно, не имѣла никакого значенія.

Прибывъ въ Аралыхъ 27. IV и наскоро устроившись, я сейчасъ же началъ коллектированіе птицъ и успѣшно продолжалъ это занятіе до 5. V, когда неожиданно подвергся жестокому припадку маляріи, продержавшей меня нѣсколько дней въ постели. 13-го я снова началъ работу, а 17-го для переменъ климата, что при лѣченіи маляріи важнѣе всего, переѣхалъ на постъ Сергіевскій (5500'). Я снова вернулся въ Аралыхъ только 5. VI и пробылъ здѣсь до 12. VI, когда черезъ ст. Камармо двинулся дальше внизъ по Араксу.

Попытаюсь нарисовать картину птичей жизни въ описанныхъ окрестностяхъ Аралыха.

Весна въ этомъ году сильно запоздала и, когда я пріѣхалъ сюда въ концѣ апрѣля, на нѣкоторыхъ деревьяхъ еще не распускались почки, на большинствѣ же была еще мелкая, едва распутившаяся свѣжая листва. Абуджилъ едва зазеленѣлъ. Это обстоятельство было весьма благопріятно для наблюденій. Насѣкомыхъ было видно еще очень мало.

Пролетъ птицъ былъ въ самомъ разгарѣ. Многихъ птицъ я видѣлъ только разъ, два, а потомъ не могъ уже найти, несмотря на всѣ мои старанія.

Паркъ былъ, если можно такъ выразиться, биткомъ набитъ птицами. Громадное количество удоновъ и сизоворонокъ своими хриплыми трескучими голосами почти заглушали всѣхъ другихъ птицъ. Въ большомъ количествѣ встрѣчались въ паркѣ скворцы, пволги, кукушки, разныя славки (*Sylvia hortensis* Lath. и *S. curruca curruca* Linn.), сѣрыя вороны, пустельги (оба вида), щеглы (*Carduelis carduelis brevirostris* Zarudn.), домашніе воробьи, сѣрыя мухоловки (*Muscicapa striata* Pall.), пѣночки (*Phylloscopus trochilus trochilus* Linn.), блѣдныя малиновки (*Hypolais pallida* Hempr. et Ehrenb.) и ремежа (*Remiza pendulina caspia* Poelz.).

Сравнительно въ небольшомъ количествѣ встрѣчались гор-
линки (*Turtur turtur* Linn.), большой пестрый дятель
(*Dendrocopus major tenuirostris* Buturl.), коршунъ
(*Milvus korschun rufiventris* Buturl.) и чеглокъ (*Hu-
protiorchis subbuteo* Linn.). Жуланъ встрѣчался только
на опушкѣ, а чернолобый сорокопутъ (*Lanius minor* Gm.),
къ удивленію, быть замѣченъ лишь одинъ разъ.

Несомнѣнно на пролетѣ замѣчены: только одинъ или два
раза соловей (судя по пѣнію—*Luscinia luscinia* Linn.),
чечевица и горихвостки, добыть которыхъ здѣсь мнѣ не удалось.

У строеній встрѣчались сороки (*Pica pica* Linn.) и дере-
венскія ласточки (*Hirundo rustica* Linn.).

Скворцы, удода и воробы гнѣздились какъ въ строеніяхъ,
такъ и въ дуплахъ деревь. Сизоворонки предпочитали дупла.
Удоды гнѣзятся очень рано, и ихъ яицъ я уже не засталъ, а
на посту Сергіевскомъ, гдѣ много холоднѣе и слѣдовательно
птица выводится позднѣе, 20. V мнѣ принесли уже совершенно
оперившагося молодого удода.

Скворцы перестали хлопотать о постройкѣ гнѣздъ и сѣли
на яйца въ срединѣ мая. Въ срединѣ этого мѣсяца я добылъ и
яйца сизоворонки и обоихъ видовъ пустельги.

Иволги летали стайками; несомнѣнно большая часть изъ
нихъ были пролетныя особи. Однако, вернувшись сюда уже въ
началѣ іюня, я наблюдалъ иволгу въ паркѣ, хотя и въ несрав-
ненно меньшемъ количествѣ.

Щурки-пчелоѣды (*Merops apiaster* Linn.) часто но-
сились надъ мѣстечкомъ большими стаями и иногда въ гро-
мадномъ количествѣ усаживались на ночлегъ въ паркѣ.

Кукушки въ срединѣ мая попадались въ большомъ числѣ,
такъ что часто можно было ихъ видѣть на одномъ деревѣ по
двѣ, по три особи.

Сравнивая описанную авифауну этого парка съ хорошо
извѣстною мнѣ авифауною зарослей долины Куры—напримѣръ
лѣсныхъ зарослей (тугаевъ) Елисаветпольскаго и Арешскаго
уѣздовъ—, я нахожу очень большую разницу.

Въ Аралыхъ нѣтъ многихъ характерныхъ для прикуринскихъ
лѣсовъ птицъ. Таковы: галки, сойки, поползни, средній и зеле-
ный дятлы (*Dendrocoptes medius colchicus* Buturl. и
Gecinus viridis saundersi Tacz.), синицы (особенно
Parus major Linn.), завирушки (*Accentor modularis*

orientalis Sharpe), зарянка (*Erithacus rubecula caucasicus* But.), соловей (*Luscinia megarhynchos africana* Fisch. & Reich.) и малая мухоловка (*Syphia parva* Bechst.).

Другія птицы встрѣчаются въ несравненно меньшемъ количествѣ, какъ, напримѣръ, чернолобый сорокопутъ, котораго я встрѣтилъ здѣсь только однажды 13. V. Это не могло быть слѣдствіемъ того, что раньше сорокопутъ этотъ еще не прилеталъ, ибо въ этомъ же году я наблюдать его у Тифлиса еще 17. IV.

Въ срединѣ мая я наблюдалъ, какъ ремезы строили гнѣзда. Въ это время съ ивъ летѣлъ бѣлый пухъ, который и ловили на лету птички.

Какъ было уже упомянуто мною выше, 17. V я покинулъ Аралыхъ и вернулся сюда лишь 5. VI. Въ этотъ промежутокъ здѣсь былъ и энергично экскурсировалъ гр. Бобринскій.

Когда въ началѣ іюня я снова вернулся въ Аралыхъ, то засталъ въ паркѣ большую перемѣну. Пролетныя птицы уже исчезли, а разросшаяся листва скрывала оставшихся. Отъ прежней кипучей птичьей жизни не оставалось и слѣда. Но шурки прилетали теперь на ночлегъ чаще, и раза два я видѣлъ большія стаи розовыхъ скворцовъ.

Изъ прежнихъ оставались сѣрые вороны, кукушки, иволги, скворцы, чернолобые сорокопуты, горлинки, пестрые дятлы, щеглы, бѣлѣныя малиновки, славки, пустельги, ремеза и др. По оросительной канавѣ держались въ небольшомъ количествѣ зимородки. Несомнѣнно теперь оставались только гнѣздящіяся здѣсь птицы.

Заросли камыша, покрывающія болотистые берега р. Карасу, среди которыхъ разбросаны небольшія группы ивъ, имѣли, конечно, совершенно иную фауну. Къ сожалѣнію, камыши были посѣщены мною всего раза два, такъ какъ я преждевременно долженъ былъ покинуть эту мѣстность изъ-за припадковъ маляріи. Главную роль здѣсь играли безчисленные дроздовидныя камышевки (*Agroscephalus arundinaceus* Linn.). На ивахъ я замѣтилъ какихъ то синицъ (*Cyanistes coeruleus* subsp.?). Въ камышахъ было много лысухъ и водяныхъ курочекъ, различныхъ утокъ, выпей и цапель.

На лугу, который тянулся за рѣчкой, было много перепеловъ, коростелей и бѣлыхъ аистовъ. Въ началѣ мая здѣсь держалось еще много дунелей.

Фауна зарослей абуджиля на пескахъ, тянущихся къ Ара-
рату, была довольно бѣдна, но оригинальна.

Наиболѣе характерною, во множествѣ гнѣздящеюся здѣсь
птичкою, была усатая славка (*Sylvia mystacea* Ménétr.),
которую еще не наблюдали такъ далеко на западѣ.

Кромѣ усатой славки, несомнѣнно гнѣздящеюся здѣсь пти-
цею является только жуланъ. Сѣрая мухоловка встрѣчалась здѣсь
довольно часто, но только поблизости парка, гдѣ, вѣроятно, и
гнѣздилась. Стайки черноголовыхъ овсянокъ имѣли видъ про-
летныхъ. Раза два я наблюдалъ здѣсь кукушку.

Удоды, сизоворонки, пустельги, шурки и бѣлые аисты встрѣ-
чались здѣсь въ большомъ количествѣ, но, очевидно, только при-
летали сюда кормиться.

Однажды я добылъ здѣсь красноголоваго сорокопута (*Lapius senator niloticus* Bonap.), котораго уже вовсе не
ожидалъ здѣсь встрѣтить.

Тамъ, гдѣ заросли абуджиля кончаются и начинается уже
ощутительный подъемъ, авифауна становится богаче, что нахо-
дится, повидимому, въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь
имѣется уже нѣкоторая травяная растительность, совершенно
отсутствующая въ районѣ, занятомъ абуджилемъ, гдѣ почва
между кустами представляетъ совершенно обнаженный песокъ.

Здѣсь я встрѣтилъ черногороваго лугового чекана (*Pratincola maura* Pall.), малаго жаворонка (*Calandrella
brachydactyla* Leisl.) и какого то конька (*Anthus*), кото-
раго добыть не удалось.

Наблюдая, чѣмъ кормятся здѣшнія птицы, я замѣтилъ, что
пустельги охотятся главнымъ образомъ за мелкими грызунами
и, можетъ быть, ящерицами. Сизоворонки и удоды отыскивали
свою пищу исключительно въ навозѣ. Желудки изслѣдованныхъ
мною сизоворонокъ были биткомъ набиты крупными жуками,
преимущественно священными скарабеями (*Atheuchus*).

17. V я переѣхалъ на постъ Сергіевскій, расположенный
на склонѣ Арарата на высотѣ около 5500', у селенія Ахуры. Ара-
ратъ, какъ извѣстно, состоитъ изъ сильно разрушающихся по-
родъ, почему его склоны по большей части покрыты каменными
осыпями. Мѣстами выступаютъ и обнаженные скалы. Раститель-
ность всюду очень скудная. За селеніемъ имѣется глубокая балка
съ обрывистыми скалистыми краями. Въ этой балкѣ на скалахъ
я добылъ нѣсколько интересныхъ птицъ.

Въ самый день прїѣзда я нашелъ здѣсь обыкновенную каменку (*Saxicola oenanthe* Linn.), каменного дрозда (*Monticola saxatilis* Linn.), черноголовую овсянку (*Fringilloides melanocephalus* Scop.) и соловья-бѣлошейку (*Irania gutturalis* Gnerin). Последняя птица является новостью для нашей фауны. Ранѣе только предполагали, что зимою эта птица залетаетъ въ Талышинскія горы, такъ какъ она водится въ горахъ Эльбурской системы. Но до сихъ поръ фактическаго подтвержденія этого предположенія не было. Упомяну еще объ одной птичкѣ, оказавшейся общей для Арарата и Демовента, главной вершины Эльбурской цѣпи. Это—*Assessor ocularis* Radde, добытый мною въ березовой рошѣ у Сардарь-булага осенью 1900 года.

Въ выбоинахъ скалъ подъ громадными нависшими камнями, образующими своды, гнѣздились множество горныхъ ласточекъ (*Riparia rupestris* Scop.) и нѣсколько паръ бѣлобрюхихъ стрижей (*Cypselus melba* Linn.). Последние гнѣздились въ самой глубинѣ образованныхъ нависшими камнями гротовъ, и мнѣ пришлось потратить много времени прежде, чѣмъ я успѣлъ добыть одинъ экземпляръ. Со свистомъ, какъ пущенный со страшною силою камень, стрижи эти внезапно вырывались изъ темнаго грота.

Другими обитателями этихъ скалъ были воронки (*Chelidon urbica* Linn.), каменные воробы (*Petronia petronia exigua* Hellm.), сизые голуби (*Columba livia* Linn.) и каменные куропатки (*Cassabis chukar* Gray).

Мѣстность около поста имѣла довольно унылый видъ и представляла горные склоны, усѣянные камнями различной величины, отъ глыбъ въ нѣсколько кубическихъ саженъ до совсѣмъ маленькихъ. Самыми многочисленными птицами въ этихъ розсыпяхъ были обыкновенныя каменки (*Saxicola oenanthe* Linn.) и рогольки (*Otocoris penicillata* Gould), а также, къ моему удивленію, и хохлатые жаворонки (*Galerida cristata caucasica* Tacz.). Кромѣ нихъ я видѣлъ около поста здѣсь и на немногихъ растущихъ около него деревьяхъ: жулана, чечевичу, лугового чекана (*Pratincola mauga* Pall.), рѣполова (*Acanthis cannabina* Linn.), садовую овсянку (*Emberiza hortulana shah* Br.), сороку и друг.

На самомъ посту держалось много домашнихъ воробьевъ и деревенскихъ ласточекъ, вившихъ гнѣзда въ конюшнѣ. Я об-

ратилъ особое вниманіе на это обстоятельство. Такимъ образомъ здѣсь деревенскія и городскія ласточки живутъ рядомъ, но первыя гнѣздятся въ строеніяхъ, а вторыя на скалахъ.

Остается еще упомянуть, что незадолго до моего приѣзда въ скалахъ былъ убитъ филинъ (*Bubo bubo* Linn.) и что я часто видѣлъ высоко летящихъ надъ скалами клушицъ.

21. Я проѣхалъ черезъ постъ Такельту на постъ Сардарь-булагъ, лежащій въ сѣдловинѣ между Большимъ и Малымъ Араратами на высотѣ свыше 8000'. На полпути между постомъ Такельту и Сардарь-булагомъ я добылъ чекана — *Saxicola finschi* Neugl. На такой высотѣ¹⁾ во всемъ Агридлѣ эта птица довольно обыкновенна.

Уже подъѣзжая къ Сардарь-булагу, видѣлъ альпійскаго вьюрка (*Montifringilla alpicola* Pall.). Шелъ дождь, и я торопился добраться до поста и полѣнился слѣзть, о чемъ потомъ очень жалѣлъ, такъ какъ болѣе не встрѣчалъ здѣсь этой птицы.

Мѣстность около поста, лежащаго въ ложбинѣ, очень неровная, пересѣченная множествомъ глубокихъ овраговъ, прорытыхъ сбѣгающими съ вершинъ весенними водами. По сѣверовосточному склону Малаго Арарата, у основанія его конуса, растетъ низкорослый березовый лѣсъ. Вдоль его нижней опушки разбросаны въ значительномъ разстояніи другъ отъ друга высокіе кусты барбариса. Все остальное пространство покрыто хорошою травянистою растительностью, между которою выдаются различные астрагалы и заросли изъ низкихъ кустовъ можжевельника. Какъ ни малы эти кусты, но въ этой мѣстности они представляютъ удобное мѣсто для гнѣздовья птицъ.

Выше на горахъ всюду еще виднѣлись обширныя поля снѣга, которыя мѣстами спускались почти къ самому посту. Западная часть березовой рощи тоже была еще подъ снѣгомъ, и почки на деревьяхъ еще не распускались. Остальная же часть рощи уже зазеленѣла, и на березахъ уже распустились листочки. Цвѣло множество цвѣтовъ, преимущественно различныхъ луковичныхъ. Весна только что вступила въ свои права.

Въ мѣстахъ съ наиболѣе скудною растительностью во множествѣ держались полевые жаворонки (*Alauda arvensis armenica* Bogd.).

¹⁾ Т.-с. около 5—6000'. *Авт.*

Въ болѣе каменистыхъ мѣстахъ самыми многочисленными птицами были обыкновенныя каменки (*Saxicola oenanthe* Linn.) и рогольки (*Otocoris penicillata* Gould).

На маленькихъ кустикахъ можжевельника постоянно держались чечевичы (*Carpodacus erythrinus roseatus* Hodgs.), а на опушкѣ рощи кромѣ того еще варакушки (*Cyanosylvia cyanescula magna* Zar. et Loud.) и славки.

Кромѣ этихъ птицъ, которыя были добыты, я видѣлъ здѣсь еще рѣполова.

Ходьба въ рошѣ была ужасно трудна, а птицы почему то отличались чрезвычайной строгостью, и мнѣ удалось собрать, вѣроятно, далеко не всѣхъ представителей ея авифауны. Такъ, напримѣръ, осенью 1900 года я добылъ здѣсь интересную завирушку—*Spermolegus ocularis* Radde. И теперь я видѣлъ птичекъ, которыхъ по ихъ повадкамъ принялъ за завирушекъ, но не могъ добыть ни одного экземпляра.

Наиболѣе громкимъ и многочисленнымъ пѣвцомъ въ рошѣ была славка (*Sylvia communis icterops* Ménétr.).

Я нашелъ въ рошѣ два гнѣзда сорокъ и одно пустельги. Всѣ гнѣзда помѣщались на такихъ невысокихъ деревьяхъ, что я, немного вытянувшись, легко могъ достать ихъ рукою. Болѣе высокихъ деревьевъ здѣсь не было. Въ сорочьемъ гнѣздѣ, найденномъ мною 26. V, было 7 сильно насиженныхъ яицъ; оно было устроено на березкѣ. Другое, устроенное очень тщательно, съ хорошей крышей, было найдено мною въ барбарисовомъ кустѣ 30. V и содержало птенцовъ. Пустельга, судя по яйцамъ—*Cenchrus tinnunculus*, устроила гнѣздо на самой высокой березкѣ, но все же я легко досталъ его, немного нагнувъ дерево. Гнѣздо содержало 26. V 5 яицъ съ совершенно сформировавшимися птенцами.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ деревья росли рѣдко, я часто поднималъ каменныхъ куропадокъ.

31. V убилъ на опушкѣ полевого конька (*Anthus campestris* Linn.) и выгналъ пару козодоевъ.

На самомъ посту, въ зданіяхъ, гнѣздились домашніе воробы и деревенскія ласточки. На той высотѣ я ожидалъ городскихъ. Однажды, именно около 6 часовъ вечера 28. V, надъ постомъ кружилась стая стрижей, насколько я могъ разсмотрѣть—обыкновенныхъ чернобрюхихъ (*Cypselus apus* Linn.). На мусорныхъ кучахъ у поста держались овсянки, кажется—*Emberiza hortulana*, сороки и удода.

Часто съ громкимъ крикомъ пролетали надъ нами стайки клушицъ.

Кукушка встрѣчалась здѣсь, какъ въ совершенно безлѣсной мѣстности, такъ и въ рощѣ.

Мнѣ остается еще упомянуть, что раза два я видѣлъ проносившихся высоко въ воздухѣ какихъ-то крупныхъ хищниковъ.

28. V я экскурсировалъ къ перевалу, лежащему выше поста къ югу-западу отъ него. Высота его на пятиверстной картѣ въ 8820'. Мѣстами лежалъ еще снѣгъ. Растительность едва пробуждалась. На каменныхъ розсыпяхъ единственными птицами были рогольки (*Otocoris penicillata* Gould), которые бѣли и гонялись другъ за другомъ.

1. VI я покинулъ Сардаръ-булагъ и спустился черезъ постъ Такельту на постъ Буруланъ. Первая часть дороги представляетъ непрерывный спускъ по горнымъ склонамъ, усѣянными камнями и съ очень скудною растительностью. Я видѣлъ здѣсь обыкновенныхъ каменокъ, овсянокъ, рѣполововъ, *Saxicola finschi* Heugl. и множество жаворонковъ.

У Буруланскаго поста, гдѣ я пробылъ до 5. V, я не собиралъ птицъ, такъ какъ было много другого дѣла.

Птицъ, вообще говоря, здѣсь было очень мало. На берегу Буруланскаго озера я замѣтилъ камышеваго луня, дроздовидную камышовку и черноголовую плиску (*Budytes melanops* Licht.). Въ степи у поста держались хохлатые жаворонки и каменки. Иногда пролетали стаи розовыхъ скворцовъ и шурокъ. Конечно, въ камышахъ озера было не мало различныхъ водяныхъ птицъ, но я не могъ охотиться на нихъ за недостаткомъ времени. Упомяну, однако, что здѣсь я видѣлъ колпицу и сѣрую цаплю. Ночью былъ слышенъ свистъ авдотки.

Страннымъ образомъ, ни здѣсь, ни въ Аралыхъ я ни разу не видалъ сыча (*Athene noctua caucasica* Zarud. & Loudon) тогда какъ въ недалеко отсюда лежащемъ имѣніи Араздайнъ ихъ было очень много.

Дальнѣйшій мой путь внизъ по долинѣ Аракса черезъ Араздайнъ, Джульфа и Досты до Ордубата былъ совершенно очень быстро и въ орнитологическомъ отношеніи не далъ почти ничего. Наступилъ жаркій сезонъ и птичья жизнь сдѣлалась незамѣтною. Жара, повидимому, тяготила и птицъ. Такъ, экскурсируя около Ордубата 26. V по выжженной солнцемъ и раскаленной степи, чрезвычайно богатой однако насѣкомыми, я уви-

дѣлъ хохлатого жаворонка, сидѣвшаго на камнѣ въ узкой тѣни верстового столба. Крылья его были опущены, а клювъ широко раскрытъ.

Изъ другихъ птицъ здѣсь встрѣчались только каменки, спизворонки, удода, черноголовыя овсянки и шурки, а на берегу Аракса—бѣлыя трясогузки и зуйки (*Charadrius hiaticula* Linn.). Раза два видѣлъ я пролетѣвшихъ надъ моею головою туртушекъ (*Pterocles aepagi* Pall.).

Ордубать весь утопаетъ въ садахъ, совершенно недоступныхъ для чужеземнаго пришельца. Это совершенно азіатскій городъ, гдѣ, по мѣткому выраженію русскихъ солдатъ, „люди не живутъ, а хоронятся“. Проникнуть въ эти сады съ экскурсіонными цѣлями нечего было и думать тѣмъ болѣе, что была пора созрѣванія фруктовъ. Оттуда постоянно слышался крикъ дятла, свистъ пиволги, пѣніе блѣдной малиновки и проч. Разъ слышалъ какихъ то синицъ. На скалахъ было много сизыхъ голубей.

Надъ городомъ съ визгомъ носились чернобрюхіе стрижи. Излишне, пожалуй, будетъ упоминать, что въ городѣ было не мало домашнихъ воробьевъ, деревенскихъ ласточекъ и сѣрыхъ воронъ.

Изъ Ордубата я проѣхалъ въ селеніе Мигры. Было уже начало іюля. Жара стояла нестерпимая и время для зоологическихъ изслѣдованій было самое неудобное. Я рѣшилъ оставить жаркую долину Аракса и подняться въ горы. Изъ селенія Мигры я направился къ сѣверу вверхъ по теченію р. Мигри-чая и остановился сперва въ урочищѣ Лишквасъ, дачномъ мѣстѣ жителей селенія Мигры.

Теперь моею цѣлью было ознакомленіе съ авифауною лѣсовъ южныхъ склоновъ горъ Малаго Кавказа.

Лишквасъ оказался совершенно негоднымъ для этой цѣли. Лѣса кругомъ были или уничтожены, или изуродованы; мѣстная молодежь, не имѣя никакого дѣла, цѣлый день шляется съ ружьями. Въ результатъ птицы были или уничтожены, или разогнаны. За нѣсколько дней моего пребыванія здѣсь, весьма плодотворнаго для другихъ отраслей зоологіи, я видѣлъ въ лѣсу только одну сойку, нѣсколько дятловъ (*Dendrocopos medius colchicus* Buturl.), державшихся на большихъ ореховыхъ деревьяхъ, и довольно много зябликовъ, единственныхъ пѣвцовъ этой мѣстности.

Изъ разспросовъ я узналъ, что лучшіе, еще нетронутые

лѣса находятся около селенія Мюлькъ, куда я и переѣхалъ 10. VII.

Мюлькъ—маленькое татарское селеніе, состоящее всего изъ 7 домовъ, затерялось среди покрытыхъ смѣшаннымъ лиственнымъ лѣсомъ горъ. Въ лѣсу преобладаетъ дубъ, но много и другихъ породъ. Лѣсъ по большей части неважный. По отзыву компетентныхъ людей, почва тутъ для него черезъ-чуръ неблагоприятна. Я прожилъ здѣсь до 14. VII, ежедневно экскурсируя въ окрестныхъ лѣсахъ.

Въ самомъ селеніи и по дорогамъ было много горныхъ-стокъ (*Ruticilla mesoleuca* Hempr. & Ehrenb.). Я добылъ здѣсь и старыхъ, и молодыхъ.

Въ лѣсу мною добыты: сойка (*Garrulus krynickyi* Kalen.), зябликъ (*Fringilla coelebs* Linn.), кавказская синица (*Periparus ater michalowskii* Bogd.), сѣрая славка (*Sylvia communis icterops* Ménétr.), пѣночка (*Phylloscopus neglectus lorenzi* Menzb.), поползень (*Sitta caesia caucasica* Reichen.), средній дятель (*Dendrocoptes medius colchicus* Buturl.), одна горная овсянка (*Emberiza cia par* Hart.), горлинка (*Turtur turtur* Linn.) и витютень (*Palumbus palumbus* Linn.).

Около самаго селенія было много домашнихъ воробьевъ, сорокъ и сѣрыхъ воронъ. Однажды надъ селеніемъ высоко парилъ стервятникъ (*Neophron percnopterus* Linn.).

Кромѣ того я видѣлъ здѣсь какого-то мелкаго сокола, повидимому дербника (*Aesalon aesalon* Linn.), слышалъ зеленого дятла (*Gecinus viridis* Linn.) и сплюшку (*Scops scops* Linn.).

Синицы и дятлы были очень многочисленны и летали выводками. Зеленый дятель былъ очень остороженъ.

14. VII я тронулся дальше и прошелъ черезъ селеніе Лишкъ въ селеніе Пирдауданъ, лежащее уже въ безлѣсной области. Передъ селеніемъ пришлось перевалить довольно высокій хребетъ (около 8500'). Немного ниже протекала рѣчка Охчи-чай, берущая начало на высочайшей вершинѣ этой мѣстности Капетджихъ¹⁾. На этой рѣчкѣ, богатой форелью, и на ея мелкихъ притокахъ было много оляпокъ (*Cinclus cinclus caucasicus* Mad.) и бѣлыхъ трясогузокъ, а порою попада-

¹⁾ На картѣ: „Капутджихъ“. *Авт.*

лись и кулички-перевозчики (*Tringoides hypoleucus* Linn.).

На субъальпійскихъ лугахъ и горныхъ склонахъ около селенія во множествѣ держались: луговые чеканы (*Pratincola rubetra inoscae* Tschusi), чечевицы (*Carpodacus erythrinus roseatus* Hodgs.) и горныя овсянки (*Emberiza cia* par Hart.). А на усѣянныхъ камнями горныхъ склонахъ летали стайки корольковыхъ вьюрковъ (*Oraegithus pusillus* Pall.) и попадались обыкновенныя каменки (*Saxicola oenanthe* Linn.).

По вечерамъ съ луговъ доносился крикъ перепела.

У селенія держались обычные воробы, воробны и сороки. Одна сорока гнѣздилась у самого селенія совершенно открыто, на единственномъ ростемъ здѣсь маленькомъ деревѣ.

17. VII я двинулся дальше и, спустившись въ ущелье рѣки Охчи-чая, прошелъ по нему въ сѣверо-восточномъ направленіи до селенія Нижній Гирратахъ, гдѣ свернулъ къ сѣверу и, поднимаясь по безымянной рѣчкѣ, дошелъ до селенія Верхній Гирратахъ и остановился здѣсь на ночлегъ.

Рѣка Охчи-чай имѣетъ здѣсь сильное паденіе, и на небольшомъ сравнительно разстояніи до Гирратаха характеръ мѣстности совершенно измѣнился. Появилась снова древесная растительность, среди которой выдавались гигантскія орѣховыя деревья. Я убилъ дорогой пѣночку—*Phylloscopus nitidus* Blyth.; ихъ была цѣлая стайка. Видѣлъ здѣсь сойку, зеленого дятла, зябликовъ и витьюня.

Селеніе Гирратахъ очень разбросано. Мы остановились въ самой верхней его части. Вся зелень осталась внизу, а здѣсь кругомъ высились только изстѣченные, зубчатые, совершенно обнаженные скалы. 18. VII, выйдя на разсвѣтъ изъ дому, я услышалъ характерный крикъ скалистаго поползня. Ихъ было очень много, но держались они строго и трудно было разглядѣть ихъ на скалахъ.

Я не буду распространяться здѣсь о деталяхъ моего дальнѣйшаго пути отъ селенія Гирратахъ черезъ селенія Гативъ до города Герюсы (18—20. VII), такъ какъ онъ былъ очень бѣденъ орнитологическими наблюденіями.

21. VII я выѣхалъ изъ города Герюсы на озеро Карагель, лежащее верстахъ въ пятнадцати къ сѣверо-западу.

Озеро Карагель лежитъ на высотѣ 8939' среди безотрад-

ныхъ голыхъ горъ, склоны которыхъ покрыты осыпями изъ сѣрыхъ камней. Оно довольно велико и имѣетъ не много меньше двухъ верстъ по своему длинному діаметру. Маленькія заросли водяныхъ растений есть только у его юго-западнаго берега. На всемъ остальномъ пространствѣ озеро совершенно чисто и имѣетъ довольно крутые каменные берега.

Къ востоку отъ него лежитъ маленькое озеро Джиллгелъ, которое теперь совершенно заросло осокой и другими водяными растеніями, такъ что узкія полосы свободной воды остались только у его восточнаго берега. Мѣстами озеро это совершенно пересохло, мѣстами очень мелко, и повсюду по нему бродить скотъ, пригнанный сюда на лѣто. Поэтому никакихъ болотныхъ птицъ я здѣсь не встрѣтилъ. Нашелъ только парочку куликовъ-травниковъ (*Totanus calidris* Linn.).

На озерѣ же Карагелъ, несмотря на его неуютность, держались во множествѣ красныя утки (*Casarca casarca* Linn.) и въ меньшемъ количествѣ кряквы (*Anas boschas* Linn.). Опредѣлять я съ помощью бинокля и не допускаю никакой ошибки относительно перваго вида; думаю, что не ошибаюсь и въ опредѣленіи второго. На берегу видѣлъ перевозчика (*Tringoides hypoleucus* Linn.).

На каменныхъ розсыпяхъ у озера было много рогольковъ (*Otocoris penicillata* Gould) и обыкновенныхъ каенокъ (*Saxicola oenanthe* Linn.).

Отсюда, переваливъ высокій хребетъ Ишихлы, на которомъ лежалъ еще снѣгъ, я прошелъ черезъ селеніе Каракилиса по альпійскимъ пастбищамъ въ селеніе Кармалиновку, Нахичеванскаго уѣзда, а оттуда въ городъ Нахичевань. Это былъ очень неинтересный путь, ибо на большей части своего протяженія шелъ по плоскогорью между культурными полями.

(Продолженіе слѣдуетъ.—*Fortsetzung folgt*).



Замѣтки по Орнитологіи Туркестана.

И. А. Зарудный.

Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan.

Von N. A. Zarudny.

(Продолженіе.—Fortsetzung) ¹⁾.

116. *Acridotheres tristis* L.

Странно, что Е. Hartert не приводитъ этого крупнаго скворца въ своемъ списокѣ птицъ Палеарктической области ²⁾. О проникновеніи *A. tristis* изъ Индіи въ Белуючистанъ уже давно сообщалъ W. Blanford („Eastern Persia“, v. II, 1876 г.). По Е. Oates („Fauna of Brit. India“, Birds, v. I), онъ распространяется и въ Афганистанъ. По моимъ наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ 1900—1901 г.г., онъ обыкновененъ въ южной части Персидскаго Белуючистана. По даннымъ, полученнымъ мною въ послѣднее время, выводится въ сѣверномъ Афганистанѣ, именно: въ изобиліи въ г. Мазаръ-и-Шерифъ и въ меньшемъ числѣ въ г. Балхъ. Весною и осенью залетаетъ на сѣверный берегъ Аму-Дарыи, гдѣ замѣчался въ окрестностяхъ г. Термезъ. Слѣдовательно его слѣдуетъ внести и въ списокъ птицъ Россійской Имперіи.

Афганцы и бухарцы обозначаютъ эту птицу названіемъ „майна“.

¹⁾ См. кн. III—IV «Орнит. Вѣсти.» за 1911 г., стр. 311—312.

S. B. III—IV «Ornit. Mitteil.», 1911, S. 311—312.

²⁾ „Die Vögel der palaarktischen Fauna“. *Aem.*

117. *Coccothraustes humii* Sharpe.

(2-ая замѣтка).

Мною и С. І. Билькевичемъ обнаруженъ на гнѣздовѣ въ довольно большомъ числѣ въ 1910 году въ горныхъ лѣсахъ восточной части Кулябскаго бэкства (близъ бэкства Дарвазъ) въ Бухарѣ, гдѣ изобилуютъ ягодные кустарники и деревья. Здѣсь найденъ нами въ окрестностяхъ селеній Хирманджау и Юль, а также въ горахъ около мѣстъ Гамидарá и Шурабдарá.—Въ 1911 году мѣсто Гамидарá посѣтилъ С. М. Алексѣевъ, причемъ 12. VI ему удалось здѣсь найти гнѣздо нашей птицы съ 4 сильно насиженными яйцами. Насколько мнѣ это извѣстно, ни гнѣзда, ни яйца ея еще нигдѣ не были описаны.

Гнѣздо было выстроено на фисташковомъ деревѣ, на высотѣ $2\frac{1}{2}$ сажень. Оно представляетъ рыхлую, непрочную, просвѣчивающуюся постройку, внѣшняя поверхность которой мало топорщится. Наружныя части состоятъ изъ размочаленныхъ листьевъ злаковъ и широкихъ полосъ луба, изъ узкихъ лубяныхъ полосъ, изъ комковъ лубяныхъ волоконъ и комковъ волоконъ листьевъ злаковъ. Къ внутреннимъ стѣнкамъ гнѣздо сдѣлано изъ все болѣе и болѣе нѣжныхъ матеріаловъ какъ по тонкости, такъ и по мягкости. На днѣ гнѣздового лоточка лежатъ предварительно растормошенные, а затѣмъ плотно умятые комки подшерстка винторогаго козла (*Capra falconeri*) и тончайшія волокна. Верхняя часть гнѣзда выстроена наиболѣе плотно (изъ полосъ мало размочаленнаго луба и листьевъ злаковъ).

Размѣры гнѣзда:

	m.m.
высота.....	70
глубина.....	47
ширина.....	118
діаметръ отверстія....	69

Основной фонъ яицъ блѣдный, грязно-зеленовато-голубой, повсюду очень хорошо замѣтный, такъ какъ отмѣтинъ вообще не много. На одномъ яйцѣ въ тупой трети, вокругъ полюса, черно-бурая и черныя длинныя, широкія и узкія линіи, перекрещивающіяся одна съ другой и отчасти вѣтвящіяся. Нѣкоторыя изъ этихъ линій начинаются кругловатыми пятнышками. Осталь-

ная поверхность покрыта небольшимъ количествомъ глубокихъ отмѣтинъ, окрашенныхъ въ блѣдно-сѣрый цвѣтъ и имѣющихъ видъ короткихъ линій, крапинокъ и каракулекъ. На остальныхъ яйцахъ верхнія отмѣтины представлены всего лишь нѣсколькими кругловатыми черно-и оливково-бурыми пятнышками вокругъ полюса тупого конца (на одномъ яйцѣ имѣется кромѣ того одно пятнышко и на острой половинѣ). Глубокія отмѣтины выражены извилистыми линіями, также частью начинающимися круглыми и кругловатыми пятнышками; затѣмъ имѣются каракульки и точки; цвѣтъ этихъ отмѣтинъ сѣрый, порою очень блѣдный; всего больше ихъ вокругъ полюса тупого конца.

Размѣры яицъ:

длина:	ширина:
м.м.	м.м.
25,2	17,5
24	18
23,6	18
26,7	17,1

118. *Cynchramus schoenicius parvirostris* Buturl.

II

119. *C. schoenicius minor* Midd.

Болотныхъ овсянокъ въ моеѣ туркестанской коллекціи къ концу февраля 1911 года состояло 380 экземпляровъ. Экземпляры эти такъ или иначе приближаются къ *C. schoenicius* L. болѣе, чѣмъ къ *C. pyrrhuloides* Pall. Въ этомъ матеріалѣ оказались между прочимъ и птицы, вполне отвѣчающія признакамъ сейчасъ озаглавленныхъ формъ; добыты онѣ зимою въ долинахъ Чирчика и средняго теченія Сыръ-Дарыи.

120. *Cynchramus schoenicius härmsi* Zag.

Эта недавно описанная мною форма болотной овсянки („Ornithol. Monatsb“, 1911, № 4)¹⁾ обозначена была въ моихъ „Замѣткахъ по Орнитологіи Туркестана“ (№ 86), какъ *C. s. canneti* Brehm.

¹⁾ Первоначально подъ названіемъ *C. pyrrhuloides härmsi*. *Авт.*

121. *Siphia albicilla* Pall.

Сибирская малая мухоловка должна быть введена въ орнитофауну Туркестана. Птица эта была обнаружена нами въ 1910 году, когда одинъ экземпляръ былъ добытъ подѣ Ташкентомъ 12. IX. Въ 1911 году въ окрестностяхъ этого же города встрѣчалась изрѣдка въ первой половинѣ послѣдней трети апрѣля; одинъ экземпляръ добытъ 13. IV.

122. *Siphia (Alseonax) ruficauda* Swains.

(2-ая замѣтка).

Во время лѣтняго путешествія нашего по бухарскимъ владѣніямъ въ 1910 году мы (я и С. I. Билькевичъ) видѣли и добыли рыжехвостую малую мухоловку только однажды, именно: 20. V въ зонѣ арчи восточнаго склона хребта Куги-тангъ (къ западу отъ с. Кампыръ-тепе).

123. *Tchitrea paradisi turkestanica* Zar. & Härms.

(2-ая замѣтка).

Я и М. М. Гермсъ¹⁾ отличили туркестанскую райскую мухоловку, какъ особый видъ, основываясь на томъ, что въ рыжемъ нарядѣ она блѣднѣе, чѣмъ индійская, а въ самыхъ старыхъ экземплярахъ, еще далеко не бѣлыхъ, она замѣтно крупнѣе, чѣмъ бѣлая индійская.

124. *Riparia sinensis bilkevitchi* Zar.

Clivicola bilkewitschi sp. nov.—N. Sarudny, „Ornithol. Monatsb.“, 1910, № 9.
Riparia bilkevitchi Sar.—N. Sarudny, „Ornithol. Monatsb.“, 1910, № 12.

Е. Hartert (l. c.) не указываетъ для Палеарктической области ни одной формы *R. sinensis*.

Во время лѣтняго путешествія нашего по бухарскимъ владѣніямъ въ 1910 году мы (я и С. I. Билькевичъ) нашли эту береговую ласточку, какъ гнѣздящуюся птичку, впервые въ окрестностяхъ г. Патта-Кисаръ и въ устьяхъ р. Сурханъ, гдѣ она была обыкновенна въ дни 27—31. V; большая колонія обнару-

¹⁾ «Ornithol. Monatsb.», 1911, № 5. *Аом.*

жена была 21. VI на правомъ берегу р. Пянджъ около пограничнаго поста Кокъ-Куль; въ небольшомъ числѣ выводилась на берегу р. Пянджъ около с. Чубэкъ, гдѣ была очень мало замѣтна среди весьма многочисленныхъ *R. riparia* (? *R. riparia diluta* Sharpe & Wyatt). 25—30. VII въ окрестностяхъ г. Патта-Кисаръ оказалась уже крайне малочисленною.

125. *Chelidon smithii* Leach.

Chelidon smithii Leach.—N. Sarudny, „Ornithol. Monatsb“, 1910, № 12.

Нитчатая касатка, представлявшая до 1910 года новостъ для орнитофауны Палеарктической области, найдена мною и С. И. Билькевичемъ въ указанномъ году въ бухарскихъ владѣніяхъ, именно въ горахъ бэкства Кулябъ, гдѣ она обыкновенна на гнѣздовѣ въ скалахъ по берегамъ р. Пянджъ, между ущельемъ Чайли-Камаръ и мѣстомъ Багаракъ; нѣсколько паръ гнѣздились въ скалахъ по тому же Пянджу около мѣста Шуробъ-даръ. Замѣтилъ парочку 2. VII около с. Анджиру-паенъ и трехъ птицъ 5. VII, носившихся надъ багарными полями на перевалѣ между вершиною Юлскою долины и вершиною Сары-гарскаго уклона. По устнымъ свѣдѣніямъ, гнѣздится на Пянджѣ въ мѣстѣ Пасику. У таджиковъ наша птичка извѣстна подъ названіемъ—„тауга-карлагачъ“.

Гнѣзда ея выстроены изъ комковъ глины, смѣшанныхъ съ ничтожнымъ количествомъ сухихъ былинковъ, и прилѣпляются къ потолку болѣе или менѣе обширныхъ нишъ и выбоинъ въ скалахъ, омываемыхъ водами. Нерѣдко гнѣзда висятъ прямо надъ поверхностью этихъ послѣднихъ, но не ниже одной сажени отъ нея. Гнѣзда имѣютъ видъ круглой, плоской шапки. Входное отверстіе направлено въ сторону рѣки, или нѣсколько въ бокъ, и представляетъ почти полукруглую вырѣзку¹⁾ гнѣздового края (верхній край этого отверстія составляется, слѣдовательно, поверхностью камня, къ которому гнѣздо прилѣплено). Иногда оно выдѣляется прямо въ гнѣздовой стѣнкѣ, совѣмъ около потолка ниши или выбоины. Гнѣзда хрупки, и мнѣ не удалось снять ни одного такого, которое можно было-бы измѣрить. Гнѣздовая выстилка состоитъ внизу изъ тонкихъ, упругихъ корешковъ, а сверху изъ перьевъ разныхъ птицъ, напримѣръ, *Milvus*

¹⁾ Обыкновенно она вытянута въ поперечномъ направленіи. *Авт.*

ater, Falco babylonicus, Tinnunculus tinnunculus, Aquila fasciata, Neophron percnopterus, Columba и другихъ, гнѣздящихся въ скалахъ здѣшнихъ горъ. — Таковы гнѣзда, лично мною осмотрѣнныя. По словамъ туземцевъ, наша птичка въ разныхъ мѣстахъ Бухары закладываетъ свои гнѣзда также подъ мостами, перекинутыми черезъ горныя рѣчки, прикрѣпляя ихъ къ дереву постройки¹⁾. С. М. Алексѣевъ во время поѣздки своей по Бухарѣ лѣтомъ 1911 года встрѣтился съ нитчатой касаткой въ слѣдующихъ мѣстахъ:

2. V около Яръ-тепе (13 верстъ отъ к. Гузарь); это самое западное мѣстонахожденіе;

12. V около г. Деннау;

19. V въ Ляйля-ханѣ на р. Кафирниганъ (къ югу отъ г. Гиссаръ); въ тотъ же день около г. Дюшамбъ; это самое сѣверное пока мѣстонахожденіе;

23. V на переправѣ Гупсаръ-тюбъ (черезъ Вахшъ);

25. V въ г. Курганъ-тюбъ; здѣсь вездѣ на гнѣздовѣ;

9. VII. около с. Фейзабадъ (ниже с. Камаръ-Серай на Пянджѣ) замѣченъ одинъ экземпляръ въ стайкѣ обыкновенныхъ касатокъ;

24. VI въ ущельѣ Чайли-Камаръ С. М. Алексѣеву посчастливилось найти гнѣздо съ 4 свѣжими яйцами. Чисто-бѣлый основной фонъ ихъ испещренъ многочисленными, большею частью кругловатыми отмѣтинами. Эти послѣднія представляютъ очень немногія пятна, частыя пятнышки и весьма частыя точки, начинающая отъ едва замѣтныхъ; цвѣтъ ихъ темный и свѣтлый, красно-коричневый (рѣже красновато-сѣрый и сѣрый); сгущены вокругъ полюса тупого конца (въ одномъ яйцѣ—на самомъ концѣ). Нѣкоторыя пятна и пятнышки кажутся внутри гораздо болѣе свѣтлыми, чѣмъ по краямъ.

Размѣры яицъ:

длина:	ширина:
mm.	mm.
17,5	13,3
18,2	13,3
17	13,5
18	13,2

¹⁾ Гнѣздится также въ глубокихъ оросительныхъ каналахъ. *Авт.*

126. *Microcichla scouleri* Vigors.

(2-ая замѣтка).

Эта, въ высокоїи степени странная птичка была обыкновенна, по словамъ Е. Л. Шестоперова, въ зиму съ 1909 на 1910 годъ между кишлаками Іорданъ и Охна (въ южной Ферганѣ), на камняхъ, непосредственно около быстро текущихъ водъ. Въ 1910 году одинъ экземпляръ былъ примѣченъ около селенія Охна уже 1. VIII.

127. *Molpastes leucogenys* Gray.

Птица новая для орнитофауны Туркестана. Около кишлака Башъ-Юкайты въ долину рѣки Сурханъ 3. VI. 1910 примѣченъ былъ мною одинокій экземпляръ какого-то *Molpastes*. Судя по присланному мнѣ въ сухомъ видѣ экземпляру, добытому 2. IX того же года около с. Камаръ-Сарай (на'р. Пянджъ), это былъ *M. leucogenys*.

128. *Scotocerca inquietus platyura* Sew.

Мѣстами скотоцерка очень обыкновенна на гнѣздовьяхъ въ бухарскихъ владѣніяхъ. Таковою показалаея она мнѣ въ горахъ Баба-дагъ въ районѣ, верстъ на 15-18 окружающемъ могилу Хазретъ-баба; держится здѣсь по каменистымъ склонамъ, поросшимъ кустами *Zygophyllum*, *Amygdalus* и кое-какими другими. При тѣхъ-же условіяхъ, но въ замѣтно меньшемъ числѣ, найдена нами по восточнымъ склонамъ хребта Кара-тау, между пограничнымъ постомъ Кизыль-су и водами родника Таллы; здѣсь держалась въ зонѣ фисташковыхъ деревьевъ; обыкновенной, а мѣстами и очень обыкновенной оказалась она въ горахъ между Гамидаръ и Шуробъ-даръ по склонамъ, поросшимъ кустарникомъ и усыяннымъ крупнымъ и мелкимъ камнемъ. Въ ущельѣ Чайли-Камаръ 23—25. VI часто видѣлъ выводки скотоцерокъ, путешествовавшихъ по сухимъ и полусухимъ зарослямъ какихъ-то сложноцвѣтныхъ растений (здѣсь кустарная растительность отсутствуетъ почти совсѣмъ); гнѣздится ли здѣсь, рѣшить не могъ, какъ не могъ убѣдиться въ ея гнѣздованіи по кустарникамъ выше кишлака Чешме-гованъ до высоты горы Кизыль-тау, гдѣ 15. VII примѣчалъ ее прямо таки часто.

129. *Budytes citreola citreola* Pall. и *B. citreola werae* Buturl.

Недавно я удосужился пересмотрѣть и переизмѣрить сѣро-спинныхъ желтоголовыхъ трясогузокъ своей коллекціи, собранныхъ на обоихъ пролетахъ въ Семирѣченской, Сырь-Дарьинской и Ферганской областяхъ. Вотъ размѣры вполне взрослыхъ экземпляровъ.

♂ ♂		♀ ♀	
<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы).</i>	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы).</i>
м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
79,6	71	81	77,3
80,6	75,2	82	76,5
82,4	79	78	71
79	74,5	82,5	77
77,5	74	83,2	75,5
78,2	75,8	79,2	73,8
78	75,5	78	71
79,2	73,6	75	69,3
79	69	75,4	73,4 (sic!)
78	74	76	72,4
79,2	74,3	76	74,3 (sic!)
77	72,8	76,2	71
78,2	75,2	73,4	69,8
83,2	75,5	78	73
82	76,3	78,6	71,6
77	73,2	78,6	71,6
78,2	74,4	76,2	72,6
		78	73,2
		78,5	71,5

С. А Бутурлинъ („Ornithol. Monatsb.“, 1907, р. 197) для *B. werae* ♂♂ даетъ такіе размѣры:

	м.м.	м.м.	м.м.
крыло:	80,5	82	77,5
хвостъ:	75	73	72

Въ моеѣ коллекціи имѣются еще слѣдующіе экземпляры самцовъ:

	Крыло.	Хвостъ.
	м.м.	м.м.
1) Джаркентъ;		
14. III. 1900.....	84,6	76,4
2) Джаманъ-баткакъ;		
10. III. 1910.....	87,2	80
3) Джаманъ-баткакъ;		
20. III. 1911.....	89	82
4) г. Вѣрный;		
16. III. 1899.....	90,2	82,7

Послѣдніе три экземпляра должны быть признаны за *B. citreola*, для самцовъ которой С. А. Бутурлинъ (l. c.) даетъ такіе размѣры:

	м.м.	м.м.	м.м.
крыло:	87	92	рѣдко 85
хвостъ:	97	84	

Такимъ образомъ громадное большинство нашихъ туркестанскихъ сѣроспинныхъ желтоголовыхъ трясогузокъ должно быть признано за *B. wegaе*. Типичная же (восточная) форма *B. citreola*, попадаетъ у насъ лишь изрѣдка. Повидимому, не часто встрѣчаются кромѣ того такія птицы, которыя занимаютъ промежуточное мѣсто между этими формами (напримѣръ, экземпляръ № 1 второй таблички).

130. *Budytes flava raddei* Härms.

Эта недавно описанная М. М. Гермсомъ („Ornithol. Monatsb.“, 1909, № 1) форма желтой трясогузки (по экземплярамъ изъ Закаспія¹⁾ и съ нижней Волги) была добыта мною въ предѣлахъ Туркестана пока только въ двухъ экземплярахъ самцовъ, именно 2. IV. 1909 въ урочищѣ Сардаба и 6. IV. 1910 на болотѣ Джаманъ-баткакъ. По мнѣнію М. М. Гермса, быть можетъ гнѣздится на нижней Волгѣ. Авторъ относитъ къ этой формѣ экземпляръ самца, упоминаемый Радде („Ornis Caucasica“) какъ *B. melan-*

¹⁾ Типомъ М. М. Гермсъ считаетъ ♂ отъ 15. V изъ окрестностей Асхабада. *Авт.*

с е r p h a l u s „съ наклономъ къ v i r i d i s на затылкѣ и съ сильно выраженною надбровною полоскою“ и добытый около Ленкорана 25. III. Мнѣ кажется, что именно эта форма была описана Ѳ. Д. Плеске (статья „Beschreibung einer Vogelbastarde“ въ Мém. l'Acad. Imp. Sciences de S.-P., t. XXXV, № 5, 1887 г.), какъ гибридъ между B. f l a v a и B. m e l a n o c e r p h a l u s (по экземпляру, добытому Карелинымъ 8. IV. 1854 около Гурьева). Найдена мною, какъ пролетная рѣдкая птица, въ Персін, именно въ участкахъ Южно-Каспійскомъ и Хорасанскомъ (N. Sarudny: „Verzeichnis der Vögel Persiens“ въ „Journ. für Ornithol.“, 1911, IV).

131. *Anthus pratensis enigmaticus* Zar.

(2-ая замѣтка).

Въ долинахъ Чирчика, Ангrena и средней Сыръ-Дарьи зимою и на обоихъ пролетахъ въ послѣднее время я собралъ много луговыхъ щеврицъ (туркестанскихъ теперь у меня имѣется болѣе 70 экземпляровъ). Въ дополненіе къ ранѣ имѣвшемуся матеріалу по западной части Европейской Россіи получилъ я отъ М. М. Гермса рядъ экземпляровъ изъ Лифляндіи, съ которыми вновь сравнилъ своихъ туркестанскихъ птицъ. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ эти послѣднія отличаются болѣе грубою, крупною пятнистостью верхней стороны тѣла и большимъ ея распространеніемъ (она идетъ на крестецъ и часто, какъ у A. s e r v i n u s, даже на верхнія кроющія хвоста). Въ осеннемъ и зимнемъ опереніи наши щеврицы въ основномъ фонѣ верхней стороны *болѣею частью* не такія яркія, какъ осеннія германскія, псковскія и лифляндскія, не такія ржавчато-желтоватыя, а болѣе блѣдныя и тусклыя.—Въ новомъ матеріалѣ съ низовьевъ Сыръ-Дарьи оказались не только типичныя A. p r a t e n s i s, но и переходныя къ A. e n i g m a t i c u s, а также пара этой послѣдней. Размѣрами обѣ формы, повидимому, не отличаются. Сильно сверху пятнистыя луговыя щеврицы попадаютъ и въ западной Европѣ, но, очевидно, рѣдко. Объ одной изъ таковыхъ говорилъ покойный С. Parrot („Ornithol. Jahrb.“, 1910, статья „Beitrag zur Ornithologie der Insel Korsica“) ¹⁾.

¹⁾ Экземпляръ изъ Аячіо обращалъ на себя вниманіе широкими черными пятнами верхней стороны, даже на верхнихъ кроющихъ хвоста. *Авт.*

132. *Anthus japonicus härmsi* Zar.

(2-ая замѣтка).

Для сравненія съ близкими формами считаю полезнымъ привести здѣсь размѣры моихъ экземпляровъ щеврицы имени Гермса (происходятъ изъ долинъ Чирчика и Ангрена и добыты въ разные годы въ промежутокъ времени съ 14. IX по 22. IV). Матеріалъ распредѣляется по степени убыванія длины крыла.

	<i>Клювъ отъ угла рта.</i>	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ отъ осно- ванія кобчиковой железы.</i>	<i>Плюсна сзади.</i>	<i>Коготь задняго пальца по хордѣ.</i>
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♂ ♂					
1)	17,5	88,2	67	20,3	9,1
2)	18	88	67,4	21,5	11
3)	18	88	64,4	21,5	9,3
4)	17	87	69,4	20,7	11,6
5)	15,6	87	66,4	21	9,5
6)	17	86,6	69	20,5	11,6
7)	18,2	86,5	69	20,4	11,5
8)	17,4	86,5	65,7	20,6	11,2
9)	18,4	86,4	67	21,3	10,2
10)	18,4	86,4	67	def.	def.
11)	18,2	86	65,7	22	11,3
12)	17,3	86	65,3	20,5	12
13)	18	86	64	20,7	10,4
14)	17	85,5	64,4	20	11,5
15)	18,5	85,4	66,4	21,4	11,8
16)	18	85	66,8	20,7	12
17)	def.	84,6	63,7	19	10,2
18)	18,2	84,5	66	22,3	10,2
19)	def.	84	def.	def.	def.
20)	16,2	83,6	66	20,4	def.
21)	17	83,6	62	19,5	12
22)	16,7	82,4	64,5	19,3	10

Е. Hartert (l. c.) говоритъ, что *A. japonicus* Temm. & Scheg. имѣетъ такіе же размѣры, какъ западная *A. sp. spinoletta* L., у самцовъ которой крыло=90—96 m.m.

	<i>Клювъ отъ угла рта.</i>	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ отъ осно- вания кочичиковой. железы.</i>	<i>Плюсна сзади.</i>	<i>Коготь задняго пальца по хордѣ</i>
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♀ ♀					
1)	18	86	62	21,4	10,6
2)	17	83,6	63,4	22	11,6
3)	18	83,2	65,4	20,5	10,4
4)	18,6	83,2	65	20,8	10,2
5)	18,2	83	67	21,3	11,6
6)	17,8	83	67	20	11,2
7)	16,7	82,7	65	21,2	9
8)	16,8	82,5	64	20,3	12,3
9)	17,8	82,3	65,5	20,5	10,7
10)	18	82	65	20,5	10,7
11)	17,2	82	63,5	22	11
12)	17,5	81,6	65	18,6	10,6
13)	16,5	81,4	65	19,2	11,6
14)	20,3	81,2	63,2	20,8	11,5
15)	16,5	81,1	65	19,2	11,6
16)	17,8	80,8	67	20,3	11,2
17)	16	80,7	60	20,8	8,9
18)	17,8	80,5	65	20,4	11,2
19)	17,5	80,4	65,3	21,2	10
20)	16,7	80,1	59,7	22	11,9
21)	16,5	80	60,6	20,6	9,5
22)	18	79,5	61,8	19,3	10,4
23)	18	79,4	61	21	10,3
24)	16,4	79,3	64,1	19,5	def.
25)	18,8	79	63,6	21,3	11,4
26)	17,3	79	62,4	20,1	10,8
27)	15,8	78,5	63,5	20,4	10
28)	17,5	78	63,7	20,2	10
29)	17	77,8	60,5	20,4	11,4

По E. Hartert'у, длина крыла самокъ настоящей *A. japonicus* = 86—92 m.m. Для *A. japonicus pensilvanica* Lath. вообще она указывается равной 81—89 m.m.

Выводы напрашиваются сами собой.

133. *Anthus gustavi* Sw.

Сибирская щеврица до сихъ поръ еще никѣмъ не указана для фауны Туркестана. Встрѣчается у насъ только на пролетахъ и, повидимому, лишь изрѣдка. Одинъ экземпляръ былъ добытъ на болотѣ Джаманъ-баткакъ (около Ташкента) 20. IX. 1906 и другой, въ томъ же году и здѣсь же 2. X. Общество изъ пяти птицъ было примѣчено тамъ же 26. IV. 1907. Одинокая попалась 5. IX. 1909 подѣ Чиназомъ. Одинъ экземпляръ былъ добытъ моимъ препараторомъ 27. IV. 1909 около станціи Кауфмановской. Пара замѣчена на Джаманъ-баткакѣ 11. IX. 1909. Здѣсь же наблюдалась одинокая 22. IX. 1910.

134. *Apus affinis* Gray & Hardw.

Малый бѣлоспинный стрижь, до сихъ поръ къ сѣверу отъ Аму-Дарьи и Пянджа указанный лишь Н. А. Сѣверцовымъ для Пянджакента (по наблюденіямъ Федченко)¹⁾, найденъ мною и С. І. Билькевичемъ на гнѣздовѣ въ горахъ окрестностей Шурабъ-дара и Гамидара въ 1910 году (Кулябское бѣкство).—Повидимому, также на гнѣздовѣ обнаруженъ С. М. Алексѣевымъ въ ущельи Акъ-капчагай къ юго-востоку отъ г. Байсунъ (Байсунское бѣкство).

135. *Phasianus michailovskii* Zag.

(2-ая замѣтка).

По свѣдѣніямъ, полученнымъ мною въ 1910 году во время странствованія нашего по Бухарѣ, фазанъ Михайловскаго между прочимъ сохранился кое-гдѣ по небольшимъ, уединеннымъ (вслѣдствіе ихъ недоступности со стороны горъ и воды) тугаямъ въ долинѣ р. Пянджъ выше Кала-и-Хогонъ.

136. *Sarcogrammus indicus* Bodd.

22—23. IV. 1910 примѣчено было подѣ г. Чарджуй по одному экземпляру индійской лопастной пугалицы. Въ началѣ апрѣля того же года былъ добытъ одинъ экземпляръ въ окрестно-

¹⁾ Н. А. Сѣверцовъ: „Вертикальное и горизонтальное распредѣленіе Туркестанскихъ животных“. *Авт.*

стяхъ г. Термезъ. Эти аму-дарьинскія находки являются для упоминаемаго вида однѣми изъ самыхъ сѣверныхъ.

137. *Pseudosclopax taczanowskii* Verr.

(2-ая замѣтка).

Добытъ одинъ экземпляръ 12. IV. 1911 на озерѣ Маріамъ-куль около Тай-гюбэ (долина р. Чирчика).

138. *Tringa subminuta* Midd.

(2-ая замѣтка).

Добытъ одинъ экземпляръ на болотѣ Джаманъ-баткакъ (около Ташкента) 22. IX. 1910.

139. *Chroicocephalus brunneicephalus* Jerd.

Китайская буроголовая чайка для Туркестана и вообще Россійской Имперіи впервые упоминается Н. А. Сѣверцовымъ, который нашелъ ее на Памирѣ, именно: на Кара-кулѣ въ концѣ іюля (взрослые въ брачномъ перѣ и молодые), на Сары-кулѣ и на Памиръ-Аличурѣ (въ зимнемъ перѣ). По словамъ Н. А. Сѣверцова, гнѣздится на всѣхъ памирскихъ озерахъ ¹⁾. Мною въ первый разъ была обнаружена 16. III. 1908 въ урочищѣ Сардаба, гдѣ одинъ экземпляръ (старый самецъ) леталъ въ обществѣ *S. ridibundus*. Старая самка добыта въ мѣстѣ Барданъ-куль 10. IV. 1910 (долина р. Чирчика). Въ томъ же мѣстѣ 21. IV. 1911 добыта такая же птица. Несомнѣнно яловая самка была добыта нами 16. VI въ урочищѣ Кара-сенгиръ (долина среднего теченія Сыръ-Дары), гдѣ держалась въ обществѣ мѣстовыхъ *S. ridibundus*. Для нашей страны должна считаться рѣдкою, не гнѣздящеюся, залетною птицею.

140. *Chroicocephalus ridibundus* L.

II

141. *C. r. lavrovi* subsp. nov.

Среди попадавшихся въ мои руки многочисленныхъ представителей обыкновенной чайки на обонхъ пролетахъ въ доли-

¹⁾ Записки Туркестанскаго Отдѣла Импер. Общества Любителей Естествознанія, Т. I, вып. 1-й, стр. 83. Ташкентъ, 1879. *Авт.*

нахъ р. Чирчика и средней Сыръ-Дарьи, а также въ урочищѣ Сардаба (Джизакскій уѣздъ, Самаркандской области), попадались мнѣ такіе экземпляры, которые обращали на себя вниманіе особенно блѣднымъ цвѣтомъ головы. Исключительно только блѣдно-голова оказались гнѣздящимися въ долину Сыръ-Дарьи между Чиназомъ и Перовскомъ; таковыя свойственны на гнѣздовья и Семірѣчью. Думаю, что въ Туркестанѣ и въ сопредѣльныхъ съ нимъ частяхъ Западной Сибири обитаетъ особливая форма обыкновенной чайки, которую обозначаю, какъ *C. ridibundus laugovi* (по имени моего товарища Н. В. Лаврова).

(Продолженіе слѣдуетъ.—*Fortsetzung folgt*).

Ташкентъ. 30. VIII. 1911.



Наблюдения надъ птицами Бугурусланскаго уѣзда Самарской губерніи за три года (съ 1907 г. до 1910 г.).

Е. Н. Исполатовъ.

Observations faites sur les oiseaux du district Bougourouslane
du gouvernement Samara durant trois années (1907—1910).

Par E. I. Ispolatoff.

(Окончаніе.—Fin) ¹⁾.

67. *Loxia curvirostra* L.

Клесты-еловики въ больномъ числѣ наблюдались въ селѣ Сосновкѣ отъ 10. VIII по 12. IX. Птицы эти стайками изъ 4—6 особей перелетали здѣсь изъ сада въ садъ и особенно охотно садились на растущія тамъ и сямъ сосны. Нерѣдко онѣ залетали на гумна, гдѣ подбирали конопляное сѣмя подъ разставленными около изгородей стеблями конопли, вынутыми изъ мочилъ для просушки.

68. *Pyrrhula pyrrhula* L.

Снѣгири встрѣчаются здѣсь поздней осенью, зимою и весною. Въ 1907 году появились 22. X (?), въ 1909 году—21. IX и въ 1910 году—3. X.

¹⁾ См. кн. III.—IV „Орнит. Вѣстн.“ 1911 г., стр. 227—239.
V. I. III.—IV „Mess. Ornith.“ 1911, p. 227—239.

69. *Carpodacus erythrinus* Pall.

Чечевица здѣсь обыкновенна. Въ 1908 году замѣчена весною 6. V; 8. VI найдено ея гнѣздо съ 5 ненасиженными яйцами. Въ 1909 году наблюдался прилетъ 4. V, а валовой пролетъ—10. V. Въ 1910 году прилетѣли 9. V. Многія здѣшнія чечевицы поютъ не такъ, какъ въ западной Россіи, а именно: *тю-тю-ви-ти-ві* или *тю-тю-ви-ти-ви-тю*, съ удареніемъ на второмъ и послѣднемъ слогахъ; на западѣ же эти птицы поютъ такъ: *тю-ві-тю-ві-тю*, съ удареніемъ на второмъ и четвертомъ слогахъ, или *ті-тю-ві-тю*.

70. *Acanthis linaria* L.

Чечетка въ концѣ 1910 года попадалась здѣсь въ большомъ количествѣ, тогда какъ въ 1907—1909 годахъ была рѣдка. Въ 1907 году первыя чечетки показались 11. X, а валовой пролетъ ихъ замѣченъ 24. X. Въ 1910 году весенній пролетъ наблюдался отъ 14. II до 28. III; осенью первыя чечетки показались 30. IX, а валовой пролетъ ихъ замѣченъ 7 и 8. X.

71. *Acanthis exilipes* Coues.

Бѣлая чечетка наблюдалась здѣсь въ большомъ количествѣ въ октябрѣ и ноябрѣ 1910 года. Первыя особи были замѣчены позже *Acanthis linaria* L., именно, 10. X.

72. *Acanthis holboelli* Brehm.

Одна самка большеклювой чечетки была убита 14. X. 1910 въ стаѣ *Acanthis linaria* L. и *Acanthis exilipes* Coues.

73. *Acanthis cannabina* L.

Коноплянка встрѣчается здѣсь преимущественно весною и осенью. Въ 1909 году прилетъ передовыхъ особей замѣченъ 20. III, а валовой пролетъ—26. III; отлетъ наблюдался отъ 3. IX до 4. X. Въ 1910 году валовой прилетъ наблюдался 24. III, а отлетъ 22. IX.

74. *Fringilla montifringilla* Briss.

Осенній пролетъ юрка наблюдался здѣсь въ 1907 году отъ 5-го до 10. X, а въ 1908 году—отъ 15 до 18. IX. Въ 1909 году весен-

ний пролетъ замѣченъ 5. IV, осенній же—отъ 31. VIII до 4. X. Въ 1910 году весенній пролетъ начался 24. III, 29. III шелъ валовой пролетъ; осенній пролетъ наблюдался отъ 12. IX до 16. X. На пролетахъ всегда наблюдались въ небольшомъ числѣ, преимущественно въ стаяхъ зябликовъ, и только 29. IX. 1910 была замѣчена мною очень большая стая юрковъ около села Сосновки. Въ это же время былъ пойманъ здѣсь одинъ юрокъ на землѣ съ обледенѣвшимъ крыломъ и выдернутымъ хвостомъ.

75. *Fringilla coelebs* L.

Отлетъ зябликовъ въ 1907 году наблюдался отъ 4. IX (все самцы) до 10. X. Въ 1908 году прилетъ его замѣченъ 1. IV (самцы); гнѣздо съ 3 яйцами (неполная кладка) найдено 3. V; отлетъ происходилъ съ 31. VIII до 24. IX. Въ 1909 году передовыя особи прилетѣли 19. III (Аманахъ), валовой пролетъ наблюдался отъ 23. III до 12. IV, а отлетъ—отъ 6. IX до 4. X. Въ 1910 году передовыя птицы прилетѣли 22. III; валовой пролетъ замѣченъ 26. III, а отлетъ наблюдался отъ 7. IX до 18. X.

76. *Passer montanus* L.

Полевой воробей здѣсь обыкновенная птица. Его ненасиженная кладка найдена близъ села Саврухи 22. V. 1908. Эти птицы, не довольствуясь пищею, находимую ими во дворахъ селеній и на гумнахъ, собираютъ за селомъ сѣмена сорныхъ травъ вмѣстѣ съ зябликами и снѣгирами.

77. *Chrysomitris spinus* L.

Чижекъ здѣсь обыкновененъ на лѣтнихъ кочевкахъ, а также на осеннемъ и весеннемъ пролетахъ. Въ 1908 году птички эти появились 9. VII. Въ 1909 году на весеннемъ пролетѣ замѣчены 26. III; осенью ихъ было очень много въ августѣ и сентябрѣ; на отлетѣ наблюдались 24. X. Въ 1910 году лѣтомъ появились 2. VII; отлетъ наблюдался отъ 22. IX до 24. X.

78. *Carduelis carduelis volgensis* Buturl.

Этотъ щеголь здѣсь обыкновенная осѣдлая птица. 11. X 1907 были убиты изъ стаи 3 самца. Въ 1910 году появились 30. III.

79. *Coccothraustes coccothraustes* L.

Парочка дубоносовъ встрѣчена мною 18. V. 1908 вблизи села Сосновки; 1. IX наблюдалъ дубоноса здѣсь же, на подсолнечникахъ. 25. III. 1909 одну птицу видѣлъ въ стаѣ воробьевъ. Въ 1910 году эти птицы встрѣчались у села Сосновки на подсолнечникахъ въ большомъ количествѣ; летающихъ молодыхъ видѣлъ 12. VI; на осеннемъ пролетѣ одинъ убитъ 17. IX.

80. *Certhia familiaris* L.

Въ 1910 году пищухъ наблюдалъ на осеннемъ пролетѣ отъ 17. IX до 30. X. Добытыя птицы не отличаются отъ особей изъ Псковской губерніи.

81. *Hirundo rustica* L.

Касатка—обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица. Въ 1907 году ея отлетъ замѣченъ 14. IX. Въ 1908 году прилетъ наблюдался 14. IV, а отлетъ—отъ 21. VIII до 13. IX. Въ 1909 году прилетѣли 17. IV, а отлетали отъ 12. VIII до 21. IX; валовой пролетъ замѣченъ 3. IX. Въ 1910 году прилетъ передовыхъ особей наблюдался 18. IV, а валовой пролетъ—23. IV; отлетъ происходить отъ 5. VIII до 12. IX. Одинъ наблюдатель видѣлъ ласточку, кормившую птенцовъ въ гнѣздѣ, 21. VIII. 1909, а другой—въ срединѣ августа 1910 года¹⁾.

82. *Cotyle riparia* L.

Колоніи береговыхъ ласточекъ наблюдались мною только по обрывистымъ песчанымъ берегамъ р. Кинель.

83. *Muscicapa parva* Bechst.

Пѣніе малаго мухолова я слышалъ въ 22 кварталѣ Сосновско-Архангельской казенной дачи въ 1908 году 7. V и 7. VI, а въ 1909 году—14. VI.—Весенній пролетъ этой птички замѣченъ въ 1908 году 7. V, въ 1909 году—3 и 4. V и въ 1910 году—30. IV. Осенній пролетъ наблюдался въ 1907 году—20. VIII, а

¹⁾ Городская ласточка (*Chelidon urbica* Linn.) въ Бугурусланѣ, по словамъ мѣстныхъ жителей, не гнѣздится, и мнѣ не случалось ее тамъ видѣть. Незамѣтилъ я этой птицы и въ селеніяхъ Бугурусланскаго уѣзда. *Авт.*

въ 1909 году—15. IX. На весеннемъ пролетѣ встрѣчались стайками, на осеннемъ же попадались въ стаяхъ синицъ.

84. *Muscicapa atricapilla* L.

Мухоловка пеструшка обыкновенна здѣсь на гнѣздовѣ. Прилетъ ея наблюдался въ 1908 году—17. IV, въ 1909 году—17 IV (валовой) и въ 1910 году—17. IV.

85. *Muscicapa grisola* L.

Мухоловка сѣрая здѣсь обыкновенна. Прилетъ ея наблюдался въ 1908 году 1. V, въ 1909 году—4. V и въ 1910 году—6. V. Отлетъ замѣченъ въ 1907 году 5. VIII (начало), въ 1908 году—31. VIII и въ 1909 году—23. IX. На осеннемъ пролетѣ сѣрыя мухоловки попадались въ стаяхъ синицъ, корольковъ и поползней. 21. V. 1909 было найдено гнѣздо этой птички съ 4 ненасиженными яйцами; изъ нихъ 2 были разбиты пестрымъ дятломъ (*Picus major* L.).

86. *Ampelis garrulus* L.

3 свиристеля были замѣчены 24. IX. 1908 въ селѣ Сосновкѣ. Зимой здѣсь наблюдалъ 2 раза.

87. *Enneactonus collurio* L.

Сорокопутъ жуланъ—обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица. Прилетъ его замѣченъ въ 1908 году 14. V (?), въ 1909 году—27. IV и въ 1910 году—28. IV. Отлетаютъ, вѣроятно, въ первой половинѣ августа, такъ какъ во второй половинѣ этого мѣсяца видѣть ихъ не случалось.

88. *Lanius minor* Gm.

Чернолобый сорокопутъ здѣсь гнѣздится спорадично. Держится въ маленькихъ рощахъ и на опушкахъ большихъ лѣсовъ. Прилетъ его замѣченъ въ 1908 году 15. V, а въ 1910 году—16. V. 17. VII. 1908 наблюдалъ летающихъ молодыхъ. Позднѣе 30. VII здѣсь не встрѣчалъ.

89. *Lanius excubitor* L.

Большой сорокопутъ попадаетъ здѣсь на пролетѣ въ октябрь и ноябрѣ.

90. *Lanius rapax* Brehm.

Сѣверный сорокопутъ, какъ и предшествующій видъ, падается здѣсь на пролетѣ въ октябрѣ и ноябрѣ.

91. *Lanius major* Pall.

Одна самка сибирскаго сорокопута была добыта здѣсь 20. I. 1909.

92. *Oriolus galbula* L.

Иволга здѣсь обыкновенна. Прилетѣ ея наблюдался въ 1908 году 13. V (? начали пѣть), въ 1909 году—4. V, и въ 1910 году—30. IV. Самое позднее пѣніе слышалъ 24. VI. 1909.

93. *Anthus arboreus* Briss.

Лѣсной конекъ—гнѣздящаяся здѣсь птица. Въ 1908 году прилетѣ его наблюдался 15. IV (?), 17. V найдено его гнѣздо съ порядочно насиженными яйцами, а 15. VI—съ только-что вылупившимися птенцами. Въ 1909 году прилетѣ передовыхъ особей замѣченъ 5. IV, а валовой—15. IV; 26. VI найдено гнѣздо съ 4 яйцами; отлетѣ наблюдался отъ 18. VIII до 27. IX. Въ 1910 году прилетѣ замѣченъ 9. IV, а отлетѣ—отъ 5. VIII до 17. IX.

94. *Anthus cervinus* Pall.

Осенній пролетѣ краснозобаго конька въ 1908 году наблюдался отъ 21. VIII до 18. IX. Летѣли въ большомъ количествѣ. Въ слѣдующіе годы наблюдались въ небольшомъ числѣ. Въ 1909 году осенній пролетѣ наблюдался отъ 27. VIII до 1. X; валовой пролетѣ замѣченъ 13. IX. Въ 1910 году весенній пролетѣ наблюдался отъ 30. IV до 8. V, а осенній—отъ 27 до 30. VIII. На осеннемъ пролетѣ нерѣдко играютъ въ воздухѣ и гоняются за ласточками. Въ 1909 году наблюдалъ ихъ стайками вмѣстѣ съ *Anthus arboreus* Briss. и *Anthus pratensis* Briss. Крикъ краснозобаго конька можно передать такъ: *псюррись* или *тюррись* и его легко отличить отъ конька лугового, который кричитъ: *сит—сит*.

95. *Anthus pratensis* Briss.

Осенній пролетѣ лугового конька въ 1908 году наблюдался 18. IX, въ 1909 году—отъ 3. IX до 12. X (въ этомъ году ихъ было

особенно много). Въ 1910 году валовой весенній пролетъ замѣченъ 5. IV; осенній пролетъ наблюдался 17. IX. Однажды видѣлъ, какъ пролетные луговые коньки нападали на бѣлыхъ трясогузокъ.

96. *Anthus campestris* L.

Конекъ полевой встрѣчается здѣсь не часто по открытымъ степнымъ холмамъ, гдѣ, вѣроятно, гнѣздится. Весною на такихъ мѣстахъ случается наблюдать самца, сидящаго подобно чекану каменкѣ (*Saxicola oenanthe* L.), на камнѣ или кочкѣ. Слетѣвъ, птица поднимается невысоко и летаетъ въ разныхъ направленіяхъ съ пѣніемъ: *тилюли-тилюм-тилюли*. 22. IV. 1910 былъ добытъ около деревни Сухари-Мажакъ.

97. *Budytes campestris* Pall.

Желтолобая трясогузка здѣсь обыкновенная гнѣздящаяся птица. Прилетъ ее въ 1908 году замѣченъ 15. IV, въ 1909 году—15. IV, а въ 1910 году—10. IV.

98. *Budytes citreola werae* Buturl.

Эта форма желтоголовой трясогузки здѣсь нерѣдка на гнѣздовьяхъ. Прилетъ ее наблюдался въ 1909 году 15. IV, а въ 1910 году—17. IV. Крикъ этой трясогузки походитъ болѣе на крикъ *Motacilla alba* L., чѣмъ на крикъ другихъ *Budytes*.

99. *Motacilla alba* L.

Бѣлая трясогузка здѣсь обыкновенна. Прилетъ ее наблюдался въ 1908 году 28. III, въ 1909 году—26. III, въ 1910 году—30. III (передовыя особи) и 5. IV (валовой пролетъ). Отлетъ происходилъ въ 1908 году отъ 31. VIII до 8. IX, въ 1909 году—отъ 3 до 20. IX и въ 1910 году—отъ 5. VIII до 17. IX.

100. *Sitta uralensis* Licht.

Этотъ поползень здѣсь обыкновененъ. Весною обычно начинается пѣть около 15. III, но иногда и раньше; въ 1910 году—я слышалъ его пѣсню 6. II. Въ концѣ лѣта и осенью начинается кочевать по селамъ; въ 1908 году кочевки начались 20. VII, въ 1907 году—1. VIII (въ большомъ числѣ). Въ 1910 году летающія молодыя наблюдались 21. VI.

101. *Cyanistes coeruleus* L.

Лазоревка зеленая встрѣчается здѣсь довольно часто весной, осенью и зимой, лѣтомъ же рѣдко попадаетъ на глаза ¹⁾.

102. *Poecile borealis* de Selys.

Ганчка—довольно обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица. Осенью и зимой никогда не случалось видѣть ее въ такомъ большомъ количествѣ, какъ въ западной Россіи. Въ 1909 году спарились 17. IV, въ 1910 году—14. IV.

103. *Parus ater* L.

Синицу московку наблюдалъ только одинъ разъ, именно: 30. IX. 1909 въ Саврушинской казенной дачѣ.

104. *Parus major* L.

Синица большая здѣсь обыкновенная осѣдлая птица. Въ 1908 году начали пѣть 15. II; въ мартѣ я наблюдалъ, какъ синицы собирались стайками отъ 15 до 20 особей, громко распѣвали и дрались. Пѣніе здѣшнихъ синицъ иногда напоминаетъ стрекотаніе кузнечика (отсюда, вѣроятно, одно изъ названій этой птицы—„кузнечикъ“). Въ концѣ августа и въ сентябрѣ синицъ бываетъ здѣсь очень много.

105. *Acredula caudata* L.

Долгохвостая синица встрѣчается здѣсь нерѣдко. Въ срединѣ іюня начинаются кочевки этихъ птицъ по садамъ.

106. *Regulus flavicapillus* L.

Этотъ королекъ наблюдался здѣсь на осеннемъ пролетѣ въ 1908 году 31. VIII, въ 1909 году—отъ 14 до 23. IX и въ 1910 году—17. IX.

107. *Locustella locustella* Lath.

Камышевка сверчокъ—не рѣдкая гнѣздящаяся здѣсь птица. Прилетъ ее замѣченъ въ 1908 году—13. V, а въ 1909 году—10. V.

¹⁾ Блѣую лазоревку (*Cyanistes cyaneus* Pall.) ни разу здѣсь не встрѣтилъ, хотя и разыскивалъ нарочно эту птичку во всѣхъ подходящихъ для нея мѣстахъ. *Авт.*

108. *Acrocephalus phragmitis* Bechst.

Камышевка барсучекъ здѣсь гнѣздится. Въ 1910 году осенній пролетъ ее наблюдался 30. VIII.

109. *Hypolais icterina* Vieill.

Малиновка лѣсная встрѣчается здѣсь на гнѣздовѣ не особенно часто. 15. VI. 1910 вблизи села Сосновки наблюдалъ въ лѣсу на вершинахъ деревьевъ много самцовъ, которые пѣли и дрались.

110. *Iduna caligata* Licht.

Бормотушка встрѣчается здѣсь на гнѣздовѣ не рѣже предшествующаго вида. Одинъ поющій самецъ былъ добытъ 23. VI. 1910.

111. *Phylloscopus viridanus* Blyth.

Пѣночка зеленая наблюдалась здѣсь мною на весеннемъ пролетѣ. Одинъ самецъ былъ добытъ 23. V. 1908 въ Саврушинской казенной дачѣ. Нѣсколько дней спустя, я слышалъ пѣніе этой птички въ 31 кварталѣ Сосновско-Архангельской казенной дачи, затѣмъ около села Сосновки. Въ 1909 году ее весенній пролетъ замѣченъ 23 и 24. V, а въ 1910 году—отъ 16. V до 1. VI.

112. *Phylloscopus sibilatrix* Bechst.

Пѣночку желтобровку за все время наблюдалъ здѣсь только однажды, именно: 27. IV. 1910 въ окрестностяхъ села Сосновки.

113. *Phylloscopus trochilus* L.

Пѣночка весничка встрѣчается здѣсь рѣже слѣдующаго вида. Въ 1908 году прилетѣли 21. IV (?); впервые слышалъ пѣніе 1. V. Осенній пролетъ этой птички наблюдался въ 1907 году 4. IX, въ 1908 году—отъ 15. VIII до 26. IX, въ 1909 году—10. IX и въ 1910 году—отъ 23. VIII до 17. IX.

114. *Phylloscopus rufus* Bechst.

Эта пѣночка здѣсь обыкновенна. Прилетъ ее наблюдался въ 1908 году 16. IV, въ 1909 году—10. IV. Въ 1910 году прилетъ передовыхъ особей замѣченъ 7. IV, а валовой—14. IV. От-

летъ наблюдался въ 1907 году—14. IX, въ 1908 году—31. VIII (?), въ 1909 году—отъ 27. VIII до 6. IX и въ 1910 году—отъ 27. VIII до 22. IX.

115. *Sylvia nisoria* Bechst.

Славка ястребиная—рѣдкая гнѣздящаяся здѣсь птица.

116. *Sylvia cinerea* Bechst.

Сѣрая славка здѣсь довольно обыкновенна на гнѣздовѣхъ. Въ 1908 году первое пѣніе ея слышалъ 11. V. Въ 1910 году прилетъ этой птички отмѣченъ 24. IV.

117. *Sylvia curruca* L.

Славка завирушка—обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица. Прилетъ ея наблюдался въ 1908 году—27. IV, въ 1909 году—28. IV и въ 1910 году—30. IV.—17. V. 1908 найдено гнѣздо этой птички съ 1 яйцомъ (начало кладки).

118. *Sylvia atricapilla* L.

Славка черноголовка здѣсь обыкновенная гнѣздящаяся птица. Въ 1908 году прилетѣли 9. V; 3. VI найдено гнѣздо этой славки съ 3 яйцами (неоконченная кладка); 11. X, когда уже начались морозы, была добыта одна самка на опушкѣ лѣса вблизи села Сосновки. Въ 1908 году прилетъ наблюдался 3. V; 21. V найдено гнѣздо съ 5 ненасиженными яйцами, на которыхъ сидѣлъ самецъ.

119. *Accentor modularis* L.

Одинъ самецъ лѣсной завирушки былъ добытъ 3. X. 1910 около села Сосновки.

120. *Erithacus philomela* Bechst.

Соловей здѣсь обыкновенная гнѣздящаяся птица. Прилетъ его замѣченъ въ 1908 году 27. IV, въ 1909 году—27. IV и въ 1910 году—25. IV. Самое позднее пѣніе слышалъ 3. VII. 1908. Въ 1909 году 1. VI найдено гнѣздо съ 3 ненасиженными яйцами; 14. VI наблюдались летающіе молодые. Здѣшніе соловьи поютъ не важно. Пѣніе начинаютъ такъ: *ки-ну, ки-ну, тик, тик*, затѣмъ

слѣдуетъ еще нѣсколько трелей, изъ которыхъ одна замѣчательно похожа на мордовское слово *покитай*. Если вслушаться въ пѣніе соловьевъ, то можно замѣтить, что многіе (если не всѣ) подражаютъ въ пѣсняхъ голосамъ другихъ птицъ. Такъ, одинъ соловей около села Сосновки включалъ въ свою пѣсню крикъ камышевки, дрозда-бѣлобровика, пѣвчаго дрозда и зяблика. Всѣ эти звуки отличить не легко, такъ какъ соловей приспосабливаетъ ихъ къ характеру своего пѣнія и, такъ сказать, облагораживаетъ ихъ.

121. *Cyanecula suecica* L.

Эта варакушка здѣсь обыкновенна. Прилетъ ее замѣченъ въ 1908 году 13. IV, въ 1909 году—12. IV и въ 1910 году—14. IV. Осенній пролетъ наблюдался въ 1908 году отъ 26. IX до 6. X; летѣли въ большомъ количествѣ. 19. VIII. 1909 и 19. VI. 1910 въ кустарникахъ въ устьѣ р. Молочной мнѣ пришлось добыть двухъ варакушекъ, у которыхъ средняя часть зоба окрашена была въ бѣлый и ржавый цвѣта. По всей вѣроятности, птицы эти являлись помѣсями между *Cyanecula suecica* L. и *C. leucoscyana* Brehm.

122. *Erithacus rubecula* L.

Зарянка была замѣчена здѣсь на осеннемъ пролетѣ въ 1908 году отъ 30. IX до 23. X, въ 1909 году—24. IX и въ 1910 году—отъ 17. IX до 2. X. Въ 1908 году этихъ птичекъ было много, а въ слѣдующіе годы совсѣмъ мало.

123. *Ruticilla phoenicurus* L.

Горихвостка лысушка—обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица. Прилетъ ея наблюдался въ 1908 году 17. IV, въ 1909 году—17. IV и въ 1910 году—10. IV. Отлетъ замѣченъ въ 1907 году 4. IX, въ 1909 году—отъ 27. VIII до 23. IX и въ 1910 году—отъ 12. IX до 2. X. Въ 1910 году птички эти летѣли въ большомъ количествѣ. 16. IV. 1910 слышалъ горихвостку, которая въ концѣ своей коротенькой пѣсни включала голоса другихъ птицъ, именно: синицы, чечевицы, дрозда и трясогузки.

124. *Pratincola rubetra* L.

Чеканъ луговой на гнѣздовѣ здѣсь обыкновененъ. Прилетъ его замѣченъ въ 1908 году 21. IV, въ 1909 году—17. IV, Отлетъ въ 1910 году наблюдался 16. VIII.

125. *Pratincola maura* Pall.

Азіатскій черноголовый чеканъ встрѣчается здѣсь, повидимому, очень рѣдко: видѣлъ лишь одного 28. V. 1910 около Бугуруслана.

126. *Saxicola oenanthe* L.

Чеканъ каменка здѣсь обыкновененъ. Прилетъ его наблюдался въ 1908 году 13. IV (?), въ 1909 году — 8. IV, въ 1910 году — 2. IV (передовыя особи) и 7. IV (валовой прилетъ). Отлетъ замѣченъ въ 1909 году — 19. VIII, въ 1910 году — отъ 5. VIII до 8. IX.

127. *Merula merula* L.

Черный дроздъ — не рѣдкая гнѣздящаяся здѣсь птица. Въ 1910 году прилетъ его замѣченъ 6. IV (начали пѣть), а отлетъ — 22. IX. — 24. VI. 1908 видѣлъ перепархивающихъ молодыхъ.

128. *Turdus iliacus* L.

Дроздъ бѣлобровый на гнѣздовьяхъ здѣсь довольно рѣдокъ. Въ 1909 году валовой прилетъ его замѣченъ 12. IV. Въ 1910 году прилетъ наблюдался 6. IV (начали пѣть), а отлетъ — 6. X. Пѣніе бѣлоброваго дрозда состоитъ изъ громкихъ звуковъ: *три-трю-трю-трю-трю*, между которыми вставляется (слышная лишь на близкомъ разстояніи) комбинація изъ голосовъ другихъ птицъ.

129. *Turdus musicus* L.

Дроздъ пѣвчій здѣсь обыкновенная гнѣздящаяся птица. Прилетъ его наблюдался въ 1909 году — 4. IV, а въ 1910 году — 1. IV. Отлетъ происходилъ въ 1908 году отъ 17. IX до 9. X, въ 1909 году — отъ 7. IX до 4. X и въ 1910 году — отъ 22. IX до 8. X. — 14. VI. 1909 видѣлъ летающихъ молодыхъ. 15. IV. 1910 найдено его гнѣздо съ первымъ положеннымъ яйцомъ.

130. *Turdus pilaris* L.

Весенній пролетъ дрозда рябинника въ 1909 году замѣченъ 2. IV. Осенній пролетъ въ 1907 году наблюдался 25. X, а въ 1910 году — 21. X. На осеннемъ пролетѣ никогда не встрѣчается здѣсь болѣе или менѣе значительными стаями.

131. *Turdus viscivorus* L.

Дроздь деряба—обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица. Прилетъ его наблюдался въ 1908 году—6. IV, въ 1909 году—2. IV и въ 1910 году—1. IV. Отлетъ замѣченъ въ 1908 году 5. IX, въ 1909 году—27. IX и въ 1910 году—отъ 22 до 30. IX. Пѣніе дерябы весьма похоже на пѣніе чернаго дрозда, только трели онъ высвистываетъ гораздо быстрее, дѣлая между ними очень короткую паузу.



Къ орнитологической фаунѣ Московской губерніи.

Г. И. Поляковъ.

Zur ornithologischen Fauna des Moskauer Gouvernements.

Von G. I. Poljakow.

Изъ доклада, прочитаннаго на засѣданіи Комиссіи для изслѣдованія фауны Московской губерніи (въ Зоологическомъ Музеѣ Имп. Московскаго Университета) 3-го декабря 1911 года.

Calidris leucoccephala (Pall).

Въ компилятивныхъ работахъ профес. М. А. Мензбира ¹⁾ и С. А. Бутурлина ²⁾ указывается, что песчанка въ центральной части Европейской Россіи наблюдалась въ качествѣ рѣдкой пролетной (по мнѣнію перваго, неправильно пролетной) птицы въ губерніяхъ Тверской и Ярославской.

О нахожденіи песчанки въ Московской губерніи имѣется свѣдѣніе лишь въ статьѣ К. А. Сатунина въ „Corrigenda et Ad-denda“ къ „Опыту каталога Московской фауны“, ³⁾ гдѣ птица эта приводится со знакомъ *tr* (т.-е. какъ пролетный рѣдкій видъ), при чемъ со ссылкой на работу профес. М. А. Мензбира. Работа эта—„Revue comparative de la faune ornithologique des gouvernements de Moscou et de Toula“ ⁴⁾. Здѣсь въ спискѣ птицъ М. А. Мензбиръ приводитъ песчанку безъ номера и лишь со знаками вопроса какъ для Московской, такъ и для Тульской

¹⁾ „Птицы Россіи“, т. I, стр. 242. „Охотничьи и Промысловыя птицы Европ. Россіи и Кавказа“, т. I, стр. 211.

²⁾ „Синоптическія таблицы охотничьихъ птицъ Россійской Имперіи“, стр. 33. „Кулики Россійской Имперіи“, выпускъ II, стр. 243.

³⁾ „Primitiae Faunae Mosquensis“, стр. 2.

⁴⁾ Изданіе Имп. Моск. Общ. Испытателей Природы, 1883 г.

губерніи; въ примѣчаніи же на страницѣ 30-ой онъ указываетъ, что въ его коллекціи имѣется экземпляръ самки этого вида отъ 12. IX изъ-подъ Ростова, Ярославской губерніи, а потому возможно думать, что эта птица бываетъ на пролетѣ и въ Московской губерніи. Такимъ образомъ, судя по литературнымъ даннымъ, возможно заключить, что въ предѣлахъ нашей губерніи песчанка еще не была добыта.

29. VIII. 1911 мнѣ удалось наблюдать одну песчанку на Монастырскомъ (Бисеровскомъ) озерѣ, въ Богородскомъ уѣздѣ. Я засталъ ее здѣсь рано утромъ на песчаной отмели значительно усохшаго въ этомъ году озера. Никакихъ другихъ куличковъ поблизости замѣчено не было.

Добытая птица оказалась молодой самкой еще въ полномъ гнѣздовомъ опереніи (безъ слѣдовъ перваго зимняго наряда).

Урира ероps Linn.

Благодаря любезности Ф. С. Щербакова, мною полученъ угодъ, добытый въ апрѣлѣ прошлаго (1911) года на полѣ вблизи села Лужки, на самомъ берегу Оки, въ Серпуховскомъ уѣздѣ. Здѣсь же 22. IV была добыта еще одна птица этого вида. Она передана Ф. С. Щербаковымъ въ Зоологическій Музей Имп. Московскаго Университета.

Г. Вучетичъ говорилъ мнѣ, что въ этомъ же (1911) году парочка уодовъ наблюдалась имъ въ теченіе лѣта вблизи Старой Каширы, въ Коломенскомъ уѣздѣ.

Nucifraga caryocatactes macrorhynchus Brehm. и *N. c. caryocatactes* (Linn.).

Въ связи съ массовымъ появленіемъ тонкоклювой орѣховки въ 1911 году, уже отмѣченнымъ въ печати для нѣкоторыхъ частей Европейской Россіи, а также и западной Европы ¹⁾, въ нашей мѣстности, т.-е. въ имѣніи „Саввино“ и его ближайшихъ окрестностяхъ (частью Богородскій и Московскій уѣзды) наблюдалось появленіе орѣховокъ западной формы.

Какъ я уже сообщалъ во 2-ой книжкѣ „Орнитологическаго Вѣстника“ за 1911 годъ, въ означенной мѣстности орѣховка,

¹⁾ „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1911 годъ, кн. 3—4; „Семья Охотниковъ“ за 1911 годъ, №№ 15—16 и 19; „Ornithologische Monatsberichte“ за 1911 годъ, №№ 11 и 12.

вообще говоря, наблюдалась мною за все время изслѣдованій только одинъ разъ, именно: 5. X. 1908 одну птицу я видѣлъ въ смѣшанномъ, преимущественно еловомъ лѣсу, на берегу Монастырскаго озера (вблизи деревни Черной), въ Богородскомъ уѣздѣ. Въ минувшемъ (1911) году орѣховка появилась у насъ въ большомъ числѣ. Впервые она была замѣчена мною 14. VIII въ имѣнїи г-на Миронова, вблизи села Троицкаго, въ Московскомъ уѣздѣ. Съ этого дня орѣховки часто попадались въ нашей мѣстности до 28. VIII, и мнѣ удалось добыть ихъ въ количествѣ 6 экземпляровъ, изъ которыхъ два оказались типичными представителями тонкоклювой формы, *N. с. masgorynchus* Brehm, и два—западной, *N. с. сагуосатаctes* (Linn.). Остальные же птицы по структурѣ ихъ клювовъ являлись особями переходной формы.

Такими же переходными особями оказались двѣ орѣховки, полученныя мною изъ Звенигородскаго уѣзда, гдѣ онѣ были добыты изъ числа четырехъ, замѣченныхъ 14. VIII въ имѣнїи „Завѣтово“ С. В. Морозова.

О массовомъ появленїи орѣховки въ этомъ году въ разныхъ частяхъ Московской губернїи мнѣ пришлось слышать отъ многихъ знакомыхъ охотниковъ. Въ мастерскую покойнаго Ф. К. Лоренца было доставлено для изготовленїя чучелъ 12 орѣховокъ, при чемъ съ 12 по 27. VIII здѣсь было получено 7 экземпляровъ, 10 и 27. IX—3 экземпляра и 8. X—2 экземпляра. Среди этихъ птицъ были *N. с. masgorynchus* Brehm, *N. с. сагуосатаctes* (Linn.) и переходныя особи.

Орѣховки, появившіяся въ нашей мѣстности, держались главнымъ образомъ въ смѣшанныхъ лѣсахъ, встрѣчаясь въ одиночку, парочками и тройками. Только разъ 28. VIII удалось мнѣ замѣтить сразу четыре особи, пролетѣвшія около 10 часовъ утра надъ березнякомъ у моего дома, въ имѣнїи „Саввино“.

Въ желудкахъ добытыхъ мною орѣховокъ оказались главнымъ образомъ ягоды крушины, навозные жуки, кузнечики и зеленые гусеницы.

***Emberiza aureola* Pall.**

Дубровникъ въ 1911 году въ качествѣ многочисленной птицы наблюдался въ долину Оки вблизи Старой Каширы, въ Коломенскомъ уѣздѣ. Въ означенной мѣстности 29 и 30. V этого

года здѣсь ее наблюдалъ В. Г. Дуровъ, а 8 и 9. VI посланный мною препараторъ безъ труда добылъ 24 экземпляра.

Препараторъ сообщилъ мнѣ, что дубровниковъ онъ находилъ главнымъ образомъ на заливномъ лугу въ заросляхъ конского щавеля.

***Loxia bifasciata* Brehm.**

Съ 2. IX по 22. X прошлаго (1911) года наблюдалось мною въ Богородскомъ уѣздѣ появленіе бѣлокрылаго клеста.

Приблизительно въ теченіе этого же времени его въ большомъ количествѣ привозили по праздникамъ въ Москву на птичій рынокъ (на Трубной площади). Насколько мнѣ извѣстно, сюда бѣлокрылые клесты доставлялись птицеловами главнымъ образомъ изъ окрестностей деревень: Кунцево, Мазилово и Нѣмчиново (Московскій уѣздъ). Не мало ловили ихъ въ Останкинѣ и вблизи Измайловскаго Звѣринца (ближайшія окрестности Москвы). Большой привозъ вызвалъ сильное пониженіе цѣны, дошедшей до 35 копѣекъ за экземпляръ, между тѣмъ какъ въ 1910 году птичку эту удавалось пріобрѣтать здѣсь не дешевле, какъ за 3 рубля 50 коп. Бѣлокрылые клесты продавались на рынкѣ и позднѣе, почти до конца ноября, но это были птицы, наловленные ранѣе и оставшіяся не проданными въ предшествующіе праздники.

Благодаря любезному сообщенію Ф. С. Щербакова, мнѣ извѣстно о появленіи *Loxia bifasciata* Brehm въ окрестностяхъ Серпухова. Исчезли эти птицы здѣсь около 8. XI.

Съ бѣлокрылыми клестами на рынокъ привозили птицеловы въ довольно большомъ числѣ и клестовъ—сосновиковъ, *Loxia pityopsittacus* Bechst., которые, насколько мнѣ удалось выяснить, появились въ нашей губерніи немного позднѣе. Среди сосновиковъ типичные экземпляры, т.-е. птицы съ очень массивнымъ клювомъ, попадались рѣдко.

***Lanius excubitor* Linn.**

Свѣдѣнія о распространеніи большого сорокопута въ предѣлахъ Московской губерніи, судя по имѣющейся въ моемъ распоряженіи литературѣ, крайне разнорѣчивы. Такъ, М. А. Мензбиръ въ „Revue comparative de la faune ornithologique des gou-

vernements de Moscou et de Toulou" ¹⁾ и К. А. Сатунинъ въ „Опытъ каталога представителей Московской фауны“ ²⁾ отмѣчаютъ его нашей болѣе или менѣе обыкновенной пролетной, гнѣздящейся и осѣдлой птицей ³⁾. Ф. К. Лоренцъ же въ „Die Vögel des Moskauer Gouvernements“ ⁴⁾ говоритъ, что этотъ сорокопутъ здѣсь осенью и весною не рѣдокъ, зимою встрѣчается рѣже, а въ качествѣ гнѣздящейся птицы былъ найденъ имъ только однажды — въ іюнѣ 1868 года въ Богородскомъ уѣздѣ. Свѣдѣніе о малочисленности гнѣздящихся особей большого сорокопута въ предѣлахъ нашей губерніи подтверждается покойнымъ Ф. К. Лоренцемъ и позднѣе, именно въ его письмѣ отъ 15. I. 1906 С. В. Морозову, въ которомъ онъ между прочимъ сообщаетъ: „Здѣсь я встрѣчалъ большого сорокопута (*Lanius excubitor*) въ его разныхъ подвидахъ во время осенняго и весенняго пролетовъ и изрѣдка зимою. Гнѣздится же онъ въ Московской губерніи чрезвычайно рѣдко. Я встрѣтилъ его здѣсь гнѣздящимся лишь одинъ разъ, именно въ іюнѣ въ Богородскомъ уѣздѣ. Молодые уже вылетѣли изъ гнѣзда, но еще плохо летали. Мнѣ удалось тогда добыть трехъ птенцовъ и старую самку“.

30. V. 1911 былъ найденъ выводокъ большого сорокопута въ Можайскомъ уѣздѣ Е. В. Тарасовымъ, уже второй годъ любезно собирающимъ здѣсь птицъ для моей коллекціи. Выводокъ этотъ держался на дубовой поруби у дороги, вблизи станціи „Бородино“ (Московско-Брестской желѣзной дороги). Состоялъ онъ изъ двухъ старыхъ птицъ и четырехъ птенцовъ. Послѣдніе еще не умѣли летать. Самка и всѣ молодые были добыты.

О наблюденіи *Lanius excubitor* Linn. въ предѣлахъ Московской губерніи въ моемъ дневникѣ имѣются лишь слѣдующія записи.

3. X. 1910 одна взрослая птица была замѣчена мною днемъ въ смѣшанномъ лѣсу имѣнія „Троицкое“ И. К. Полякова, въ Московскомъ уѣздѣ.

7. IV. 1911, около 6 часовъ вечера, я наблюдалъ двухъ птицъ на ольхахъ среди лугового болота, вблизи деревни Темниково, въ Московскомъ же уѣздѣ. Несмотря на мое преслѣдованіе, птицы упорно держались одного мѣста, но были крайне осторожны и

¹⁾ Изданіе Имп. Моск. Общества Испытателей Природы, 1883 г. Стр. 7.

²⁾ „Primitiae Faunae Mosquensis“, 1892 г. Стр. 8.

³⁾ Въ обѣихъ названныхъ работахъ птица эта приведена съ пометкою *ins.*

⁴⁾ 1894 г. Стр. 90.

не допускали къ себѣ на вѣрный ружейный выстрѣлъ. На другой день здѣсь же и въ это же время я видѣлъ одного большого сорокопута.

4. IV. 1911 одинъ самецъ былъ добытъ вблизи имѣнія „Завѣтово“ С. В. Морозова, въ Звенигородскомъ уѣздѣ.

10. IV. 1911 одинъ самецъ былъ убитъ вблизи станціи „Подсолнечное“ Николаевской желѣзной дороги, въ Клинскомъ уѣздѣ.

Кромѣ того, въ моей коллекціи имѣется два экземпляра большого сорокопута: взрослый самецъ, добытый 19. XII. 1910 вблизи деревни Кунцево, въ Московскомъ уѣздѣ, и взрослая самка, пойманная 24. III. 1911 у деревни Мазилово, того же уѣзда.

Интересно, что въ Покровскомъ уѣздѣ ¹⁾, Владимірской губерніи, сорокопутъ этотъ на гнѣздовьи не рѣдокъ.

Periparus ater (Linn.).

Какъ извѣстно, обиліе синичекъ московокъ на пролетахъ въ Московской губерніи наблюдается не ежегодно.

Въ теченіе октября 1911 года птичка эта была очень многочисленна въ Богородскомъ уѣздѣ. Приблизительно въ это же время ее въ большомъ числѣ доставляли въ Москву на птичій рынокъ изъ окрестностей деревень Мазилово, Кунцево и Нѣмчиново (Московскій уѣздъ).

Въ нашей мѣстности, т.-е. въ имѣніи „Саввино“ и его ближайшихъ окрестностяхъ (частью Богородскій и Московскій уѣзды) синичка москковка держалась въ это время главнымъ образомъ по смѣшаннымъ лѣсамъ, встрѣчаясь какъ отдѣльными стаиками, такъ и въ сообществѣ гапчекъ [*Penthestes borealis* (Sel.)] и большихъ синицъ (*Parus major* Linn.). Въ одномъ изъ такихъ сообществъ мнѣ удалось 20. X замѣтить и добыть одну самку *Sitta europaea sibirica* Pall.

Acrocephalus aquaticus Temm.

Судя по имѣющейся въ моемъ распоряженіи литературѣ, камышевка вертлявая отмѣчается мною для нашей губерніи впервые.

Эту камышевку въ числѣ трехъ особей я нашелъ 6. VII. 1911 въ Черновскомъ урочищѣ Никольско-Аверкиевской казенной дачи, въ Богородскомъ уѣздѣ. Птички держались здѣсь

¹⁾ Граничащемъ съ Богородскимъ уѣздомъ нашей губерніи.

въ заросляхъ камыша, среди трудно проходимоѣ топи уже сильно зарастающаго карьера выработаннаго торфяного болота.

Добытый мною экземпляръ оказался молодою (даннаго года) самочкою, въ гнѣздовомъ нарядѣ, безъ признаковъ наступленія первой линьки. Судя по времени находженія, возможно предположить, что птичка эта была изъ числа выведшихся въ означенной мѣстности.

Интересно, что въ болѣе южной Тульской губерніи вертячая камышевка найдена профес. П. П. Сушкинымъ лишь дважды, по одному экземпляру на весеннемъ и осеннемъ пролетахъ. Лѣтомъ же, несмотря на всѣ старанія, П. П. Сушкину этой птички здѣсь найти не удалось ¹⁾. Насколько мнѣ извѣстно, въ Рязанской и Смоленской губерніяхъ она не найдена.

Phylloscopus viridanus Blyth.

Пѣночка зеленая въ минувшемъ (1911) году часто встрѣчалась въ предѣлахъ нашей губерніи, а въ нѣкоторыхъ частяхъ ея даже считалась обыкновенной птицей. Въ качествѣ послѣдней, по словамъ В. В. Станчинскаго, она наблюдалась въ паркѣ Московскаго Сельскохозяйственнаго Института, въ Петровско-Разумовскомъ. С. И. Огневъ, не разыскивая, добылъ три экземпляра этого вида въ Тесовскомъ удѣльномъ имѣніи, въ Можайскомъ уѣздѣ.

Самому же мнѣ удалось добыть лишь одну зеленую пѣночку—взрослаго самца 23. VI. 1911 въ имѣніи „Мотяково“ князя С. М. Голицына, въ Московскомъ уѣздѣ.

Sylvia nisoria (Bechst.).

О гнѣздованіи ястребиной славки въ Московской губерніи извѣстно съ 1866 года изъ сообщенія Л. П. Сабанѣева, указывавшаго, что она встрѣчается и гнѣздится здѣсь рѣже всѣхъ остальныхъ представителей рода *Sylvia* ²⁾. Позднѣе эта славка въ качествѣ болѣе или менѣе обыкновенной гнѣздящейся птицы приводится профес. М. А. Мензбиромъ въ „Revue comparative de la faune ornithologique des gouvernements de Moscou et de

¹⁾ П. П. Сушкинъ: „Птицы Тульской губерніи“ (1891 г.), стр. 76.

²⁾ Л. П. Сабанѣевъ: „Замѣтка о птицахъ Московской губерніи“ (Извѣстія Общества Любителей Естествознанія, т. III, вып. I, 1866 г.).

Toula“¹⁾ и К. А. Сатунинымъ въ «Опытъ каталога представителей Московской фауны“²⁾. Ф. К. Лоренцъ въ „Die Vögel des Moskauer Gouvernements“³⁾ говоритъ, что ястребиная славка, какъ гнѣздящаяся птица совсѣмъ не рѣдка на Воробьевыхъ горахъ и въ садахъ близлежащихъ деревень. Однако, насколько мнѣ извѣстно, никому изъ позднѣйшихъ изслѣдователей этого вида въ предѣлахъ нашей губерніи на гнѣздовья найти не удалось.

10. VI. 1911 я нашелъ гнѣздо ястребиной славки въ выработанной части большого торфяного болота Никольско-Аверкиевской казенной дачи, въ Богородскомъ уѣздѣ. Гнѣздо находилось вблизи дороги, пересѣкающей болото, въ старомъ, невполнѣ осушенномъ и сильно заросшемъ осокою карьерѣ. Устроено оно было подъ прикрытіемъ вѣтвей небольшого ивового кустика, совсѣмъ не виднаго издали въ высокой осоцѣ, на высотѣ четырехъ вершковъ надъ водою. Держалось же оно главнымъ образомъ на лежащемъ сухомъ осиновомъ сучкѣ и отчасти на пучкѣ прошлогодней засохшей осоки.

Гнѣздо, построенное очень непрочо, неправильной продолговатой формы.

Размѣры его слѣдующіе:

длина.....	около 200	м.м.
ширина.....	” 125	”
высота.....	” 72	”
діаметръ лоточка.....	” 75	”
глубина ”.....	” 40	”

Матеріаломъ для гнѣзда послужили главнымъ образомъ стебли, листья и корни различныхъ травянистыхъ растений. Внутреннія стѣнки и лоточекъ выстланы конскимъ волосомъ.

Въ гнѣздѣ оказалось 5 еще совсѣмъ маленькихъ, голыхъ птенцовъ. Птенцы эти вмѣстѣ съ ихъ самцомъ и самкою хранятся въ моей коллекціи.



¹⁾ Изданіе Имп. Московск. Общества Испытателей Природы, (1883 г.) стр. 6.

²⁾ «Primitiae Faunae Mosquensis» (1892 г.), стр. 8. Въ обѣихъ работахъ видъ этотъ приводится съ пометкою ».

³⁾ 1894 г. Стр. 98.

Интересныя находки въ Тарскомъ уѣздѣ, Тобольской губерніи.

В. Е. Ушаковъ.

Interessante Funde im Tarsker Kreise des Tobolschen Gouvernements.

Von W. E. Uschakow.

Насколько мнѣ удалось выяснитъ по литературнымъ даннымъ¹⁾, приводимые ниже 5 видовъ птицъ отмѣчаются для Тарскаго уѣзда впервые.

Fuligula rufina Pall.

16. IV. 1911 (ст. ст.) въ 40 верстахъ отъ города Тары, въ окрестностяхъ села Устьтарскаго, добытъ изъ пары самецъ красноносаго нырка. Судя по болѣе скромной окраскѣ второй, не добытой, птицы, возможно предположить, что это была самка того же вида. Добытый экземпляръ въ настоящее время находится въ моей коллекціи.

Totanus stagnatilis Bechst.

21. IV. 1911 (ст. ст.) вблизи Тары была добыта самка поручейника. 30. IV. 1911 (ст. ст.) въ 7 верстахъ отъ Тары удалось

¹⁾ П. Я. Словцовъ: «Списокъ позвоночныхъ Тюменскаго округа и ихъ распространіе въ Тобольской губерніи»; С. Н. Алфераки: «Утки Россіи»; М. А. Мензбиръ: «Птицы Россіи»; С. А. Бутурлинъ: «Синоптическія таблицы»; А. Морозовъ: «Списокъ птицъ Акмолинской области и прилегающихъ мѣстностей Тобольской и Томской губерніи»; В. Л. Біанки: «Матеріалы для орнитофауны Акмолинской области»; Г. Э. Іоганзенъ: «Матеріалы для орнитофауны степей Томскаго края» и статья въ „*Ornit. Jahrb.*“ за 1902 г. Авт.

добыть вторую самку этого же вида. Въ яичникѣ послѣдней были довольно большія яйца. Въ теченіе этой весны я часто видѣлъ поручейниковъ, встрѣчавшихся здѣсь преимущественно парочками.

***Pastor roseus* Linn.**

Одна самка этого вида была добыта въ стайкѣ обыкновенныхъ скворцовъ 17. V. 1909 (ст. ст.) вблизи Тары. Шкурка этой птицы находится въ коллекціи С. А. Бутурлина.

***Pratincola rubetra* Linn.**

Луговой чеканъ былъ добытъ 8. VI. 1910 (ст. ст.) вблизи Тары. Экземпляръ этотъ болѣе подходитъ къ западной формѣ, чѣмъ къ подвиду *Pratincola rubetra margarite*, описанному Г. Э. Юганzenомъ въ „Матеріалахъ для орнитофауны степей Томскаго края“. Шкурка этой птицы послана для провѣрки опредѣленія проф. М. А. Мензбиру.

***Astur candidissimus* Dyb.**

Одинъ молодой бѣлый ястребъ добытъ вблизи Тары въ октябрѣ 1910 года. Птица эта вцѣпилась въ одно изъ чучелъ, разставленныхъ мѣстнымъ охотникомъ при охотѣ на тетеревовъ. Экземпляръ опредѣленъ С. А. Бутурлинымъ.



Гнѣздовья куличка-лопатня.

С. А. Бутурлинъ.

Breeding grounds of *Eurynorhynchus pygmaeus* Linn.

By S. A. Buturlin.

Въ № 2 „Орнитологическаго Вѣстника“ за 1911 годъ я уже говорилъ о сенсационномъ открытіи гнѣздовій куличка-лопатня въ той формѣ, въ какой свѣдѣнія о томъ проникли въ печать въ концѣ 1910 года. Теперь предо мною лежитъ болѣе обстоятельный и болѣе вѣрный отчетъ самого виновника этого событія,—статья Джона Тайера въ апрѣльской книжкѣ „The Auk“ за 1911 годъ (стр. 153—155 и 2 цвѣтныхъ таблицы).

Джонъ Тайеръ, владѣлецъ великолѣпнаго Орнитологическаго Музея въ Ланкастерѣ, уже давно пытался добыть яйца этого удивительнаго куличка. Нѣсколько лѣтъ назадъ я сообщалъ о гибели на сѣверо-восточномъ берегу Сибири одной изъ посланныхъ имъ экспедицій, когда спасся лишь норвежецъ Іоганъ Куринъ, знакомый мнѣ по поѣздкѣ на Колгуевъ въ 1902 году.

Весной 1910 года г. Тайеръ послалъ экспедицію подъ руководствомъ Іогана Курина на землю Врангеля, которую американцы считаютъ своею, такъ какъ первые высаживались на нее на нѣсколько часовъ, хотя по злосчастному договору о продажѣ Аляски этотъ островъ отходилъ къ намъ. І. Курина было поручено коллектировать на пути туда, перезимовать на землѣ Врангеля и въ слѣдующемъ 1911 году начать коллектированіе весною какъ можно раньше. Было куплено судно, набранъ экипажъ и экспедиція отправилась изъ Ситля 1 мая (18 апрѣля ст. ст.). Сильная буря 13-го (1-го) мая привела судно въ такое состояніе,

что рѣшено было вернуться и нанять другое. Но это оказалось невозможнымъ и І. Куринъ съ двумя людьми изъ экипажа сѣлъ на торговое судно, намѣревавшееся пройти вдоль сѣвернаго берега Чукотской земли.

І. Куринъ надѣялся высадиться близъ Мыса Сердце-Камень и найти гнѣзда куличка-лопатня, такъ какъ въ 1911 году ему удалось добыть здѣсь нѣсколько экземпляровъ этой птицы. Но пловучій ледъ оказался такъ густъ, что капитанъ боялся riskовать судномъ, и имъ пришлось вернуться назадъ безъ высадки на берегахъ Сибири.

Однако капитанъ Ф. Клейншмидтъ, отправившійся въ коммерческую и коллекторскую поѣздку недѣлей раньше І. Курина, т.е. еще въ первой половинѣ апрѣля ст. ст., умудрился добратъся до мыса Сердце-Камень ($67^0\ 3'$ сѣв. шир. и $8\frac{1}{2}^0$ запад. долг. отъ Гринв., самый сѣверо-восточный мысъ Чукотскаго полуострова). Ему удалось найти 15-го (2-го) іюля гнѣздо съ четырьмя почти вполне насиженными яйцами и добыть изъ нѣсколькихъ выводковъ восемь пуховыхъ птенцовъ.

Весьма интересно, что даже у только что вылупившихся птенцовъ лопаточка вершины клюва развита относительно такъ же хорошо, какъ и у взрослыхъ, что говоритъ за значительную древность этой оригинальной формы. Только у пуховиковъ вершинка лопатки вытянута болѣе впередъ, а боковые выступы болѣе закруглены и не такъ оттянуты впередъ, такъ что въ общемъ лопаточка имѣетъ гораздо болѣе сердцеобразную форму. Кромѣ того, основная, цилиндрическая часть клюва сильно укорочена, такъ что на лопаточку приходится не одна, а почти двѣ трети длины клюва.

Судя по изображеннымъ головкамъ, окраска пуховиковъ кулика-лопатня, менѣе ржавая, болѣе охристая,—не только по сравненію съ пуховиками кулика-дутьша (*Tringa maculata*) или песчанки (*Calidris leucorhaea*), но даже и куличка-воробья (*Tringa minuta*), хотя къ послѣднимъ эти пуховички очень близки.

Размѣры яицъ, въ дюймахъ, Дж. Тайеръ даетъ такіе: 1.20×0.92 ; 1.22×0.90 ; 1.20×0.88 ; 1.30×0.90 . По красотѣ окраски онѣ далеки отъ яицъ кулика-воробья (*Tringa minuta*). Основной цвѣтъ ихъ гораздо менѣе оливковый, скорѣе зеленовато-сѣровато-охристый, довольно равномерно и очень густо испещренный мелкими темными пятнышками. Такимъ образомъ онѣ напо-

минають яйца бонапартова песочника (*Tringa fuscicollis*) или наиболѣе мелко испещренныя яйца бѣлохвостика (*Tringa temminckii*) и поплавокъ (*Phalaropus*). Конечно, пока мы можемъ судить только по одной кладкѣ.

По сообщеніямъ капитана Ф. Клейншмидта, какъ гнѣздо, такъ и выводки попались ему на мягкихъ склонахъ тундры, прилегающихъ къ небольшимъ прѣснымъ озеркамъ или лужамъ, столь обычнымъ на тундрѣ. Гнѣздо представляло собою округленное углубленіе во мху, довольно густо устланное сухими ивовыми листьями. Высиживаетъ, повидимому, одинъ самецъ, хотя и самка была—можетъ быть, случайно добыта близъ гнѣзда. Съ птенцами же попадались исключительно самцы. Такимъ образомъ, и у курьезнаго куличка-лопатня существуетъ, судя по этимъ интереснымъ наблюденіямъ, такое же своеобразное отношеніе между полами, какое доказано для куликовъ-поплавокъ, цвѣтныхъ бекасовъ и немногихъ другихъ птицъ. Надо замѣтить, что у куличка-лопатня,—какъ, впрочемъ, у кроншнеповъ и нѣкоторыхъ другихъ парно живущихъ куликовъ,—самка нѣсколько крупнѣе самца. Въ яркости же окраса по музейскимъ экземплярамъ разницы я не замѣчалъ.

Пуховички очень подходятъ къ окраскѣ мха и отыскивать ихъ капитанъ Клейншмидтъ находилъ весьма затруднительнымъ.

Въ 1911 году г. Тайеръ предполагалъ опять послать І. Курина къ мысу Сердце-Камень, чтобы собрать большій матеріалъ.

Съ нахожденіемъ яицъ розовой чайки [*Rhodostethia rosea* (Mc. G.) въ 1905 году мною], бекасовиднаго веретенника [*Pseudoscophax taczanowski* Verril. въ 1908 году В. Е. Ушаковымъ] и кулика-лопатня [*Egypthopus rufmaeus* (Linn.) въ 1910 году капитаномъ Ф. Клейншмидтомъ]—въ нашихъ предѣлахъ не остается болѣе *родовъ* птицъ, яйца которыхъ были бы неизвѣстными, но *видовъ* такихъ есть еще очень не мало, и энергія американскихъ изслѣдователей могла бы служить намъ хорошимъ примѣромъ.



Phalacrocorax carbo Linn. въ Смоленской губерніи.

Г. Л. Граве.

Phalacrocorax carbo Linn. im Gouvernement Smolensk.

Von G. L. Graue.

13. X. 1911 (ст. ст.) была добыта на пруду сельца Яковлевки, Ельнинскаго уѣзда, и любезно прислана мнѣ О. Н. Майеръ молодая самка большого баклана (*Phalacrocorax carbo* Linn.). Птица эта прилетѣла на прудъ еще наканунѣ вечеромъ и до утра пробыла въ сообществѣ домашнихъ утокъ ¹⁾).

До сихъ поръ, какъ мнѣ извѣстно, большой бакланъ не былъ наблюдаемъ въ Смоленской губерніи.

Такимъ образомъ, списокъ птицъ этой губерніи обогатился еще однимъ видомъ и, по имѣющимся въ моемъ распоряженіи свѣдѣніямъ, достигъ въ настоящее время 240 видовъ.



1) Объ этомъ же случаѣ, но безъ точнаго указанія времени, сообщаетъ В. Каверзневъ въ „Замѣткѣ“, напечатанной въ № 23 журнала „Наша Охота“ (стр. 53) за 1911 годъ. Не говоритъ авторъ также о полѣ и возрастѣ добытой птицы.

Нахожденіе большого баклана въ Смоленской губерніи не является неожиданностью: двѣ птицы этого вида были добыты 21. XI. 1891 въ Волоколамскомъ уѣздѣ, Московской губерніи (Г. И. Поляковъ: „Къ орнитологической фаунѣ Московской губерніи. Птицы отрядовъ: *Pygopodes*, *Longipennes*, *Lamellirostrès* и *Steganopodes*“). „Матер. къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи“, отд. зоологич., вып. X, 1910 г.). *Ред.*

Нѣсколько словъ къ вопросу о стремленіи птицъ расширить свою гнѣздовую область.

Г. Л. Граве.

Zur Frage über die Neigung der Vögel zur Erweiterung ihres Nistgebietes.

Von G. L. Graue.

Лѣтъ семнадцать тому назадъ, когда я впервые началъ свои наблюденія надъ птицами Смоленской губерніи, въ западной части Вяземскаго уѣзда дроздъ бѣлобровый (*Turdus iliacus* Linn.) на гнѣздовѣ былъ не многочисленъ. Хотя видѣть и слышать птицу эту можно было каждое лѣто, но для этого ее приходилось искать, такъ какъ далеко не каждая подходящая станція была ею занята.

Съ 1897 года бѣлобровикъ сталъ встрѣчаться все въ большемъ и большемъ количествѣ, заполняя всѣ удобныя мѣста, а въ настоящее время это уже весьма обыкновенный дроздъ всего Вяземскаго уѣзда.

Къ сожалѣнію, въ прошломъ мои наблюденія были ограничены мѣстомъ, и я не могу сказать, происходило ли за это время подобное увеличеніе числа гнѣздящихся бѣлобровиковъ въ какомъ-либо другомъ уѣздѣ губерніи. Я могу только замѣтить, что въ западной части губерніи они и въ настоящее время болѣе рѣдки, чѣмъ въ Вяземскомъ уѣздѣ, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что А. Г. Гржибовскій въ 1910 году обратилъ вниманіе на появленіи этихъ птицъ въ большомъ количествѣ въ окрестностяхъ Смоленска („Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1911 г., № 1).

Въ Вяземскомъ уѣздѣ въ 1910 году привлекъ вниманіе удода (*Upupa epops* Linn.), котораго мнѣ удалось ранѣе наблюдать здѣсь далеко не каждый годъ и въ весьма ограниченномъ числѣ особей. Въ этомъ же году, въ апрѣлѣ, ихъ появилось сразу очень много, и характерный голосъ этой птицы былъ слышенъ всюду на поляхъ и лугахъ. Черезъ нѣсколько дней удоды значительно уменьшились въ числѣ, но много ихъ осталось и гнѣздовать. Я, по крайней мѣрѣ, на разстояніи пяти верстъ по рѣкѣ Вязмѣ наблюдать все лѣто три выводка. Для описаннаго уѣзда этотъ случай не обыченъ, тогда какъ въ западныхъ частяхъ губерніи удода довольно обыкновененъ.

Подобныя явленія въ жизни птицъ, конечно, нельзя разсматривать, какъ случайныя. Здѣсь выражается поступательное ихъ движеніе для завоеванія новыхъ гнѣздовыхъ мѣстъ. У насъ такое движеніе для расширенія гнѣздовой области особенно замѣтно на бѣломъ аистѣ (*Ciconia ciconia* Linn.), который во всѣхъ западныхъ уѣздахъ Смоленской губерніи и въ губерніяхъ, сосѣднихъ съ ней на югъ и западъ, является вполне основавшейся обыкновенной птицей. Въ восточной же части губерніи онъ настолько рѣдокъ, что въ томъ же 1910 году появленіе этой птицы въ Сычевскомъ уѣздѣ было встрѣчено, какъ нѣчто исключительное, и даже многіе изъ охотниковъ видѣли ее здѣсь въ первый разъ. Въ Вяземскомъ же уѣздѣ съ бѣлымъ аистомъ болѣе знакомы. Я лично встрѣчалъ его весной почти ежегодно въ-одиночку, парами и небольшими стайками по лугамъ Днѣпра и Вязмы. И, конечно, онъ оставался бы здѣсь и на лѣто, если бы его не встрѣчали выстрѣлами. Самыя восточныя гнѣздованія бѣлаго аиста въ губерніи изъ извѣстныхъ мнѣ—это по р. Днѣпру, именно: въ Волочкѣ, на границѣ Сычевскаго и Вяземскаго уѣздовъ,—и въ селѣ Николо-Погорѣлое, на границѣ Вяземскаго и Дорогобужскаго уѣздовъ. Въ Волочкѣ эта птица гнѣздилась нѣсколько лѣтъ тому назадъ, а въ селѣ Николо-Погорѣломъ она вывела птенцовъ въ 1909 году, но въ томъ же году была спугнута ремонтомъ того зданія, около котораго помѣщалось дерево съ гнѣздомъ и въ 1910 году уже не появилась. Можно съ увѣренностью сказать, что бѣлый аистъ, если бы не подвергался преслѣдованію со стороны человѣка, быстро распространился бы по всему уѣзду, а отсюда проникъ бы и далѣе на востокъ.



Новая форма гаички.

В. А. Хачловъ.

Über eine neue mattköpfige Sumpfschneise.

Von W. A. Hachlow.

Poecile baicalensis съ Тарбагатая довольно рѣзко отличается отъ *P. baicalensis* изъ окрестностей Томска, что и послужило основаніемъ выдѣлить ее въ качествѣ новаго подвида. Эту новую форму называю *Poecile baicalensis suschkini*, въ честь професс. П. П. Сушкина.

Diagn. Macula jugulari nigra fere duplo majore, quam in *P. baicalensi*, rostro plerumque tenuiore; supra obscurior.

Hab. Sylvae jugi Tarbagatai.

Горловое пятно почти вдвое больше, чѣмъ у *P. baicalensis*; сверху темнѣе и болѣе буроватая; клювъ большею частью тоньше, болѣе сжатъ съ боковъ, и, разсматриваемый сверху, болѣе шилообразный.

♂ ad. 29. VII. 1911 г. Сауръ, р. Теміръ-су.

Голова, затылокъ и идущая на спину полоса—черныя, какъ у *P. baicalensis*. Спина, плечевыя, надхвостье и верхнія кроющія хвоста болѣе бурья, чѣмъ у типичной, почему верхняя сторона кажется темнѣе, чѣмъ у *baicalensis*. Рулевья какъ у типичной, но съ болѣе голубовато-сѣрой каймой на среднихъ парахъ. На наружномъ опахалѣ крайняго рулевого

едва замѣтная ¹⁾ бѣлая полоска, занимающая приблизительно около $\frac{1}{4}$ ширины опахала, тогда какъ у *P. baicalensis* эта полоска шире, рѣзче выступаетъ и занимаетъ болѣе $\frac{1}{3}$ опахала (смотримъ сверху. Измѣреніе на разстояніи 1 ст. отъ вершины).

Первостепенныя маховыя какъ у типичной. Второстепенныя съ бурыми каемками ²⁾ (а не бѣлыми или сѣроватыми, какъ то у типичныхъ *baicalensis*). Большія верхнія кроющія крыла, равно какъ и малыя болѣе темныя, бурія, какъ вслѣдствіе болѣе темной, основной окраски, такъ и болѣе узкихъ и бурыхъ каемокъ. Нижнія кроющія крыла бѣлыя съ буланымъ оттѣнкомъ.

Подбородокъ, горлышко и часть зоба черные. Остальная нижняя сторона бѣлая съ буланымъ оттѣнкомъ, особенно на бокахъ, и болѣе интенсивнымъ, чѣмъ у типичныхъ. Нижнія кроющія хвоста какъ низъ.

Радужина орѣховая. Клювъ болѣе сжатъ съ боковъ, острѣе и имѣетъ характерную форму шила (смотримъ сверху).

♀ ad. какъ ♂, но меньше.

♀ juv.

Голова, затылокъ и полоса, идущая на спину,—матово-черныя. Остальной верхъ бурый, гораздо темнѣе, чѣмъ у типичныхъ.

Подбородокъ, горлышко и частью зобъ—матово-черные съ кое-гдѣ замѣтными бѣловатыми каемками перьевъ. Это горловое пятно рѣзко отграничено отъ остального низа, который грязно-бѣлаго цвѣта и съ буланымъ оттѣнкомъ, болѣе интенсивнымъ на бокахъ.

Крыло замѣтно темнѣе, чѣмъ у типичныхъ.

Въ весеннемъ перѣ (мартѣ) *P. b. suschkinii* отличается отъ *P. baicalensis* болѣе грязнымъ верхомъ вслѣдствіе примѣси бурога пигмента. Имѣетъ болѣе темное крыло, такъ какъ бурый оттѣнокъ и здѣсь замѣтно преобладаетъ. Каемка-же на второстепенныхъ махахъ болѣе грязно-бѣлая, а не бурая, какъ у осеннихъ, но все же и уже и темнѣе, чѣмъ у типичныхъ.

¹⁾ Эта полоска бываетъ или ясно отграничена, или граница размыта; но въ обоихъ случаяхъ плохо замѣтна. *Авт.*

²⁾ У новой формы эти каемки могутъ быть и бѣловатыми, но всегда уже и грязнѣе. *Авт.*

Размѣры:

	№ 1. ♂ ad.	№ 2. ♂ ad.	№ 3. ♂ ad.	№ 4. ♀ ad.	№ 5. ♀ ad.	№ 6. ♀ ad.	№ 7. O ad.	№ 8. ♀ juv.	№ 9. O juv.	№ 10. O juv.
Плюсна....	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Клювъ отъ ноздрей до вершины .	8 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂	8	8	8	8 ¹ / ₂	7
Длина кры- ла.....	68	64	70	65	63	66	65	65	67	62
Хвостъ . . .	63	60	63	60	59	60	62	61	62	51
Длина.....	—	—	—	—	—	—	—	135	136	—
Размахъ ...	—	195	—	—	—	—	—	200	205	—
Форма кры- ла.....	—	—	4=5= =6; 7>3; 2=втр.	—	—	—	—	6=5; 4>7 >3> 8>9; 2=втр.	4=5 =6; 7>3> 8>9; 2=втр.	5=6; 4=7; 3>8 >9; 2=втр.

Нѣкоторые экземпляры уклоняются къ типичнымъ *P. baicalensis*; на примѣръ, ♀ за № 5, по формѣ клюва ближе къ типичной, тогда какъ другіе признаки характерны для *P. b. suschkini*.

Область распространенія ограничивается, кажется, Тарбагатайскими горами, гдѣ встрѣчается всюду въ лѣсу, предпочитая лиственный, и поднимаясь до 1800 метровъ надъ уровнемъ моря. До сихъ поръ не была найдена въ долинахъ.



Туркестанская раса бородатой куропатки.

С. А. Бутурлинъ.

Perdix daurica turcomana Stolz.

By S. A. Buturlin.

Въ виду противорѣчивости литературныхъ свѣдѣній и возникшаго вслѣдствіе этого спора на страницахъ „Орнитологическаго Вѣстника“ объ отношеніяхъ *Perdix daurica turcomana* Stolz. 1897, описаной изъ Ферганы, и *Perdix daurica occidentalis* Buturl., 1908, описаной изъ Семирѣчья, я счелъ необходимымъ обратиться къ единственно неоспоримому способу разрѣшенія вопроса—сравненію типовъ описаній. Благодаря любезности И. А. Штольца, директора Орнитологическаго Музея графовъ Браницкихъ въ Варшавѣ, я получилъ для осмотра изъ этого музея типы описанія *P. d. turcomana*: ♂, 7. X. 1894, 6000', № 2659^d (шкурка); ♂, 7. XII. 1894, 6000', № 2659^b, и ♀, 7. XII. 1894, 6000', № 2659^c (чучела). Птицы эти по окраскѣ и размѣрамъ сходны съ моими экземплярами съ Исыкъ-куля. Единственное отличіе: у ферганскихъ экземпляровъ хвостъ нѣсколько болѣе закругленъ (крайняя пара рулей короче средней болѣе, чѣмъ на 1½ снтм.) и плюсна чуть длиннѣе (не короче 4 снтм., а не около 3¾—4),—но это, вѣроятно, объясняется небольшимъ числомъ сравненныхъ экземпляровъ. Такимъ образомъ Н. А. Зарудный оказывается, повидимому, совершенно правъ, и „*P. d. occidentalis*“ должно считаться синонимомъ, а туркестанская раса бородатой куропатки, отличающаяся отъ типичной буроватымъ оттѣнкомъ грудного пятна и большими лапами (средній палецъ безъ когтя длиннѣе 2¾ снтм.), должна называться *Perdix daurica turcomana* Stolz.



Замѣтка о южно-каспійскомъ королькѣ (*Regulus regulus hyrcanus* Zar.).

И. А. Зарудный.

Einige Worte über das Süd-Kaspische Goldhänchen (*Regulus regulus hyrcanus* Zar.).

Von N. A. Sarudny.

Бѣглое описаніе этого королька помѣщено мною въ апрѣльской книжкѣ журнала „Наша Охота“ за 1910 годъ. Описанъ онъ по экземплярамъ, добытымъ въ хвойныхъ заросляхъ Эльбурской горной системы (по южному берегу Каспійскаго моря), а также по тѣмъ, которые были добыты зимою въ южной части Талышской низменности (въ Закавказьи). О немъ же я упоминаю въ своемъ „Verzeichnis der Vögel Persiens“ („Journal für Ornithologie“, 1911, Aprilheft).

Въ „Ornithologische Monatsberichte“ за 1911 годъ, № 10, p. 158, баронъ Г. В. Лоудонъ описываетъ подъ названіемъ *Regulus regulus buturlini* новую форму королька изъ Талыша, именно изъ горъ, лежащихъ къ западу отъ Ленкорана. Судя по данному имъ описанію, а также и мѣстонахожденію, его королькъ однозначущъ съ моимъ, установленнымъ почти годомъ раньше.

Ташкентъ, 28 октября, 1911 года.



ОТЪ РЕДАКЦИИ.

Von der Redaktion.

Есть проблемы научнаго изслѣдованія, разрѣшеніе которыхъ возможно лишь при одновременной работѣ многихъ изслѣдователей.

Такою проблемою является въ орнитологіи изученіе перелетовъ птицъ. Выясненіе пролетныхъ путей, направленіе и скорость движенія перелетающихъ птицъ, причины, обуславливающія ихъ первое появленіе, зависимость пролета отъ поступательнаго хода весны и осени, направленіе летящихъ птицъ въ зависимости отъ вѣтра и многіе другіе вопросы требуютъ для своего разрѣшенія одновременныхъ наблюденій въ различныхъ частяхъ изучаемой области.

Конечно, устройство сѣти спеціальныхъ орнитологическихъ станцій по заранѣе намѣченному плану и подъ общимъ руководствомъ какого-либо одного ученаго учрежденія государства—лучшій способъ изученія всѣхъ этихъ явленій. Но это врядъ ли осуществимо у насъ въ ближайшемъ будущемъ, и для выясненія явленія перелетовъ въ нашемъ отечествѣ приходится пока изыскивать иные способы.

Однимъ изъ такихъ способовъ является отмѣтка птицъ путемъ прикрѣпленія къ нимъ металлическихъ колецъ, и какъ уже извѣстно нашимъ читателямъ, организацію этого дѣла у насъ въ Россіи взяло на себя Отдѣленіе Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній въ лицѣ предсѣдателя своего Д. М. Россинскаго.

Редакція „Орнитологическаго Вѣстника“ въ свое время высказала свою готовность помочь въ этомъ дѣлѣ Отдѣленію Орнитологін, но, сознавая всю важность изученія явленій переле-

товъ, какъ для науки вообще, такъ и для отдѣльныхъ работниковъ на мѣстахъ, рѣшается теперь предложить своимъ сотрудникамъ и читателямъ слѣдующее, что, по ея мнѣнію, является способомъ, могущимъ дать въ изученіи интересующаго насъ явленія несравненно больше конкретныхъ результатовъ, чѣмъ такъ называемое „окольцовываніе“ птицъ.

Въ настоящее время уже не мало орнитологовъ любителей и профессионаловъ разбросано на огромномъ пространствѣ нашего отечества. Многіе изъ нихъ, намъ кажется, могли бы изъ года въ годъ наблюдать на мѣстахъ картины пролетовъ. Объединеніе же такихъ наблюденій могло бы до извѣстной степени замѣнить работу стѣи орнитологическихъ станцій, а разработка ихъ дать весьма цѣнные и интересные результаты.

Поэтому мы позволяемъ себѣ обратиться съ просьбою ко всѣмъ, кто будетъ имѣть возможность систематически наблюдать надъ пролетомъ птицъ въ текущемъ году, а также и въ послѣдующіе годы, сообщать о своихъ наблюденіяхъ на страницахъ „Орнитологическаго Вѣстника“, какъ это сдѣлано въ настоящей книжкѣ журнала А. Г. Гржибовскимъ.

Съ цѣлью установленія научной равноцѣнности сообщаемыхъ данныхъ мы считаемъ необходимымъ указать здѣсь на слѣдующія правила для нашихъ корреспондентовъ.

1. Данные о пролетахъ должны сообщаться только въ томъ случаѣ, если въ правильности опредѣленія вида не можетъ быть никакого сомнѣнія.

2. Относительно каждаго вида желательны указанія:

- 1) перваго появленія;
- 2) времени начала массоваго пролета;
- 3) времени конца пролета;
- 4) направленія пролетныхъ стаѣ;
- 4) въ какое время сутокъ происходитъ пролетъ;
- 6) летятъ ли птицы въ данной мѣстности широкимъ фронтомъ, или придерживаясь опредѣленнаго пролетнаго пути.

3. Попутно необходимо наблюдать надъ поступательнымъ ходомъ весны и осени и отмѣчать всѣ наиболѣе важныя фенологическія явленія.

Своевременное опубликованіе такихъ сообщеній имѣетъ громадное значеніе и для самихъ наблюдателей, такъ какъ оно, знакомя ихъ своевременно съ тѣмъ, что происходитъ въ другихъ

частяхъ нашего отечества—иногда въ сравнительно близкомъ соседствѣ,— подготавливаетъ къ болѣе продуктивной работѣ въ слѣдующую же весну или осень. Само собою разумѣется, что чѣмъ больше ежегодно окажется наблюдательныхъ пунктовъ и чѣмъ больше будетъ число наблюдаемыхъ въ каждой мѣстности видовъ,—тѣмъ продуктивнѣе будетъ работа.

У насъ въ Россіи есть лица, уже много лѣтъ изучающія движенія птицъ, и для нихъ подобныя сообщенія нашихъ корреспондентовъ являлись бы очень цѣннымъ матеріаломъ. Редакція же „Орнитологическаго Вѣстника“ общается со своей стороны данныя о пролетахъ птицъ, напечатанныя на страницахъ журнала, свести воедино, обработать, иллюстрировать картограммами и предоставить во всеобщее пользованіе.



Наблюдения надъ прилетомъ и пролетомъ нѣкоторыхъ птицъ въ Смоленской губерніи весною 1911 года.

А. Г. Гржибовскій.

Bemerkungen über die Ankunft und den Zug einiger Vögel des Gouvernements Smolensk im Frühling des Jahres 1911.

Von A. G. Grzibowski.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ только для очень немногихъ видовъ, кромѣ времени появленія, указаны еще кое-какія свѣдѣнія, какъ-то: валовой пролетъ, направленіе, величина стаякъ и т. д. Этотъ весьма существенный пробѣлъ въ наблюденияхъ зависитъ, главнымъ образомъ, отъ того, что въ данной мѣстности, насколько я могъ замѣтить, не пролегаетъ значительныхъ весеннихъ пролетныхъ путей, а существуютъ только ихъ конечныя вѣточки. Поэтому здѣсь почти не приходится наблюдать большихъ пролетныхъ стай, а лишь птицъ, появляющихся въ мѣстахъ своихъ гнѣздовій, или же птицъ, сбивающихся съ главнаго пролетнаго пути и въ одиночку и небольшими стайками держащихся по нѣскольку дней на мѣстахъ кормежекъ.

Приведенныя ниже наблюдения собраны мною, В. А. Меландеромъ и И. П. Пѣтуховымъ¹⁾. Я наблюдалъ въ окрестностяхъ Смоленска; В. А. Меландеръ—въблизи имѣнія „Милаго“, расположеннаго верстахъ въ 46—50 къ СОО отъ Смоленска, а И. П. Пѣтуховъ—въ Ердичьей казенной лѣсной дачѣ, отстоящей отъ Смоленска къ О по прямому направленію верстъ на 40.

¹⁾ Препараторъ В. В. Станчинскаго. *Авт.*

Названіе вида.	Мѣсяць и число.	Наблюденія.
1. <i>Podiceps cristatus</i> L.	13—14. IV	замѣчены пролетныя стайки на Днѣпрѣ около Смоленска.
2. <i>Larus canus</i> L.	1—8. IV	наблюдались первыя особи подъ Смоленскомъ. Въ стайкахъ рѣдко можно было видѣть болѣе 10 птицъ.
3. <i>Larus ridibundus</i> L.	3. IV	замѣтилъ около Смоленска одну птицу, летѣвшую внизъ по Днѣпру (обратно весеннему пролетному направленію).
	27. IV	наблюдать пролетную стаю.
4. <i>Larus minutus</i> Pall.	24—25. IV	наблюдались мною и И. П. Пѣтуховымъ пролетныя стайки, состоявшія изъ 3—5 птицъ, на Днѣпрѣ, около станціи Приднѣпровской Р. У. желѣзной дороги.
5. <i>Hydrochelidon nigra</i> L.	26. IV	наблюдалъ стайку, кружившую надъ Днѣпровскимъ разливомъ около станціи Приднѣпровской Р. У. желѣзной дороги.
6. <i>Scelopax rusticola</i> L.	3. IV	начали тянуть около имѣнія „Милаго“.
	4. IV	начали тянуть въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
	5. IV	наблюдаѣь перваго на тягѣ подъ Смоленскомъ.
7. <i>Scolopax major</i> Gm.	14. IV	наблюдаѣь токъ около Ер- дицкой казенной лѣсной дачи.
8. <i>Scolopax gallinago</i> Briss.	3. IV	появились первые въ имѣніи „Миломъ“.
	4. IV	наблюдаѣь перваго около Смоленска.
	8. IV	здѣсь же начались тока.
9. <i>Limosa melanura</i> Leisl.	27. IV	видѣлъ одну птицу около Ердицкой казенной лѣсной да- чи.
10. <i>Totanus pugnax</i> Briss.	25. IV	наблюдались мною и И. П. Пѣтуховымъ многочисленныя стаи, державшіяся по лугамъ около станціи Приднѣпровской Р. У. желѣзной дороги.
11. <i>Totanus hypoleucus</i> L.	6. IV	появились первыя особи подъ Смоленскомъ.
	7. IV	наблюдались первыя особи око- ло имѣнія „Милаго“.
12. <i>Totanus ochropus</i> L.	2. IV	наблюдались первыя особи около Смоленска и около имѣ- нія „Милаго“.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
13. <i>Totanus glottis</i> L.	6. IV	появились первыя особи около Смоленска.
14. <i>Numenius arquatus</i> L.	26. III	наблюдались первыя особи около Смоленска и вблизи имѣнія „Милаго“.
15. <i>Vanellus cristatus</i> Meyer.	17. III	наблюдавъ первыхъ птицъ подъ Смоленскомъ.
	19. III	были замѣчены у имѣнія „Милаго“.
16. <i>Charadrius minor</i> Meyer et Wolf.	8. IV	видѣлъ перваго около Смоленска.
17. <i>Grus cinerea</i> Bechst.	27. III	видѣли первую стаю около имѣнія „Милаго“.
	2—8. IV	наблюдавъ подъ Смоленскомъ пролетныя стаи, летѣвшія съ юго-запада на сѣверо-востокъ и рѣже съ юга на сѣверъ.
18. <i>Gallinula chloropus</i> L.	8. IV	наблюдались около Ердичкой казенной лѣсной дачи.
19. <i>Crex pratensis</i> Bechst.	27. IV	слышалъ крикъ нѣсколькихъ птицъ около Ердичкой казенной лѣсной дачи.
	28. IV	слышали впервые около имѣнія „Милаго“.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
20. <i>Porzana maruetta</i> Leach.	10. IV	наблюдались первыя особи около имѣнія „Милаго“.
21. <i>Ooturnix communis</i> Bonnat.	27. IV	появились около имѣнія „Милаго“.
22. <i>Turtur auritus</i> Gray.	7. IV	наблюдались первыя особи около имѣнія „Милаго“.
23. <i>Columba oenas</i> Briss.	17. III	наблюдать пару около Смоленска.
	20. III	были замѣчены у имѣнія „Милаго“.
24. <i>Columba palumbus</i> L.	25. III	наблюдать около Смоленска стайки птицъ по 20, летѣвшія съ юго-запада на сѣверо-востокъ.
25. <i>Mergus albellus</i> L.	5 IV	держалась стайка на рѣчкѣ Ольшѣ, притокѣ Днѣпра, нѣсколько ниже Смоленска.
26. <i>Mergus serrator</i> L.	10. IV	былъ добытъ на Днѣпрѣ пролетный самецъ.
27. <i>Fuligula clangula</i> L.	23. III	появились первыя пары на Днѣпрѣ подъ Смоленскомъ.
28. <i>Fuligula cristata</i> Leach.	23. III	наблюдать первую пару на Днѣпрѣ подъ Смоленскомъ.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
29. <i>Fuligula ferina</i> L.	24. IV	наблюдали пару этихъ нырковъ на Днѣпровскомъ разливѣ около станціи Приднѣпровской Р. У. желѣзной дороги, а 26. IV тамъ же былъ добытъ крестьяниномъ самецъ изъ стайки въ 4 птицы.
30. <i>Anas clypeata</i> Briss.	3—4. IV	попадались пролетныя особи подъ Смоленскомъ.
31. <i>Anas crecca</i> L.	23. III	появились на Днѣпрѣ подъ Смоленскомъ и около имѣнія „Милаго“.
32. <i>Anas circia</i> L.	23. III	появились подъ Смоленскомъ.
33. <i>Anas boschas</i> L.	21. III	наблюдались первыя особи около Смоленска.
	23. III	появились вблизи имѣнія „Милаго“.
34. <i>Anas acuta</i> L.	3. IV	стали попадаться на Днѣпрѣ около Смоленска.
35. <i>Anas penelope</i> L.	3. IV	появились первыя особи на Днѣпрѣ подъ Смоленскомъ.
	4—5. IV	летѣли ночью многочисленныя стаи, вдоль Днѣпровской поймы.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
36. <i>Ciconia alba</i> Briss.	4. IV'	появились около Ердницкой казенной лѣсной дачи.
37. <i>Ardea cinerea</i> Briss.	7. IV'	наблюдать подѣ Смоленскомъ.
38. <i>Pandion haliaëtus</i> L.	5. IV'	я видѣлъ первую птицу подѣ Смоленскомъ.
39. <i>Tinnunculus alaudarius</i> Briss.	6. IV'	появились первыя особи около имѣнія „Милаго“.
40. <i>Falco subbuteo</i> L.	25. III	наблюдались первыя особи подѣ Смоленскомъ.
41. <i>Pernis apivorus</i> L.	4. IV'	замѣченъ впервые подѣ Смоленскомъ.
42. <i>Milvus ater</i> Gmel.	1. IV'	появились около имѣнія „Милаго“.
	4. IV'	наблюдались первыя особи около имѣнія „Милаго“.
43. <i>Buteo vulpinus</i> Licht.	8. IV'	видѣлъ впервые вблизи Смоленска.
	4. IV'	видѣлъ первую пару подѣ Смоленскомъ. 4-го же появились канюки и около имѣнія „Милаго“.
44. <i>Circus cineraceus</i> Mont.	19. III	появились вблизи имѣнія „Милаго“.

Названіе вида.	Мѣсяць и число.	Наблюденія.
45. <i>Circus cyaneus</i> L.	19. III	появились впервые около имѣнія „Милаго“.
	25. III	наблюдалъ подѣ Смоленскомъ.
46. <i>Cuculus canorus</i> L.	7. IV*	наблюдалъ первую птицу подѣ Смоленскомъ. Куковать начали 12. IV.
	12. IV*	начали куковать въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ и около имѣнія „Милаго“.
47. <i>Jynx torquilla</i> L.	10. IV*	появились вблизи имѣнія „Милаго“.
48. <i>Coracias garrula</i> L.	12. IV*	появились въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ.
	13. IV*	замѣчены около имѣнія „Милаго“.
	20. IV*	наблюдалъ подѣ Смоленскомъ пролетную стаю, державшуюся по дубамъ поймы.
49. <i>Caprimulgus europaeus</i> L.	7. IV*	появились въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ.
	17. IV*	наблюдались около имѣнія „Милаго“.
50. <i>Cypselus apus</i> L.	3. V*	наблюдались впервые подѣ Смоленскомъ.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
51. <i>Upupa epops</i> L.	9. V	замѣчены около имѣнія „Милаго“.
	8. IV	наблюдались первыхъ птицъ вблизи Смоленска.
	11. IV	появились около имѣнія „Милаго“.
52. <i>Alauda arvensis</i> L.	13. IV	наблюдались впервые въ Ердичьей казенной лѣсной дачѣ.
		подъ Смоленскомъ единичныя птицы появились уже въ первыхъ числахъ марта. Въ болѣе значительномъ количествѣ жаворонки появились 16. III, съ наступленіемъ болѣе теплыхъ дней.
53. <i>Alauda arborea</i> L.	14. III	были замѣчены около имѣнія „Милаго“.
	17. III	появились впервые подъ Смоленскомъ.
	20. III	наблюдались около имѣнія „Милаго“.
54. <i>Corvus frugilegus</i> L.	26. II	появились первыя особи подъ Смоленскомъ.
	2. III	наблюдались впервые вблизи имѣнія „Милаго“.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
55. <i>Sturnus vulgaris</i> L.	17. III	Валовой пролетъ наблюдался около Смоленска въ первыхъ числахъ марта. Птицы летѣли съ юго-запада на сѣверо-востокъ. наблюдались первыя стаи подъ Смоленскомъ и около имѣнія „Милаго“.
56. <i>Plectrophenax nivalis</i> L.	18—26. III	наблюдались очень большія стаи по полямъ около Смоленска. Пуночка появляется зимою здѣсь ежегодно.
57. <i>Emberiza schoeniclus</i> L.	1. IV	появились около имѣнія „Милаго“.
	2. IV	наблюдались первыя особи подъ Смоленскомъ.
58. <i>Carpodacus erythrinus</i> Pall.	6. V	замѣчены вблизи имѣнія „Милаго“.
59. <i>Acanthis cannabina</i> L.	16. III	появились первыя стайки подъ Смоленскомъ и около имѣнія „Милаго“.
60. <i>Fringilla montifringilla</i> Briss.	20. III	замѣчены впервые около имѣнія „Милаго“.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
61. <i>Fringilla coelebs</i> L.	16. III	появились первыя особи въ близости имѣнія „Милаго“.
	17. III	наблюдать первыя стаи подъ Смоленскомъ.
62. <i>Chloris chloris</i> Briss.	19. III	замѣчены первыя особи около имѣнія „Милаго“.
63. <i>Cotile riparia</i> Briss.	22. IV	наблюдать первую птицу подъ Смоленскомъ.
64. <i>Hirundo rustica</i> L.	12. IV	появились первыя особи въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ.
	14. IV	наблюдались первыя особи въ имѣніи „Миломъ“.
	19. IV	наблюдается валовой пролетъ подъ Смоленскомъ. Стаи летѣли вверхъ по Днѣпру, строго придерживаясь русла рѣки.
65. <i>Chelidon urbica</i> L.	27. IV	замѣчены первыя особи въ Смоленскѣ.
66. <i>Muscicapa atricapilla</i> L.	8. IV	появились въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ.
67. <i>Muscicapa grisola</i> L.	11. IV	наблюдались впервые въ имѣніи „Миломъ“.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
	24. IV'	замѣчены первыя особи въ имѣніи „Миломъ“.
68. <i>Lanius collurio</i> L.	25. IV'	наблюдались первыя особи около имѣнія „Милаго“ и въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ.
69. <i>Lanius excubitor</i> L.	27—30. III	наблюдается пролетъ вблизи Смоленска. Два добытые мною экземпляра принадлежали къ этому виду.
70. <i>Oriolus galbula</i> L.	27. IV'	появились первыя особи вблизи имѣнія „Милаго“.
71. <i>Anthus arboreus</i> Briss.	26. III	замѣчены впервые около имѣнія „Милаго“.
72. <i>Anthus pratensis</i> Briss.	28. III	появились первыя особи въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ.
	1. IV'	наблюдались впервые около имѣнія „Милаго“.
73. <i>Motacilla flava</i> L.	4. IV'	замѣчены первыя особи около имѣнія „Милаго“.
	11. IV'	наблюдались впервые подъ Смоленскомъ.
74. <i>Motacilla borealis</i> Sundev.	16. IV'	добыть первую птицу подъ Смоленскомъ.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
75. <i>Motacilla alba</i> L.	20. III	наблюдались первыя особи подъ Смоленскомъ и вблизи имѣнія „Милаго“.
76. <i>Troglodytes parvulus</i> L.	17. III	замѣчены въ имѣніи „Миломъ“.
	25. III	появились въ Ердичской казен- ной лѣсной дачѣ. Подъ Смоленскомъ крапив- ники осенью уменьшаются въ числѣ, но совершенно не ис- чезаютъ всю зиму.
77. <i>Locustella fluviatilis</i> Wolf.	12. V	слышалъ впервые пѣніе.
78. <i>Acrocephalus phragmitis</i> Bechst.	13. IV	появились около имѣнія „Ми- лаго“.
79. <i>Hypolais icterina</i> Vieill.	3. V	замѣчены вблизи имѣнія „Ми- лаго“.
80. <i>Phylloscopus sibilatrix</i> Bechst.	21. V	появились около имѣнія „Ми- лаго“.
81. <i>Phylloscopus trochilus</i> L.	15. V	наблюдались въ имѣніи „Ми- ломъ“.
82. <i>Phylloscopus collybita</i> Vieill.	7. IV	появились около имѣнія „Ми- лаго“.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
	12. IV	начали „тенькать“ подѣ Смоленскомъ.
83. <i>Sylvia atricapilla</i> L.	26. IV	появились первыя особи около имѣнія „Милаго“.
84. <i>Erithacus philomela</i> Bechst.	20. IV	замѣчены около имѣнія „Милаго“.
	22. IV	начали пѣть въ Ердичкой казенной лѣсной дачѣ.
85. <i>Erithacus leucocy-nus</i> Brehm.	16. IV	появились около имѣнія „Милаго“.
86. <i>Erithacus rubecula</i> L.	25. III	наблюдались первыя особи подѣ Смоленскомъ.
	5. IV	замѣчены вблизи имѣнія „Милаго“.
87. <i>Ruticilla phoenicurus</i> L.	10. IV	наблюдались первыя особи подѣ Смоленскомъ и у имѣнія „Милаго“.
88. <i>Pratincola rubetra</i> L.	11. IV	наблюдали первыхъ около Ердичъ.
	13. III	замѣчены первыя особи около имѣнія „Милаго“.
	20. III	слышалъ впервые пѣніе подѣ Смоленскомъ.

Названіе вида.	Мѣсяцъ и число.	Наблюденія.
89. <i>Saxicola oenanthe</i> L.	21. III	наблюдать первую пару подъ Смоленскомъ.
90. <i>Merula merula</i> L.	20. III	появились около имѣнія „Милаго“.
	25. III	наблюдать подъ Смоленскомъ.
91. <i>Turdus viscivorus</i> L.	16. III	видѣлъ первыхъ птицъ подъ Смоленскомъ.
	18. III	наблюдать впервые около имѣнія „Милаго“.
92. <i>Turdus musicus</i> L.	26. III	замѣчены впервые вблизи имѣнія „Милаго“.
	27. III	появились первыя особи подъ Смоленскомъ.
93. <i>Turdus iliacus</i> L.	1. IV	наблюдались первыя птицы около имѣнія „Милаго“.
	8. IV	были заняты станціи подъ Смоленскомъ.
94. <i>Turdus pilaris</i> L.	20. III	замѣчены впервые вблизи имѣнія „Милаго“.



Сообщение о птицахъ, отмѣченныхъ кольцами.

Mitteilung über die mittelst Ring gemerkten Vögel.

Борисомъ Александровичемъ Бронеvскимъ, выписавшимъ кольца изъ Росситтена (Vogelwarte Rossitten), сообщено въ редакцію о слѣдующихъ, отмѣченныхъ имъ въ минувшемъ (1911) году птицахъ.

Видъ. Species.	№№ ^о колецъ. №№ der Ringe	Время от- лѣтки 1). Datum.	Мѣсто. Ort.
<i>Sturnus vulgaris</i> Linn.	4184	16. IV. 1911.	Имѣніе «Петрово», Рославльскаго уѣзда, Смоленской губерніи. Gouvernement Smolensk.
» " "	4192	2) 19 V. 1911.	
» " "	4195		
<i>Riparia riparia</i> (Linn.)	1785	30. V. 1911.	
» " "	1786		
» " "	1787		
» " "	1788		
» " "	1789		
» " "	1790		
» " "	1791		
<i>Passer montanus</i> (Linn.)	1793	26. VI. 1911.	
<i>Coracias garrula</i> Linn.	4185	6. VII. 1911.	
<i>Upupa epops</i> Linn.	4187	3) 29. VII. 1911.	
» " "	4188		
» " "	4189		
» " "	4190		
<i>Passer domesticus</i> (Linn.) ♂	3577	іюль 1911.	Имѣніе «Милое», Ельнинскаго уѣзда, Смоленской губер- ніи. Отмѣченъ В. А. С* Меландеръ. Gouver- nement Smolensk.
» " " ♀	3575	juli 1911.	

Кромѣ того, имъ сообщается безъ упоминанія №№ колецъ объ отмѣченныхъ: *Urupa eops* Linn. 19. V. 1911 въ имѣніи „Петрово“ и *Ascanthis cannabina* Linn. 18. VI. 1911 въ имѣніи „Холмъ“, Ельнинскаго уѣзда, Смоленской губерніи.

Адресъ Б. А. Броневаго—почтовое отдѣленіе Скоріевка, Рославльскаго уѣзда, Смоленской губерніи.

Г. II.



¹⁾ Даты по старому стилю.

²⁾ Молодые птицы.

³⁾ Молодые птицы.

Краткія сообщенія.—Kurze Mittheilungen.

Орнитологическія изслѣдованія въ Черниговской губерніи. Н. И. Фененко, производившій при содѣйствіи Императорскаго Общества Испытателей Природы зоологическія изслѣдованія въ Черниговской губерніи, сообщаетъ о нахожденіи имъ одного экземпляра *Loxia curvirostra* L. 18. VII. 1909 въ сосновомъ бору Михайловскаго лѣсничества, въ Глуховскомъ уѣздѣ; *Aquila pennata* Gm. 30. VI. 1909 на гнѣздовѣ, въ лѣсу „Каменьщина“ г-на Терещенко, въ Конотопскомъ уѣздѣ (было найдено здѣсь гнѣздо съ двумя птенцами); *Tetrao tetrix* Linn. въ казенныхъ дачахъ: Батуринской (Конотопскій уѣздъ), Вербенской (Кролевецкій уѣздъ) и Горѣлые хутора (Глуховской уѣздъ), и о двухъ экземплярахъ *Tetrao urogallus* Linn., добытыхъ въ декабрѣ 1908 года въ Дмитровской казенной дачѣ Новгородъ-Сѣверскаго уѣзда.

Орнитологическія изслѣдованія въ Костромской губерніи. Б. Д. Кирпичниковъ, посѣтившій при содѣйствіи Императорскаго Общества Испытателей Природы лѣтомъ 1909 года Костромской, Кинешемскій, Юрьевецкій и Макарьевскій уѣзды Костромской губерніи,—собралъ до 300 экземпляровъ птицъ, представляющихъ главнымъ образомъ гнѣздящуюся фауну. По распространенію наиболѣе интересными являются: *Sterna minuta*, *Terekia cinerea*, *Surnia ulula*, *Gecinys viridis*, *Loxia rubrifasciata*, *Lanius excubitor*, *Phylloscopus viridanus*, *Sylvia nisoria*; кромѣ того имъ найдена здѣсь черно-бурая варіація *Buteo vulpinus* и *Motacilla flava* въ экземплярахъ, варьирующихъ отъ типичной *borealis* до переходовъ къ *beema*.

Зимованіе грача въ Московской губерніи. 18. I. 1912 былъ замѣченъ и добытъ одинъ грачъ (*Corvus frugilegus* Linn.) въ имѣніи „Саввино“, въ Богородскомъ уѣздѣ Московской губерніи. Птица эта въ сообществѣ галокъ [*Coloeus monedula collaris* (Drum.)] держалась вблизи фабричныхъ строеній.

* * *

Послѣднія работы русскихъ орнитологовъ. В. Л. Біанки, заведывающій орнитологическимъ отдѣленіемъ Зоологическаго Музея Имп. Академіи Наукъ, закончилъ обработку группы *Tubinages*, началъ обработку *Steganopodes* и напечаталъ 1-ый полутомъ 1-го тома „Птицъ Россіи и сопредѣльныхъ странъ“ для особаго изданія Зоологическаго Музея, выходящаго подъ общимъ заглавіемъ: „Фауна Россіи и сопредѣльныхъ странъ, преимущественно на основаніи коллекціи Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ“.

Въ XV томѣ „Ежегодника Зоологическаго Музея“ напечатана, между прочимъ, статья Андреева В. Д. и Біанки В. Л. — „Къ авифаунѣ Устьсысольскаго уѣзда Вологодской губерніи“. Объ остальныхъ орнитологическихъ статьяхъ этого тома „Ежегодника“ уже упоминалось въ „Обзорѣ русской орнитологической литературы“ въ № 2 „Орнитологическаго Вѣстника“ (стр. 187) за прошлый годъ.

П. П. Сушкинъ, профес. Имп. Харьковскаго Университета, приготовилъ къ печати работу „Птицы Минусинскаго края, западнаго Саяна и Урянхайской земли“.

В. В. Станчинскій, ассистентъ зоологической лабораторіи Московскаго Сельскохозяйственнаго Института, продолжалъ обработку матеріала по фаунѣ птицъ Смоленской губерніи и съ 15. IX. 1910 началъ систематическія наблюденія надъ птицами Петровскаго-Разумовскаго съ цѣлью выяснитъ значеніе біологическихъ сообществъ для распространенія видовъ.

* * *

Объ отмѣткѣ птицъ кольцами. Въ № 17 „Извѣстіи Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера“ за 1911 годъ

помѣщено слѣдующее сообщеніе: 16. V. 1911 въ 8 верстахъ отъ с. Оксина, у „Курыи“, въ Пустозерской волости, Печорскаго уѣзда была добыта самка утки („вѣрнѣе всего—*Anas strepera* L.“), на ногѣ которой оказалось алюминіевое кольцо съ надписью: „H. Chr. C. Martensen. Viborg. Danmark. 278. E.“



Обзоръ иностранной литературы по орнитологіи.

С. А. Бутурлинъ.

Rewiew of the foreign ornithological Literature.

By S. A. Buturlin.

(Продолженіе.—Continued) ¹⁾.

„The Auk“.

Въ январской книгѣ „Оукъ“ за 1910 годъ немного статей, имѣющихъ отношеніе къ нашей фаунѣ. Отмѣчу двѣ фотографіи въ статьѣ Таунзенда и Бента о Лабрадорскихъ птицахъ. На одной изображена нора топорика (*Fratercula arctica*), на другой—гнѣздо съ яйцами гаги (*Somateria dresseri*).

Альбертъ Риганъ, надзиратель мѣстнаго птичьяго заповѣдника, сообщаетъ о бурѣ, свирѣпствовавшей на тихоокеанскомъ берегу штата Вашингтонъ въ послѣднихъ дняхъ прошлаго августа (нов. ст.). Въ это время птенцы морскихъ птицъ были только на взлетѣ и гибли массами. Чайки вывелись раньше и пострадали мало, но погибло много баклановъ, почти всѣ молодые топорики и всѣ гагарки. Берегъ послѣ бури былъ покрытъ трупами. Въ общемъ въ окрестностяхъ погибло не менѣе пятидесяти тысячъ птицъ.

Года два назадъ я сообщалъ въ журналѣ „Естествознаніе и Географія“ о случаѣ, когда, безъ бури, метеорологическія условія повели къ гибели по меньшей мѣрѣ двухъ миллионовъ осо-

¹⁾ См. кн. II „Орнит. Вѣстн.“ 1911 г., стр. 197—203.

бей лапландскаго подорожника во время перелета на сравнительно не обширной площади.

Въ апрѣльской книгѣ Чарльзъ Таунсендъ описываетъ подробно ухаживанія гоголей (*Clangula clangula americana*) и гагъ (*Somateria dresseri*). Леонъ Коль, выбранный теперь предсѣдателемъ Американской Ассоціаціи для отмѣчиванія живыхъ птицъ, даетъ довольно подробный отчетъ о работѣ за 1909 годъ. Всего было роздано около 5000 колець, около 1000 изъ нихъ были использованы и къ концу года 31 вернулось съ убитыхъ птицъ.

Въ статьѣ Джона Ферри о птицахъ Саскачевана имѣются хорошія фотографіи колоніи молодыхъ пелекановъ, гнѣзда кряквы, гнѣзда канадской казарки (*Branta canadensis*), гнѣзда кроншнепа (*Numenius americanus*) и колоніи рѣчныхъ крачекъ.

Относительно уже упомянутой выше экспедиціи г-на Вильяма Бибъ сообщается, что изъ Индіи она двинется въ Бирманю, на Суматру, Яву, Борнео, въ Кохинхину, на Формозу, въ восточный Китай и Японію. Главной задачей является не столько систематическое и анатомическое изученіе фазановъ, сколько изученіе ихъ образа жизни, способности къ прирученію и ухода за ними. Экспедицію, которая продлится годъ, сопровождаетъ художникъ. Она совершается подъ покровительствомъ Нью-Йоркскаго Зоологическаго Общества, но всецѣло на средства Антони Кузера.

Въ той же книгѣ приводится рапортъ командира крейсера „Оетиды“, несущаго охранную службу, о заарестованіи на островахъ Лайсанъ и Лизіанскомъ 23 японцевъ, занимавшихся уничтоженіемъ птицъ для сбора пуха, перьевъ и крыльевъ. Въ январѣ было захвачено при нихъ, между прочимъ, 259400 крыльевъ. Это была уже вторая добыча, такъ какъ въ августѣ 1909 года они уже сдали на японское судно, кромѣ пера, 236100 штукъ крыльевъ, добытыхъ ими съ апрѣля по августъ. Японцы эти, сверхъ конфискаціи добычи, были присуждены къ суточному аресту, такъ какъ судья нашелъ доказаннымъ, что они были лишь невѣжественнымъ орудіемъ другихъ лицъ, т.-е. организаторовъ этого промышленнаго предпріятія, до которыхъ американское правительство попытается добраться.

Въ іюльской книгѣ „Окъ“ имѣется весьма интересная статья Хеншоу о перелетахъ и зимовкахъ темнокрылой ржанки (*Cha-*

gradrius dominicus) на Гавайскихъ островахъ, которыхъ онѣ достигаютъ перелетомъ въ 3000 верстъ черезъ совершенно открытый океанъ, и покидаютъ весной, несмотря на обиліе корма, чтобы провести нѣсколько недѣль въ сѣверныхъ тундрахъ.

Къ статьѣ Боудиша „Фотографированіе птицъ въ Каролинѣ“ имѣется нѣсколько замѣчательно удачныхъ фотографій, между прочимъ: стая крупныхъ крачекъ (*Sterna maxima*) у гнѣздъ, стая этихъ же птицъ на крыльяхъ, птенцы малой крачки (*Sterna antillarum*), гнѣзда флоридскаго баклана.

Richard C. Mc Gregor: „A Manual of Philippine Birds“.

Ричардъ Макъ-Грегоръ: „Руководство по Филиппинскимъ птицамъ“, въ 2 частяхъ, 8°, XVI+769 стр., 1909 (въ дѣйствительности вторая часть выпущена въ январѣ 1910 года), Манильа; цѣна 4 доллара (8 руб.).

Эта книга—„казенное“ изданіе Филиппинскаго „Научнаго Департамента“ (Bureau of Science). Здѣсь мы находимъ таблички для опредѣленія какъ высшихъ группъ, такъ и видовъ, синониму и краткія литературныя указанія, мѣстныя названія, очень сжатый списокъ мѣстонахожденій и коллекторовъ, подробное описаніе съ размѣрами и—не всегда—замѣчанія о гнѣздованіи, яйцахъ, станціяхъ. Книга эта, давая полный списокъ Филиппинскихъ птицъ и краткую сводку свѣдѣній о нихъ, конечно, крайне полезна.

(Продолженіе слѣдуетъ.—Continued).



Хроника. — Chronik.

Присужденіе премій за ориктологическія работы. На чрезвычайномъ засѣданіи Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы премія имени К. И. Ренара (съ отчисленіемъ 25% на увеличеніе основного капитала преміи) была присуждена дѣйствительному члену Общества профес. П. П. Сушкину за сочиненіе: „Птицы Средней Кыргызской степи. (Тургайская область и восточная часть Уральской)“ („Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи,“ отд. зоологич., вып. 8, 1908 г.).

В. Л. Біанки былъ удостоенъ Императорской Академіей Наукъ малой преміи имени М. Н. Ахматова за сочиненіе „Матеріалы для авифауны Монголіи и Восточнаго Тибета.“

* * *

ХІІІ съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей. 9. X. 1911 въ Тифлисѣ управляющимъ Кавказскимъ учебнымъ округомъ Л. Г. Лопатинскимъ было созвано предварительное совѣщаніе объ устройствѣ въ 1913 году въ Тифлисѣ ХІІІ съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей, а 29. X состоялось засѣданіе, на которомъ были произведены выборы президіума организаціоннаго комитета и завѣдывающихъ секціями и подсекціями предстоящаго съѣзда. Ближайшее засѣданіе организаціоннаго комитета было назначено на 3. XII.

* * *

Новое изданіе Департамента Земледѣлія. Департаментомъ Земледѣлія выпущенъ въ свѣтъ „Списокъ періодическихъ сельскохозяйственныхъ изданій“ (по свѣдѣніямъ Департамента Земледѣлія къ 1 августа 1911 года).

Учрежденіямъ и лицамъ, имѣющимъ надобность въ этомъ «Спискѣ», съ просьбами о бесплатной высылкѣ такового надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія, коимъ такого рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по мѣрѣ возможности.

* * *

Проектъ изданія „Fauna Mosquensis“. На засѣданіи „Комиссіи для изслѣдованія фауны Московской губерніи“, состоявшемся 3-го декабря прошлаго (1911) года въ Зоологическомъ Музеѣ Императорскаго Московскаго Университета, было доложено: В. Ф. Болдыревымъ—„О зимнихъ экскурсіяхъ“ (энтомологія) и Г. И. Поляковымъ—„Новыя данныя о птицахъ Московской губерніи“ (извлеченіе изъ этого доклада напечатано въ настоящей книжкѣ журнала).

Предсѣдатель Комиссіи проф. Г. А. Кожевниковъ сдѣлалъ докладъ подъ заглавіемъ „Проектъ изданія „Fauna Mosquensis““. Указавши сперва на то, что въ будущемъ 1912 году истекаетъ уже 20 лѣтъ со времени изданія „Primitae Faunae Mosquensis“, появившагося въ формѣ 2-го изданія сочиненія Двигубскаго въ трудахъ 2-го Международнаго Зоологическаго Конгресса 1892 года въ Москвѣ, докладчикъ отмѣтилъ, что эти списки, по условіямъ ихъ опубликованія, не могли явиться серьезной научной работой. Это было изданіе „къ случаю“, сдѣланное спѣшно въ очень короткій срокъ и по отношенію ко многимъ группамъ ограничившееся сокращенными выборками изъ ранѣе напечатанныхъ работъ или подборомъ случайныхъ свѣдѣній. Съ тѣхъ поръ шла работа фаунистической Комиссіи, порою болѣе, порою менѣе энергичная, и въ результатъ въ настоящее время у Комиссіи является возможность приступить къ печатанію „Fauna Mosquensis“ уже не въ видѣ голыхъ списковъ, а въ видѣ отдѣльныхъ систематико-фаунистическихъ монографій по тѣмъ группамъ, которыя къ этому достаточно подготовлены. Пока будутъ печататься первые выпуски, можно надѣяться на подготовку слѣдующихъ. Изданіе затянется на долгіе годы, но нечего этимъ смущаться, а надо начинать. Въ первую очередь по подготовленности можно поставить работу С. И. Огнева по млекопитающимъ, затѣмъ можно разсчитывать на обработку для этого изданія птицъ Г. И. Поляковымъ, моллюсковъ В. А. Линдгольмомъ, бабочекъ С. С. Четвериковымъ, нѣкоторыхъ семействъ жуковъ А. П. Золотаревымъ, планктона П. С. Гальцовымъ и Н. Л. Чугуновымъ, мно-

гоножекъ В. С. Муралевичемъ. По мысли докладчика въ планъ работы должна входить систематическая обработка фауны по коллекціямъ, собраннымъ въ предѣлахъ Московской губерніи, а не только по литературнымъ даннымъ. Распространеніе въ предѣлахъ Московской губерніи должно быть указано подробно со ссылками на экземпляры коллекцій, затѣмъ должно быть выяснено распространеніе каждаго вида въ предѣлахъ Россійской Имперіи, поскольку это возможно на основаніи современной литературы, и дано понятіе о распространеніи каждой формы по земному шару, въ самыхъ общихъ чертахъ. Кромѣ того, должны быть сообщены данныя объ образѣ жизни каждаго вида, по возможности на основаніи непосредственныхъ наблюденій въ предѣлахъ Московской губерніи.

Не предрѣшая вопроса о подробностяхъ изданія въ этомъ предварительномъ докладѣ, имѣющемъ цѣлью дать лишь общую идею изданія, докладчикъ просилъ у Комиссіи принципіальнаго одобренія этой идеи. Комиссія единогласно одобрила предложеніе объ изданіи „Fauna Mosquensis“, послѣ чего предсѣдатель предложилъ составить отъкрытую подкомиссію для выработки нѣкоторыхъ подробностей плана предполагаемаго изданія. Въ составъ подкомиссіи вошли: проф. Г. А. Кожевниковъ, П. С. Гальцовъ, А. П. Золотаревъ, В. А. Линдгольмъ, В. С. Муралевичъ, С. И. Огневъ, Г. И. Поляковъ, С. С. Четвериковъ и Ѳ. С. Щербаковъ.

* * *

„Труды второго всероссійскаго съѣзда охотниковъ въ Москвѣ“. Намъ просятъ сообщить, что многіе изъ гг. членовъ второго Всероссійскаго Съѣзда Охотниковъ до сихъ поръ не взяли тома „Трудовъ Съѣзда“, который вышелъ въ свѣтъ еще весною прошлаго года. Изданіе это находится на складѣ въ домовой конторѣ Востряковыхъ (Б. Дмитровка, домъ Востряковыхъ), и каждый членъ Съѣзда можетъ получить его бесплатно, если явится за нимъ лично, а для полученія по почтѣ гг. иногородніе должны прислать одинъ рубль на расходы по пересылкѣ на имя Георгія Ильича Морозова по указанному адресу. Не члены съѣзда могутъ купить изданіе за пять рублей.



Издакія, присланныя въ редакцію.

Éditions parvenus à la rédaction.

В. Н. Востанжогло: „Орнитологическая фауна Арало-Каспійскихъ степей“. „Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи“, вып. XI, 1911 г. Отд. оттискъ. *Отъ автора.*

В. Г. Аверинъ и А. И. Лавровъ: „Матеріалы къ изученію фауны птицъ Томской губерніи“. 2 отд. оттиска. *Отъ авторовъ.* Изъ какого изданія—не извѣстно.

В. Г. Аверинъ: „Орнитологическія наблюденія лѣтомъ 1909 и 1910 г.г. въ окрестностяхъ станицы Митякинской, Донецкаго Округа, Области Войска Донскаго“. Victor Awerin: „Ornithologische Beobachtungen während der Sommermonaten 1909 und 1910 in der Umgegend der Stanitza Mitjakinskaja Donez—Gebietes Gouvernement Don.“ 1911 г. Отд. оттискъ. *Отъ автора.* Изъ какого изданія—не извѣстно.

В. Г. Аверинъ: „Степная овсянка—*Emberiza citrinella somovi* nov. subsp“. W. Awerin: „Eine neue Form des Steppengoldammers—*Emberiza citrinella somovi* nov. subsp.“ Отд. оттискъ изъ „Трудовъ Общества Испытателей Природы“, т. LXV, 1911 г. *Отъ автора.*

В. М. Житковъ: „Полуостровъ Ямалъ“. Отд. оттискъ изъ „Записокъ по Гидрографіи“, вып. XXXIII, 1911 г. *Отъ автора.*

П. В. Нестеровъ: „Матеріалы по орнитофаунѣ юго-западнаго Закавказья и сѣверо-восточной части Малой Азіи“. P. V. Nesterov: „Matériaux pour la faune des oiseaux de la Transcaucasie S.-O. et de la partie N.-E. de l'Asie Mineure“. Отд. оттискъ изъ „Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ“, т. XVI, 1911 г. *Отъ автора.*

П. В. Нестеровъ: „Отчетъ о зоологическихъ изслѣдованіяхъ въ юго-западномъ Закавказьѣ (1909 и 1910) и Эрзерумскомъ вилайетѣ (1910)“. P. V. Nesterov: „Rapport sur une mission zoologique dans la partie S.-W. de la Transcaucasie (en 1909 et 1910) et dans le vilayet d'Erzeroum (en 1910)“. Отд. оттискъ изъ „Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ“, т. XVI, 1911 г. *Отъ автора.*

Э. Шарлеманъ: „Каталогъ Кіевскаго Зоологическаго Сада“. Изданіе Кіевскаго Общества Любителей Природы. Кіевъ. 1911. *Отъ автора.*

M. Härms: „Ornithologische Reminiscenzen“. Sonderabdruck aus Reichenow's „Ornithol. Monatsberichte“. Juli—Augustheft, 1910. *Отъ автора.*

J. Thienemann: „X. Jahresbericht (1910) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft“. Sonderabdruck aus „Journal für Ornithologie“. Oktoberheft, 1911. *Отъ автора.*

Harald Baron Loudon: „Zwei neue Drosselformen“. Sonderabdruck aus Reichenow's „Ornithol.“ Monatsberichte. Januarheft, 1912. *Отъ автора.*

Harald Baron Loudon: „Meine vierte Reise nach Zentral-Asien und Talysch. Januar—März 1908“. Sonderabdruck aus „Bericht über den V. Internationalen Ornithologen-Kongress“. Berlin. 1910. *Отъ автора.*

Въ обмѣнъ на „Орнитологическій Вѣстникъ“ въ 1911 году были получены слѣдующія изданія:

„Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ“, 1911 г., т. XVI, №№ 1 и 2.

„Извѣстія Общества для изслѣдованія природы Орловской губерніи“, 1910 г., № 2. (Орнитологическія работы: С. Н. Горбачевъ.—Весенній пролетъ птицъ и инныя зоо- фенологическія наблюденія въ Орловскомъ уѣздѣ (1908, 09 и 10); А. С. Тарачковъ.—Наблюденія надъ весеннимъ перелетомъ птицъ въ Орловскомъ и Карачевскомъ уѣздахъ въ 1851 г.).

„Отчетъ о состояніи Московскаго Сельскохозяйственнаго Института за 1910 годъ“.

„Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института“, 1911 г., книги 1 и 2.

„Ежегодникъ Русскаго Горнаго Общества“, VII, 1911 г.

„Отчетъ по естественно-историческому музею въ Херсонѣ за 1910—1911 г.г.“.

„Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga“. LIV, 1911.

„Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu Riga“. Neue Folge. Dreizehntes Heft, 1911. (Ornithologie von F. E. Stoll.).

„Матеріалы къ познанію природы Орловской губерніи“, № 15, 1911 г. (В. О. Клеръ: „Матеріалы по гельминтологіи изъ Орловской губерніи.“).

„Труды Общества Испытателей Природы при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ“, т. XLIII, 1910 г. (В. Г. Аверинъ: „Къ орнитологіи Харьковской губерніи.“).

„Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея“, вып. XIX, 1911 г.

„Записки Императорскаго Харьковскаго Университета“, 1911 г.

„Труды Бессарабскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Естествознанія“, т. II, вып. I, 1910 г.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества“, 1911 г.

„Лѣсной Журналъ“, 1911 г.

Журналъ „Сельское Хозяйство и Лѣсоводство“, 1911 г.

„Труды Бюро по прикладной ботаникѣ“, 1911 г.

„Ученыя записки Императорскаго Казанскаго Университета“, 1911 г.

„Природа“. Журналъ Николаевскаго Общества Любителей Природы, № 2, 1911 г.

Журналъ „Природа Украйны“, выпускъ 1-ый, 1911 г. (Изданіе „Кружка натуралистовъ“ при Кіевскомъ Политехническомъ Институтѣ“).

Журналъ „Землеводѣніе“, 1911 г.

„ „Естествознаніе и Географія“, 1911 г.

„ „Любитель Природы“, 1911 г.

„ „Вопросы Колонизаціи“, 1911 г.

Всѣ изданія Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній.

Журналъ „Семья охотниковъ“, 1911 г. ¹⁾

„ „Извѣстія Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера“, 1911 г. (№ 15. Н. И. Яблонскій: „Изъ орнитологіи Сѣверо-Енисейской тайги“).

„ „Справочный листокъ Птицеводства“, 1911 г.

¹⁾ Орнитологическія статьи и замѣтки будутъ приведены въ „Обзорѣ орнитологическихъ статей русскихъ охотничьихъ журналовъ“.

Журналъ „Птицеводное Хозяйство“, 1911 г.
„Рыболовъ-Охотникъ“, 1911 г.
„Наша Птицеводная Жизнь“, 1911 г.
„Извѣстія по литературѣ, наукамъ и библіографіи“,
1911 г.



Вышелъ изъ печати 11 февраля (ст. ст.) 1912 г.—Ausgegeben am 11 Februar (a. St.) 1912.

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляковъ. Le rédacteur: G. I. Poliakov.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1912 годъ на:

Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета.

Въ Ученыхъ Запискахъ заключаются: I. Отдѣлъ Наукъ. II. Отдѣлъ критики и библиографіи. III. Университетская лѣтопись. IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей, памятники историческіе и литературные, съ научными комментаріями, и памятники, имѣющие научное значеніе и еще не обнаруженные.

Ученые Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не менѣе 13 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложений.

Подписная цѣна въ годъ со всеми приложеніями съ пересылкою 7 р. Подписка принимается въ Правленіи Университета.

Редакторъ А. Пюнтковский.

„Естествознаніе и Географія“.

Годъ изданія XVII-й. Выходитъ ежемѣсячно, за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (іюня—іюля), книжками въ 5—6 печатныхъ листовъ. Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библиотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній и для учительскихъ библиотекъ, учительскихъ институтовъ и семинарій и городскихъ училищъ; Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ ОДОБРЕНЪ за всѣ годы существованія и допущенъ на будущее время въ библиотеки подѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеній; Учебнымъ Комитетомъ Министерства Торговли и Промышленности РЕКОМЕНДОВАНЪ въ библиотеки коммерческихъ учебныхъ заведеній.

Журналъ ставитъ себѣ задачей удовлетворять научному интересу читателей въ области естествознанія и географіи, а также способствовать правильному постановкѣ и разработкѣ вопросовъ по преподаванію естествознанія и географіи. Въ журналѣ имѣются отдѣлы: 1) научно-популярныя статьи по всѣмъ отраслямъ естествознанія и географіи, статьи по вопросамъ преподаванія естествознанія теоретическаго и прикладнаго (садоводство, пчеловодство и т. под.) и географіи; 2) акваріумъ и терраріумъ; 3) библиографія (обзоръ русской и иностранной литературы по естествознанію и географіи); 4) хроника; 5) смѣсь; 6) вопросы и отвѣты по предметамъ программы.

Въ журналѣ были помѣщены статьи: И. Я. Акинфіева, А. П. Артари, проф. П. И. Бахметьева, В. Н. Волдырева, Л. П. Бородавскаго, проф. А. О. Брандта, В. В. Богданова, П. Вольногорскаго, Н. Н. Вакуловскаго, проф. С. П. Глазскаго, М. П. Голеникина, проф. А. С. Догеля, М. П. Демкова, Л. Н. Елагина, Е. В. Жадовскаго, Б. М. Житкова, В. Р. Заленскаго, проф. Н. Ю. Зографа, Н. О. Золотницкаго, А. П. Иванова, проф. Н. О. Кашенко, Н. М. Книповича, проф. Н. П. Кузнецова, проф. И. А. Каблукова, проф. Н. М. Кулагина, проф. Г. А. Кожевникова, М. А. Кожевниковой, проф. А. Н. Краснова, А. Ф. Лейстера, М. Э. Мендельсона, С. П. Меца, проф. Н. В. Насонова, Г. А. Надсона, проф. А. М. Никольскаго, К. Д. Носилова, проф. А. П. Павлова, А. Н. Рождественскаго, проф. В. В. Сапожникова, К. А. Сатунина, К. К. Сентъ-Илера, М. М. Сизова, В. П. Талиева, проф. К. А. Тимирязева, проф. А. А. Тихомирова, П. Р. Фрейберга, проф. Н. А. Холодковскаго, проф. В. М. Шимкевича, П. Ю. Шмидта, проф. И. П. Щелкановцева, проф. А. Эйхенвальда, Э. В. Эриксона и нѣкоторыхъ другихъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доставкой и пересылкою 4 р. 50 коп., на полгода съ пересылкою и доставкой 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цѣну можно получать журналъ за 1903—1910 гг.; за остальные годы (1896—1902) по 4 р. за каждый годъ съ пересылкой. Выписывающіе всю серію за первыя 10 лѣтъ платятъ 35 руб. съ пересылкой. Книжки журнала въ отдѣльной продажѣ стоятъ 75 коп. каждая.

Книжные магазины, доставляющие подписку, могут удерживать за комиссию и пересылку денег только 20 к. съ каждого годового полного экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается. При непосредственномъ обращеніи въ контору допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб. 50 коп. и къ 1-му юня 2 руб. Другихъ условий разсрочки не допускается.

Контора редакціи: Москва, Донская ул., д. Даниловой, кв. № 3.

Редакторъ-издатель М. П. Баравва.

„Труды Бюро по прикладной ботаникѣ“. 5-й годъ изданія.

Подписная цѣна на годъ 3 руб. съ доставкой и пересылкой. „Труды“ выходить по возможности ежемѣсячно (12 номеровъ въ годъ) подъ редакціей Р. Э. Регеля.

Въ складѣ изданій Бюро имѣются въ продажѣ:

„Труды Бюро“ т. т. I, II (1908 и 1909 г. г.) 3 руб.

„ „ т. III, (1910 г.) 3 руб.

„ „ т. IV (1911 г.) 3 руб.

А. Мальцевъ. Изученіе воздѣлываемыхъ растений, какъ основа развитія отраслей сельскаго хозяйства..... 45 коп.

А. Мальцевъ. Пивоваренные ячмени въ Россіи и настоящее положеніе ихъ въ хозяйствѣ и въ отпускной торговлѣ..... 50 коп.

Р. Регель, К. Фляксберггеръ и А. Мальцевъ. Важнѣйшія формы пшеницы, ячменей и сорныхъ растений Россіи, съ рис..... 10 коп.

Н. Скалзубовъ. Какъ выводятся новые сорта культурныхъ растений. Происхожденіе формъ растений, какъ основа практики сѣменоводства, съ 35 рис. 25 коп.
Дж. Шудль. Иллюстрація закона Менделя 10 коп.

Отдѣльные выпуски „Трудовъ“ по 1 руб.

Цѣны обозначены съ пересылкой. Выписать можно или черезъ редакцію (СПБ., Бабуринъ пер., д. 5) или черезъ книжный магазинъ, Киммеля въ Ригѣ; пробные номера высылаются по требованію безплатно.

Въ „Трудахъ“ помѣщаются научныя работы изъ области прикладной ботаники, куда относятся всякаго рода изслѣдованія, матеріалы и замѣтки по специальному изученію хлѣбовъ, кормовыхъ, огородныхъ, плодовыхъ и прочихъ воздѣлываемыхъ, а также и сорныхъ растений. Въ „приложеніяхъ“ къ „Трудамъ“ будутъ помѣщаться общедоступныя работы, излагающія современное положеніе нашихъ познаній по различнымъ отдѣльнымъ вышеуказаннымъ отраслямъ. Работы по мѣрѣ необходимости и возможности иллюстрируются. Научныя статьи сопровождаются резюме на одномъ изъ иностранныхъ языковъ, въ которыхъ подробно и по возможности дословно сообщается все то, что представляется новымъ въ данной работѣ. Цифровыя таблицы снабжаются заголовкомъ, а рисунки объяснительнымъ текстомъ на двухъ языкахъ.

Весь доходъ отъ подписки на „Труды Бюро по прикладной ботаникѣ“ обращается на улучшеніе самаго изданія.

Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института. Открыта подписка на 1912 годъ.

Извѣстія выходятъ четырьмя книгами въ годъ, составляющимъ не менѣе 35 листовъ текста in 8^о.

Программа Извѣстій. Офіціальный отдѣлъ. Правительственныя распоряженія, касающіяся М. С. Х. Института.

Постановленія Совѣта Института и относящіяся къ нимъ приложенія. Работы комиссій, назначаемыхъ Совѣтомъ Института для разслѣдованія различныхъ вопросовъ. Отчеты о командировкахъ членовъ совѣта и другихъ лицъ, служащихъ въ Институтѣ.

Нѣкоторые изъ журналовъ засѣданій Сельско-хозяйственнаго комитета, состоящаго при Институтѣ, а именно тѣ, которые имѣютъ особенное значеніе для учебной и ученой дѣятельности Института.

Годичный отчетъ о состояніи Института (въ приложеніи).

Неофіціальный отдѣлъ. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студентовъ Института и постороннихъ лицъ.

Какъ отдѣльныя самостоятельныя изслѣдованія, такъ и совмѣстныя работы, исполненныя въ лабораторіяхъ, кабинетахъ, на опытномъ полѣ, или на опытной станціи, пасѣкѣ, въ лѣсной дачѣ, огородѣ, питомникѣ, саду и пр.

Метеорологическія наблюденія, произведенія на обсерваторіи Института.

Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, чертежами, диаграммами и пр. и, по желанію автора, краткимъ резюме на какомъ-либо иностранномъ языкѣ (резюме должно быть составлено самимъ авторомъ и прислано въ редакцію одновременно со статьей).

Подписка принимается въ канцеляріи Московскаго Сельскохозяйствен. Института и въ книж. магаз. Карбасникова (Москва, Варшава, Вильна, С.-Петербургъ).

Подписная цѣна въ годъ, за четыре книги, 5 р.; для студентовъ высшихъ учебныхъ заведеній 2 р. 50 к.; цѣна отдѣльной книги 1 р. 50 к.

Редакторы С. И. Ростовцевъ.

Д. Н. Прянишниковъ.

„Извѣстія Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера“

Открыта подписка на 1912 годъ на двухнедѣльный журналъ. Годъ изданія четвертый. (Журналъ жизни сѣвернаго края). Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца. Задачи и цѣли общества опредѣляютъ и задачи „Извѣстій“.

Программа журнала: Указанія. Распоряженія и постановленія правительственныхъ и общественныхъ учрежденій центральныхъ и мѣстныхъ, имѣющія отношенія къ жизни Сѣвера. Текущая дѣятельность Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера. Отдѣльныя статьи и доклады по изученію Сѣвера и выясненію условий его развитія. Обсужденіе предположеній, направленныхъ къ измѣненію условий жизни и производительности Сѣвера. Хроника частной, правительственной и общественной инициативы въ дѣлѣ изученія Сѣвера, развитія его производительныхъ силъ и условий жизни населенія. Отдѣльныя замѣтки и сообщенія о жизни края и ея изученія. Очерки жизни. Сообщенія изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами Сѣвера. Обзоръ литературы о Сѣверѣ. Справочный отдѣлъ. Консультанія по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества (отвѣты редакціи). Объявленія.

Подписная плата: 1) для членовъ Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера 3 руб. въ годъ; 2) для прочихъ подписчиковъ 4 руб. въ годъ. Допускается разсрочка по полугодіямъ и по четвертямъ года, при взносѣ денегъ впередъ. Плата за объявленія на нервой страницѣ журнала—20 коп. за строку негита, на послѣдней—10 коп.

Подписка на „Извѣстія А. О. И. Р. С.“ принимается во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Имперіи безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ.

Въ Архангельскѣ подписка и объявленія принимаются: въ Библіотекѣ, въ Обществѣ въ зданіи Городской Думы, въ Городск. Публичной библіотекѣ, въ Магазины Об-ва Потребителей и въ книжныхъ магазинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ.

Г. иностранніе публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по адресу: Архангельскъ, Правленіе Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера. Рукописи слѣдуетъ направлять по адресу редакціи. Статьи и корреспонденціи оплачиваются по усмотрѣнію редакціи. Пробныя №№ высылаются за 4 семикоп. марки. За перемѣну адреса взимается 4 семик. марки.

Издатель *Архангельское Общество
изученія Русскаго Сѣвера.*

Редакторъ В. Ленгауэръ

„Любитель Природы“. Открыта подписка на 1912 годъ. Годъ VII-й. Популярный ежемѣсячный журналъ для любителей и учащихся. Органъ Общества Любителей Природы въ С.-Петербургѣ. Утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія мнѣніемъ Ученаго Комитета опредѣлено ввести журналъ въ списокъ изданій, заслуживающихъ вниманія при пополненіи учебннческихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Утвержденнымъ Г. Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣіемъ мнѣніемъ Ученаго Комитета журналъ за 1906 годъ одобренъ для библіотекъ подѣлкомствѣнныхъ Главному Управленію учебныхъ заведеній.

Журналъ рекомендованъ въ циркулярѣ по военно-учебнымъ заведеніямъ для фундаментальныхъ и рѣзныхъ библіотекъ военно-учебныхъ заведеній.

Постановленіемъ Учебнаго Комитета Министерства Торговли и Промышленности журналъ рекомендованъ для библіотекъ коммерческихъ училищъ.

Программа журнала: Растеніе и его жизнь въ естественныхъ и искусственныхъ условіяхъ (комнатная культура, оранжерейная и проч.). Животное царство—акваріумъ, терраріумъ и виваріумъ; пѣвчіи и декоративныя птицы. Изготовленіе коллекцій по растительному и животному царствамъ.

Кромѣ оригинальныхъ и переводныхъ статей по перечисленнымъ рубрикамъ, въ журналъ помѣщаются также: 1) сошты начинающимъ любителямъ; 2) мелкіи замѣтки; 3) свѣдѣнія о дѣятельности Общества Любителей Природы и другихъ обществъ и учреждений, преслѣдующихъ аналогичныя задачи; 4) критика и библіографія; 5) вопросы и отвѣты; 6) объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками, въ 2 печатныхъ листа, съ рисунками и чертежами въ текстѣ и на отдѣльныхъ листахъ.

Въ 1912 году при журналѣ будутъ разосланы съмена растеній годныхъ для комнатной и воздушной культуры.

Подписка цѣна на годъ съ доставкой и пересылкою 3 руб. На пересылку подъ заказной бандеролью прилагаемыхъ къ журналу цвѣтныхъ таблицъ къ подписной платѣ слѣдуетъ прибавлять 21 коп. За перемѣну адреса высылать 25 коп. (можно марками). Члены Общества Любителей Природы, унававшие годовой членскій взносъ (5 руб.), получаютъ журналъ бесплатно. Журналъ за 1-ый годъ изданія (1906 г.) разошелся сполна. Полный годовой комплектъ журнала за 1907 г. со всѣми приложениями (въ томъ числѣ 3 цвѣтныхъ таблицы) высылается за 4 руб.: за 1908 и 1909 г.—по 3 руб. 50 коп. съ пересылкой. Объявленія, для помѣщенія въ журналъ, принимаются въ конторѣ редакціи за плату: по 10 руб. за страницу, 6 руб. за $\frac{1}{2}$ страницы, 4 руб. за $\frac{1}{4}$ страницы, 2 руб. 50 коп. за $\frac{1}{8}$ страницы и 1 руб. 50 коп. за $\frac{1}{16}$ страницы—за одну разъ. При повтореніи—скидка по соглашевію.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ конторѣ редакціи у В. П. Разумова (Спб., Екатерининская ул., 3, кв. 63), а также во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: Спб., Петербургская Сторона, Звѣринская ул., 17А, кв. 7.

Редакторъ И. Мамонтовъ.

„Птицеводное Хозяйство“. Открыта подписка на 1912 годъ.

Органъ Императорскаго Россійскаго Общества Сельско-Хозяйственнаго Птицеводства. Годъ изданія 14-й. Подписная цѣна: на годъ—3 р., на $\frac{1}{2}$ года—1 р. 50 к., на 3 мѣс.—75 к. Для членовъ Общества и Отдѣловъ, а равно и для сельскихъ школъ, народныхъ учителей и духовенства на годъ—2 р. съ доставкой и пересылкой во всѣ мѣстности Россійской Имперіи.

Цѣна отдѣльнаго номера 15 к. За перемѣну адреса—7 к. Программа журнала включаетъ въ себя слѣдующіе отдѣлы: I.—Оффиціальныя: распоряженія правительства, извѣщенія отъ Общества, протоколы засѣданій Совѣтовъ и общихъ собораній Центрального Общества и Отдѣловъ. II.—Отчеты о дѣятельности Общества и Отдѣловъ. III.—Отчеты о птицеводныхъ выставкахъ Центрального Общества, Отдѣловъ и другихъ Обществъ. IV.—Оригинальныя и переводныя статьи по птицеводству. V.—Описаніе птицеводныхъ хозяйствъ. VI.—Новости Птицеводства. VII.—Замѣтки по птицеводству.

VIII.—Корреспонденция. IX.—Среди газетъ и журналовъ. X.—Хроника. XI.—Вопросы и отвѣты. XII.—Объявленія.

Кромѣ того, будутъ помѣщаться статьи по голубоводству, кролиководству и козоводству.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала „Птицеводное Хозяйство“—Москва, Театральная площадь, Музей птицеводства.

Редакторъ *Д. Халтуринъ.*

„Наша Птицеводная Жизнь“. Открыта подписка на 1912 годъ на единственный въ Россіи большой частный иллюстрированный ежемѣсячный журналъ прогрессивнаго птицеводства, кролиководства и козоводства. (Подписной годъ считается съ Октября по Октябрь) VI-й г. издаваемый съ 1906 г. въ Кишиневѣ при ближайшемъ участіи извѣстныхъ отечественныхъ дѣятелей по названнымъ выше отраслямъ сельского хозяйства (съ отдѣломъ собаководства). Программа журнала прежняя:

Подписная цѣна: а) съ пересылкой и доставкой во всѣ города и мѣстности Россіи на годъ 3 руб. Отдѣльные номера 25 к.; б) за границу на годъ 5 руб. Для земствъ, народныхъ учителей и сельского духовенства и крестьянъ 2 руб. въ годъ. При выпискѣ 10 экземпляровъ—одинадцатый безплатно.

Новые подписчики получаютъ всѣ номера отъ начала года. Подписные деньги адресовать: г. Кіевъ, Кадетскій корпусъ, барону Гейкингу.

Отвѣтственный редакторъ-издатель, сотрудникъ Департамента Земледѣлія по птицеводству, баронъ Г. А. Гейкингъ.

„Сельское хозяйство и лѣсоводство“. Открыта подписка на ежемѣсячный журналъ Главнаго управленія землеустройства и земледѣлія 1912 г. LXXII г. Журналъ ставитъ себѣ задачей—служить проводникомъ агрономическихъ знаній и быть органомъ дѣятелей въ области сельского хозяйства, какъ научной, такъ и практической. Съ этою цѣлью на страницахъ „Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства“ будутъ помѣщаться: 1. Оригинальныя статьи техническаго и экономическаго характера по всѣмъ отраслямъ сельского хозяйства, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, не исключая землеустройства, переселенія, колонизаціи, рыбныхъ и звѣриныхъ промысловъ, а равно и лѣсоводства. 2. Обзоры русской и иностранной литературы по сельскому хозяйству. 3. Библіографія изданій, отвѣчающихъ характеру и программѣ журнала. 4. Переводы наиболее выдающихся произведеній иностранной сельско-хозяйственной литературы въ видѣ приложеній къ журналу отдѣльными листами. 5. Объявленія. „Сельское Хозяйство и Лѣсоводство“ выходитъ ежемѣсячно книжками въ разлѣтѣ 15 печатныхъ листовъ, съ рисунками. Подписная цѣна на журналъ съ доставкой и пересылкой: въ Россію на годъ 6 руб., на полгода 3 руб., въ государствахъ почтоваго союза на годъ 8 руб., на полгода 4 руб. Отдѣльный номеръ 1 руб. За квитанцію въ приемъ подписной платы доплачивается 5 коп.

Полные комплекты журнала за 1901—1905 гг. продаются по 7 р., за 1906 г.—по 3 р., за 1909 г. (съ двумя книжками за 1908 г. и приложеніемъ: В. Гарвудъ — „Созданіе новыхъ растительныхъ формъ. Очеркъ жизни и дѣятельности Л. Бербенка“), за 1910 годъ съ приложеніемъ: Г. Де-Фризъ — „Племенное растеніеводство (сортководство)“—по 6 руб. за годовую экземпляръ съ пересылкою, и за 1911 годъ съ приложеніемъ: В. А. Генри — „Корма и кормленіе“.

Подписка принимается въ конторѣ журнала „Сельское Хозяйство и Лѣсоводство“—С.-Петербургъ, Вас. Остр., 10 л. д. 23, кв. 31.

Редакторъ *П. М. Дубровский.*

„Плодоводство“, принимается подписка на 1912 годъ на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ. Издаваемый Императорскимъ Россійскимъ Обществомъ Плодоводства 1912 годъ—XXIII годъ изданія.

Журналъ содержитъ слѣдующіе отдѣлы: I. Извѣстія о дѣятельности Общества. II. Статьи: а) по плодоводству. б) по огородничеству и спеціальнымъ культурамъ, в) по садоводству при народныхъ школахъ. III. Корреспонденція. IV. Обзоръ спеціальныхъ журналовъ. V. Разныя извѣстія. VI. Библіографія. VII. Вопросы и отвѣты. VIII. Объявленія.

Въ 1912 г. подписчики, кромѣ хромолитограф. табл. плодовъ и сѣмянъ полезныхъ растений, получать, въ видѣ **бесплатныхъ** приложений: 1) Новое иллюстрированное сочиненіе П. М. Еремѣева, подъ редакціей А. С. Бондарцева: Грибныя болѣзни плодовыхъ и огородныхъ растений. Часть I. Болѣзни плодовыхъ деревьевъ и борьба съ ними. 2) иллюстриров. книжку, составл. по сочиненію всемірно извѣстнаго пловода Р. Гёте „Использованіе стѣнъ для шпалерной культуры плодовыхъ деревьевъ и винограда“ и 3) новое иллюстриров. сочиненіе К. П. Сахновскаго: „Доходный садъ и огородъ русскаго крестьянина“, удостоенное 1-й преміи имени П. С. Крючкова, за лучшія брошюры по плодоводству для народа.

Въ 1912 г. въ журналѣ „Плодоводство“ будетъ напечатанъ рядъ статей по плодоводству въ популярномъ изложеніи, приспособленномъ для народной школы и хуторянъ.

Подписная плата съ доставкой и пересылкой два рубля въ годъ (за границу три рубля).

Подписка принимается въ конторѣ редакціи—С.-Петербургъ. Чернышевъ пер., № 16.

За объявленія взимается: за 1 страницу—15 р., $\frac{3}{4}$ стран.—12 р., $\frac{1}{2}$ стран.—9 р., $\frac{1}{4}$ стран.—5 р., $\frac{1}{8}$ стран.—3 р. Если объявленіе печатается 6 разъ, то дѣлается скидка въ 10%, а если 12 разъ, то 20%. За разсылку приложений, вѣсомъ не болѣе лота, съ каждой 1000 экз. платится 8 р. и за каждый лишній лотъ по 4 руб.

Редакторъ В. Эндеръ.

„Лѣсной Журналъ“. XLII годъ изданія. Изданіе Лѣснаго Общества въ С.-Петербургѣ. Въ 1912 году будетъ выходить 10 выпусками въ общемъ свыше 80 печатныхъ листовъ съ таблицами, планами, картами, рисунками и портретами. Журналъ печатается въ количестве 2000 экземпляровъ.

ПРОГРАММА: I. Оригинальныя статьи по всѣмъ отраслямъ лѣснаго хозяйства: лѣсовѣдѣнію и лѣсоводству, методикѣ изученія лѣсоводственныхъ вопросовъ и лѣсной таксаціи, экономикѣ и организаціи лѣснаго хозяйства, оцѣнкѣ лѣсовъ, лѣсной статистикѣ, исторіи лѣснаго хозяйства и вопросамъ государственнаго лѣснаго хозяйства. II. Рефераты и переводныя статьи по тѣмъ же отраслямъ лѣснаго хозяйства. III. Извѣстія о дѣятельности Лѣсныхъ Обществъ. IV. Правительственныя распоряженія. V. Лѣсоторговныя замѣтки. VI. Хроника. VII. Библіографія и новыя книги. VIII. Вопросы и отвѣты. IX. Письма въ Редакцію.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 6 рублей въ годъ, съ пересылкой и доставкой. Учащіеся при непосредственномъ обращеніи къ г. Казначею Общества (а не черезъ книжныя магазины) могутъ получать журналъ за половинную плату, т. е. за 3 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Лѣсномъ Обществѣ (у Синяго моста, д. Министерства Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ).

Статьи и письма въ редакцію просятъ адресовать на имя редактора: Сиб. Императорскій Лѣсной Институтъ, проф. Г. О. Морозову. Подписныя же деньги и плату за объявленія г. Казначею Лѣснаго Общества Леониду Петровичу Серебрякову. Сиб. Лѣсной Департаментъ.

Полные экземпляры Лѣснаго Журнала за прошлые годы продаются по слѣдующимъ цѣнамъ: 1) до 1905 года—по 3 руб. за годъ. 2) съ 1905 года по 6 руб. за годъ. 3) Полный же комплектъ за всѣ годы, исключая: 1871, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 96, 97, 98, 1904, 1908 и 1909, которыхъ уже нѣтъ, продается за 28 руб. 4) Отдѣльные №№ Л. Ж.—до 1905 г. по 50 к., а съ 1905 по 1 руб.

Такса для объявлений. Позади текста: за 1 стр. (in 8⁰) 12 р., $\frac{1}{2}$ стр. 7 р., $\frac{1}{4}$ стр. 4 р., $\frac{1}{8}$ стр. 2 р. 50 к., $\frac{1}{16}$ стр. 1 р. 50 к. Впереди текста: за 1 стр. (in 8⁰) 18 р., $\frac{1}{2}$ стр. 10 р., $\frac{1}{4}$ стр. 6 р., $\frac{1}{8}$ стр. 4 р., $\frac{1}{16}$ стр. 2 р. За повторные объявления дается уступка: за 3 раза—20% за 6 раз—30% и за 10 раз—50%. За рассылку при журнале объявлений всем каждое отдельно не тяжелее одного лота, взимается восемь рублей с тысячи экземпляров. За каждый лишний лот прибавляется 5 рублей с тысячи. Деньги уплачиваются при заказе все сполна.

Редактор проф. Г. О. Морозов.

„СЕМЬЯ ОХОТНИКОВЪ“. В годъ изданія. Открыта подписка на 1912 годъ на охотничій иллюстрированный журналъ Выходитъ два раза въ мѣсяцъ. 24 №№ 4 р. 50 к. Допускается подписка по четвертямъ года и по полугодіямъ (1 р. 25 к. и 2 р. 50 к.).

Программа изданія отвечаетъ всемъ запросамъ охотничьей жизни, обнимаетъ собой все виды нашихъ разнообразныхъ охотъ—псовой, ружейной, охоты съ ловчими птицами.

Спеціальныя отдѣлы по вопросамъ: охотничье оружіе, собаководство, дичеразведение, орнитологія, маммологія, рыболовство, безлестристка, описаніе различныхъ способовъ охоты, обзоръ выставокъ, сидокъ и полевыхъ испытаній, хроника, корреспонденція, вопросы и ответы.

Подписчики журнала получаютъ безплатную премію: „Легавыя Собаки“, при участіи лучшихъ знатоковъ охотничьей собаки. Лица, внесшія деньги частями, получаютъ указанную премію при послѣднемъ взносъ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Алсераки С. Н., Бутурлинъ С. А., Бронцнъ И. С., Вилловскій Д. А., Востряковъ Б. Д., Гемель Л. К., Давиловъ А. О., Де-Конворъ Л. В., Дяковъ В. П., Донникъ Н. Я., Дмитріева-Сулума М. Н., Дубенскій Э., Зарудный Н. А., Жбановъ К. М., Елизуръ В. Г., Пвашенцевъ А. П., Калитовскій Г. З., Карновъ А. К., Картевъ С. А., Каръевъ С. С., Качіони С. С., Кипъ-ташъ, Кишенскій Н. П., Корчемкинъ Г. Г., Копыловъ П. Н., Лавге П. В., Лебедевъ В. А., Лейдекеръ С. К., Леоповъ А. П., Лялинъ А. Н., Липицкій К., Мамонтовъ В. С., Оглоблинъ Н. А., Олочининъ Е. Н., Орнатскій П. В., Пачоскій П. К., Песчанскій І. П., Поздняковъ А. А., Полторацкій А. В., Поплавскій І. Я., Проскура К. А., Разевигъ В. А., Разунаевъ В. Н., Рашевскій Н. Н., Романовскій Л. Н., Саблянь П. Н., Санчо Г., Сатунинъ К. А., Селастенниковъ А., Скрипкинъ В. О., Столировъ А. В., Сумароковъ К. В., Тарновскій Г. В., Терещенко К. І., Тюльпановъ А. С., Ушаковъ В. Е., Шишовъ Н. А., Финогеновъ В. П., Энгельмейеръ А. К., Эмке А. О., Яблонскій Н. І., и другіе.

Подписка принимается: въ редакціи (Москва, Сущевскій тупикъ, д. № 11, кв. 2, телефонъ № 166-38); въ оружейныхъ и книжныхъ магазинахъ г. Москвы и во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи.

Пробный № высылается за 14 к. почтовыми марками.

Рыболовъ и Охотникъ, открыта подписка на 1912 годъ на двухквѣтный иллюстрированный журналъ, издаваемый въ Вяткѣ съ 1909 года.

Журналъ издается по типу лучшихъ французскихъ спортивныхъ журналовъ, по программѣ: Законы и правительственныя распоряженія по рыболовству и охотѣ.—Повѣсти, рассказы, стихотворенія, описанія.—Спеціальныя статьи по руж. техникѣ, собаководству.—Наши прѣсноводныя рыбы: ихъ описаніе и способы ловли.—Рыболовныя снасти: удильща, крючки, лески и т. д.—Приманки и прикормки. Галерея писателей рыболововъ и охотниковъ.—Рыболовство.—Изъ жизни общества и кружковъ.—Хроника.—За границей.—По Россіи.—Смѣсь.—Отвѣты на вопросы.—Рисунки, карикатуры.—Особая приложеніе—картины съ фотографій С. А. Лобовикова. Доплатная премія: „Занеска объ ужевѣ рыбы“ С. Т. Аксакова съ портретомъ и біографіей автора.

Подписная цена: без премій на годъ 2 р., $\frac{1}{2}$ года—1 р. 10 к., съ преміей на годъ—2 р. 50 к., $\frac{1}{2}$ г.—1 р. 60 к. Проб. № за 7 к. марку.

Подписка принимается: въ редакціи, Вятка, Николаевск, д. Берманъ и во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи.

Ред.-издатель О. Куриловъ.

Физикъ-Любитель.

Изд. съ 1904 г. Общедоступный журналъ по физическимъ наукамъ и ихъ приложеніямъ въ школѣ, техникумъ и любительской практикѣ.

Постоянные отдѣлы журнала: астрономія, радиоактивные явленія и электроныя теорія, самодѣльные приборы, химія любителя, воздухоплаваніе, домашнія электротехника, любительская фотографія, переписка читателей, запросы и отвѣты.

Подписной годъ учебный (съ августа по май). 20 №№ въ годъ. Цена: 3 руб. въ годъ. Наложеннымъ платежомъ на вышедшіе №№ 3 р. 20 к.

Отзывы печати, подробная программа, образцы рисунковъ, содержаніе за прошлые годы и каталоги изданій и діапозитивовъ высылаются бесплатно по первому требованію.

При конторѣ журнала: 1) складъ изданій „Физика-Любителя“. 2) Складъ діапозитивовъ для волшебнаго фонаря. Гор. Николаевъ, Херс. губ.

„Литературно-Медицинскій Журналъ“

Открыта подписка на ежемѣсячное изданіе въ 1912 г. подъ редакціей д-ра Б. А. Окса. Пятнадцатый годъ изданія. Учебнымъ отдѣломъ Министерства Торговли и Промышленности рекомендованъ для фундаментальныхъ библиотекъ подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеній. Подписчики „Литературно-Медицинскаго Журнала“ получаютъ бесплатно ежемѣсячный народный медицинскій Журналъ „Домашній Докторъ“ подъ редакціей д-ра Б. А. Окса. Въ журналѣ общепонятнымъ языкомъ излагается все, что способствуетъ охраненію здоровья и продленію жизни.

Болезни, предупрежденіе и лѣченіе ихъ.—Домашній лѣчебникъ.—Домашняя ветеринарія.—Растительный столъ.—Практическая медицина.—Общественная медицина.—Медицинскія замѣтки.—Почтовый ящикъ для отвѣтовъ на вопросы читателей. Въ 1912 году въ „Литературно-Медицинскомъ Журналѣ“ будутъ напечатаны:

I. Научный отдѣлъ. Проф. Заблудовскій. „Техника массажа“. Переводъ съ 3-го нѣмецк. изданія (1911 г.), взмѣненнаго и дополненаго д-ромъ І. Эйгеромъ, главнымъ врачомъ амбулаторіи для массажа въ Берлинѣ. Съ 80 рисунками въ текстѣ.—Д-ръ Е. А. Аркинъ. „Мозгъ и душа“.—Д-ръ мед. В. Гаммеръ. „Половое несчастье женщины“ (перев. съ нѣм.)—Д-ръ мед. С. М. Аренскій. „Домашнія лѣчебныя средства“.—Магистръ І. Миндесъ. „Несовмѣстимыя лѣкарственные средства и неразумныя рецепты“.—Проф. А. Келлеръ. „Первая врачебная помощь при поврежденіяхъ“.—Проф. А. Форель. „Гипнотизмъ и лѣченіе внушеніемъ“ (окончаніе).—Женщина-врачъ М. Ф. Мохначева. „Болезни дѣтей и уходъ за больными дѣтьми“ (окончаніе).—„Санитаръ“. Первая помощь при внезапныхъ заболѣваніяхъ и въ несчастныхъ случаяхъ. Съ 104 рис. въ текстѣ. Перев. съ 2-го изданія прусскаго министерства внутреннихъ дѣлъ.

II. Литературный отдѣлъ: Д-ръ А. Н. Муморцевъ. „Страхъ смерти въ произведеніяхъ Льва Толстого“.—Д-ръ В. М. Бурлаковъ. „І. Н. Толстой—великій психологъ интуиціи“.—М. Цитронъ. 1) „Незамѣтное“. 2) „Этотъ служить будетъ“ (изъ фельдшерскаго быта).—Н. Савета. „Бунтъ сумасшедшихъ“.—Н. К. Бѣлецкій. „Товарищи по несчастью“ (разсказы).—Бор. Фромметъ. „Самоубійства, какъ барометръ“.—Д-ръ Н. Филончиковъ. „Сила внушенія“.—В. Брусилынъ. „Литературное обозрѣніе“: разборъ новыхъ книгъ и произведеній, соприкасающихся съ медициной и появляющихся въ текущей журнальной литературѣ.

III. Библиографія.

IV. Двѣнадцать №-ровъ Журнала „Домашній Докторъ“ съ разнообразнымъ содержаніемъ.

Цѣна „Литературно-Медицинскаго Журнала“: четыре рубля за годъ, два рубля за полгода и одинъ рубль за 3 мѣсяца съ перес.

Подписка на „Литературно-Медицинскій Журналъ“ принимается во всѣхъ почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Россійской Имперіи, безъ всякой надбавки подписной цѣны, а также въ конторѣ редакціи (С.-Петербургъ, Офицерская, 26). Желающіе воспользоваться разсрочкой обращаются исключительно въ контору журнала. Редакція отвѣчаетъ за исправную доставку своихъ изданій при подпискѣ чрезъ контору редакціи, а также чрезъ всѣ почтово-телеграфныя учрежденія въ Россіи.

С.-Петербургъ, Офицерская, 26.

Редакторъ-издатель д-ръ Б. А. Оксѣ.

„Вѣстникъ Любителя Акваріума и Терраріума“,

двухнедѣльный журналъ, издаваемый Кіевскимъ Обществомъ любителей природы.

Въ журналѣ помѣщаются статьи о содержаніи рыбъ и другихъ водяныхъ животныхъ въ акваріумѣ и на открытомъ воздухѣ, — объ обитателяхъ терраріума и уходѣ за ними, о комнатной культурѣ растений. Кромѣ того ведутся постоянные отдѣлы: Обзорѣніе русской и иностранной литературы по акваріуму и терраріуму, любительская хроника и сезонныя замѣтки, заключающія въ себѣ описаніе всѣхъ работъ любителя акваріума и комнатныхъ растений. Особое вниманіе редакція обращаетъ на школьный отдѣлъ, впервые въ Россіи введенный при нашемъ журналѣ.

Кромѣ художественныхъ приложеній на отдѣльныхъ листахъ, какъ черныхъ, такъ и въ краскахъ, въ 1912 г. всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ разсылаться и литературныя приложевія, въ томъ числѣ монографіи, посвященныя лабиринтовымъ рыбамъ, кромѣ того подписчикамъ будетъ разсылаться вторая часть монографіи „Семейство Сургинodontidae, зубатые карпы“, заключающая въ себѣ описаніе всѣхъ введенныхъ когда-либо въ Европу живородящихъ рыбокъ этого семейства.

Первую часть гг. подписчики могутъ получать при уплатѣ 75 копѣекъ.

Вѣстникъ Любителя Акваріума и Терраріума Ученымъ Комитетомъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія (Журналъ Ученаго Комитета за № 351) признанъ заслуживающимъ вниманія при пополненіи библіотекъ, подвѣдомственныхъ Главному Управленію учебныхъ заведеній.

Подписная цѣна, со всѣми приложеніями, остается прежняя 3 руб. 50 коп. въ годъ.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 1 руб. 50 коп. къ 1 Апрѣля 1 руб., къ 1 Августа 1 руб. Проспекты бесплатно.

Подписной годъ съ 1-го Января 1912 года по 1-е Января 1913 года.

Такъ какъ, ида являстрѣчу желаніямъ гг. подписчиковъ, мы перемѣнили срокъ подписки съ 1 Марта на 1 Января и старые подписчики благодаря этому получаютъ въ 1912 году не 24 №№, а 20 (т. к. до 1 Марта ими уже уплачено), то подписная цѣна для старыхъ подписчиковъ, со всѣми приложеніями, назначается не 3 руб. 50 коп., а 2 руб. 95 коп. въ годъ съ доставкой и пересылкой.

Адресъ редакціи и конторы; Кіевъ, Львовская, д. № 45.

Редакторъ Б. Тимофѣевичъ.



„Природа“ ежемѣсячный популярный естественно-историческій съ иллюстраціями въ текстѣ журналъ для самообразованія подъ редакціей проф. В. А. Вагнера и проф. П. В. Писаржевскаго.

Содержаніе: Философія естествознанія. Астрономія. Физика. Химія. Геологія съ палеонтологіей. Минералогія. Общая біологія. Зоологія. Ботаника. Человѣкъ и его мѣсто въ природѣ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: проф. С. В. Аверинцевъ, акад. проф. Н. И. Андрусовъ, проф. В. М. Арнольдъ, лаб. Г. Ф. Арнольдъ, проф. Н. А. Артемьевъ, акад. проф. П. Н. Бекетовъ (+), проф. П. И. Боргманъ, проф. А. Н. Бахъ (Женева), прив.-доц. А. И. Бачинскій, прив.-доц. В. А. Бородавскій, проф. В. А. Вагнеръ, проф. Ю. Н. Вагнеръ, акад. проф. П. И. Вальденъ, проф. Б. Ф. Веригъ, акад. проф. В. И. Вернадскій, лаб. В. Н. Верховскій, проф. Г. В. Вульфъ, М. И. Гольдсмитъ (Парижъ), проф. А. Г. Гурвичъ, проф. В. Я. Давилевскій, В. А. Дубянский, Е. А. Елачичъ, проф. В. В. Завьяловъ, проф. В. Р. Заленскій, проф. А. А. Ивановъ, проф. В. И. Кнатьевъ, лаб. П. В. Казанецкій, проф. А. В. Коссовскій, проф. П. К. Кольцовъ, проф. А. И. Красновъ, проф. Н. И. Кузнецовъ, прив.-доц. П. В. Кузнецовъ, проф. П. И. Лазаревъ, лабор. Г. А. Левитскій, Л. Д. Лукашпичъ, проф. А. К. Медвѣдевъ, проф. М. А. Мензбиръ, проф. П. Г. Меликовъ, проф. С. И. Метальниковъ, П. А. Морозовъ, прив.-доц. А. В. Немцовъ, проф. А. В. Нечаевъ, проф. А. М. Никольскій, лаб. А. Г. Огородниковъ, проф. А. В. Павловъ, проф. В. И. Паладинъ, проф. Л. В. Писаржевскій, проф. В. В. Подвысоцкій, проф. К. Д. Покровский, А. Л. Рихтеръ, Н. А. Рубакинъ, проф. Д. П. Рузскій, препод. С. И. Созоновъ, лаб. И. И. Соколовъ, проф. С. М. Тататаръ, докт. Л. А. Тарасевичъ, маг. хим. А. А. Титовъ, адъюнктъ-астрономъ Пулк. обсерв. Г. А. Тиховъ, проф. М. М. Тихвинскій, проф. Б. Е. Тищенко, проф. П. А. Умовъ, проф. О. Д. Хвольсонъ, преп. А. А. Черновъ, проф. Л. А. Чугаевъ, прив.-доц. В. В. Шипчинскій, проф. Е. А. Шульцъ, преп. А. И. Яницкій, проф. А. И. Яроцкій.

Въ портфель редакціи мѣются слѣдующія статьи: Проф. С. В. Аверинцева: „По побережью чернаго континента (изъ записной книжки натуралиста)“. Акад. проф. Н. И. Андрусова: „О возрастѣ земли“. Акад. проф. П. Н. Бекетова: „Попытка объясненія свойствъ радія“. Проф. П. И. Боргмана: „Что такое свѣтъ“. Проф. В. А. Вагнера: „До-психическая жизнь животныхъ“. Проф. Ю. Н. Вагнера: „Новое о наследственности“. Акад. проф. П. И. Вальдена: „Ломоносовъ какъ химикъ“. М. И. Гольдсмитъ (Парижъ): „Оль искусственною партеногенезисъ“. Проф. А. Г. Гурвичъ: „Современная проблема ученія о наследственности“. В. А. Дубянский: „Къ біологіи русской пустыни“. Проф. А. А. Иванова: „Солнечныя пятна“. Проф. А. Н. Краснова: „Антропо-географическіе очерки“. Проф. С. И. Метальникова: „Физиологическія причины старости и смерти“. П. А. Морозова: „Врехенныя звѣзды“. Проф. А. В. Металева: „Успѣхи геологіи“. Проф. Л. В. Писаржевскаго: „Объ эпергетическомъ міровоззрѣніи“. Проф. С. М. Тататара: „Что такое термохимія“. Адъюнктъ астроном. Пулк. обсерв. Г. А. Тихова: „Новое о планетахъ“. Проф. Л. А. Чугаева: „О границахъ превращенія матеріи“. Проф. Е. А. Шульца. „Регенерація, какъ одна изъ существенныхъ особенностей жизни“ и друг.

Условія подписки: цѣна въ годъ (съ доставкой и пересылкой)—4 руб.; на три мѣсяца—1 руб. 50 коп., за границу на годъ—6 руб.

При подпискѣ въ главной конторѣ (Москва, Мясницкая, Мясютинскій пер., 16) допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подпискѣ и 1 р. 50 к. не позже 15 іюня.

Цѣна отдѣльной книжки 50 к.

За перемѣну адреса—25 к.

Объявленія печатаются въ журналѣ по слѣдующей цѣнѣ: на обложкѣ: 4-я стр.—100 р., $\frac{1}{2}$ стр.—60 р., $\frac{1}{4}$ стр.—35 р.; 2-я и 3-я стр.—75 р., $\frac{1}{2}$ стр.—40 р., $\frac{1}{4}$ стр.—25 р., послѣ текста: стр.—60 р., $\frac{1}{2}$ стр.—35 р., $\frac{1}{4}$ стр.—20 р.

Подписка принимается: Въ конторѣ журнала „Природа“, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отдѣленіяхъ.

Адресъ главной конторы и редакціи: Москва, Мясницкая, Мясютинскій пер., д. № 16. Телефонъ № 410-81.



Имѣются въ продажѣ Ежегодники Русскаго Торкаго Общества.

Вышло семь выпусковъ. Каждый выпускъ богато иллюстрированъ рисунками и картами. Между прочимъ въ нихъ помѣщены статьи:

Въ I вып. С. Керцелл. Экскурсія на ледникъ Бартуй; А. К. фонъ-Меккъ. Альпійскіе клубы и Русское Горное Общество. Его же. Клухорскій переваль.

Во II вып. А. П. Ендржеевскій. Ледники въ верховьяхъ Сонгунъ-дона и Сарди-дона; В. Н. Никольскій. Прогулка по Памиру; М. П. Преображенская. Вокругъ Казбека; Н. В. Поггенполь. Черезъ Сванетію въ долину Баксана; Н. Н. Рашевскій. Изъ Алагіра въ Нальчикъ, чрезъ Дигорію и Балкарію; проф. Э. Е. Лейстъ. О метеорологическихъ наблюденіяхъ туристовъ; А. К. фонъ-Меккъ. Вола-вцекъ; В. А. Разевигъ. Въ дебряхъ Абхазіи; В. Н. Никольскій. На велосипедѣ по горамъ Крыма и Кавказа.

Въ III вып. Н. В. Поггенполь. По сѣвернымъ долинамъ Казбекскаго массива и первое восхожденіе на Майли-хохъ.—Н. Н. Рашевскій. Черезъ Гобнацекъ.—М. П. Преображенская. Кистинское ущелье.—М. П. Преображенская. Къ западнымъ истокамъ Арагвы.—Д-ръ В. А. Щуровскій. Съ Малки чрезъ Сванетію на Каратай.—В. А. Пещеевъ. Экскурсія по южному Дагестану въ 1903 г.—Д-ръ Теуберъ. Двѣ недѣли по Бернскому Оберланду и Валузу.—А. К. фонъ-Меккъ. Казбекъ и Ермолковская хижина.

Въ IV вып. А. К. фонъ-Меккъ. Первосхожденія въ верховьяхъ Теберды.—Д-ръ А. Фишеръ. Экскурсія по Западному Кавказу.—А. Ендржеевскій. По современнымъ и древнимъ ледникамъ Дигоріи.

Въ V вып. П. В. Поггенполь. По ледникамъ Дигоріи и Балканіи.—Д-ръ В. А. Щуровскій. Семь недѣль по переваламъ Западнаго Кавказа.—И. Корженевскій. По рѣкѣ Мукъ-су (отъ Памира до Каратегіана).—И. Корженевскій. По Алайскимъ переваламъ. Перевалы Шюль и Кальта-бозъ.—М. Путешествіе В. А. Федченко по Памирамъ.—В. А. Разевигъ. На Шагъ-дагъ и Салаватскимъ переваломъ на южный склонъ Главнаго Кавказскаго хребта.—И. А. Поляковъ. Экскурсія въ сталактитовую пещеру близъ селенія Янджила (Эриванской губерніи).—Путешествіе проф. В. В. Сапожникова въ Монгольскій Алтай въ 1905 г.—А. ф.-Меккъ. Русская Ледниковая Комиссія.

Въ VI вып. Н. В. Поггенполь. Восхожденія въ Тироли лѣтомъ 1906 г.—Филиппо ди Филиппи. Путешествіе герцога Абрुцкаго на гору св. Пліи.—Сокращенный переводъ съ итальянскаго кн. С. К. Голицыной.—Таррѣ и Мартинъ. Ледники бухты Яку-татъ (Аляска).

Въ VII вып. Некрологи Александра Карловича Фонъ-Мекка съ фототипическимъ портретомъ. В. Ронкетти. Группа Адай-хохъ съ перевала Мамисонъ и попытка восхожденія на Мамисонъ-хохъ. Ф. С. Красильниковъ. Въ долину р. Ксанъ Г. К. Мерчангъ.—Эккурсія лѣтомъ 1907 г. въ южно-тирольскіе Доломиты. Ф. С. Красильниковъ. Погибшій городъ Каратагъ. В. Клеръ. Туризмъ на Уралѣ. А. К. фонъ-Меккъ. Путешествіе А. Е. Соколова въ Имеретію въ 1802 г.

Цѣна I выпуска 1 руб., II—VII выпуски по 2 руб.

Членамъ О-ва скидка 50%, иногороднихъ просятъ присылать на пересылку 20 коп. Съ требованіями обращаться въ Совѣтъ Общества. Москва, Обуховъ, 6.

Книгопродавкамъ обычная уступка. По желанію высылаются съ наложеннымъ платежомъ.



Единственный въ Россіи магазинъ
спеціально рыболовныхъ
принадлежностей

С. А. Малиновскій,

Москва, Рождественка, 8.

Поставщикъ почти всѣхъ существующихъ въ Россіи рыболовныхъ Обществъ
и Кругковъ.

Громадный выборъ: всевозможныхъ удилицъ, лесъ, снастей
и снарядовъ исключительно лишь высшаго качества отъ перво-
классныхъ англійскихъ и американскихъ фирмъ.

Цѣны сообразно съ качествомъ въ конкуренціи.

Собственная мастерская для изготовленія (по моделямъ) и
ремонта снастей.

Исполненіе заказовъ г.г. провинціальныхъ рыболововъ про-
изводится подъ наблюденіемъ *И. Н. Комарова* (авторъ книги „Ру-
ководство въ ужению рыбы“, сотрудникъ рыболовн. журналовъ).

Тщательно составленный иллюстрированный прейсъ-курантъ вы-
сылается по первому требованію.



Открыта подписка на 1912 г.

— НА —

„ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ“

„Messager Ornithologique“.—„Ornithologische Mitteilungen“

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Выходить въ годъ четыре книжки объемомъ каждая не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ, двѣ до и двѣ послѣ лѣтняго сезона.

Журналъ имѣетъ своей цѣлью объединять орнитологическія работы русскихъ ученыхъ, способствовать ознакомленію охотниковъ и любителей съ нашей фауной птицъ и привлекать ихъ къ совместной дѣятельности по ознакомленію съ литературой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изученіемъ. Въ журналѣ имѣются слѣдующіе отдѣлы: 1) Статьи и замѣтки по систематикѣ и біологіи птицъ; 2) Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и бібліографія; 4) Корреспонденція; 5) Хроника; 6) Заявленія гг. подписчиковъ о взаимномъ обменѣ шкурками, гнѣздами и яйцами птицъ; 7) Вопросы и отвѣты.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: В. Г. Аверинъ, С. Н. Алфераки, В. М. Артоболевскій (предс. Киевск. Орнит. Общ. им. Н. О. Кесслера), В. Л. Бианки, С. І. Билькевичъ, В. Н. Бостанжогло, А. А. Браунеръ, С. А. Бутурлинъ, А. М. Быковъ, Б. С. Вальхъ, К. М. Дерюгинъ (прив.-доц. Имп. С.-Пет. Унив.), Б. А. Домбровский, Б. М. Житковъ (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. Зарудный, Г. Э. Юганзенъ, Е. И. Исполатовъ, Д. Н. Кайгородовъ (профес. Лѣн. Инст.), А. Н. Карамзинъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Коменинъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. Ф. Котсъ, Г. В. баронъ Лоудонъ, Р. С. Магницкій, Л. А. Молчановъ, П. В. Нестеровъ, С. И. Огневъ, Бенио Отто, І. К. Пачоскій, О. Д. Плеске, Г. И. Поляковъ, Д. М. Россинскій, К. А. Сатунинъ, А. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій, П. Ф. Соловьевъ, В. В. Станчинскій, П. П. Сушинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. И. Сѣниций, И. К. Тарнани (проф. Н. Алекс. Инст. С.-Х. и Лѣс.), А. Я. Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ, Э. Шарлеманъ и др.

Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы въ 1912 году будетъ вести С. А. Бутурлинъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

съ пересылкой въ Россіи и за границу: на 1 годъ—4 руб., на $\frac{1}{2}$ года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб.

Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка“ Московск. губ., имѣнію „Саввино“. Телефонъ № 7—51.

Кромѣ конторы редакціи, подписка принимается въ Москвѣ и С.-Петербургѣ въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, Карбасникова и „Новаго Времени“.

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляновъ.

Le rédacteur: G. I. Poliakov.

Тип. Импер. Моск. Унив.



РНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN

№ 2

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

Troisième ANNÉE

1912 г.



Отъ Редакціи.

1. Редакція не принимаетъ на себя отвѣтственности за своевременную доставку журнала, если подписка не была адресована непосредственно на ея имя.

2. При сообщеніи адреса подписчиковъ просить разборчиво обозначать имя, отчество, фамилію, а также губернію, уѣздъ и ближайшее почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяются Редакціей только въ тѣхъ случаяхъ, если таковыя поступаютъ отъ подписчиковъ не позже полученія ими слѣдующаго номера и съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы.

3. При заявленіи о неполученіи журнала и о перемѣнѣ адреса просить прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №. При заявленіи о перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4. Лица, обращающихся письменно въ Редакцію съ запросами, для полученія отвѣта просить прилагать почтовую марку. На вопросы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5. Наложеннымъ платежемъ выпуски журнала не высылаются.

6. Рукописи, присылаемыя въ Редакцію, должны быть четко написаны, обязательно за полной подписью автора и съ указаніемъ его точнаго адреса. При этомъ авторовъ просить писать на одной сторонѣ листа и оставлять поля. Желательно, чтобы названія статей снабжались кромѣ русскаго названіями на какомъ либо западно-европейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя названія птицъ въ работахъ были подчеркнуты авторами одинъ разъ. За номенклатуру въ научныхъ статьяхъ отвѣтственность лежитъ на авторахъ.

7. Непринятая рукописи возвращаются за счетъ авторовъ въ видѣ посылки или подъ заказной бандеролью.

8. Для библиографическихъ отзывовъ просить присылать по два экземпляра работъ.



MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Орнитологическій Вѣстникъ.

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Выходитъ четыре раза въ годъ: два №№ до и два — послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна за 1 г.—4 руб., за $\frac{1}{2}$ года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу—8 р., за $\frac{1}{2}$ страницы—4 р., за $\frac{1}{4}$ страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половиною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просить адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle) l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, $\frac{1}{2}$ page Rbl. 4, $\frac{1}{4}$ page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messenger Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakov, Russie, Chemin de fer Moscou — Nijninoygorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein) jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, $\frac{1}{2}$ Seite Rbl. 4, $\frac{1}{4}$ Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mittheilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poliakov, Russland, Postabteilung «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

Auf der Sitzung der „Kaiserlichen Russischer Gesellschaft der Akklimatisation der Tiere und Pflanzen“ vom 30 Januar 1912 wurde Herrn G. J. Poliakov die grosse goldene Medaille für die Herausgabe der „Ornithologischen Mittheilungen“ zuerkannt.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
1. Экскурсія въ южное Закавказье. (Продолженіе). К. А. Сатуниинъ.....	99
2. Замѣтки по орнитологіи Туркестана. (Продолженіе). Н. А. Зарудный.....	111

	Стр.
3. Къ орнитофаунѣ Енисейской губерніи. <i>А. Я. Тугариновъ</i> ..	124
4. Къ авифаунѣ Бутурусланскаго уѣзда Самарской губерніи. <i>А. Н. Карамзинъ</i>	129
5. Къ орнитофаунѣ Тарбагатайскихъ горъ. <i>В. А. Хавловъ</i> ..	131
6. Большая бѣлая синица (<i>Parus bokharensis</i> Licht.) и ея расы. <i>Н. А. Зарудный</i> и <i>С. Г. Билжесвичъ</i>	132
7. Забѣтки о Закавказскихъ птицахъ. (Продолженіе). <i>П. В. Нестеровъ</i>	151
8. Мелкія забѣтки о птицахъ Закавказья. <i>К. А. Сатуринъ</i> ..	157
9. Къ систематическому положенію крымской пищухи. <i>В. В. Баньковский</i>	160
10. Ферганская сѣрая синица. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	163
11. Къ вопросу о высотѣ полета перелетныхъ птицъ. <i>Проф. Д. Н. Кайгородовъ</i>	165
12. Объ окольцовываніи птицъ. <i>Г. В. баронъ Лоудонъ</i>	167
13. Обзоръ русской орнитологической литературы. (Продолженіе). <i>С. А. Бутурлинъ</i>	170
14. Обзоръ иностранной литературы по орнитологіи. (Продолженіе). <i>С. А. Бутурлинъ</i>	172
15. Краткія сообщенія. <i>Г. П.</i>	185
16. Хроника.....	189
Изданія, присланныя въ редакцію.	
Объявленія.	

SUJET.—INHALT.

	Р.
1. Ornithologische Excursion nach dem südlichen Transcaucasien. (Fortsetzung). Von <i>K. A. Saturin</i>	99
2. Mittheilungen über die Ornithologie von Turkestan. (Fortsetzung). Von <i>N. A. Zarudny</i>	111
3. Neues über die Vögel des Jenisseischen Gouvernements. Von <i>A. I. Tugarinov</i>	124
4. Zur Avifauna des Buguruslanschen Kreises im Gouvernement Ssamara. Von <i>A. N. Karamsin</i>	129

	<i>P.</i>
5. Zur Ornithofauna der Tarbagatai—Gebirge. Von <i>W. A. Hachlow</i> .	131
6. <i>Parus bokharensis</i> Licht. und ihre Rassen. Von <i>N. A. Zarudny</i> und <i>S. I. Bilkewitsch</i> .	132
7. Mittheilungen über transkaukasische Vögel. (Fortsetzung). Von <i>P. W. Nesterow</i> .	151
8. Kurze Mittheilungen über die Vogelwelt Transkaukasiens. Von <i>K. A. Satunin</i> .	157
9. Neue Form des Baumläufers. Von <i>W. B. Banikowski</i> .	160
10. <i>Parus cinereus ferghanensis</i> Buturlin. By <i>S. A. Buturlin</i> .	163
11. Zur Frage über die Zugshöhe der Vögel. Von Prof. <i>D. N. Kaygorodow</i> .	165
12. Die Ringanlage der Vögel. Von <i>G. W. baron Loudon</i> .	167
13. Review of the Russian ornithological Literature. (Continued). By <i>S. A. Buturlin</i> .	170
14. Review of the foreign ornithological Literature. (Continued). By <i>S. A. Buturlin</i> .	172
15. Kurze Mittheilungen. Von <i>G. P.</i>	185
16. Chronik .	189
Éditions parvenus à la rédaction.	
Inserate.	



Экспедиція въ южное Закавказье.

К. А. Сатунинъ.

Ornithologische Excursion nach dem südlichen Transcaucasien.

Von K. A. Satunin.

(Продолженіе.—Fortsetzung) 1).

Чтобы избѣжать излишняго повторенія названій мѣстностей, привожу краткій маршрутъ этой поѣздки.

25—27. IV: Тифлисъ—Эривань—Камармо—Аралыхъ.

28. IV—16. V: Аралыхъ и его окрестности.

17. V: Аралыхъ—постъ Сергіевскій.

18—20. V: постъ Сергіевскій.

21. V: постъ Сергіевскій—постъ Такельту—постъ Сардарь-булагъ.

22—31. V: постъ Сардарь-булагъ.

1. VI: постъ Сардарь-булагъ—постъ Такельту—постъ Буруланъ.

2—4. VI: постъ Буруланъ.

5. VI: постъ Буруланъ—постъ Аралыхъ.

6—11. VI: Аралыхъ.

12. VI: Аралыхъ—Камармо—Араздаянъ.

13. VI: Араздаянъ.

14. VI: Араздаянъ—Джульфа.

15—17. VI: Джульфа.

18. VI: Джульфа—постъ Досты.

1) См. кн. I „Орнит. Вѣстн.“ за 1912 г., стр. 1—15.
S. B. I „Ornit. Mitteil.“, 1912, S. 1—15.

- 19—21. VI: постъ Досты.
21. VI: постъ Досты—Ордубать.
22. VI—3. VII: Ордубать и его окрестности.
4. VII: Ордубать—Мигры.
5. VII: селеніе Мигры.
6. VII: селеніе Мигры—урочище Лишквасъ.
- 7—9. VII: урочище Лишквасъ.
10. VII: Лишквасъ—селеніе Мюлькъ.
- 11—13. VII: селеніе Мюлькъ.
14. VII: селеніе Мюлькъ—селеніе Лишкъ—селеніе Пирдауданъ.
- 15—16. VII: селеніе Пирдауданъ.
17. VII: селеніе Пирдауданъ—селеніе Охчи—селеніе Гирратахъ.
18. VII: селеніе Гирратахъ—селеніе Тативъ.
19. VII: селеніе Тативъ—городъ Герюсы.
20. VII: городъ Герюсы.
21. VII: городъ Герюсы—озеро Карагель.
22. VII—27. VII: озеро Карагель—селеніе Каракилиса—селеніе Кармалиновка—Нахичеванъ.

Списокъ собранныхъ и наблюдавшихся птицъ.

- Corvus corax* Linn. Воронъ замѣченъ въ Джульфтѣ 16. VI.
- Corvus cornix* Linn. Сѣрая ворона наблюдалась на всемъ пути.
- Pica pica* Linn. Сорока обыкновенная встрѣчалась на всемъ пути.
- Garrulus krynicki* Kalen. Кавказская сойка наблюдалась 7. VII, 13. VII—adult. et juv. (взросл. и молод.)—и 17. VII.
- Pyrrhocorax pyrrhocorax* Linn. Клушица замѣчена 20. V, 27. V, 16. VII и 19. VII (Тативъ).
- Sturnus purpurascens* Gould. Пурпуровый скворецъ во множествѣ гнѣздится въ деревьяхъ и зданіяхъ урочища Аралыхъ ¹⁾.

¹⁾ Вмѣстѣ съ аралыхскими экземплярами мною были посланы С. А. Бутурлину скворцы этого вида изъ другихъ мѣстностей, между ними и убитые 1 и 17. X у Тифлиса. О нихъ С. А. говоритъ: „Эта серія въ 12 экземпляровъ хорошо представляетъ обычныя колебанія оттѣнковъ оперенія этой формы по сезонамъ: весной значительная примѣсь зеленого на плечахъ и на нижней части спины, голова пурпурная. Среди лѣта зеленый блескъ съ перьевъ названныхъ частей въ значительной степени стертъ. Въ свѣжемъ осеннемъ перѣ плечи нѣсколько синеваты, на головѣ замѣтенъ зеленоватый блескъ. Крыло менѣе чисто бронзовое“. *Авт.*

Sturnus caucasicus Lorenz. Одинъ изъ скворцовъ, добытыхъ 28. IV въ Аралыхъ при обстановкѣ, заставляющей предполагать, что они тамъ гнѣздились, оказался принадлежащимъ къ этому виду.

Pastor roseus Linn. Стаю розовыхъ скворцовъ наблюдалъ въ Аралыхскомъ паркѣ 10. VI.

Oriolus galbula Linn. Иволга встрѣчена всюду на равнинѣ и въ ущельи Аракса, гдѣ есть большіе густые сады, но уже въ Лишквасѣ ея не было. Затѣмъ я снова встрѣтилъ ее въ городѣ Герюсы (5...') и селеніи Кармалиновкѣ. Въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая въ Аралыхъ наблюдался пролетъ. Значительное число осталось здѣсь на гнѣздовьяхъ.

Нѣкоторые экземпляры изъ числа добытыхъ въ Аралыхъ отличаются чрезвычайно яркостью оперенія.

Carduelis carduelis brevirostris Zarudn. Эта форма щегла въ значительномъ количествѣ гнѣздится въ паркѣ Аралыха и по пирамидальнымъ тополямъ, которыми обсажены сады селенія.

Какихъ то щегловъ я наблюдалъ въ селеніи Каракилиса, но не добылъ.

Acanthis cannabina Linn. Рѣполовъ наблюдался на склонахъ Апарата.

Какую то коноплянку наблюдалъ 3. V въ Аралыхъ.

Oraegithus pusillus Pall. Многочисленные стайки корольковыхъ вьюрковъ держались у самого селенія Пирдауданъ.

Carpodacus erythrinus roseatus Hodgs. Наблюденія этого года еще разъ подтвердили уже ранѣе нѣсколько разъ высказанное мною указаніе, что область гнѣздовья чечевицы въ Закавказьѣ суть субъ-альпійскіе луга. Теперь я встрѣтилъ ее около постовъ Сергіевского и Сардаръ-булага, гдѣ она гнѣздилась въ маленькихъ кустикахъ можжевельника, и у селенія Пирдауданъ.

Гдѣ гнѣздилась эта птица въ послѣднемъ мѣстѣ, для меня осталось невыясненнымъ, ибо здѣсь не было не только кустиковъ, но и высокихъ травъ, въ которыхъ я наблюдалъ гнѣздованіе чечевицы въ Дагестанѣ (Курушъ) и Карсской области (Гельская котловина). Въ Аралыхъ, гдѣ она встрѣчается, вѣроятно, только на пролетѣ, наблюдалъ 28. IV и 1. V.

О птицѣ изъ Пирдаудана С. А. Бутурлинъ пишетъ: „Старый яркій самецъ, тождественный съ экземплярами изъ Тянь-Шаня и горной Бухары“.

Fringilla coelebs Linn. Зябликъ замѣченъ въ урочищѣ Лип-
квасъ и въблизи селенія Мюлькъ.

Montifringilla alpicola Pall. 21. V немного ниже Сардарь-бу-
лага наблюдалъ одинъ экземпляръ этого вьюрка. Жители Пир-
даудана хорошо знаютъ эту птицу и говорили мнѣ, что она
прилетаетъ къ нимъ зимою.

Petronia petronia exigua Hellm. Каменный воробей замѣченъ
19. V.

Passer domesticus Linn. Домашній воробей наблюдался на
всемъ пути во всѣхъ посѣщенныхъ мною обитаемыхъ мѣстахъ.
Въ Араздайнѣ большая компанія этихъ воробьевъ гнѣздилась
въ гнѣздѣ аиста.

Черногрудый воробей, встрѣченный мною въ 1894 году при
такихъ же обстоятельствахъ въ ущельи рѣки Аракса у поста
Мендживанъ, очевидно далѣе на западъ не идетъ.

Fringilloides melanocephalus Scop. Черноголовая овсянка на-
блюдалась 3. V, 17. V, 26. VI и 25. VII (Каракилиса).

Emberiza hortulana shah Br. Эта форма садовой овсянки за-
мѣчена 20. V, 21. V (Такельту) и 29. V.

„Кавказскіе и вообще азіатскіе экземпляры поярче типич-
ныхъ. Б“.

Emberiza cia par Hart. Эта горная овсянка наблюдалась
мною 1. VII, 11. VII и 16. VII.

Calandrella brachydactyla Leisl. Малый степной жаворонокъ
замѣченъ 17. V.

Galerida cristata caucasica Tacz. Кавказскій хохлатый жаво-
ронокъ наблюдался 18. V, 21. VI и 28. VI.

Alauda arvensis armenica Bogd. Закавказскій полевой жаво-
ронокъ во множествѣ гнѣздится у Сардарь-булага и отсюда
всюду ниже до Такельту.

С. А. Бутурлинъ о посланныхъ ему экземплярахъ, добы-
тыхъ 23 и 25. V у Сардарь-булага, пишетъ: „оба араратскіе
экземпляра принадлежатъ къ крупной крупноклювой формѣ
A. a. armenica Bogd.“

Otocoris penicillata Gould. Горный рогатый жаворонокъ для
гнѣздовья выбираетъ предпочтительно каменные розсыпи. На-
блюдался на Араратѣ, въ горахъ у озера Карагель.

Anthus campestris Linn. Самецъ полевой щеврицы былъ
добытъ 31. V.

? **Budytes flavus** Linn. Много желтыхъ плисокъ видѣлъ на лугу
на пути изъ Аралыха въ Камармо.

Budytes melanocephalus Licht. Черноголовая плиска наблюдалась 2. VI и 11. VI.

Motacilla alba dukhunensis Sykes. Эту форму бѣлой трясогузки я встрѣчалъ почти на всемъ пути по берегамъ рѣкъ, но очень неравномѣрно. У Аралыха она была положительно рѣдка, ибо не любитъ камышей и болотистыхъ береговъ. Обыкновенна по Араксу, Охчи-чаю, Бичинакъ-чаю (у Кармалиновки) и др.

Sitta caesia caucasica Reichen. Кавказскій поползень замѣченъ вблизи селенія Мюлькъ.

Rupisitta parva Buturl. Взрослый (adult.) самецъ и молодая (juv.) самка добыты вблизи селенія Гирратахъ 18. VII.

„Кавказскій скалистый поползень, отличный лишь въ 1906 году („Ibis“, p. 417), настолько полно выдѣлился отъ европейскаго *S. peimayeg* и каспійскаго *S. terphogota*, что я не нахожу нужнымъ считать его лишь подвиомъ. Б“.

Cyanistes coeruleus subsp.? Лазоревку я замѣтилъ 28. IV на пвѣ, стоящей среди камышей на берегу р. Карасу, но добыть эту птичку, къ сожалѣнiю, не удалось.

Periparus ater michalowskii Bogd. Кавказская горная синица встрѣчалась многочисленными выводками вблизи селенія Мюлькъ.

Remiza pendulina caspia Poelzm. О существованiи каспійскаго ремеза въ Аралыхѣ я узналъ еще осенью 1900 года по нѣсколькимъ его гнѣздамъ, найденнымъ мною въ паркѣ. Теперь я наблюдалъ постройку гнѣздъ (въ первой половинѣ мая), но долженъ оговориться, что, по словамъ мѣстныхъ жителей, весна въ этомъ году очень запоздала и что обыкновенно постройка этихъ гнѣздъ бываетъ на мѣсяць раньше.

Lanius minor Gmel. Чернолобый сорокопутъ наблюдался въ Аралыхскомъ паркѣ 13. V и 10. VI.

Lanius senator niloticus Vopar. Самецъ этой формы красно-голового сорокопута добытъ 17. V.

„Центральная пара рулей бѣлая почти на 3 снтм. отъ корня. Эта форма лишь недавно указана для Кавказскаго края (и тѣмъ самымъ для Имперiи) по экземпляру изъ Елисаветпольской губерни („Орнит. Вѣстн.“, 1911 г., № 1). Вѣроятно—даже несомнѣнно—всѣ кавказскiе красноголовые сорокопуты принадлежать къ ней. Б“.

Enneoctonus collurio kobylini Buturl. Этотъ жуланъ наблюдался на опушкѣ Аралыхскаго парка, въ заросляхъ абуджиля, и у поста Сергiевского 20. V. Станнымъ образомъ я совершенно

не встрѣтилъ жулана, пересѣкая горы Малаго Кавказа отъ селенія Мигры на городъ Герюсы. Поднимаясь въ эти же горы въ 1895 году съ востока по ущелью Тертера и на Мураздаи, я прослѣдилъ его до альпійской области и онъ былъ тамъ положительно обыкновеннѣйшей птицей.

Muscicapa striata Pall. Сѣрая мухоловка замѣчена на опушкѣ Аралыхскаго парка.

Phylloscopus nitidus Blyth. Одинъ экземпляръ желтобрюхой пѣночки добытъ 11. VII вблизи селенія Мюлькѣ, другой—17. VII въ долинѣ Охчи-чая, ниже селенія Охчи.

Phylloscopus trochilus trochilus Linn. Пѣночки веснички, добыты 29. IV и 1. V въ Аралыхскомъ паркѣ, были, повидимому, пролетныя.

Phylloscopus neglectus lorenzi Menzb. Три экземпляра кавказской пѣночки были добыты 14. VII въ селеніи Мюлькѣ.

Acrocephalus arundinaceus Linn. Дроздовидная камышевка въ громадномъ количествѣ обитаетъ въ камышевыхъ заросляхъ по рѣкѣ Араксу и ея притокамъ. Экземпляры коллекціи изъ Аралыха отъ 2. V.

Hippolais pallida Hempr. & Ehrenb. Блѣдная малиновка найдена на гнѣздовѣ въ Аралыхскомъ паркѣ и въ Ордубатѣ.

Sylvia hortensis Lath. Садовая славка наблюдалась 3. V въ Аралыхѣ.

Sylvia curruca curruca Linn. Славка завирушка замѣчена въ Аралыхѣ 28. IV.

„Обѣ птицы типичны. Б“.

Sylvia communis icterops Ménétr. Восточная сѣрая славка наблюдалась 25. V вблизи поста Сардарь-булагъ и 11. VII вблизи селенія Мюлькѣ.

„Эти птицы совершенно однотипны съ тѣми *S. c. icterops* (= *fuscipilea* Sev.), которыхъ я собралъ въ приалтайскихъ степныхъ уремахъ, и легко отличаются отъ типичной формы. Б“.

Sylvia mystacea Ménétr. Бѣлоусая славка во множествѣ гнѣздится въ заросляхъ абуджия у Аралыха. Самецъ съ пѣніемъ поднимается въ воздухъ, часто трепеща крылышками, и опускается снова на кустъ, сдѣлавъ большую дугу. На вершинѣ куста онъ остается не болѣе секунды и сейчасъ же прячется во внутрь его.

Monticola saxatilis Linn. Пестрый каменный дроздъ наблюдался 17 и 20. V.—26. V мнѣ принесли еще не умѣющаго летать птенца.

Saxicola oenanthe Linn. Каменка обыкновенная наблюдалась всюду въ каменистыхъ мѣстностяхъ отъ Эриванской равнины до наивысшей посѣщенной мною во время пути этого года мѣстности (около 9000').

Saxicola finschi Heugl. Эта форма чернопѣлага чекана замѣчена 21. V.

Pratincola rubetra noskae Tsch. Выводки этого лугового чекана встрѣчены мною на лугу у Пирдаудана.

„Форма съ трудомъ отличимая отъ типичной европейской по чуть большей въ среднемъ величинѣ. Указываемыя обычно цвѣтотвоя отличія едва ли уловимы. Экземпляръ отъ 15. VII—старая птица въ полной линькѣ. Старыя перья ея, конечно, блѣднѣе лѣтняго наряда среднерусской птицы, такъ какъ на Кавказѣ выцвѣтаніе идетъ быстрѣе, но новыя перья по чернотѣ центровъ и по яркости и густотѣ рыжихъ краевъ приравняются даже не къ среднимъ, а къ болѣе богато окрашеннымъ изъ серій среднерусскихъ особей. Б“.

Pratincola maura Pall. Черноголовый чеканъ наблюдался 17 и 18. V.

Ruticilla mesoleuca Hempr. & Ehrenb. Бѣлокрылая горихвостка многочисленна въ селеніи Мюлькѣ.

Luscinia luscinia Linn. Судя по пѣнію, къ этому, а не къ *L. megarhynchos africana* Fischer & Reich. принадлежалъ очевидно пролетный соловей, котораго я наблюдалъ въ Аралыхъ единственный разъ 29. IV.

Cyanosylvia cyanecula magna Zarud. & Loud. Эта варакушка очевидно гнѣздится въ маленькихъ кустикахъ на опушкѣ рощи у Сардарь-булага. Добытые мною 30 и 31. V самцы пѣли на вершинѣ кустовъ. При этомъ они распускали крылья, приподнимали хвосты и надували зобъ.

„Эта форма варакушки очень близка къ обычной европейской (и кавказской) *C. cyanecula* Wolf, именно къ тому личному измѣненію, у котораго нѣтъ яснаго бѣлаго пятнышка на зобѣ (var. *wolfi* Brehm), и отличается лишь нѣсколько большимъ ростомъ. Впрочемъ въ этомъ отношеніи араратскія птицы нѣсколько ближе къ европейскимъ, чѣмъ типъ *C. s. magna*, описанный („Orn. Jahrb.“, 1904, p. 225) изъ юго-западной Персіи. Б“.

***Irania gutturalis* Guérin.** Самецъ соловья бѣлошейки добытъ 17. V на скалахъ около Сергіевского поста. Это первый случай нахожденія *Irania gutturalis* въ Закавказьѣ, хотя теоретически Г. И. Радде и М. А. Мензбиръ предполагали, что птица эта можетъ залетать зимою въ Талышинскія горы.

„Первый кавказскій экземпляръ и притомъ очевидно гнѣздящійся. Б“.

***Spermolegus ocularis* Radde.** Осенью 1900 года я убилъ одинъ экземпляръ этой рѣдкой завирушки въ березовой рошѣ у Сардарь-булага. Птички эти летали небольшой стаей и присаживались у корней деревь. Повидимому, судя по повадкамъ, ихъ же видѣлъ я теперь, но не могъ добыть.

***Cinclus cinclus caucasicus* Mad.** Эта оляпка многочисленна по рѣчкѣ Охчи-чаю, богатой форелью.

***Hirundo rustica* Linn.** Деревенская ласточка встрѣчена во всѣхъ посѣщенныхъ мною осѣдлыхъ населенныхъ пунктахъ, изъ которыхъ самый высокій—постъ Сардарь-булагъ находится на высотѣ около 8500’.

***Chelidon urbica* Linn.** Городская ласточка гнѣздится на скалахъ у поста Сергіевского (5950’). Въ строеніяхъ поста гнѣздится *Hirundo rustica* Linn.

***Riparia rupestris* Scop.** Горная ласточка въ большомъ числѣ гнѣздится на скалахъ у поста Сергіевского вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ.

***Dendrocopus major tenuirostris* Buturl.** Эта форма большого пестраго дятла наблюдалась мною въ Аралыхскомъ паркѣ.

***Dendrocoptes medius colchicus* Buturl.** Этотъ вертлявый дятель былъ замѣченъ въ урочищѣ Лишквасъ и вблизи селенія Мюлькъ.

***Gecinus viridis* Linn.** Зеленый дятель наблюдался у селенія Мюлькъ, въ ущельи Охчи-чая и у селенія Гирратахъ. Экземпляра не добылъ, почему и не могу судить о томъ, принадлежитъ ли этотъ дятель къ подвиду *saundersi* Tacz., или къ другому.

***Cypselus apus* Linn.** Стрижей однажды наблюдалъ надъ Сардарь-булагскимъ постомъ. Въ Ордубатѣ большія стаи ихъ видѣлъ ежедневно.

***Cypselus melba* Linn.** Бѣлобрюхій стрижь замѣченъ 19. V. Гнѣздили онъ въ числѣ двухъ или трехъ паръ въ недоступномъ маленькомъ гротѣ.

Cypselus affinis Hardw. Нѣсколько африканскихъ стрижейъ я наблюдалъ 19. VII въ скалистомъ ущельи у моста Сатана-керпи, близъ Татива.

Caprimulgus sp.? 31. V около Сардарь-булага поднялъ пару козодоевъ, изъ которыхъ одного убить, но не нашелъ, а другой скрылся въ рощѣ. Они показались мнѣ очень свѣтлыми, глинисто-желтыми.

Bubo bubo Linn. Одинъ филинъ былъ убить въ началѣ мая близъ Сергіевскаго поста.

Athene noctua caucasica Zarudn. & Loudon. 13. VI въ Араздайнѣ вечеромъ, еще засвѣтло, видѣлъ нѣсколько сычей, сидѣвшихъ на крышахъ хозяйственныхъ построекъ.

Scops scops Linn. Крикъ сплюшки я слышалъ въ урочищѣ Лишквасъ и вблизи селенія Мюлькъ, но ни разу не слыхалъ его въ Аралыхъ, хотя и пробылъ здѣсь довольно долго.

Upupa epops Linn. Удодъ всюду многочисленъ отъ равнины до Сардарь-булага. Но въ лѣсныхъ мѣстностяхъ (Лишквасъ, Мюлькъ) и у селенія Пирдаудана я его не видалъ. 20. V на Сергіевскомъ посту мнѣ принесли уже летнаго молодого.

Merops apiaster Linn. Щурка золотистая многочисленна на Эриванской равнинѣ и въ ущельи рѣки Аракса.

Alcedo ispida Linn. По канавѣ у Аралыхскаго парка держалось нѣсколько зимородковъ, очевидно здѣсь гнѣздящихся.

Coracias garrula caucasica Buturl. Эта форма сизоворонки весьма многочисленна всюду на равнинѣ, но не поднимается высоко въ горы. Я встрѣчалъ ее еще въ Лишквасѣ, но выше ее уже не было. Въ гнѣздахъ, устроенныхъ въ дуплахъ, я находилъ въ Аралыхъ въ срединѣ мая еще неполное число яицъ: отъ 1 до 4.

Cuculus canorus Linn. Въ первой половинѣ мая въ Аралыхъ наблюдался пролетъ кукушекъ. И въ эту поѣздку я часто встрѣчалъ ихъ въ совершенно безлѣсныхъ мѣстностяхъ, гдѣ онѣ куковали, сидя на камнѣ. 13. V наблюдалъ въ Аралыхскомъ паркѣ спариваніе кукушекъ.

Turtur turtur Linn. Горлица въ небольшомъ числѣ гнѣздится въ Аралыхскомъ паркѣ. Встрѣчена также въ урочищѣ Лишквасъ и вблизи селенія Мюлькъ. Но въ особенно большомъ числѣ попадались горлицы на пути изъ селенія Кармалиновки въ Нахичевань.

Columba livia Linn. Сизый голубь гнѣздится на скалахъ у поста Сергіевскаго. Наблюдалъ я его также на скалахъ около города Ордубата.

Palumbus palumbus Linn. Въ селеніи Мюлькѣ мнѣ принесли одного уже летнаго молодого витютня. Другого я видѣлъ въ ущельи Охчи-чая.

Pterocles arenarius Pall. У передового Ордубатскаго поста 26. VI я наблюдалъ двѣ пары чернобрюхихъ рябковъ, а 27. VI—одну.

Oedienemus scolopax Linn. Свистъ авдотокъ я слышалъ по ночамъ 2—4. V у поста Буруланъ, а въ концѣ іюня и въ началѣ іюля на р. Араксъ, у расположенныхъ противъ Ордубата постовъ.

Gallinago major Linn. Въ концѣ апрѣля эриванскіе охотники во множествѣ избивали дупелей на болотистомъ лугу между селеніями Камармо и Аралыхомъ.

Tringoides hypoleucus Linn. Перевозчикъ—самый обыкновенный куликъ въ Закавказьи. Я встрѣчалъ его всюду по р. Араксу и на мелкихъ горныхъ рѣчкахъ даже высоко въ горахъ. Онъ многочисленъ былъ на р. Охчи-чай выше селенія Охчи. 22. VII наблюдался на берегу озера Карагель (8935').

Vanellus vanellus Linn. 12. VI я наблюдалъ чибисовъ на лугу близъ селенія Камармо.

Charadrius hiaticula Linn. Зукъ галстушникъ былъ замѣченъ на берегу Аракса 19. VI около поста Досты, а 17. VI около Джульфы.

Fulica atra Linn. Лысуха наблюдалась мною на р. Карасу у Аралыха.

Crex crex Linn. Коростель наблюдался на лугу между селеніями Камармо и Аралыхомъ.

Porzana sp.? Какія то мелкія курочки были очень обыкновенны по р. Карасу у Аралыха, но я не добылъ ни одного экземпляра.

Lyrurus mlokosiewiczzi Tacz. По разспроснымъ свѣдѣніямъ, кавказскій тетеревъ, котораго мѣстные охотники—татары называли „меша хорушъ“, т.-е. „лѣсной пѣтухъ“ и подробно описывали, живетъ въ Охчинскомъ ущельи, въ мѣстности „Ардзачучулана“.

Coturnix coturnix Linn. Перепелъ на равнинѣ встрѣчается тамъ, гдѣ есть хорошіе луга, напримѣръ, между селеніями Ка-

мармо и Аралыхомъ. Въ горахъ держится по посявамъ и на моемъ пути прослѣженъ до высоты свыше 8000' (у селенія Пирдауданъ).

Perdix perdix Linn. По разспроснымъ свѣдѣнiямъ, сѣрая куропатка или „чиль-кегликъ“ водится въ Охчинскомъ ущельи и въ степи близъ Аралыха.

Saccabis chukar Gray. Куропатка каменная въ большомъ количествѣ встрѣчалась на склонахъ Большого и Малаго Арарата. Во время стоянки моей у поста Сергiевскаго единственною мясною пищею были зайцы и кеглики. Ихъ было много и у Сардарь-булага, гдѣ я часто поднималъ ихъ и въ рощѣ. Осенью 1900 года я стрѣлялъ кегликовъ на Большомъ Араратѣ на высотѣ около 11500'.

П. В. Нестеровъ, на основанiи своихъ двухъ кратковременныхъ поѣздокъ въ юго-западное Закавказье, не поколебался признать „заблужденiемъ“ мое показанiе, что кеглики поднимаются до ледниковъ, лишь потому, что онъ его выше 5000' въ Аджарiи не нашелъ. Но г. Нестеровъ не замѣтилъ на яйлахъ Аджарiи не только кеглика, но и сѣрой куропатки, и показанiе Ф. В. Вильконскаго безъ стѣсненiя назвалъ ошибкой. А нахожденiе сѣрыхъ куропатокъ на Сарычаирскихъ яйлахъ П. В. Нестеровъ никакъ уже отрицать не можетъ, ибо въ охотѣ на нихъ принималъ участiе весь составъ Батумской администрацiи: г. военный губернаторъ, начальникъ округа и начальники участковъ.

Tetraogallus caspius Gmel. На высокихъ горахъ, гдѣ имѣются ледники, горная индѣйка всегда держится около снѣга, какъ на Араратѣ, Капуджижѣ и др. Но это не непремѣнное условiе ея существованiя: часто она встрѣчается и на болѣе низкихъ безснѣжныхъ горахъ; такъ я встрѣтилъ ее на хребтѣ, господствующемъ надъ Пирдауданомъ.

Tinnunculus tinnunculus Linn. Пустельга—обыкновенная гнѣздящаяся птица Эриванской равнины. Въ срединѣ мая въ Аралыхъ въ гнѣздахъ было по 4—6 свѣжихъ яицъ. 26. V въ березовой рощѣ у поста Сардарь-булага я нашелъ гнѣздо съ 4 яйцами, въ которыхъ были вполне сформировавшiеся птенцы.

Tinnunculus naumanni Fleisch. II эта пустельга обыкновенна на Эриванской равнинѣ. Въ Аралыхскомъ паркѣ гнѣздилась одновременно съ предыдущимъ видомъ.

Milvus korschun rufiventris Buturl. Эта форма коршуна замѣчена мною въ Аралыхъ.

Neophron percnopterus Linn. Стервятникъ часто встрѣчался мною въ различныхъ пунктахъ горъ Малаго Кавказа.

Anser anser Linn. Гусь сѣрый гнѣздится по болотамъ долины р. Аракса.

Casarca casarca Linn. Красную утку я встрѣтилъ 22. VII въ большомъ количествѣ на озерѣ Карагель.

Anas boschas Linn. Кряква очень многочисленна на болотахъ Эриванской равнины. Встрѣчена и на озерѣ Карагель.

Ciconia ciconia Linn. Бѣлый аистъ на Эриванской равнинѣ очень многочисленъ. Онъ живетъ всюду по р. Араксу, даже въ узкомъ его ущельи, идущемъ отъ Ордубата до Бартаза.

Ciconia nigra Linn. Въ настоящую поѣздку я не встрѣтилъ чернаго аиста, но осенью 1894 года, проѣзжая по почтовому тракту отъ Эривани въ Ордубатъ, видѣлъ ихъ во множествѣ на рисовыхъ поляхъ и болотахъ у дороги.

Platalea leucorodia Linn. Колпикъ многочисленъ на всѣхъ болотахъ. Особенно много этихъ птицъ было въ Араздайнѣ.

Ardetta minuta Linn. Малая выпь наблюдалась мною 8. VI.

Herodias alba Linn. На болотахъ по Араксу довольно часто попадались бѣлыя цапли, вѣроятно, именно этого вида.

Ardea cinerea Linn. Сѣрая цапля встрѣчалась часто по р. Карасу и на Буруланскомъ озерѣ. Многочисленна также всюду по Араксу.

Pelecanus crispus Bruch. Пеликанъ кудрявый въ большомъ количествѣ держался мѣстами по р. Карасу.



Замѣтки по орнитологіи Туркестана.

Н. А. Зарудный.

Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan.

Von N. A. Sarudny.

(Продолженіе.—Fortsetzung) ¹⁾.

142. *Urinator arcticus suschkini* subsp. nov.

Полосатые гагары, бывающія въ русскомъ Туркестанѣ на пролетахъ и въ зимнее время, судя по собранному мною матеріалу, оказались на столько ясно отличными отъ типичныхъ изъ Псковской и С.-Петербургской губерній, что, какъ мнѣ кажется, не могутъ носить названіе *Urinator arcticus* (Linn.) и заслуживаютъ выдѣленія въ качествѣ особливаго подвида.

Изъ имѣющихся у меня экземпляровъ туркестанскихъ полосатыхъ гагаръ я имѣю въ виду только вполне взрослыхъ, именно:

- 1) ? ♀; взморье около устья Аму-Дарьи; 2. II. 1907.
- 2) ♀; урочище Кокъ-булакъ; 4. XI. 1907.
- 3) ♂; Казалинскъ; 16. IV. 1908.
- 4) ♂; озеро Чушка-куль (около г. Туркестана); 10. VI. 1908.
- 5) ♀; ib.
- 6) ♂; урочище Таръ-тугай на Сыръ-Дарьѣ; 22. XII. 1909.
- 7) ? ♂; Нижній Чирчикъ; зимою съ 1909 г. на 1910 г.
- 8) ? ♀; урочище Булаки, въ предгоріяхъ Кара-тау; весною 1911 года.
- 9) ♂; Джулекъ, Байга-кумъ; 28. III. 1911.

¹⁾ См. кн. I «Орнит. Вѣстн.» за 1912 г., стр. 16—30.
S. B. I «Ornit. Mitteil.», 1912, S. 16—30.

Отличія заключаются въ слѣдующемъ.

Въ брачномъ нарядѣ сѣрый цвѣтъ верха головы и задней стороны шеи у туркестанскихъ птицъ болѣе блѣдный и болѣе бѣлесоватый, но не такой блѣдный и бѣловато-пепельный, какъ у тихоокеанской *Uginator pacificus* Lawr. Этотъ признакъ не зависитъ отъ выгорания перьевъ и замѣтенъ на экземплярѣ за № 1, смѣняющемъ зимній нарядъ на брачный. Въ зимнемъ нарядѣ (экземпляры за №№ 2, 6 и 7) сѣрый цвѣтъ указанныхъ частей также остается весьма замѣтно болѣе блѣднымъ.

Бѣлыя, прерывчатая, поперечныя полосы на плечевыхъ партяхъ и на передней части спины кажутся въ большинствѣ случаевъ болѣе широкими, даже по сравненію мелкихъ туркестанскихъ особей съ крупными псковскими и петербургскими.

Также въ большинствѣ случаевъ кажутся болѣе крупными бѣлыя пятна на верхнихъ кроющихъ крыла.

Передняя сторона шеи кажется болѣе темною, а ея пурпуровый блескъ менѣе развитымъ.

Въ громадномъ большинствѣ случаевъ наши птицы оказываются болѣе мелкими и имѣютъ болѣе короткій клювъ, что уже давно было замѣчено П. П. Сушкинымъ („Птицы Уфимской губерніи“, „Птицы Средней Киргизской степи“) для гагаръ южнаго Урала и Тургайской области. Въ моихъ экземплярахъ длина крыла и обнаженнаго (отъ лобныхъ перьевъ) *culmen* выражается слѣдующимъ образомъ (въ дюймахъ).

<i>Крыло.</i>	<i>Culmen.</i>
1).....11,6	2,3
2).....12,2	2,25
3).....12,23	2,32
4).....12,35	2,2
5).....12,1	2,26
6).....12,5	2,6
7).....12,12	2,35
8).....12,7	2,3
9).....11,8	2,27

Typical
У типичной *U. arcticus* длина крыла колеблется между 12,15" и 13,2", а *culmen* а—2,5"—2,85". У *U. pacificus* крыло 11,2"—12,25", а *culmen* 2"—2,35".
The longest of the wing

Болѣ короткій клювъ туркестанскихъ гагаръ по сравненію съ западными кажется пропорціонально болѣ высокимъ, причемъ его *gonyx* (киль нижней челюсти отъ самой передней точки выемки со стороны подбородка) въ большинствѣ случаевъ поднять болѣ круто, образуя около вѣтвей челюсти гораздо болѣ явственный уголъ.

Обозначаю эту форму полосатой гагары въ честь проф. П. П. Сушкина.

143. Поправка по поводу *Turtur orientalis* Lath.

Въ великолѣпномъ трудѣ своемъ „Матеріалы по птицамъ Енисейской губерніи“ А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ говорятъ, между прочимъ, что, по моимъ словамъ, восточно-сибирская горлица (*Turtur orientalis* Lath.) гнѣздится въ Ферганѣ.... Въ виду того, что въ этомъ показаніи кроется какое-то недоразумѣніе, могущее повлечь за собою неправильное толкованіе распространенія названной птицы, спѣшу сдѣлать поправку: нигдѣ и никому я не сообщалъ о таковой находкѣ, такъ какъ ни мною лично, ни кѣмъ-либо другимъ и не только въ Ферганѣ, но и вообще въ Русскомъ Туркестанѣ эта горлица до сихъ поръ не была найдена.

144. *Asio flammeus pallidus* (Zar. et Loud.).

(*A. accipitrinus pallidus* Zar. et Loud.)

А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ ¹⁾ редуцируютъ установленную мною и Г. В. барономъ Лоудономъ блѣдную форму болотной совы съ *Asio flammeus aegolius* (Pall.)=*Strix accipitrina* Pall. Съ мнѣніемъ уважаемыхъ авторовъ согласиться я не могу, такъ какъ въ описаніяхъ, данныхъ Палласомъ, не содержится ничего, указывающаго на то, что онъ имѣлъ дѣло именно съ нею, а не съ типичною темною формою. Относительно „*Strix accipitrina*“ Палласа, добытой „у Каспійскаго моря“, эти авторы говорятъ только предположительно о принадлежности ея къ блѣдной формѣ („намъ кажется, что къ блѣдной“) ²⁾,

¹⁾ „Матеріалы по птицамъ Енисейской губерніи“. *Авт.*

²⁾ Бѣлыя подкрылья бываютъ и у блѣдныхъ особей темной расы. *Авт.*

относительно же *S. aegolius* категорически заявляютъ, что она представляетъ безъ всякаго сомнѣнія свѣтлую форму. Вотъ это-то и является для меня вполне сомнительнымъ. Если согласиться съ аргументаціей нашихъ авторовъ и считать, что Палласъ, описывая свою „*S. aegolius*“, имѣлъ въ виду птицъ изъ западной и центральной частей Сибири и именно свѣтлую форму, то почему онъ нигдѣ не упоминаетъ, что здѣсь же встрѣчается и темная? Затѣмъ, эта послѣдняя тамъ и здѣсь, въ западной и центральной Сибири, можетъ встрѣчаться чаще, чѣмъ блѣдная. Напримѣръ, по словамъ В. Г. Аверина въ статьѣ „Къ орнитологіи Акмолинской области“¹⁾, темная болотная сова добыта въ концѣ іюля 1909 года около станціи Токуши, а изъ 10 шкурокъ изъ Змѣиногорскаго уѣзда Томской губерніи 9 оказались сходными съ харьковскими (10-ая принадлежала, по мнѣнію П. П. Сушкина, выцвѣтшей особи). Палласъ упоминаетъ, будто встрѣчалъ „*S. aegolius*“ въ Бельгіи и въ Крыму. Въ этомъ показаніи наши авторы усматриваютъ ошибку Палласа и считаютъ, что это были „очевидно, блѣдныя особи типичной расы“. Если это такъ, то почему Палласъ не говоритъ, что встрѣчалъ темную расу въ Бельгіи и въ Крыму? Или ему случайно попадались здѣсь только эти блѣдныя особи, а не представители обычной для этихъ странъ *A. flammeus* (Pantopp.)?

145. *Cerchneis naumanni turkestanicus* subsp. nov.

Красная пустельга, гнѣздящаяся въ Семирѣчьи, въ Сырь-Дарьинской и Ферганской областяхъ и въ Бухарскихъ владѣніяхъ, а также встрѣчающаяся на пролетахъ вообще въ восточныхъ частяхъ русскаго Туркестана, не можетъ быть принята ни за *C. naumanni* (Fleisch.), ни за *C. rekinensis* (Swinh.), и представляетъ промежуточную форму, болѣе или менѣе постоянную въ своихъ признакахъ, по крайней мѣрѣ въ старыхъ самцахъ. Эти признаки у этихъ послѣднихъ заключаются въ окраскѣ верхнихъ кроющихъ крыла.

У западной формы (*C. naumanni* Fleisch.) малыя, среднія и большія кроющія крыла кирпично-рыжія, при чемъ нѣкоторыя изъ среднихъ и большихъ имѣютъ пепельно-сѣрую стержневую

¹⁾ „Орнит. Вѣстникъ“ за 1911 г., № 1. Авт.

полосу, а иногда и пепельно-сѣрый цвѣтъ на внѣшнемъ опахалѣ. Сѣрый цвѣтъ развитъ узкой полосой по лучевому и кистевому сгибамъ крыла.

У восточной формы (*C. rekinensis* Swinh.) пепельно-сѣрый цвѣтъ распространяется на всѣ верхнія кроющія крыла.

У туркестанской формы (*C. turkestanicus*) на верхнихъ кроющихъ крыла пепельно-сѣрый цвѣтъ господствуетъ рѣшительно, такъ какъ кирпично-рыжій распространяется только на самыя малыя кроющія, но не на прикрывающія крыловой стибъ, гдѣ остается широкая сѣрая полоса, а также на самыя внутреннія изъ среднихъ кроющихъ, но не сплошь по поверхности каждого изъ нихъ; на среднихъ изъ среднихъ кроющихъ рыжій цвѣтъ образуетъ иногда узкія стержневые полосы и узкіе, растушеванные бордюры по краю наружнаго опахала.

У старыхъ самокъ сѣрый цвѣтъ надхвостья и верхнихъ кроющихъ хвоста развитъ и по распространенію, и по интенсивности сильнѣе, чѣмъ у западной формы, но нѣсколько слабѣе, чѣмъ у восточной.

146. *Hypotriorchis subbuteo* Linn.

(2-ая замѣтка) 1).

То обстоятельство, что, по словамъ С. А. Бутурлина („Орнит. Вѣст.“ за 1911 г., № 2), профессоръ Лѣннбергъ поддерживаетъ противъ Шалова отличность крупной блѣдной формы изъ Тянь-Шаня и ссылается на замѣчаніе покойнаго др. Оттосона, что и яйца этой расы значительно крупнѣе европейскихъ, заставило меня еще разъ пересмотрѣть свой матеріалъ по туркестанскимъ бѣлогорликамъ. Приведу здѣсь размѣры моихъ птицъ, дабы орнитологи Европейской Россіи и Сибири имѣли возможность сдѣлать сравненіе съ экземплярами своихъ коллекцій.

Свой матеріалъ располагаю по степени убыванія длины крыла. Буквой „N“ обозначаю птицу, добытую на несомнѣнномъ гнѣздовѣ; знакомъ „?N“—почти навѣрное расположившуюся на таковое.

1) „Орнит. Вѣстникъ“ за 1911 г., № 1, стр. 9. Авт.

Клювъ (отъ перед-
няго края ноздри по
хордѣ до вершины).

Крыло.

Хвостъ (отъ осно-
ванія кобчиковой
железы).

♀ ♀.

1). 30. IV. 1907; Ташкентъ. ? N 13,7	306,2	157
2). 2. V. 1911; Ib. ? N 13,7	305,4	157,2
3). 30. IV. 1907; ib. ? N . . . 13,4	305	154
4). 2. IX. 1909; Перовскъ. 13	300	150
5). 15. IV. 1909; постъ Никольскій. . . 13,5	289	147
6). 31. VIII. 1909; г. Туркестанъ. 12,6	288	150,4
7). 3. VI. 1907; Богустанъ (въ Талас- скомъ Ала-тау). N . . 13,2	283	153,5
8). 2. V. 1911; урочище Кара-Камышъ, около Ташкента. N . . 13,2	282,5	148,2
9). Ib. N 13	282	147
10). 25. IV. 1907; Ташкентъ. N 13,4	281,5	150,2
11). Ib. N 13,4	281,2	150
12). 26. IV. 1907; постъ Никольскій. . . 12,6	281	149
13). 3. VI. 1907; Богустанъ (въ Талас- скомъ Ала-тау). N . . 12,7	280	149,4
14). Ib. N 12,6	277,5	148
15). 17. VI. 1908; Кішемышъ (въ хребтѣ Туркестанскомъ). N . . 12,6	275	147,5
16). Ib. N 12,6	274	147
17). 9. IX. 1911; Ташкентъ. 12,5	274	def.
18). Ib. 13,6	273	151,5
19). 11. IX. 1907; урочище Кокъ-булакъ на Сыръ-Дарьѣ. . . . 12,5	270	146,8

	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри по хордѣ до вершины).	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ</i> (отъ основанія кобчиковой железы).
♀ ♀.			
20).	28. IX. 1907; ib.....13,5	268	146,3
21).	9. IX. 1907; постъ Никольскій....13,6	267	147
22).	3. VII. 1909; урочище Аралъ (въ Чаткаль-тау). N.....12,4	267	146
23).	1. VII. 1909; р. Итокаръ (въ Чаткаль-тау). N.....12,4	266,5	146
24).	30. IV. 1900; Джаркентъ. ? N.....13,5	265	139,5
25).	17. VI. 1908; Кшемышъ (въ хребтѣ Туркестанскомъ). N..12,4	264	135
26).	9. IX. 1908; Джаманъ-баткакъ....12	264	130

♂ ♂.

1).	6. VIII. 1907; станція Кауфмановская11,6	272	132,4
2).	16. VIII. 1906; Ташкентъ.....12	269	133
3).	27. VIII. 1908; станція Кауфмановская.....12,3	268,2	150
4).	17. VI. 1908; Кшемышъ (въ хребтѣ Туркестанскомъ). N..13	266,8	153
5).	ib. N.....13	266	153
6).	26. VI. 1908; озеро Кара-куль (въ хребтѣ Туркестанскомъ). N.....11,6	265,5	150

	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри по хордѣ до вершины).	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ</i> (отъ основанія кобчиковой железы).
♂ ♂.			
7). Ib. N.....	11,6	265	141,8
8). 22. V. 1909; Ташкентъ. N.....	12	264,8	150
9). 15. V. 1907; Ib. N....	12,5	264,5	148
10). Ib. N.....	12,4	260	148,5
11). 3. VII. 1909; урочище Араль (въ Чаткаль-тау). N.....	12	259,2	140
12). 9. V. 1911; урочище Кара-камышъ. ? N.....	13	259	137
13). 15. V. 1910; Ташкентъ. ? N.....	12,5	258	137
14). 13. IV. 1911; Шаръ-тепе на р. Чирчикъ.....	12,3	256	134
15). 11. IX. 1907; урочище Кокъ-булакъ (на Сыръ-Дарьѣ)	12,4	255,8	138
16). 17. VI. 1908; Кшемышъ (въ хребтѣ Туркестанскомъ).....	12,2	255,8	135
17). 13. V. 1907; Ташкентъ. ? N.....	12,4	255,5	129
18). 3. VI. 1907; Богустанъ (въ Талас- скомъ Ала-тау). N....	12,2	254	130,8
19). 13. IV. 1911; Шоръ-тепе (на Чир- чикъ).....	12,3	252	142,6
20). 15. VI. 1907; селеніе Пскемъ (въ Та- лаасскомъ Ала-тау). N.	12,5	252	138
21). 10. VIII. 1907; Ташкентъ.....	12	251,5	136,7

Клювъ (отъ передняго края ноздри по хордѣ до вершины).

Крыло.

Хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы).

♂ ♂.

22). 5. VI. 1899; Джаркентъ. N.....12,2	248	140,5
23). Ib. N.....12,5	248	137
24). 12. IX. 1900; ib.....12,6	247	133,8

Всѣ эти экземпляры представляютъ взрослыхъ птицъ.

Вотъ размѣры молодыхъ въ вполне развитомъ нарядѣ первой осени.

Клювъ (отъ передняго края ноздри по хордѣ до вершины).

Крыло.

Хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы).

♀ ♀.

1). 14. X. 1906; урочище Кокъ-булакъ (на Сыръ-Дарьѣ)....12,6	270	140
2). 15. IX. 1906; селеніе Ходжикентъ..12,5	268	138
3). 5. X. 1907; станція Кауфманов- ская.....14	264,6	144
4). 5. IX. 1908; постъ Никольскій....13,6	250	142
5). 16. VIII. 1908; ib.....13	247	135

♂ ♂.

1). 5. IX. 1911; урочище Кара-ка- мышъ.....11,8	239	137,5
2). 25. VIII. 1909; ib.....12,7	238	133,7
3). 15. IX. 1906; селеніе Ходжикентъ..12,7	235	132
4). 8. IX. 1907; Ташкентъ.....12,7	233	130

Къ настоящему времени въ моей коллекціи сохранилось лишь весьма небольшое количество бѣлогорликовъ изъ Псковской и Оренбургской губерній. Эти немногіе экземпляры по размѣрамъ не отличаются отъ гнѣздящихся въ западныхъ отрогахъ Тянь-Шаня. Было бы интересно знать, какъ обстоитъ дѣло въ длинныхъ серіяхъ западныхъ птицъ.

Что касается до упомянутой блѣдности тянь-шанскихъ бѣлогорликовъ, то, опять таки, судя по моимъ немногимъ западнымъ экземплярамъ, для большинства она имѣетъ мѣсто въ дѣйствительности.

Мѣстовые бѣлогорлики Хорасанскаго, Кухисто-Керманскаго и Загросскаго участковъ Персіи также кажутся мнѣ въ большинствѣ случаевъ болѣе блѣдными, чѣмъ псковскіе и оренбургскіе (при размѣрахъ, соотвѣтственно покрывающихъ другъ друга). Очень темною кажется пара мѣстныхъ бѣлогорликовъ изъ Южно-Каспійскаго участка.

Среди туркестанскихъ бѣлогорликовъ изрѣдка попадаются на пролетѣ подъ Ташкентомъ особи съ поразительно блѣдною окраскою верхней стороны тѣла, такую же какъ у киргизскаго дербника (*Lithofalco aesalon pallidus* Suschk.), и съ рѣзкими, узкими, темными стержневыми полосками на перьяхъ спины и плечевыхъ (таковы, напримѣръ, ♂♂ за №№ 14 и 19)¹⁾. Замѣчу еще, что у немалаго числа моихъ экземпляровъ (какъ туркестанскихъ, такъ и персидскихъ) ясно наблюдается широкая, свѣтло-сѣрая, поперечная полосатость на верхнихъ кроющихъ хвоста, а иногда также и на перьяхъ крестца. На самыхъ длинныхъ перьяхъ надхвостья число такихъ полосъ достигаетъ шести.

147. Выродки сырѣ-дарьинскаго фазана (*Phasianus turkestanicus* Lorenz).

1). *Станція Кауфмановская*, 29. IX. 1907. Пѣтухъ съ бѣлыми хвостомъ, подхвостьемъ, верхними кроющими хвоста и заднею половиною крестца.

2). *Урочище Кокъ-булакъ*, 14. IX. 1909 (Е. К. Михайловскій). Старый пѣтухъ съ чисто-бѣлыми бровями, которыя начинаются немного впереди глазъ и оканчиваются у задняго края ушной партіи, вездѣ имѣя въ ширину 3 м.м.; уздечки чисто-

¹⁾ Таковыя не отличаются, однако, крупными размѣрами. *Авт.*

бѣлая; крестецъ съ сильнымъ развитіемъ сѣро-зеленоватаго цвѣта.

3). *Станція Байга-кумъ*, X. 1910. Чисто-бѣлый пѣтухъ съ грязно-розоватыми ногами (съ когтями) и клювомъ; райки глазъ красные. Экземпляръ первой осени.

4). *Устья р. Арысь*, около 15. XII. 1910. Крайне любопытная особь неизвѣстнаго пола. Хранится въ Ташкентскомъ музеѣ. Въ общемъ производитъ впечатлѣніе очень крупной самки, опереніе которой сильно испещрено пѣтушиными перьями, особенно многочисленными на правой половинѣ тѣла.

Голова и шея. Верхняя сторона головы, какъ у самки, но не съ черными, а съ зелеными, поперечными предвершинными полосами. Узкая темная дорожка, идущая отъ надклювья по лбу, не черноватая, а зеленая. Верхъ и бока шеи зеленые, причемъ однообразность этого цвѣта нарушается поперечною пятнистостью такой же окраски, какъ основной фонъ у самки, и съ такимъ же блѣднымъ виннымъ оттѣнкомъ; ближе къ ушнымъ партіямъ зеленый цвѣтъ пріобрѣтаетъ синеватый оттѣнокъ; рябь закрытыхъ частей перьевъ, какъ у самки.

Ушные партіи, какъ у самки, но съ зеленымъ корнемъ перьевъ и двумя синеватыми на нихъ перевязями. Перья уздечки, какъ у самки, но съ сине-зелеными узкими бордюрами.

Нижняя сторона головы и шеи на зеленомъ фонѣ испещрена рыжимъ, а мѣстами и бѣлесымъ. Перья этихъ частей имѣютъ черноватые корни, широкія бѣлесоватыя середины, темно-рыжія предвершинныя перевязи и зеленыя вершинныя.

Ошейника не имѣется.

Оперенное подглазное пространство какъ у самки.

Голыя части боковъ головы занимаютъ большее пространство, чѣмъ у самки, особенно на правой сторонѣ.

Грудь, какъ у самки, но съ рыжеватымъ основнымъ фономъ; повсюду выступаютъ пѣтушиныя перья (болѣе блѣдныя, чѣмъ обыкновенно, и безъ темныхъ бордюровъ), закрытыя части которыхъ либо цѣликомъ, какъ у самца, либо являются таковыми только въ вершинной части. Особенно много этихъ перьевъ на правой сторонѣ.

Врѣхо. Длинные перья боковъ длиннѣе, чѣмъ у самки, и менѣе испещрены чернымъ; свободныя вершины многихъ изъ нихъ, особенно на правомъ боку, окрашены, какъ у самца, но не имѣютъ темной вершинной отмѣтины въ громадномъ боль-

шинствѣ. Середина брюха, какъ у самки, но многія перья самой средней ея части окрашены въ черный цвѣтъ и снабжены широкой ржавой бахромой; на правой сторонѣ такихъ перьевъ много больше и они за ржавой бахромой имѣютъ металлически-зеленую кайму.

Остальныя части нижней стороны. Мягкія перья, прикрывающія ноги, на правой сторонѣ, какъ у самца, но болѣе блѣднаго тона, а на лѣвой—какъ у самки. Оперенная часть правой ноги темно-ржавая съ черными продольными пятнами, какъ это бываетъ у самца, лѣвой—какъ у самки, но съ сильною ржавою примѣсью. Перышки около пятки, какъ у самки, но съ ржавымъ оттѣнкомъ, болѣе темнымъ на правой ногѣ (у самца они черноваты съ ржавою примѣсью). Корень подхвостья, какъ у самки, но съ очень сильнымъ ржавымъ оттѣнкомъ, при чемъ нѣкоторыя перья правой его стороны такія же, какъ у самца; вершинныя двѣ трети подхвостья, какъ у самца, но болѣе блѣдныя.

Верхняя сторона туловища. Передъ спины и спинная партія, какъ у самки, но нѣкоторыя перья, особенно на правой сторонѣ, какъ у самца; вершинныя отмѣтины этихъ перьевъ на лѣвой сторонѣ вовсе отсутствуютъ, а на правой намѣчены лишь слегка, да и то не на всѣхъ.

Крестецъ, какъ у самки, но на многихъ перьяхъ съ рыжими бордюрами, имѣющими сильный зеленый и фіолетовый блескъ, и съ сильнымъ зеленымъ блескомъ на вершинныхъ черныхъ отмѣтинахъ. Такихъ перьевъ особенно много на правой сторонѣ.

Надхвостье, какъ у самки, но на многихъ перьяхъ, особенно правой стороны, съ сильно развитою ржавою и фіолетово-ржавою примѣсью и съ сильнымъ зеленымъ блескомъ на конечной и предконечной отмѣтинахъ.

Лѣвая плечевая партія, какъ у самки, но болѣе темнаго основного цвѣта, а на нѣкоторыхъ перьяхъ съ широкимъ, темнымъ, ржавымъ бордюромъ, имѣющимъ такой же блескъ, какъ у самца. Правая плечевая партія, какъ у самца (лишь немногія перья окрашены сходно съ самкой), но съ болѣе широкими свѣтлыми срединными полями, съ болѣе узкою металлически блестящею вершинною частью, безъ вершинныхъ темныхъ отмѣтинъ и съ чернымъ цвѣтомъ, испещряющимъ ржаво-каштановыя предкраевыя поля. Повсюду на этой партіи проглядываетъ свѣтлый цвѣтъ (рыжевато-глинистый) срединныхъ полей и предкраевыя пространства съ ихъ черною рябью.

Крылья. Малыя верхнія кроющія, какъ у самки, но на правомъ крылѣ нѣкоторыя изъ нихъ такія же бѣлыя, какъ у самца; нѣкоторыя изъ этихъ бѣлыхъ перьевъ, именно болѣе крупныя, ограничены съ краевъ фіолетово-ржавымъ. Переднія нижнія кроющія на правомъ крылѣ съ такимъ же ржавымъ цвѣтомъ, какъ у самца, но вообще съ меньшимъ его распространеніемъ.

Остальная часть лѣваго крыла, какъ у самки, но на внутреннихъ кроющихъ задніе махи съ широкими ржавыми краями, отливающимими фіолетовымъ цвѣтомъ. Остальная часть праваго крыла такъ же, какъ у самки, но упомянутыя перья окрашены, какъ у самца, т.-е. имѣютъ широкіе фіолетово-ржавые края и продольный черный рисунокъ въ срединныхъ частяхъ каждого пера (этотъ рисунокъ развитъ, однако, не такъ рѣзко, какъ у самца, тогда какъ поперечный—не такъ сильно, какъ у самки).

Хвостъ. Въ общемъ окрашенъ, какъ у самца, но съ болѣе блѣднымъ основнымъ фономъ. Рули правой половины хвоста пѣтушья. Изъ рулей лѣвой половины пѣтушьями кажутся (считая отъ самого длиннаго срединнаго) 1-й, 2-й, 3-й и 6-й; остальные, какъ у самки, но съ сильно развитою ржавою примѣсью. Черныя поперечныя полосы на пѣтушьяхъ перьяхъ шире, чѣмъ обыкновенно, раза въ 2—3. На четырехъ среднихъ руляхъ правой стороны между этими полосами имѣются, какъ у самки, прерывчатая, отчасти зубчатая черныя полосы.

Размѣры:

Клювъ отъ угла рта.....	22 м.м.
Крыло.....	221 „
Хвостъ (средніе рули еще не отросли вполнѣ).....	516 „ !
Плюсна спереди.....	66 „
Высота шпоры.....	1,5 „

Это—или куроперый пѣтухъ или, что вѣроятнѣй, гермафродитъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.—Fortsetzung folgt).

Ташкентъ, 26. X. 1911.



Къ орнитофаунѣ Енисейской губерніи.

А. Я. Тугариновъ.

Neues über die Vögel des Jenisseischen Gouvernements.

Von A. I. Tugarinow.

Служебныя дѣла не позволили мнѣ лѣто минувшаго (1911) года посвятить, какъ всегда, производству орнитологическихъ наблюдений въ Енисейской губерніи. Тѣмъ не менѣе, при помощи своего коллектора В. П. Ермолаева, мнѣ удалось пополнить свою коллекцію новыми сборами изъ Канскаго уѣзда и окрестностей Красноярска. Просматривая эти сборы, я натолкнулся на рядъ интересныхъ находокъ. Въ настоящей замѣткѣ я указываю на наиболѣе интересныя изъ нихъ, являющіяся дополненіями къ уже опубликованнымъ наблюденіямъ надъ птицами нашей губерніи ¹⁾).

Oreocincla sibirica (Pall.).—Черный сибирскій дроздъ наблюдался подъ Красноярскомъ и, по всей вѣроятности, на гнѣздовьи. Птицы были встрѣчены по рѣчкѣ Слизневой, правому притоку Енисея, верстахъ въ 12 выше города, на золотомъ приискѣ Лангвальдъ, гдѣ онѣ держались въ черемуховой заросли. Ихъ была цѣлая семья, изъ коей пару молодыхъ и одного взрослого удалось добыть.

¹⁾ А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: «Матеріалы по птицамъ Енисейской губерніи». Записки Красноярскаго Подъотдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества, т. I, вып. 3—4. Авт.

Имѣющійся въ моемъ распоряженіи экземпляръ отъ II. VIII—молодой самецъ. Его горло, зобъ, щеки и кроющія уха желто-охристыя; надглазная полоса выражена неясно; верхняя часть груди въ пестринахъ отъ треугольных наствольныхъ пятенъ; середина груди сплошь черная; низъ ея и бока туловища въ бѣлыхъ пестринахъ; середина брюха сплошь бѣлая; окраска остальныхъ частей оперенія, какъ у взрослыхъ, но болѣе тусклая.

Cinclus cinclus saturatus Dress.—Мнѣ удалось пополнить свою коллекцію оляпокъ тремя интересными экземплярами. Первый, отъ 20. I. 1910, я получилъ черезъ посредство Н. С. Федорова съ рѣчки Кизыра, изъ окрестностей села Имисскаго; второй былъ добытъ подъ Красноярскомъ 7. XI. 1910, а третій любезно присланъ мнѣ А. А. Яковлевымъ изъ Минусинскаго уѣзда, гдѣ былъ добытъ у селенія Верхній Суэтукъ 20. XII. 1911. Всѣ три экземпляра принадлежатъ къ группѣ съ темной грудью. Привожу (въ миллиметрахъ) размѣры этихъ птицъ и—для сравненія—размѣры *Cinclus cinclus baicalensis* Dress.

C. c. baicalensis.						C. c. saturatus.		
Дата.	20. XII. 1911;	20. XII. 1911;	20. XII. 1911;	4. I. 1912;	14. XII. 1908;	20. XII. 1911;	20. I. 1910;	7. XI. 1910;
Мѣсто.	с. Верхній Суэтукъ.	с. Верхній Суэтукъ.	с. Верхній Суэтукъ.	с. Ерма- ковское, Минусин- скій уѣздъ.	Красно- ярскъ.	с. Вер- хній Суэ- тукъ.	с. Имис- ское.	Кра- сно- ярскъ.
Длина	19.9	19.9	20.0	20.0	18.2	20.2	18.4	17.8
Крыло	91.0	87.3	84.0	89.0	86.0	85.0	84.0	82.0
Хвостъ	58.0	54.3	52.3	54.0	54.0	51.3	47.6	49.0
Плечна	22.0	22.0	21.3	21.6	21.3	23.0	22.4	21.2
Клювъ	29.0	28.3	27.0	28.2	27.7	27.7	28.3	27.0

Такимъ образомъ, сравнительно съ *C. c. baicalensis* описываемыя птицы будутъ въ общемъ мельче, что особенно замѣтно на длинѣ хвоста, а также и крыла, только въ одномъ случаѣ достигающаго минимальныхъ размѣровъ крыла *C. c. baicalensis*, что говоритъ не въ пользу предположенія о близкомъ родствѣ ихъ съ названной формой. Если обратимся къ

окраскѣ, то несходство выступить болѣе замѣтно. У всѣхъ трехъ нашихъ птицъ горло и верхняя часть груди настолько затемнены, что ни объ одной изъ нихъ нельзя сказать, что окраска у нея этихъ частей тѣла бѣлая съ размытыми наствольями перьевъ. Только у одного экземпляра изъ селенія Верхній Суэ-тукъ горловая часть нѣсколько свѣтлѣе, такъ какъ общій окрасъ перьевъ грязно-буроватый съ расплывчатыми темными центрами. У этого экземпляра, какъ и у красноярскаго, болѣе свѣтлая манишка отграничена отъ черно-бурого окраса остальной нижней части тѣла; у экземпляра же изъ села Имисскаго граница эта выражена не такъ рѣзко, и вся манишка, не исключая и горла, однообразнаго темно-буровато-сѣраго цвѣта. Чешуйчатый рисунокъ верхней части у всѣхъ экземпляровъ выраженъ не совсѣмъ ясно, особенно у птицы изъ селенія Верхній Суэ-тукъ, у которой, кромѣ того, поясница и надхвостье болѣе сѣраго аспиднаго цвѣта. Поэтому, и по окраскѣ, и по размѣрамъ описываемыхъ птицъ трудно разсматривать, какъ *C. c. baicalensis* Dress. съ затемненной манишкой. Замѣчу еще, что ни у одной изъ настоящихъ *C. c. baicalensis* темный окрасъ груди не распространяется сколько-нибудь на бѣлое поле верхней части груди, и цвѣта эти рѣзко разграничены, или, наоборотъ, бѣлый цвѣтъ, въ видѣ свѣтлыхъ концовъ перьевъ, заходитъ неправильными пятнышками въ область нижней части груди. Такимъ образомъ, на основаніи имѣющихся экземпляровъ нельзя говорить о существованіи переходныхъ особей между *C. c. baicalensis* и описываемыми темнозобыми.

Мои птицы, слѣдовательно, будутъ ближе къ тѣмъ темнозобымъ оляпкамъ, которыя извѣстны подъ именами *C. c. saturatus* Dress., *C. bilkewitschi* Zar. и *C. middendorffi* Suschk. (= *C. kibortii* Mad.) и разсматриваются иногда, какъ переходныя къ настоящимъ бѣлозобымъ. Судя по описанію профес. П. П. Сушкина ¹⁾, сдѣланному по экземплярамъ, добытымъ имъ у деревни Тюхтятки Минусинскаго уѣзда, т.-е. по соседству съ мѣстностью, откуда происходитъ и мой имисскій экземпляръ, его *Cinclus middendorffi* значительно крупнѣе: крыло 90—92, а плюсна 30—31 м.м.; кромѣ того, чешуйчатый рисунокъ моихъ птицъ выраженъ яснѣе. Такимъ образомъ, енисейскія птицы будутъ ближе къ *C. c. saturatus* и *C. bilke-*

¹⁾ Сообщено мнѣ въ письмѣ отъ 1. III. 1910. *Авт.*

witschi (о тождествѣ которыхъ, впрочемъ, неоднократно высказывались предположенія различными авторами). Н. А. Зарудный для самца описанной имъ птицы даетъ размѣры: крыло 84, хвостъ 53 и плюсна 29 м.м. Судя по описаніямъ, къ тому же приводитъ и характеръ окраски моихъ птицъ, именно верхней стороны ихъ тѣла. Поэтому я и рѣшаюсь отнести ихъ къ *C. saturatus* Dress. съ оговоркой, что ихъ нельзя считать принадлежащими къ группѣ „бѣлозобыхъ“ съ затемненной грудью. На этомъ основаніи, между прочимъ, невозможно было бы описываемыхъ птицъ опредѣлить по таблицѣ Г. Э. Юганзена („Орнит. Вѣстн.“ за 1910 г., книга 4-ая), въ которой *C. saturatus* (= *C. bilkewitschi* = *C. kiborti*) отнесенъ въ группу подъ рубрикой „горло бѣлое“.

Dumeticola intermedia (Oates).—Въ моихъ рукахъ имѣется экземпляръ самца этой птички, добытый 17. VI. 1911 у селенія Таншетъ, на границѣ Енисейской и Иркутской губерній. Его размѣры: крыло 53, хвостъ 56, culmen 13, плюсна 18,6 м.м. Считаю не лишнимъ привести здѣсь полное описаніе этого самца.

Вся верхняя сторона буроватая съ оливковымъ оттѣнкомъ. Маховыя и рулевыя темнѣе, безъ оливковаго налета; внутреннія изъ второстепенныхъ маховъ и большія кроющія крыла съ болѣе свѣтлыми буровато-охристыми внѣшними опахалами. Рулевыя въ поперечныхъ полосахъ. Нижняя поверхность стержней рулей и маховъ сѣровато-бѣлая, а верхняя—бурая. Надбровная полоса у клюва бѣловатая, за глазомъ блѣдно-охристая, скоро теряющаяся. Ушныя перья цвѣта верха, съ бѣлыми центрами. Уздечка темнѣе. Горло бѣлое. На зобѣ перья съ темными пестринами. Верхняя часть груди сѣровато-желтая, при чемъ цвѣтъ этотъ темнѣе къ бокамъ. Средине нижней части груди и брюха бѣлая. Бока тѣла, голень и подхвостье свѣтло-желтовато-бурые. Нижнія кроющія крыла свѣтло-желтовато-бурыя; подмышечныя еще свѣтлѣе. Стибъ крыла блѣдно-буланый. Выдающаяся часть перваго махового—11, второго—33 м.м. Формула крыла: $3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 2 = 8 < 9 \dots$. Крайнія рулевыя короче самыхъ длинныхъ на 18 м.м. (перо замѣтно поношено).

Anthus pratensis (Linn.).—1911 годъ ознаменовался залетомъ въ окрестности Красноярска лугового конька. Въ моей коллекціи имѣется 4 экземпляра этого вида отъ 8. IX и 4—отъ 14. IX. Птички держались большими стаями на луговой террасѣ Енисея около селеній Ладейки и Торгашино. Въ стаяхъ были старыя и

молодые птицы. Для Енисейской губернии это первый случай находки лугового конька.

Muscicapa atricapilla L.—Новой для губернии является и мухоловка пеструшка, такъ какъ восточнѣе Томска она пока не наблюдалась. Моя птица—взрослый самецъ, добытый 17. IV близъ монастыря въ 7 верстахъ отъ Красноярска.

Hirundo tytleri Jerd.—Въ настоящее время я могу утверждать, что эта ласточка гнѣздуетъ въ восточной части Канскаго уѣзда. В. П. Ермолаевъ сообщилъ мнѣ, что онъ видѣлъ эту птицу среди колоніи обыкновенныхъ ласточекъ въ деревнѣ Терехиной, въ Красноярскомъ уѣздѣ. Кромѣ того, минувшимъ лѣтомъ тотъ же наблюдатель видѣлъ ее въ деревнѣ Базаихѣ, въ 7 верстахъ отъ Красноярска. Наконецъ, въ моей коллекціи есть молодой экземпляръ этого вида, добытый 8. VIII у села Торгашино, противъ Красноярска.

Tringa acuminata (Horsfield).—Острохвость былъ добытъ изъ стайки около десяти особей, замѣченной 9. VII. 1911 на грязныхъ лужахъ недалеко отъ деревни Базаихи. Такимъ образомъ, мнѣ приходится констатировать второй случай нахожденія этого куличка въ бассейнѣ Енисея (впервые онъ былъ найденъ проф. П. П. Сушкинымъ въ Саянахъ).



Къ авифаунѣ Бугурусланскаго уѣзда Самарской губерніи.

А. Н. Карамзинъ.

Zur Avifauna des Buguruslan'schen Kreises im Gouvernement Samara.

Von A. N. Karamsin.

1). *Circaëtos gallicus* Gm.—25. VI. 1911 на Тихомъ Хуторѣ близъ станціи Филипповка Самаро-Златоустовской желѣзной дороги на меня налетѣлъ хищникъ, котораго я хорошо рассмотрѣлъ въ бинокль, и потому утвердительно могу сказать, что это былъ орелъ-змѣядъ. Какую разновидность—типичную или свѣтлозобую (*C. gallicus* var. *hypoleuca* Pall.)—пришлось мнѣ наблюдать, сказать не могу, но зобъ у видѣнной мной птицы былъ очень свѣтелъ, съ небольшими темными пятнами и полосами.

2). *Troglodytes parvulus* Linn.—Крапивникъ наблюдался мною здѣсь впервые 3. X. 1911 въ моемъ саду, гдѣ, послѣ выпавшаго наканунѣ необычно глубокаго для этого времени снѣга, собралось много пролетныхъ птицъ. Крапивникъ выскочилъ изъ кучи хвороста, всего въ пяти шагахъ отъ меня, и усѣлся на кончикъ одной изъ хворостинокъ, такъ что я могъ хорошо его рассмотреть.

3). *Loxia bifasciata* Brehm.—Стайка бѣлокрылыхъ клестовъ (3 самца и 1 самка) наблюдалась мною 21. X. 1911 у села Полибина

въ посадкахъ лиственницъ. Птички лазали по деревьямъ, кормясь шишками, и позволили хорошо разсмотрѣть себя.

Съ присоединеніемъ змѣеяда, бѣлокрылаго клеста и мохноногаго сыча (*Nyctala tengmalmi* Gm.), найденнаго на пролетѣ Е. И. Исполатовымъ ¹⁾, число видовъ нашей авифауны достигаетъ 261.



¹⁾ «Наблюденія надъ птицами Бугурусланскаго уѣзда Самарской губерніи за три года (съ 1907 г. до 1910 г.)». «Орнит. Вѣстн». за 1911 г., стр. 232. *Авт.*

Къ орнитофаунѣ Тарбагатайскихъ горъ.

В. А. Хачловъ.

Zur Ornithofauna der Tarbagatai—Gebirge.

Von W. A. Hachlow.

Въ Саурскомъ хребтѣ, по р. Улькунъ-Джемени были пойманы въ сѣти на голубя два экземпляра рѣдкихъ кречетовъ: *Hierofalco altaicus* Menzb. и *Hierofalco lorenzi* Menzb.

1). *Hierofalco altaicus* Menzb.; ♂ juv.; 11. XII. 1907.—Сверху темно-бурый съ узкими свѣтло-бурыми ободками и черными стержнями. Затылокъ свѣтлый. Снизу нечисто-бѣлый, съ охристымъ отбѣнкомъ и темными стержневыми пятнами, развитыми настолько, что вся нижняя сторона кажется темной. Плюсна оперена только до половины. Крыло—355, плюсна—45, хвостъ—196, клювъ по сгибу—30, высота клюва около ноздрей—17, ширина около восковицы—12 m.m.

2). *Hierofalco lorenzi* Menzb.; ♂ subad.; 15. III. 1911.—Напоминаетъ *H. cheggii*, но сверху замѣтно раздѣленіе окраски: задняя половина болѣе пепельная, передняя рыжеватая. Кромѣ того, на второстепенныхъ махахъ есть супротивно-расположенные рыжія округлыя пятна. На спинѣ они очень рѣдки. Бока низа съ поперечнымъ рисункомъ. Крыло—358, плюсна—45 (оперена дальше половины), хвостъ—198, клювъ по сгибу—30, высота клюва у ноздрей—17, ширина около восковицы—12 m.m.



Большая бѣлая синица (*Parus bokharensis* Licht.) и ея расы.

Н. А. Зарудный и С. И. Билкевичъ.

Parus bokharensis Licht. und ihre rassen.

Von N. A. Zarudny und S. I. Bilkewitsch.

Большая синица въ настоящее время представлена въ нашей коллекціи длиннымъ рядомъ экземпляровъ, позволяющимъ установить отдѣльныя ея расы и указать примѣрныя границы распространенія этихъ послѣднихъ. Для лицъ, мало знакомыхъ съ *Parus intermedius* Zar.=*P. transcaspicus* Zar. („Bull. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou“, 1890, p. 789; ib., 1893, p. 364) изъ горъ Закаспійской области (Копетъ-дагъ), а также изъ садовъ равнинъ Ахала и Атэка, замѣтимъ, что она относится къ другому виду, болѣе близкому къ большой желтой синицѣ (*Parus major* Linn.).

1). *Parus bokharensis turkestanicus* Zar. & Loud. („Ornit. Monatsber.“, 1905, p. 109).—Горы къ югу отъ хребтовъ Александровскаго и Кунгей-Алатау включительно до горъ южной Бухары, долины рѣкъ Чирчика и Ангрена, вся Фергана, долина Аму-Дарыи вверхъ включительно отъ г. Келіфъ. По существованію у молодыхъ въ первомъ нарядѣ зеленоватыхъ оттѣнковъ на верхней сторонѣ и желтоватыхъ на нижней, мы считаемъ эту расу *наиболѣе древнею, основною и родоначальною для всѣхъ остальныхъ*.

2). *Parus bokharensis iliensis* subsp. nov.—Семирѣчье (окрестности Джаркента и ближайшія къ нимъ части долины рѣки Или, хребетъ Ала-тау).

3). *Parus bokharensis dzungaricus* subsp. nov.—Джунгарія (Булунъ-тохой и Орху; вѣроятно южные склоны Эктагъ-Алтая и Тарбагатая). Какая раса обитаетъ въ Восточномъ Туркестанѣ—это вопросъ открытый.

4). *Parus bokharensis bokharensis* Licht. (H. Lichtenstein, in Eversmann's Reise Orenb. Buchara, 1823).—Долина Сыръ-Дарьи ниже устья Чирчика (съ какого именно пункта—пока не выяснено), г. Туркестанъ, долина Аму-Дарьи ниже Чарджуя и около этого послѣдняго (какъ высоко поднимается вверхъ по Аму-Дарьѣ, еще неизвѣстно; подъ Келифомъ и выше нами найдена только *P. b. turkestanicus*), низовыя части долины Зерафшана, закаспійскія части бассейновъ Теджена и Мургаба, пустыни Кызылъ-кумъ и Кара-кумъ (закаспійскій) на западъ до Арала и Каспія.—Какая раса обитаетъ долину Чу, неизвѣстно.

Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ экземпляры распредѣляются по степени убыванія длины крыла.

Parus bokharensis turkestanicus.

	Крыло.	Хвостъ.	Клювъ (отъ передняго края ноздри).	Плюсна (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂♂.				
1). 4. XII. 1907; Ташкентъ	75,4	85	8,8	19
2). 2. XII. 1907; ib.	75	82	8,8	18,6
3). 4. XII. 1907; ib.	74,4	83	8,8	19
4). 2. XII. 1906; ib.	74,3	81,2	9	18,7
5). 4. V. 1908; ib.	74,3	81	9,2	18,4
6). 13. XII. 1908; ib.	74,2	80,2	9	18
7). 4. VIII. 1907; станція Кауфмановская.	74	86	8,4	18,2
8). 18. XI 1908; Ташкентъ	74	82,6	9	18,4
9). 5. X. 1906; ib.	74	80,8	8,5	18
10). Ib.	73,9	82	8,9	18
11). 2. XI. 1908; ib.	73,8	83,2	8,8	17,6
12). 20. II. 1908; ib.	73,8	80	8,7	18,4
13). 18. I. 1908; ib.	73,5	82,2	8,5	18,6
14). 19. VII. 1910; Кызылъ-су (Бухара).	73,5	82	8,8	17,4
15). Ib.	73,5	80,4	8,6	17,4
16). Ib.	73,4	83	9	19
				10*

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюси</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂♂.				
17). 28. IX. 1911; станція Кауфмановская....	73,3	82	8,8	19,1
18). 25. IX. 1911; Ташкентъ.....	73,3	81	8,5	19,1
19). 10. I. 1910; ib.....	73	81,6	9,2	18,8
20). Ib.....	72,7	81	8,8	18,2
21). 30. XII. 1907; Талды-булакъ.....	72,2	78,5	9,2	18,5
22). 5. XI. 1908; Ташкентъ.....	72	80,3	8,6	def.
23). 14. XI. 1907; ib.....	72,3	81	8,5	19,2
24). 7. XII. 1907; ib.....	72	81,4	8,6	19,6
25). 21. IX. 1910; ib.....	72	80	9	19
26). 31. XI. 1906; ib.....	72	80	8	18,5
27). 23. VIII. 1907; ib.....	72	79,5	8,7	18,4
28). 31. I. 1908; ib.....	71,7	78,6	8,9	18,3
29). 13. V. 1910; Ходжа-и-Филь (Бу- хара).....	71,5	75	8,5	18,4 ¹⁾
30). Ib.....	71,4	77,7	9	19
31). 18. XII. 1907; Ташкентъ.....	71,4	79	8,7	18,2
32). 6. II. 1908; ib.....	71,5	79	9	19,3
33). 31. X. 1906; ib.....	71,4	82,8	8,6	18
34). 27. IX. 1909; ib.....	71,3	79	8,6	18,6
35). 1. I. 1907; ib.....	71,3	80	9	19,1
36). 23. I. 1908; Кибрай.	71,2	81	def.	18
37). 17. XII. 1907; Ташкентъ.....	71,2	78	8,5	18
38). 13. XII. 1908; ib.....	71	80,3	9	18,2
39). 10. X. 1909; ib.....	71	79,3	9	19

¹⁾ Рули и махи очень сильно отрепаны. *Авт.*

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♂ ♂.				
40) 13. VI. 1910; Кабадіанъ (Бухара).....	71	80	8,8	18,2
41). 5. IX. 1911; Ошъ... 71		80	9	19
42). Ів.....	70,8	82,5	8,7	18,6
43). 8. XII. 1906; Ташкентъ.....	70,6	78,6	8,6	18
44). 22. X. 1908; ів.....	71	78	8,6	19
45). 23. VII. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара).....	70,8	79,5	8,7	18,5
46). Ів.....	70,6	79	8,7	18,7
47). 13. I. 1908; Ташкентъ.....	70,4	79	8,5	def.
48). 5. XII. 1906; ів.....	70,4	78,5	9	18,8
49). 17. IX. 1907; Кокандъ.....	70,4	79	8,6	18,6
50). 6. IV. 1908; Кнбрай.....	70,3	80	8,6	17,8
51). 13. VI. 1910; Кабадіанъ (Бухара).....	70,3	79	8,6	18
52). 7. VI. 1910; Хазретъ-баба (Бухара).....	70,2	78	9	18
53). 24. X. 1908; Ташкентъ.....	70,3	76	8,6	19
54). 5. XI. 1908; ів.....	70,4	79	8,5	18,6
55). 23. VII. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара).....	70,3	78,5	8,7	18,8
56). 30. XI. 1907; Ташкентъ.....	70,3	78	9	17,8
57). 10. XI. 1911; ів.....	70,3	76,5	8,4	18,4

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂ ♂.				
58). 13. V. 1910; Ходжа-и-филь (Бухара).....	70,3	77	8,5	18,2
59). 21. IX. 1910; Ташкентъ.....	70,2	78,2	8,6	19.
60). 13. I. 1908; ib.....	70	79	8,4	18,5
61). 2. III. 1908; ib.....	70	79,9	9	17,9
62). Ib.	70	79	8,7	18
63). 7. IV. 1908; ib.....	70	72,8	8,6	17,4 ¹⁾
64). 12. V. 1910; Ходжа-и-филь (Бухара).....	69,9	79	8,5	18
65). 15. XII. 1908; Ташкентъ.....	69,8	80	8,8	18,6
66). 30. VII. 1910; Термезъ (Бухара).69,8		81	9	18,5
67). 31. VIII. 1909; Ташкентъ.....	69,7	81	8,5	def.
68). 27. XI. 1906; ib.....	69,6	79,8	8,7	18,7
69). 18. XI. 1906; ib.....	69,6	76	9	18
70). 22. VII. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара)	69,6	77,2	8,5	18,5
71). 13. XII. 1907; Ташкентъ.....	69,5	78	8,7	18,6
72). 30. IX. 1907; ib.....	69,3	77,4	8,5	19
73). 10. XII. 1907; ib....	69	80,5	9,2	18,2
74). 1. XI. 1911; ib.	69	77,3	8,6	18,3
75). 18. XI. 1906; ib.	69	77,2	9,2	18
76). 16. II. 1909; ib.	69,2	80	8,5	18,2
77). 7. IV. 1908; ib.	69	76,3	8,7	18
78). 6. XII. 1907; ib.	69	76,4	8,3	18,3
79). 19. III. 1908; ib.	69	76	8,7	19

¹⁾ Хвостъ уродливо коротокъ по отношенію къ крылу. *Авт.*

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂ ♂.				
80). 21. II. 1907; Маргеланъ69		76,8	8,9	19
81). 18. XI. 1911; Ташкентъ69		75	9,2	18
82). 30. IX. 1908; Наманганъ69		75	9	17,7
83). 14. V. 1908; Ташкентъ69		78	9	18,6
84). 3. XII. 1908; ib.....68,8		78	9	18,2
85). 10. I. 1910; ib.....68,5		79	8,8	18
86). Ib.....68		74,1	8,5	18,2
87). 6. IV. 1908; ib.....68,6		75,5	9	18
88). 26. I. 1909; ib.....68,1		77,2	8,6	18,9
89). 18. X. 1909; ib.....67,4		83	8,5	18,3
90). 13. I. 1910; ib.....67		73	8,7	18,7
♀ ♀.				
1). 25. X. 1911; Ташкентъ72,2		79,2	9,2	17,9
2). 13. V. 1910; Ходжа-и-филь (Бухара).....71		77	8,8	def.
3). 18. XI. 1907; Ташкентъ71		76	8,6	def.
4). 13. I. 1908; ib.....70		76,4	8,2	17,5
5). 26. IX. 1907; ib.....70		76	def.	17,6
6). 10. I. 1910; ib.....70		76	8,2	17,8
7). 8. XII. 1906; ib.....70		75	8,6	18,5
8). 22. VII. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара).....70		74	8,7	17,9
9). 8. XII. 1907; Ташкентъ69,8		77	8,4	18,3
10). 8. XII. 1908; ib.....69,7		74	8,5	18
11). 30. I. 1908; ib.....69,5		75,2	8,5	18,2

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♀ ♀.				
12). 22. I. 1910; ib.	69,5	74,5	9,4	17,5
13). 17. VIII. 1911; ib.	69,3	75	def.	18,3
14). 13. IX. 1906; ib.	69,2	75,7	9	17,6
15). 5. XI. 1908; ib.	69,2	76,2	8,5	17,6
16). 6. XI. 1910; ib.	69	79,8	8,6	18,4
17). 2. I. 1908; ib.	69	75,5	8,3	17
18). 27. VII. 1910; Термезъ (Бухара). 69		75,5	8,5	18
19). 11. X. 1911; Ташкентъ.	69	76,3	9	18
20). 13. I. 1911; ib.	69	76	8,3	17,5
21). 30. IX. 1908; Наманганъ.	69	76	9	18
22). 16. II. 1909; Ташкентъ.	68,8	72,6	8,8	18,8
23). 28. VII. 1910; Термезъ (Бухара). 68,8		76	8,7	17,8
24). II. 1908; Маргеланъ.	68,8	72,2	9	18,3
25). 15. VIII. 1910; Ташкентъ.	68,7	76,2	9	18
26). 18. XI. 1906; ib.	68,6	74,2	9	18,5
27). 9. XII. 1907; ib.	68,5	73	8,4	17,4
28). 28. I. 1908; ib.	68,4	72,3	8,6	18
29). 10. V. 1910; Койтанъ (Бухара). 68,4		72	8,8	18
30). Ib.	68,3	72,2	8,4	17,7
31). 2. XII. 1906; Ташкентъ.	68,2	75	8,4	18
32). 29. VIII. 1906; ib.	68,2	74,4	def.	17,8
33). 4. XI. 1906; ib.	68	76	8,6	def.
34). 30. IX. 1908; Наманганъ.	68	75	8,6	def.
35). 21. I. 1909; Ташкентъ.	68	74	8,7	17

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♀ ♀.				
36). 15. X. 1907; ib	68	74	8,3	17
37). 13. V. 1910; Ходжа-и-филь (Бухара)	68	71,3	8,5	17,6 ¹⁾
38). 13. I. 1908; Ташкентъ	67,8	73	8,4	18
39). 5. XII. 1908; ib	67,8	73,8	8,4	16,8
40). 3. II. 1908; ib	67,7	74,3	8,4	17,6
41). 4. XII. 1907; ib	67,4	73,8	8,4	18
42). 16. XII. 1906; ib	67,2	76,2	8,2	16,7
43). 15. IX. 1910; ib	67,2	72,8	8,5	18,2
44). 26. IX. 1908; Чиназъ	67	74,5	8,1	18
45). 28. X. 1906; Ташкентъ	67	74	8,5	17,6
46). 21. IX. 1909; ib	67,2	75	9	18,8
47). II. 1908; Маргеланъ	67	73,8	9,2	17,4
48). 17. XI. 1907; Ташкентъ	67	73,6	8,4	18
49). 5. XI. 1909; ib	67	73	8,2	18
50). 29. X. 1908; ib	67	73	8,5	17,6
51). 29. I. 1908; ib	67	72	8	16,5
52). 19. XI. 1907; ib	66,5	71,6	8,5	18
53). 8. XII. 1906; ib	66,3	76,6	9	17,6
54). 17. I. 1907; ib	66,3	76	8,4	18,4
55). 2. XII. 1906; ib	66	76	8,6	17,4
56). 15. XII. 1908; Ошъ	66	75,5	9	18
57). 13. I. 1907; Ташкентъ	66	71,5	8,4	18
58). 25. IX. 1911; ib	66	71,4	8	18
59). 26. I. 1909; ib	65,5	73,5	8,2	17,5

¹⁾ Рули и махи сильно отрешаны (какъ и у экземпляровъ за №№ 29—30).
Авт.

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♀ ♀.				
60). Ib.....	65,5	70	8,4	17,6
61). Ib.....	65,3	73,5	8,1	17,6
62). 19. X. 1907; ib.....	65,5	73,4	8,4	17,6
63). 5. I. 1908; ib.....	65	72	8,3	def.
64). 10. I. 1910; ib... ..	65	73,8	8,4	16,8
65). 16. I. 1907; ib.....	63,2	70	def.	16

Такимъ образомъ, мы здѣсь имѣемъ такія колебанія размѣровъ:

Крыло: у ♂♂ 75,4—67 m.m.¹⁾, у ♀♀ 72,2—65 m.m.
(экземпляръ за № 64 уродливо малъ).

Хвостъ: у ♂♂ 85—73 m.m., у ♀♀ 79,2—70 m.m.

Клювъ: у ♂♂ 9,2—8,3 m.m., у ♀♀ 9,4—8 m.m.

Плюсна: у ♂♂ 19,6—17,4 m.m., у ♀♀ 18,8—16,5 m.m.

(не считая экземпляра за № 64, уродливо малаго).

Первый нарядъ туркестанской синицы является рѣзко отличнымъ отъ того, который носится другими расами. Тогда какъ у этихъ послѣднихъ всѣ бѣлые и сѣрые цвѣта представляются чистыми, у туркестанской расы бѣлый цвѣтъ нижней стороны тѣла, щекъ и пятна на задней сторонѣ шеи кажется болѣе мутнымъ и весьма часто развиваетъ явственный желтый оттѣнокъ (у многихъ особей этотъ цвѣтъ можетъ быть обозначенъ желтовато-бѣлымъ, а у нѣкоторыхъ даже блѣдно-желтымъ); сѣрый же цвѣтъ спины и плечевыхъ кажется грязноватымъ и большею частью развиваетъ явственный зеленый оттѣнокъ (у многихъ особей онъ можетъ быть обозначенъ зелено-сѣрымъ). Въ нашемъ матеріалѣ наиболѣе зеленоватые и желтоватые экземпляры происходятъ изъ южной Бухары; именно изъ бекствъ Келифскаго, Байсунскаго, Деннаузкаго, Кабадианскаго и Кулябскаго. Эти оттѣнки развиваются, повидимому, особенно сильно у самочекъ.

¹⁾ По Э. Хартеру („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, p. 344), длина крыла достигаетъ 77 m.m. (у „*Parus major bokharensis* Licht.“ съ первоначальной его точки зрѣнія, т.-е. когда онъ еще не отличалъ *P. b. turkestanicus*). Очевидно, что такая величина найдена имъ именно у туркестанской или, можетъ быть, у семирѣченской расы. *Авт.*

Вотъ размѣры туркестанской синицы въ вполне развитомъ первомъ нарядѣ.

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂♂.				
1). 25. V. 1909; Ташкентъ.....	74	73,4	8,5	18,3
2). 5. VII. 1909; ур. Аралъ (Фергана).....	73,8	73	9	18,4
3). 7. VI. 1910; Хазретъ-баба (Бухара).....	72,8	71	8,9	19
4). 5. VII. 1909; ур. Аралъ (Фергана).....	72,4	73	9	18,5
5). 2. VII. 1910; Юльъ (Бухара).....	72	71,2	8,5	18
6). 2. VI. 1909; Нанайъ (Фергана).....	71,4	69,8	8,3	17
7). 22. V. 1909; Ташкентъ.....	71	70,5	8,4	17,8
8). Ib... ..	70,8	69,8	8,5	18
9). 13. VI. 1910; Кабадианъ (Бухара)	70,8	69,6	9	18,4
10). Ib.....	70,5	68,8	8	18
11). 10. V. 1909; Ошъ.....	70,5	69	8,7	19
12). 10. VI. 1910; Хазретъ-баба (Бухара)	69	64,6	8	18
13). 29. VI. 1907; Ташкентъ.....	69,5	68	8,7	18,3
14). Ib.....	69,3	68,3	8,7	18,5
15). 8. VI. 1910; Хазретъ-баба (Бухара).....	68,4	68,3	8,3	18,2

	Крыло.	Хвостъ.	Клювъ (отъ пе- редняго края ноздри).	Плюсна (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♀ ♀.				
1). 7. VII. 1910; Юль (Бухара).....	71	67	8,7	18
2). 8. V. 1908; Ташкентъ.....	68,2	65	7,6	18
3). Ib.....	68	65,9	7,8	17,8
4). 20. V. 1908; ib.....	67,5	66,1	8	17,8
5). 5. VII. 1909; ур. Аралъ (Фер- гана).....	66	66	7,7	17,7
6). 10. V. 1909; Ошъ..	66	63	8	17,9
7). 10. VI. 1910; Хазретъ-баба (Бухара).....	65,3	65,3	8	16,8
8). 13. VI. 1910; Кабаданъ (Бухара)..	64,3	63,5	7,8	18
9). Ib.....	63	62	def.	18
10). Ib.....	62,3	62,3	8	17,8

Крыло: у ♂♂ 74—68,4 м.м., у ♀♀ 71—62,3 м.м.

Хвостъ: у ♂♂ 73,4—64,6 м.м., у ♀♀ 67—62 м.м.

Клювъ: у ♂♂ 9—8 м.м., у ♀♀ 8,7—7,6 м.м.

Плюсна: у ♂♂ 19—17 м.м., у ♀♀ 18—16,8 м.м.

Parus bokharensis iliensis.

Семирѣченская большая бѣлая синица отличается въ се-
рияхъ болѣе блѣднымъ оттѣнкомъ сѣраго цвѣта на спинѣ, мень-
шимъ развитіемъ этого цвѣта на бокахъ брюха и вообще болѣе
массивнымъ клювомъ ¹⁾. По размѣрамъ, вѣроятно, совпадаетъ съ
предыдущею.

¹⁾ Э. Хартертъ (Novitates Zoologicae, v. XII, September, 1905, p. 498), упоми-
няя о мой Р. *irkistanicus*, по сравненію съ Р. *bokharensis* называетъ ея клювъ
огромнымъ («huge»). Выразаясь такимъ образомъ, онъ, повидимому, имѣлъ въ
виду именно семирѣченскихъ птицъ, длинная серія которыхъ была незадолго до того
отправлена мною въ Трингъ. *Авт.*

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края (ноздри)).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂♂.				
1). 18. XI. 1907; р. Или.....	73,5	83,8	9,6	18,5
2). Ib.....	73,2	83,2	9,4	19,2
3). 20. XI. 1907; Джаркентъ.....	73	82,2	9,3	17,8
4). 7. XI. 1899; ib....	72,8	82	9,3	18
5). 18. XI. 1907; р. Или.....	72,5	81,6	8,8	17,9
6). 17. XI. 1900; Джаркентъ	72,8	81,7	8,9	18
7). 7. XI. 1899; ib... ..	72,2	81,2	9,4	17,9
8). 25. XI. 1907; ib... ..	72	81	8,7	18
9). 11. XI. 1899; ib... ..	72	81	8,7	18
10). 7. II. 1900; ib... ..	72	81	8,6	17,7
11). 7. II. 1900; ib... ..	71,8	80,7	9	17,8
12). 23. X. 1899; ib... ..	70	77	8,8	17,8
13). Ib... ..	69	78,2	8,7	18
14). 22. XI. 1900; р. Или.....	69	77,2	8,7	17,8
15). 28. X. 1899; Джаркентъ.....	69	80	8,8	18
16). 23. X. 1899; ib... ..	68,2	77,2	8,7	17,7
♀♀.				
1). 23. X. 1899; Джаркентъ.....	70,7	78	8,9	17,8
2). 18. XI. 1907; р. Или.....	70,4	77	8,8	17,5
3). 23. X. 1899; Джаркентъ.....	70	77	9,9	17,7
4). Ib.....	69	79	9,9	17,3
5). Ib.....	68,2	78,8	10	17
Крыло: у ♂♂ 73,5—68,2 м.м., у ♀♀ 70,7—68,2 м.м.				
Хвостъ: у ♂♂ 83,8—77 м.м., у ♀♀ 79—77 м.м.				
Клювъ: у ♂♂ 9,6—8,6 м.м., у ♀♀ 10—8,8 м.м.				
Плюсна: у ♂♂ 19,2—17,7 м.м., у ♀♀ 17,8—17 м.м.				

Parus bokharensis dzungaricus.

Джунгарская большая бѣлая синица извѣстна намъ лишь по тремъ экземплярамъ. Въѣсть съ предыдущей отличаясь отъ *P. b. turkestanicus* блѣдною окраскою спины и боковъ брюха, она разнится отъ нихъ весьма массивнымъ и высокимъ клювомъ, киль котораго весьма сильно изогнутъ. Въ длинной серіи ея окраска, быть можетъ, окажется еще болѣе блѣдной, чѣмъ у *P. b. iliensis*.

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂; 1870; Булунъ-то-хой (Джунгарія)...74,3		85	10	18,5
♀; декабрь 1890; р. Орху (Джунгарія)...70,7		78	9,9	17,3
♀; ib.....71		79	10	18,3

Parus bokharensis bokharensis.

Отличается отъ туркестанской расы меньшими размѣрами и болѣе блѣднымъ оттѣнкомъ сѣраго цвѣта спины ¹⁾ (въ отношеніи окраски болѣе или менѣе сходится съ семірѣченскою и джунгарскою расами, рѣзко отличаясь отъ нихъ далеко менѣе массивнымъ клювомъ), а также, повидимому, меньшимъ количествомъ чернаго цвѣта на бокахъ шеи. Возможно также, что бѣлый цвѣтъ крайнихъ рулей у ней развитъ вообще сильнѣе, чѣмъ у другихъ расъ.

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂♂.				
1). 18. II. 1903; Тедженъ.....70		76	7,6	17,7

¹⁾ Конечно, попадаются и особи не столь блѣдныя, но таковыя затериваются въ массѣ блѣдныхъ, такъ же какъ у туркестанской расы блѣдныя особи окончательно тонутъ среди нормальныхъ темныхъ. *Авт.*

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ пс- редняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂ ♂.				
2). 8. IV. 1911; Сары- язы (Мургабъ) .. 68,8		71,2	8	18
3). 27. XII. 1911; Бесъ-песыкъ (Сыръ-Дарья) .. 68,2		76,3	8,5	17,2
4). 12. VIII. 1892; Заливъ Михай- ловскій (Касп. море) 68,1		72,9	8	17,4
5). 29. XII. 1911; Репетекъ 68		72,5	7,7	17
6). 8. IV. 1911; Сары-язы (Мургабъ) 68		71	8,3	18
7). 23. XII. 1909; Чйили (Сыръ- дарья) 67,5		76,5	8	16,8
8). Ib 67,4		75,8	8	17,3
9). 18. XI. 1909; Джулекъ 67,3		75,6	7,8	17,4
10). 16. XII. 1911; Сары-язы (Мургабъ) 67,3		74	7,6	17
11). 10. I. 1909; г. Туркестанъ .. 67,2		75,4	7,8	17,2
12). 27. XII. 1911; Репетекъ 67,2		73,7	8,3	17
13). 10. I. 1909; г. Туркестанъ .. 67,1		75,5	8	17,9
14). 23. II. 1903; Юлатанъ (Мур- габъ) 67		75	8	17,6
15). 15. IV. 1903; Сары-язы (Мур- габъ) 67		74	8	17

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзадн).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂♂.				
16). 4. IV. 1911; Репетекъ.....67	73	8	18,7	
17). 29. III. 1904; ib...67	72,7	8,4	18,8	
18). 13. IV. 1911; ib...67	69,8	8,3	16,5	
19). 27. XII. 1911; Бесъ-песыкъ (Сыръ-Дарья)...66,7	74	7,6	16	
20). 26. XII. 1911; Репетекъ.....66,5	72,5	7,6	16,8	
21). 24. IV. 1911; Чарджуй.....66,4	72	8,5	17,6	
22). 11. IV. 1896; ib...66,4	71,5	8,4	17,6	
23). 22. XII. 1911; Репетекъ.....66,4	71,2	8,5	17	
24). 8. IV. 1911; Сары-язы (Мур- габъ).....66,3	72	8,4	17,5	
25). 12. IV. 1909; Репетекъ.....66,1	73	8,4	16,5	
26). 12. VIII. 1892; Заливъ Михай- ловскіи (Касп. море).....66,2	71	8,3	17,5	
27). 8. IV. 1911; Сары-язы (Мур- габъ).....66	73	9	17,6	
28). 15. XII. 1911; ib...66	72,6	8,5	17,3	
29). 25. II. 1903; Имамъ-баба (Мур- габъ).....66	69	8,4	17	
30). 8. IV. 1911; Репетекъ.....66	68	8,3	16,6	
31). 18. II. 1903; Тедженъ.....65,7	70	8,5	17,7	

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂ ♂.				
32). 26. IV. 1910; Чарджуй	65,3	72,2	8,2	17,4
33). 11. IV. 1909; Репетекъ	65,2	72,2	8,2	17,5
34). 26. IV. 1910; Чарджуй	65,2	72,2	8,2	17,5
35). 27. XII. 1911; Бесъ-песыкъ (Сыръ-Дарья) . . .	65	75	8	17,3
36). 18. II. 1903; Тедженъ	65	70	8,8	17
37). 15. XII. 1911; Сары-язы (Мур- габъ)	64,8	71,4	8	16,2
38). 26. XII. 1911; Репетекъ	64,7	73,6	8	16,8
39). 6. IV. 1903; Учь-аджи	64,5	70,2	8,7	17,6

♀ ♀.

1). 23. XII. 1909; Чійли (на Сыръ- Дарьѣ)	66,5	71,5	8	17,8
2). Ib	65,5	70,8	8	17,3
3). 28. III. 1896; Имамъ-баба (Мур- габъ)	65,2	70	8,4	18,2
4). Ib	65	69	8,4	18,2
5). 8. IV. 1911; Сары-язы (Мур- габъ)	64,8	69,2	8,3	18,3
6). Ib	64,8	69	8,3	18
7). 12. VII. 1907; Акъ-кумъ (Сыръ- Дарья)	64,7	70	7,4	16,5

	Крыло.	Хвостъ.	Клювъ (отъ посре- дняго края ноздри).	Плюсна (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♀ ♀.				
8). Ib.....	64,5	69,7	7,5	16,7
9). 8. IV. 1911; Сары-язы (Мур- габъ).....	64,5	69	8,3	18
10). 25. XII. 1911; Репетекъ.....	64,3	66,5	8	17,8
11). Февр. 1903; ib....	64,2	68	8,3	17,5
12). 14. XII. 1911; ib....	64,2	66,3	8,2	17,2
13). 23. II. 1897; Тедженъ.....	63,8	68,2	8,5	18
14). 21. XII. 1911; Репетекъ.....	63,5	72	7,6	15,7
15). 26. XII. 1911; Бесъ-песыкъ (Сыръ-Дарья)....	63,4	68,9	7,7	15,8
16). Ib.....	63,3	68,3	8,3	17
17). 18. II. 1903; Тедженъ.....	63,3	68	8,3	17,6
18). 10. I. 1909; г. Туркестанъ....	62,8	69,4	7,6	16,8
19). 26. IV. 1910; Чарджуй.....	62,8	67,2	9	16,4
20). Ib.....	62,3	66,7	9	16,4
21). 10. I. 1909; г. Туркестанъ....	62	69	7,5	16,7
Крыло: у ♂♂ 70 ¹⁾ —64,5 м.м., у ♀♀ 66,5—62 м.м.				
Хвостъ: у ♂♂ 76,5—68 м.м., у ♀♀ 71,5—66,3 м.м.				
Клювъ: у ♂♂ 9—7,6 м.м., у ♀♀ 9—7,4 м.м.				
Плюсна: у ♂♂ 18,8—16 м.м., у ♀♀ 18,3—15,7 м.м.				

Молодые въ полномъ развитомъ первомъ нарядѣ (у нѣкото-
рыхъ мелкое перо перебирается въ осеннее).

¹⁾ Только одинъ разъ. Авт.

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ, передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂ ♂.				
1). 22. VII. 1907; Кудукъ-кекенъ (Кизыль-кумъ)..67,6		69,5	7	17,2
2). 24. VII. 1907; Му- сабай-Кудукъ ..67,5		69,4	7,6	17
3). 7. VI. 1911; Узунъ-Аралъ (Сыръ-Дарья)..66,8		69	7,5	16,8
4). 22. VII. 1907; Кудукъ-кекенъ (Кизыль-кумъ)..66,6		68,8	7,5	18
5). 29. VII. 1907; Акъ-кумъ (Сыръ-Дарья)...66,2		69,3	8	17
6). 1b.....66,2		69,2	7,8	17,2
7). 24. VII. 1907; Мусабай-кудукъ (Кизыль-кумъ)..66,2		64	7,3	16
8). 25. V. 1911; Репетекъ.....65		64,2	7,5	16,6
♀ ♀.				
1). 16 VII. 1907; Кара-кумъ(Сыръ- Дарья)66,5		67,3	7,5	17
2). 15. VI. 1911; Тупчекъ (1b)...65,4		61,8	8	16,3
3). 24. VII 1907; Мусабай-кудукъ (Кизыль-кумъ)...65		def.	7,3	15,4
4). 12. VII. 1907; Акъ-кумъ (Сыръ- Дарья)64,7		62	8,2	17
5). 7. VI. 1911; Узунъ-Аралъ ...64,2		63	7,5	16,4

	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ.</i>	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Плюсна</i> (сзади).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♀ ♀.				
6). 24. VII. 1907; Мусабай-кудукъ (Кизыль-кумъ). .64,2		63	7,3	16
7). 7. VI. 1911; Узунъ-Аралъ (Сыръ-Дарья)...63		58	7,5	16,6
8). Ib.62,7		58	7,4	16,2
9). 22. VII. 1907; Кудукъ-кекенъ (Кизыль-кумъ). .62		def.	7,3	def.
10). Ib.62		57,5	7,5	16
Крыло: у ♂ ♂ 67,6—65 м.м., у ♀ ♀ 66,5—62 м.м.				
Хвостъ: у ♂ ♂ 69,5—64 м.м., у ♀ ♀ 67,3—57,5 м.м.				
Клювъ: у ♂ ♂ 8—7,3 м.м., у ♀ ♀ 8,2—7,3 м.м.				
Плюсна: у ♂ ♂ 18—16 м.м., у ♀ ♀ 17—15,4 м.м.				

Различіе въ величинѣ между бухарской и остальными расами особенно сильно бросается въ глаза при сравнительномъ обзорѣ цѣльныхъ таблицъ.

Ташкентъ.

17 января 1912 г.



Замѣтки о Закавказскихъ птицахъ.

П. В. Нестеровъ.

Mitteilungen über transkaukasische Vögel.

Von P. W. Nesterow.

(Продолженіе.—Fortsetzung) ¹⁾.

„Кутаисскія“ и „ахалцыхскія“ лазоревки.

Какъ извѣстно, синицы, составляющія группу зеленыхъ лазоревокъ (р. *Cyanistes*), чрезвычайно нестойки въ своихъ видовыхъ и подвидовыхъ отличительныхъ признакахъ. Варіаціи и индивидуальныя уклоненія ихъ во многихъ случаяхъ уже послужили мотивомъ къ описанію новыхъ формъ. Въ результатъ для одного Кавказа и смежныхъ съ нимъ странъ оказалось уже семь видовъ и подвидовъ. Если нѣкоторые изъ нихъ пріобрѣли законное право гражданства въ орнитологической литературѣ, то, нѣтъ никакого сомнѣнія—другіе этого права гражданства никогда не пріобрѣтутъ. Къ числу послѣднихъ я отношу не такъ давно описанныхъ С. А. Бутурлинымъ лазоревокъ изъ окрестностей Ахалцыха, но подъ широкимъ названіемъ „Центрально-Закавказскихъ“ (*Cyanistes georgicus*) и лазоревокъ изъ окрестностей г. Кутаиса, еще подъ болѣе широкимъ названіемъ „Западно - Закавказскихъ“ (*Cyanistes colchicus*). Насколько такое дробленіе неестественно, лучше всего видно изъ

¹⁾ См. кн. II «Орнит. Вѣстн.» за 1911 годъ, стр. 99—108.
С. В. II. «Ornit. Mitteil.», 1911, S. 99—108.

самого діагноза, который я приведу дословно ¹⁾: „*Cyanistes georgicus* Buturl. (Центральное Закавказье: Ахалцыхъ). Клювъ немного сильнѣе (3,9—4,2 м.м. выс., при 6,2—6,3 м.м. дл. отъ ноздрей), а спина *чуть-чуть сроватѣе* и темя *поблѣднѣе*, чѣмъ у типичной *caeruleus* L.

Cyanistes colchicus Buturl. (Западное Закавказье: Кутаисъ). *При тѣхъ же въ общемъ размѣрахъ* (крыло 64—68 м.м., хвостъ 52—56 м.м.), какъ типичная лазоревка, и *при такомъ же чуть-чуть сроватомъ* отбѣнкѣ спины, какъ у Ахалцыхскихъ птицъ, Кутаисскія лазоревки отличаются *самымъ сильнымъ клювомъ* ²⁾ во всей группѣ (4,3—4,5 м.м. высоты, при 6—6,7 м.м. длины отъ ноздри)“ ³⁾.

Итакъ, главнымъ и единственнымъ отличіемъ двухъ этихъ лазоревокъ другъ отъ друга служитъ только размѣръ клювовъ. Но въ длинѣ клюва второй формы (6—6,7 м.м.) цѣликомъ указываются размѣры первой (6,2—6,3 м.м.). Такимъ образомъ, этотъ признакъ самъ собою отпадаетъ; что же касается разницы въ высотѣ клювовъ, то въ самомъ лучшемъ случаѣ она равняется 0,3 м.м., а въ нѣкоторыхъ можетъ равняться только 0,1 м.м. Отличить обѣ эти формы, по указанію автора, можно только при наличности серіи шкурокъ и опытнаго глаза. Но насколько выраженіе „опытный глазъ“—понятіе условное, видно изъ того, что авторъ нѣсколькими мѣсяцами ранѣе этихъ двухъ формъ самъ не различалъ: А. М. Кобылинъ въ 44-мъ примѣчаніи къ своей статьѣ „Матеріалы для орнитофауны Кавказскаго края“ пишетъ, что, по словамъ С. А. Бутурлина, „Кутаисскія лазоревки *неотличимы* отъ типичныхъ“. Самостоятельное существованіе этихъ двухъ „новыхъ“ формъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ одна отъ другой безъ постоянного смѣшенія невозможно и потому, что оба пункта—Ахалцыхъ и Кутаисъ—отстоятъ другъ отъ друга на разстояніи едва ли больше 100 верстъ; обѣ изолирующемъ же вліяніи горныхъ хребтовъ въ данномъ случаѣ говорить болѣе, чѣмъ рискованно.

Что же касается отличій этихъ двухъ формъ отъ типичной *Cyanistes caeruleus*, то они не болѣе реальны. Такія же

¹⁾ Журналъ «Наша Охота» за 1908 г., кн. за октябрь, стр. 29. *Авт.*

²⁾ По указанію С. А. Бутурлина, у типичной *Cyanistes caeruleus* L., *самой тонкоклювой* изъ всей группы,—толщина клюва 3,7—4,2, а длина 6,2—6,9 м.м. (Журналъ «Наша Охота» за 1908 г., октябрьская книжка, стр. 28). *Авт.*

³⁾ Курсивъ мой. *Авт.*

отличія, какъ „чуть-чуть сѣроватѣе“ или „поблѣднѣе“,..... совершенно не могутъ считаться обоснованными.

Нѣсколько словъ о кавказскихъ сизоворонкахъ.

Въ моей первой коллекціи птицъ изъ Батумской области, между прочимъ, оказалось два экземпляра сизоворонокъ. При сравненіи ихъ съ восточною разновидностью, *Coccyzus garrula semenovi* Loud. & Tschusi, я могъ замѣтить между ними нѣкоторое, хотя и несущественное, отличіе, при сравненіи же съ нашими сѣверными птицами никакихъ отличій даже въ отѣнкахъ окраски я не нашелъ. Между тѣмъ въ новѣйшихъ работахъ по орнитофаунѣ Кавказа мѣстныхъ сизоворонки стали отождествляться именно съ восточною разновидностью. Такъ поступилъ К. А. Сатунинъ ¹⁾ со своими кавказскими птицами, ссылаясь на авторитетъ С. А. Бутурлина, такъ точно распорядился и самъ С. А. Бутурлинъ съ кутаисскими сизоворонками въ статьѣ А. М. Кобылина ²⁾. Въ 30-мъ примѣчаніи къ статьѣ г. Кобылина С. А. Бутурлинъ по этому поводу и въ дополненіе къ діагнозу восточной формы, данному Лоудономъ и Чузи, пишетъ: „Въ своемъ діагнозѣ восточной разновидности названные авторы указываютъ на *несущественные признаки*, но форма эта всегда можетъ быть отличена *болѣе голубоватой (а не зеленоватой) нижней стороной* и болѣе массивнымъ клювомъ (конечно, при непосредственномъ сравненіи экземпляровъ“).

Итакъ, по категорическому заявленію С. А. Бутурлина *самымъ существеннымъ* признакомъ для отличія кавказскихъ птицъ *должна служить болѣе голубоватая, а не зеленоватая окраска нижней стороны*.

Къ своему немалому удивленію въ № 3 „Орнитологическаго Вѣстника“ за 1910 годъ я прочелъ новое описаніе *кавказской* сизоворонки, устанавливаемой С. А. Бутурлинымъ *по нѣсколькимъ экземплярамъ изъ Геокъ-Тана* и, между прочимъ, на основаніи того, что „*брюхо у кавказцевъ зеленоватѣе*“ ³⁾ ⁴⁾. Итакъ, одна и та же

¹⁾ «Матеріалы къ познанію птицъ Кавказскаго края», стр. 82. *Авт.*

²⁾ «Матеріалы для орнитофауны Кавказскаго края. Кутаисская губернія» («Извѣстія Кавказскаго Музея», т. III, вып. 4, 1908 г., стр. 309). *Авт.*

³⁾ «Орнитологическій Вѣстникъ» за 1910 годъ, № 3, стр. 191. *Авт.*

⁴⁾ Курсивъ вслѣдъ мой. *Авт.*

часть тѣла „кавказцевъ“ въ зависимости отъ потребности С. А. Бутурлина становится то „болѣе голубоватой, а не зеленоватой“, то, наоборотъ, „зеленоватѣе“.

Съ этимъ вопросомъ мнѣ невольно пришлось столкнуться при обработкѣ новыхъ сборовъ. Въ моей нынѣшней коллекціи имѣется шесть экземпляровъ сизоворонокъ: по два изъ Батумской области (♂ и ♀), Карсской области (ad. & juv.) и Эрзерумскаго вилайета Турціи (два juv.). Птицы изъ Батумской области прекрасно препарированы ¹⁾ и потому на нихъ я главнымъ образомъ и останавлиюсь.

Если обѣихъ птицъ держать рядомъ при какихъ угодно поворотахъ и условіяхъ освѣщенія, то у одной изъ нихъ верхъ головы, горло, зобъ, грудь и брюхо даютъ рѣзко голубую окраску, у второй же тѣ же самыя части тѣла обнаруживаютъ ясный зеленый окрасъ. Эта разница въ окраскѣ столь рѣзка, что кому бы я этихъ птицъ ни показывалъ,—одну изъ нихъ неизмѣнно называютъ „голубой“, другую—„зеленою“.

Памятуя, что одинъ изъ многихъ экземпляровъ добытъ близъ Батума, гдѣ гнѣздованіе сизоворонокъ съ опредѣленностью никѣмъ не констатировано, это противорѣчіе съ „зеленоватымъ брюхомъ кавказцевъ“ я первоначально думалъ объяснить просто тѣмъ, что „голубая сизоворонка“ принадлежитъ къ числу полетныхъ особей. Однако на этикеткѣ я читаю: „*Согасіас g a g g u l a* L., ♂, 9. VI. 1910, близъ Ардануча, Батумской области“, т.-е. эта птица добыта тамъ, гдѣ гнѣздованіе ея засвидѣтельствовано К. М. Дерюгинымъ ²⁾ и мною ³⁾. При сравненіи же этой птицы съ экземпляромъ изъ Карсской области (8. VII. 1910; с. Таускертъ), разница въ окраскѣ выступаетъ еще сильнѣе, такъ какъ послѣдній экземпляръ еще „зеленоватѣе“.

Въ качествѣ второго отличія С. А. Бутурлинъ приводитъ *малый ростъ* кавказцевъ. Въ слѣдующей таблицѣ мною приведены *размѣры* „кавказцевъ“ и типичныхъ по Бутурлину, а рядомъ съ ними размѣры ⁴⁾ моихъ трехъ взрослыхъ экземпляровъ ⁵⁾:

1) Птицъ этихъ мы видѣли. Препарировка ихъ никакъ не можетъ быть названа прекрасной. *Ред.*

2) „Матеріалы по орнитофаунѣ Чорохскаго края etc.“, стр. 32. *Авт.*

3) „Матеріалы для орнитофауны Батумской области“, стр. 47. *Авт.*

4) Размѣры всюду показаны въ миллиметрахъ. *Авт.*

5) Размѣры взрослой птицы въ первой коллекціи: крыло 197, хвостъ 140, плюсна 23, клювъ отъ лба 30 м.м. *Авт.*

„Кавказцы“.	Типичныя.	Мои.
Крыло.....182—193	185, чаще 190—210	195, 197 и 192.
Хвостъ (отъ корня рулей)..121—124, рѣдко 126	125—140	141, 143 и 138.
Плюсна.....21 ¹ / ₂ —23 ¹ / ₂ , рѣдко 24 ¹ / ₂	23—25	23 ³ / ₄ , 23 и 22.
Клювъ отъ лба.....26—32 ¹ / ₂	29—34,5	30, 30 и 31.
„ отъ ноздрей.....23,5—27,3	24—27	27, 25 ¹ / ₂ и 26.

Какъ видно изъ этой сравнительной таблицы, мои экземпляры никакъ не могутъ быть отнесены къ группѣ „малорослыхъ кавказцевъ“, такъ какъ по размѣрамъ они ближе всего стоятъ къ типичной формѣ.

Наконецъ, третьимъ и послѣднимъ отличіемъ „кавказцевъ“ С. А. Бутурлинъ считаетъ болѣе тупое крыло: „отъ конца самаго короткаго изъ второстепенныхъ до конца крыла 64¹/₂—71, рѣдко 74¹/₂ м.м.; у типичныхъ—71, чаще 73—82 м.м.“ У моихъ же трехъ взрослыхъ экземпляровъ тупость крыла выражается цифрами: 78, 73³/₄ и 72¹/₂ м.м. Слѣдовательно, и по тупости крыла мои экземпляры не подходятъ къ „кавказцамъ“.

Во всемъ же остальномъ, по признанію С. А. Бутурлина, „кавказцы“ сходятся съ европейскими. Я же беру на себя смѣлость утверждать, что они *во всемъ сходны* съ европейскими.

Что касается отличій европейскихъ и кавказскихъ птицъ отъ восточныхъ, то *теперь* С. А. Бутурлинъ приводитъ слѣдующія: у первыхъ исподъ крыла и большія кроющія кисти голубыя (у *Cotacias garrula semenovi*—зеленыя). При непосредственномъ сравненіи у большинства это отличіе существуетъ; однако среди экземпляровъ со средней Аму-Дарьи (Университетская коллекція г. Ященко) у одного экземпляра *C. g. semenovi* исподъ крыла ясно голубой.

Верхнія же кроющія крыла у типичныхъ и восточныхъ формъ одинаково темно-голубовато-зеленыя.

Второе отличіе, по С. А. Бутурлину, состоитъ въ томъ, что „мелкія кроющія предплечья очень густого лилово-синяго цвѣта и эта окраска занимаетъ большее пространство“ у типичныхъ и кавказцевъ. У большинства это отличіе ясно замѣтно, но у двухъ крымскихъ экземпляровъ (Университетская коллекція, Кессирь) лилово-синій цвѣтъ свѣтлѣе, чѣмъ у экземпляровъ съ восточныхъ береговъ Каспія, что, конечно, объясняется большею изношенностью пера.

Въ качествѣ третьяго отличія С. А. Бутурлинымъ приводится то, что клювъ „въ общемъ *покороче*, но размѣры покрываются“. Въ 30-мъ же примѣчаніи къ статьѣ А. М. Кобылина о кутанскихъ сізovorонкахъ С. А. Бутурлинъ говоритъ, что онѣ отличаются „болѣе *массивнымъ* клювомъ“. Конечно, это отличіе никакого значенія не имѣетъ.

Наконецъ, въ видѣ признака для отличія спеціально кавказскихъ птицъ отъ восточныхъ, С. А. Бутурлинъ приводитъ вершины рулей, которыя у *Cotacias garrula caucasica* голубоваты, а у *C. g. semenovi* зеленоваты. Но у одного изъ трехъ моихъ экземпляровъ вершины рулей голубоваты, а у двухъ зеленоваты.

Для отличія типичной формы отъ ея восточной разновидности, мнѣ кажется, довольно надежными признаками могутъ служить слѣдующіе: у типичныхъ (Кавказъ, Астрахань, Крымъ, Новгородъ) нижняя поверхность внутреннихъ опахалъ почти всѣхъ рулевыхъ (исключая иногда самыхъ крайнихъ и всегда самыхъ среднихъ) синяго цвѣта, который усиливается по направленію къ средней парѣ, отчего нижняя поверхность развернутаго хвоста кажется синей,—у восточной же расы только вторая и третья пара, считая отъ средней, окрашена въ синій цвѣтъ и притомъ въ слабой степени, отчего нижняя поверхность развернутаго хвоста кажется зеленой; во-вторыхъ, надхвостье у типичныхъ или сплошь фіолетоваго цвѣта, или съ небольшою примѣсью грязно-зеленаго,—у восточныхъ же (съ восточнаго берега Каспія и съ средней Аму-Дарьи) существуетъ обратное отношеніе: надхвостье или сплошь темно-зеленаго цвѣта, или съ небольшою примѣсью фіолетоваго; наконецъ, у типичныхъ наружныя опахала первостепенныхъ маховыхъ (начиная съ 5) свѣтлоголубыя и на сложенномъ крылѣ ясно выдѣляются,—у восточныхъ же эти опахала одинаковаго цвѣта съ верхними кроющими крыла и на сложенномъ крылѣ не выдѣляются.



Мелкія замѣтки о птицахъ Закавказья.

К. А. Сатунинъ.

Kurze Mittheilungen über die Vogelwelt des Transkaukasiens.

Von K. A. Satunin.

Passer montanus transcaucasicus Buturl.

П. В. Нестеровъ ¹⁾ вывелъ изъ того, что мною сказано о полевомъ воробѣ, что я считаю его *исключительно рѣдкою находкою*. Таковою я его никогда не считалъ, а замѣтилъ только, что онъ встрѣчается *сравнительно съ домашнимъ* очень рѣдко, а затѣмъ въ указанной же статьѣ ²⁾ перечислилъ довольно много мѣстъ его нахождения.

Зимою 1905—1906 г.г. дѣти часто ловили въ Тифлисѣ этого воробья въ западню. Экскурсируя съ дѣтьми около Тифлиса зимою 1910—1911 г.г., я часто встрѣчалъ въ садахъ по Курѣ стайки полевыхъ воробьевъ въ 20—30 особей, а иногда и больше, такъ что однимъ выстрѣломъ убилъ однажды 11 особей.

Coloeus monedula collaris Drumm.

Относительно этого вида г. Нестеровъ пишетъ (l. c. 101): „К. А. Сатунинъ считаетъ его весьма обыкновенной гнѣздящейся птицей (Елисаветпольская и Эриванская губерніи) и удивляется тому, какъ могъ Г. И. Радде проглядѣть ея „массовое гнѣздо-

¹⁾ „Орнитологическій Вѣстникъ“, 1911 г., стр. 99. *Авт.*

²⁾ „Матеріалы къ познанію птицъ Кавказскаго края“, стр. 23. *Авт.*

ваніе. Къ сожалѣнію, самъ К. А. Сатунинъ не приводитъ *никакихъ* датъ своихъ наблюденій. Можетъ быть, это было позднею весною или раннею осенью—тогда это могли быть и не гнѣздящіеся особи. Такіе *надежные* изслѣдователи, какъ К. О. Кесслеръ, М. Богдановъ и г. Михайловскій совсѣмъ не встрѣчали этого вида“.

Конечное заключеніе нашего автора: „галка во всемъ Закавказьи въ качествѣ гнѣздящейся птицы *очень рѣдка*“.

Не знаю, чѣмъ я заслужилъ такое недовѣріе почтеннаго автора, ибо П. В. Нестеровъ полагаетъ, что, встрѣтивъ птицу осенью, я заключу изъ этого, что она тутъ и гнѣздится. Повторяю, что крайне удивленъ высказанному мнѣ здѣсь недовѣрію къ моимъ многолѣтнимъ наблюденіямъ. Но не менѣе удивительно неумѣніе нашего автора читать по-русски.

Онъ упускаетъ изъ виду, что его *надежные* изслѣдователи совершили только по одной кратковременной экскурсіи на Кавказъ, а лишенный довѣрія П. В. Нестерова Сатунинъ прожилъ здѣсь уже 18 лѣтъ, въ теченіе которыхъ могъ, конечно, увидѣть во много разъ больше, чѣмъ вышеупомянутые изслѣдователи при всей ихъ неоспоримой надежности.

Кромѣ того, къ восточному Закавказью г. Нестеровъ присоединилъ и Эриванскую губернію, о которой я въ выше цитированной статьѣ ничего не говорю и которую зоогеографически никогда къ восточному Закавказью не причислялъ. Затѣмъ онъ не нашелъ у меня датъ, а тамъ есть фразы: „Въ первой половинѣ мая каждый татарченкокъ обязательно носитъ на плечѣ галченка“. Неужели еще нужно объяснять, что это значить, что высиживаніе оканчивается въ первой половинѣ мая? Далѣе вѣдь подробно указано, что въ Кубинскомъ уѣздѣ галки гнѣздятся въ дуплахъ, около Аджи-Кабула въ норахъ и т. д... Какъ же послѣ этого почтенный авторъ спрашиваетъ: „можетъ быть, это было весною или осенью“....?

Я думаю, что каждый авторъ въ правѣ требовать, чтобы критикъ его произведенія по крайней мѣрѣ предварительно внимательно прочиталъ его.

Далѣе, я думаю, что для того, чтобы опровергать результаты моихъ многолѣтнихъ изслѣдованій, нужно что-нибудь болѣе основательное, чѣмъ старинныя показанія авторовъ, недолго бывшихъ на Кавказѣ.

Оцѣнка нѣкоторыхъ выводовъ П. В. Нестерова уже сдѣлана глубокоуважаемымъ С. А. Бутурлинымъ. Надѣюсь, что скоро достойнымъ образомъ будутъ оцѣнены и остальные.

Gallinago gallinago L.

Я указывалъ уже раньше на гнѣздованіе бекаса въ Гельской котловинѣ.—(„Лѣтняя поѣздка въ Гельскую котловину“ въ „Извѣстіяхъ Кавказскаго Отдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества“).

Urupa europaeus L.

Въ напечатанной въ мое отсутствіе статьѣ „Къ орнитологич. Батумской области“ („Извѣстія Кавказскаго Музея“, т. V), въ главѣ объ удождѣ, вѣроятно, вслѣдствіе неразборчивости моей рукописи, вкралось такое сильное искаженіе моихъ словъ, что я долженъ безотлагательно исправить это мѣсто, хотя, къ сожалѣнію, сейчасъ не имѣю означенной статьи ни напечатанной, ни въ рукописи. Именно: тамъ напечатано, что удождѣ—*зимняя* птица Батумскаго побережья. Между тѣмъ, я хотѣлъ только подтвердить показанія П. В. Нестерова и сказать, что это дѣйствительно обыкновеннѣйшая птица второй половины лѣта. Вѣроятно, я написалъ „лѣтующая“, но и это не точно. Удождѣ близъ Батума регулярно появляется въ половинѣ іюля, какъ это прослѣжено мною и моими дѣтьми въ Кобулетахъ въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ. Но время отлета его отсюда намъ, къ сожалѣнію, не извѣстно, ибо мы постоянно уѣзжали около 1-го сентября.

12. VIII. 1911.

Кобулеты.



Къ систематическому положенію крымской пищухи.

В. Б. Баньковский.

Neue Form des Baumläufers.

Von W. B. Banikowski.

Въ прошломъ году, при обработкѣ кавказской коллекціи я обратилъ вниманіе на 2 экземпляра пищухи изъ Крыма, хранящихся въ коллекціи Зоологическаго Музея Московскаго Университета. Эти экземпляры С. А. Бутурлинъ (журналъ „Наша Охота“, 1909 г., кн. II, стр. 59) отнесъ къ кавказской расѣ пищухи—*Certhia familiaris caucasica* Buturl. При детальномъ осмотрѣ и сравненіи этихъ птичекъ съ экземплярами типичной *C. f. familiaris* L. изъ центральной Россіи и съ *C. f. caucasica* Buturl. оказалось возможнымъ выдѣлить ихъ въ отдѣльную расу. Это мною и сдѣлано въ VII томѣ „Извѣстій Кавказскаго Музея“ (въ настоящее время находится въ печати). Въ честь С. А. Бутурлина я назвалъ крымскую расу *Certhia familiaris buturlini*.

Въ настоящее время, благодаря любезности проф. П. П. Сушкина, я получилъ для просмотра 8 экземпляровъ крымской пищухи изъ его коллекціи. Кромѣ этого матеріала въ коллекціи Зоологическаго Музея Московскаго Университета оказалась самка изъ крымскихъ сборовъ г. Шатилова въ 1865 году.

Дая промѣры этого матеріала въ миллиметрахъ.

		Крыло.	Хвостъ.	Culmen.	Клювъ отъ ноздри до конца.
♂; 8. XI. 1907. Корензъ. № 873 ¹⁾ .	(Крымъ). П. П. Сушекинъ.	66	65	19,5	13,0
♂; 23. XII. 1910. Ай-Петри.		64,5	66	19,3	13,3
♂; 6. XI. 1907. Корензъ.		64	65	18,7	12,6
♂; 9. I. 1908. Корензъ.		65	66	20,7	14,1
♂; 4. XI. 1907. Корензъ.		64	63,5	19,5	13,3
(♂?); 4. XI. 1907. Корензъ. № 874 ¹⁾ .		64	64,5	17,9	12,0
♀; 7. X. 1907. Корензъ. № 875 ¹⁾ .		64	64,5	15,8	10,0
♀; 9. I. 1908. Корензъ.		63,5	66	16,7	11,0
♀; 1865 г. Тамань (Крымъ). Шатилонъ.		62	65	15,0	9,3
♂ ♂ { Minim. ²⁾		64	63,5	17,9	12,0
{ Maxim.		66	69	20,7	14,1
♀ ♀ { Minim.		62	64,5	15,0	9,3
{ Maxim.		64	66	16,7	11,0

Такимъ образомъ, на новомъ, болѣе обширномъ, матеріалѣ вновь подтвердилось мое первоначальное описаніе. Въ общихъ чертахъ оно сводится къ слѣдующему: *C. f. buturlini* отличается отъ типичной *C. f. familiaris* L. болѣе интенсивно рыжимъ надхвостомъ, болѣе длиннымъ клювомъ ³⁾ и немного болѣе длиннымъ хвостомъ; двумя послѣдними признаками крымскія птички приближаются къ кавказской формѣ—*C. f. caucasica* Buturl., но отъ послѣдней отличаются болѣе свѣтлой окрас-

¹⁾ Экземпляры за №№ 873, 874 и 875 находятся въ моей личной коллекціи. *Авт.*

²⁾ Сюда входятъ также 2 экземпляра, по которымъ было произведено первоначальное описаніе; промѣры ихъ даны въ VII т. «Извѣстій Кавказскаго Музея». *Авт.*

³⁾ Клювъ типичныхъ по моимъ промѣрамъ («Изв. Кавказ. Муз.», т. VII): ♂ ♂ 15,0—17,4; ♀ ♀ 14,5—15,0 м.м. *Авт.*

кой верхней стороны съ большимъ развитіемъ бѣлаго и рыжаго цвѣта, ярко рыжимъ надхвостьемъ и большимъ развитіемъ рыжаго цвѣта на основаніяхъ рулевыхъ, а также болѣе свѣтлыми (на шкуркахъ) ногами.

Типомъ *Certhia familiaris buturlini* Bank. надо считать экземпляръ, хранящійся въ Зоологическомъ Музеѣ Московскаго Университета и занесенный въ шнутовую книгу Музея подъ: „R. № 4137. ♂. 10. XII. 1894. Салгирка (Крымъ). Сѣницкий“.

28. II. 1912 г.



Ферганская сѣрая синица.

С. А. Бутурлинъ.

Parus cinereus ferghanensis Buturlin ¹⁾.

By S. A. Buturlin.

Сѣрая синица юго-восточной Ферганы (долина Куршаба въ сѣверныхъ склонахъ Алайскаго хребта, 5000—5500 ф. н. у. м.), въ имѣющихся у меня довольно свѣжихъ экземплярахъ (январь и февраль 1912 года), въ сравненіи съ *Parus cinereus turkestanicus* Zarud. et Loud. отъ тѣхъ же мѣсяцевъ изъ Тянь-Шаня и съ Сыръ-Дарьи, значительно крупнѣе—крыло въ среднемъ на 2—3, хвостъ, по меньшей мѣрѣ на 5—8, плюсна на 1 m.m.—верхняя сторона потемнѣе, черный цвѣтъ на горлѣ и въ особенности на бокахъ шеи гораздо болѣе развитъ, такъ что уши сзади сплошь и широко окаймлены чернымъ; *P. c. bokharenensis* Licht. изъ Закаспійскаго края еще мельче и блѣднѣе, чѣмъ *P. c. turkestanicus*; *P. cinereus* Bodd. изъ Индіи еще того мельче; *P. c. cashmirensis* Hart. изъ Кашмира, во-первыхъ, не крупнѣе, чѣмъ *turkestanicus*, во-вторыхъ, имѣетъ сильный сѣрый налетъ на груди и свѣтлой крыловой полосѣ, чего у *ferghanensis* нѣтъ. *P. intermedius* Zarudn. изъ горъ сѣверо-восточной Персіи относится къ иной группѣ, съ зеленоватымъ налетомъ на спинѣ.

Parus cinereus ferghanensis from Alai Mountains in South-eastern Ferghana (5000—5500 feet high, winter specimens in my collection) is the largest among its congeners: wing fully 0,1

¹⁾ Краткій діагнозъ опубликованъ ¹¹/₂₁ апрѣля 1912 года въ книгѣ 6-ой журнала «Наша охота». Ред.

inch, tail at least 0,2 in., tarsi 0,04 in. longer, than in *P. c. turkestanicus* Zar. et Loud. (next largest form). In colour somewhat darker, black on the neck much more developed, ears being broadly encircled by black behind; alar bar snowy white, and breast as white as in *P. c. bokharensis* Licht., not greyish as in *P. c. cashmirensis* Hart. Upper back clear grey, not greenish as in *P. intermedius* Zarud.



Къ вопросу о высотѣ полета перелетныхъ птицъ.

Проф. Д. Н. Кайгородовъ.

Zur Frage über die Zugshöhe der Vögel.

Von Prof. D. N. Kaygorodow.

Въ орнитологической литературѣ зарегистрировано слѣдующее наблюдение англійскаго астронома Tennant'a: осенью 1875 года названный астрономъ, наблюдая въ телескопъ солнечный дискъ, видѣлъ множество птицъ, передвигавшихся черезъ поле зрѣнія его телескопа; вертикальное разстояніе, на которомъ эти птицы находились надъ поверхностью земли, Tennant оцѣнилъ приблизительно въ 7 верстъ ¹⁾).

Подобное же явленіе посчастливилось однажды наблюдать и пишущему эти строки. Въ моей записной книжкѣ на 1898 годъ, подъ датой 21 августа, записано слѣдующее: „Въ 11-мъ часу вечера, при телескопированіи полной луны (увеличеніе въ 54 раза) наблюдалъ пролетъ, на громадной высотѣ, черезъ дискъ луны, какихъ-то перелетныхъ птицъ. Одна группа изъ нихъ, летѣвшая съ большими интервалами особъ отъ особи (въ $\frac{1}{2}$ —1 минуту времени разстоянія другъ отъ друга), состояла изъ крупныхъ птицъ—думаю, что голенастыхъ (цапли? выпи?). При этомъ ясно были видны медленные взмахи сильно изгибавшихся острыхъ крыльевъ (4—5 взмаховъ на протяженіи діаметра луннаго диска).

¹⁾ E. F. von Homeyer. Die Wanderungen der Vögel (pag. 413).

Наблюденіе это было произведено въ Зегевольдѣ, Лифляндской губерніи.

Полагаю, что хорошій математикъ могъ бы вычислить, съ нѣкоторымъ приближеніемъ, высоту, на которой летѣли наблюдавшіяся птицы.

23 января 1912 г.
Лѣсной.



Объ окольцовываніи птицъ.

Г. В. баронъ Лондонъ.

Die Ringanlage der Vögel.

Von G. W. baron London.

Одной изъ интереснѣйшихъ задачъ орнитологіи является выясненіе вопросовъ о пролетѣ птицъ: время отлета и прилета, путь и направленіе полета, продолжительность его, интенсивность и т. д. Для отдѣльныхъ видовъ птицъ уже установлены всѣ характерныя черты ихъ прилета на гнѣздовье и отлета на зимовку. Но для массы видовъ мы не располагаемъ такими свѣдѣніями и однимъ изъ способовъ изученія перелетовъ птицъ является т. н. „окольцовываніе“ птицъ. Какія интересныя данныя доставляетъ этотъ пріемъ, видно изъ слѣдующаго. Д-ръ Чузи (Зальцбургъ) въ 1911 г. доказалъ, что пара окольцованныхъ имъ стрижей (*A r u s a r u s*) возвратилась на старое гнѣздовье и что обѣ эти особи не разлучались ни на зимовкѣ, ни на гнѣздовьѣ!

Въ Западной Европѣ окольцовываніе птицъ признано хорошимъ способомъ для изученія птичьихъ перелетовъ. „Германское Орнитологическое Общество“, „Венгерская Центральная Орнитологическая Станція“ и др. въ массѣ распространяютъ кольца. Благодаря интенсивной работѣ въ этомъ направленіи, для многихъ видовъ птицъ удалось составить очень подробныя карты ихъ перелетовъ. Что мысль о томъ или иномъ способѣ отмѣтки птицъ уже роится въ головахъ отдѣльныхъ наблюдателей, видно изъ слѣдующаго. Дѣлая докладъ объ отмѣткѣ птицъ кольцами на послѣднемъ Международномъ Орнитологическомъ Конгрессѣ въ Берлинѣ, д-ръ Тинеманъ демонстриро-

валъ цѣлую коллекцію всевозможныхъ веревокъ, лентъ, кусковъ проволоки и т. п., которые были найдены прикрѣпленными къ ногамъ убитыхъ птицъ и присланы ему его корреспондентами. Такой способъ отмѣтки птицъ, конечно, не можетъ дать никакихъ научныхъ результатовъ, но онъ показываетъ, что въ обществѣ существуетъ интересъ къ дѣлу отмѣтки вообще.

Въ Россіи „Рижское О-во Естествоиспытателей“ широко распространяетъ кольца для птицъ съ своими значками. Я самъ отмѣтилъ кольцами станціи Росситтенъ болѣе тысячи птицъ, главнымъ образомъ, скворцовъ, аистовъ и разныхъ мелкихъ пѣвчихъ птицъ.

Всѣ указанныя выше учрежденія рассылаютъ кольца для отмѣтки птицъ бесплатно всѣмъ желающимъ, при чемъ получающій кольца долженъ сообщать учрежденію, какіе виды птицъ, подъ какими номерами, когда и гдѣ онъ отмѣтилъ.

Что касается Европейской Россіи, то я полагаю необходимымъ для изученія перелетовъ птицъ слѣдующее.

I. Учредить въ странѣ три станціи: одну—постоянную—въ центрѣ, другую такую же въ восточной части Европ. Россіи, а третью—временную (на зимніе и весенніе мѣсяцы)—на юго-западномъ берегу Каспійскаго моря.

II. Кольца, употребляемая для птицъ, должны быть однотипны, т. е., имѣть одинъ адресъ центральной станціи и номерацию отъ единицы. Надпись должна быть выгравирована на одномъ изъ иностранныхъ языковъ, въ виду того, что не малая часть отмѣченныхъ кольцами птицъ будетъ убита внѣ предѣловъ Имперіи, людьми, не знающими русскаго языка.

III. Въ цѣляхъ выясненія продолжительности жизни птицъ я рекомендую окольцовывать не только перелетныхъ, но по возможности всѣ виды птицъ, а кольца должны быть прочныя и съ глубокой гравировкой.

IV. Однимъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ я считаю выясненіе мѣстъ зимовки и пролетныхъ путей нашей дичи. Охрана этого живого капитала является серьезной обязанностью государства, и выясненіемъ частныхъ пролета можно будетъ достигнуть болѣе существенной охраны его.

V. Для успѣха дѣла необходимо, чтобъ отмѣтка птицъ производилась людьми, знакомыми съ орнитологіей, и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ птицъ можно добывать безъ особеннаго труда. Мнѣ кажется, что Талышинское побережье и Муганская степь благоприятно поставлены въ послѣднемъ смыслѣ.

Что касается матеріальныхъ расходовъ на дѣло отмѣтки, то они не могутъ быть велики и на помощь здѣсь могли бы прійти русскія естественнoисторическія общества.

Противники окольцовыванія птицъ говорятъ, что кольца вредятъ птицѣ, лишая ее способности къ сопротивленію въ борьбѣ за существованіе, что птицѣ становится трудно летать и что—самое главное—окольцовываніе птицъ ведетъ къ усиленному истребленію птицъ въ поискахъ колецъ, къ настоящей „охотѣ за кольцами“.

Но опытъ показалъ, что птицы не ощущаютъ тяжести и неудобствъ отъ колецъ. Изъ личныхъ наблюденій я знаю, что отмѣченные кольцами птицы вовсе не обращаютъ вниманія на нихъ.

Указываютъ на случай находки мертвoго аиста (*Ciconia ciconia*), увязившаго клювъ въ кольцо, и связываютъ съ этимъ то обстоятельство, что и большинство другихъ окольцованныхъ аистовъ не вернулось на мѣста своего гнѣздовья. Но оказывается, что гибель аистовъ произошла не отъ колецъ, а отъ того, что они ѣли въ Южной Африкѣ отравленную саранчу. Что же касается опасеній усиленнаго истребленія птицъ въ поискахъ за кольцами, то уже нужно считать установленнымъ тотъ принципъ, что избіеніе птицъ въ массѣ ради колецъ (какъ и вообще всякое массовое избіеніе) недопустимо. Во всякомъ случаѣ, нужно признать, что наша звѣрская промысловая охота наноситъ птичьему міру болѣшій ущербъ, чѣмъ окольцовываніе.

Эти строки написаны мною съ горячимъ желаніемъ того, чтобъ высказанныя выше предложенія были подвергнуты обсужденію и скорѣе приведены въ исполненіе. О результатахъ отмѣтки птицъ кольцами въ научномъ смыслѣ сообщу въ другой разъ.

Им. Лизденъ.

¹²/₂₈ X. 1911.



Обзоръ русской орнитологической литературы.

С. А. Бутурлинъ.

Rewiew of the Russian ornithological Literature.

By S. A. Buturlin.

(Продолженіе.—Continued) ¹⁾.

К. А. Сатунинъ. „Систематическій каталогъ птицъ Кавказскаго края. I. Passeriformes“. „Записки Кавказскаго Отдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества“. Тифлисъ, 1911 г., 8^о, стр. 86.

Эта работа К. А. Сатунина содержитъ не только голый списокъ, но и краткую синонимичку съ нѣкоторыми литературными указаніями, русскими именами и сжатыми очерками распространенія и характера пребыванія птицъ въ предѣлахъ края.

Болѣе подробныя критическія замѣчанія на этотъ каталогъ я уже опубликовалъ въ началѣ мая 1911 года (журналъ „Наша Охота“, № 9), поэтому здѣсь вкратцѣ отмѣчу только пропускъ *Pratincola mauga indica*, внесеніе подъ двумя именами дерябы (*Turdus viscivorus bonapartei* и *T. v. hodgsoni*) и черной синички (*Periparus ater michalowskii* и *P. a. derjugini*), внесеніе въ списокъ *Cyanistes caeruleus* Linn. typ. на основаніи устарѣлыхъ данныхъ, а *Pyrrhula pyrrhula* typ. ²⁾ и *Sturnus vulgaris poltoratzkyi* безъ всякихъ основаній. Желтоголовая трясогузка неправильно приведена подъ именемъ типичной восточной расы.

Весьма желательно видѣть поскорѣе окончаніе этой полезной работы.

¹⁾ См. кн. II «Орнит. Вѣстн.» за 1911 г., стр. 187—196.

²⁾ Это тѣмъ болѣе странно, что авторъ согласился со мною и отказался отъ своего прежняго ошибочнаго взгляда, будто *P. r. rossikovi* есть птица лишь Чорохскаго края, а не всего Кавказа. *Лвт.*

А. Θ. Котсъ. „Замѣтки объ орнитологической фаунѣ юго-западной Сибири (Варабинской степи и сѣверо-восточной части Акмолинской области)“. Оттискъ изъ X выпуска „Матеріаловъ къ изученію фауны и флоры Россійской Имперіи“. Москва, 1910 г., 8°, стр. 34.

Настоящая статья была написана 10 лѣтъ назадъ, какъ отчетъ о студенческой поѣздкѣ автора, коллектировавшаго птицъ лѣтомъ 1899 года около Омска, у границы Омскаго уѣзда и Семипалатинской области и по сѣверной окраинѣ озера Чаны.

Всего авторъ приводитъ 117 видовъ, съ перечисленіемъ добытыхъ экземпляровъ и краткими указаніями на характеръ встрѣчъ. Изъ отдѣльныхъ указаній интересны слѣдующія: *Tringa minuta* во множествѣ наблюдался въ концѣ мая по озерамъ Омской степи, а отдѣльные экземпляры и въ разныхъ числахъ іюня. Но *T. teminckii* лишь изрѣдка попадался среди куличковъ—воробьевъ. (Я нашелъ бѣлохвостика гнѣздящимся въ области Алея около 51° с. ш.). 28. V замѣченъ экземпляръ *Phalacrocorax fulicarius* (въ стаѣ малыхъ плавунчиковъ). Очень интересно было бы указаніе на гнѣздование *Turtur auritus* въ Омскомъ уѣздѣ и въ Барабѣ, если бы не вѣроятность того, что рѣчь въ дѣйствительности идетъ о *T. ferrago*, о которой авторъ вовсе не говоритъ. Интересно указаніе, что *Fuligula cristata* наиболѣе обыкновенный нырокъ посѣщенныхъ мѣстъ. 12. IV у Омска „наблюдался“ экземпляръ бѣлой совы, необыкновенно строгой. *Cuculus intermedius* найдена очень обыкновенной близъ Омска. Нѣсколько *Pratincola rubetra* наблюдались у озера Чаны,—и крайне жаль, что не были добыты, такъ какъ *P. g. margaritata*—форма сомнительная и нуждающаяся въ провѣркѣ.

Опредѣленія не доведены до подвида. Но орнитофауна Западной Сибири изучена еще очень мало, а потому даже такая небольшая работа во всякомъ случаѣ интересна.

(Продолженіе слѣдуетъ.—To be continued).



Обзоръ иностранной литературы по орнитологіи.

С. А. Бутурлинъ.

Rewiew of the foreign ornithological Literature.

By S. A. Buturlin.

(Продолженіе.—Continued) ¹⁾.

„Journal für Ornithologie“.

Почти половину первой книги нѣмецкаго Орнитологическаго Журнала за 1910 годъ занимаетъ окончаніе обширной статьи барона Г. В. Лоудона о его поѣздкѣ въ 1903 году въ Центральную Азію. Большая работа эта весьма интересна. Однако, надо сказать, что она была бы еще гораздо интереснѣе, если бы нѣсколько больше было отведено вниманія систематическимъ и географическимъ отношеніямъ близкихъ формъ. Приведу нѣсколько примѣровъ. Общій очеркъ дается для *Saxicola finschi* Heugl. и *S. f. turganica* Zag., при чемъ просто замѣчается, что большинство экземпляровъ относилось къ послѣдней формѣ. Но птицы эти были собраны, начиная отъ Апшеронскаго полуострова на Кавказѣ до Бухары включительно. Неужели на всемъ этомъ огромномъ протяженіи обѣ формы встрѣчались всегда совмѣстно и при томъ смѣшанными въ одинаковой пропорціи? Если такъ, то слѣдовало бы отмѣтить специально, такъ какъ это было бы случаемъ крайне замѣчательнымъ и бросающимъ новый свѣтъ

¹⁾ См. кн. 1-ю «Орнит. Вѣстн.» за 1912 г., стр. 88—90.

на таксономическое значеніе этихъ формъ. А если не такъ, то тѣмъ болѣе интересно, гдѣ именно преобладала, а можетъ быть, и исключительно встрѣчалась какая-нибудь одна изъ двухъ формъ. Затѣмъ, самъ авторъ приводитъ „туранскую“ форму въ качествѣ подвида. Значитъ, различія не рѣзки и есть переходы. Слѣдовало бы посвятить пару словъ и такимъ особямъ, и ихъ примѣтамъ.

Въ концѣ концовъ, въ такихъ путешествіяхъ, какъ барона Г. В. Лоудона, т.-е. производящихся внѣ гнѣздового времени и вблизи желѣзно-дорожныхъ линій,—главный интересъ сборовъ и лежитъ въ выясненіи именно такихъ вопросовъ. То же нужно сказать и о голубыхъ зимородкахъ, коихъ совмѣстно приводится уже три формы.

Многія близкія формы приводятся отдѣльно, напримѣръ, *Pelecanus minor* Rüpp. и *P. onocrotalus* Linn.. Въ этомъ случаѣ, въ виду спорности различія, слѣдовало бы привести измѣренія клюва.

Изъ болѣе интересныхъ находокъ могу привести: *Podiceps albirennis* у Ленкорани, *Chelidon lagoroda* у Кушка, *Cypselus affinis gallilejensis* въ Бухарѣ, *Sitta parva* къ востоку отъ Каспія. Приводитъ авторъ и типичную галку, *Corvus monedula*, вмѣстѣ съ *C. m. collaris*, что мнѣ кажется невѣроятнымъ.

Далѣе слѣдуетъ краткій обзоръ формъ, близкихъ къ *Pratincola rubicola* и *P. caprata*, данный Эрнестомъ Хартертомъ. Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить слѣдующее. Имя Палласа отъ *P. mauga* переносится на ту кавказско-уральскую форму съ сильнымъ развитіемъ бѣлаго на хвостѣ, которую до сихъ поръ обозначали именемъ *P. hemprichi*, а обычной западно-сибирской и туркестанской формѣ дается имя *P. indica* Hume. Отъ нея отличается восточно-азиатская форма *P. stejnegeri* Parrot и западно-китайская *P. przewalskii* Pleske—все въ качествѣ подвидовъ.

Что касается черныхъ чекановъ, то Хартертъ описываетъ по мервскому экземпляру нашу закаспійскую птицу, какъ особую форму, отличающуюся болѣе сильнымъ распространеніемъ бѣлаго цвѣта на брюхѣ, и называетъ ее *Pratincola caprata rossorum*. Когда я прочелъ эту статью Хартерта, мое описаніе этой птицы—по матеріалу изъ Асхабада, любезно доставленному мнѣ Е. Я. Катинымъ—было уже набрано для статьи въ

журналъ „Наша Охота“; я предлагалъ назвать эту форму „*ignis*“ по центру ея распространенія. Благодаря всегдашней любезности Н. Н. Фокина, мнѣ удалось, однако, изъять свою статью изъ набора и избѣгнуть созданія лишняго синонима.

Мнѣ кажется, что Хартертъ указываетъ лишь одинъ наименѣе постоянный и трудно оцѣниваемый признакъ новой формы, не замѣчая лучшаго признака—размѣровъ частей. Поэтому я считаю полезнымъ привести здѣсь конецъ своей ненапечатанной замѣтки, разумѣется, соотвѣтственно измѣнивъ научныя имена.

.....Итакъ, оставляя въ сторонѣ незнакомую мнѣ *Pratincola caprata aethiops* (Sci.) съ архипелага Бисмарка, можно дать слѣдующую краткую табличку формъ вида *Pratincola caprata*:

A. Крыло короче 72 м.м., плюсна почти всегда короче 21.5 м.м.

a) Клювъ отъ черепа около 14, отъ ноздрей около 9 м.м.; только нижнія кроющія хвоста бѣлы...*caprata* (Linn.) (Филиппины и юго-восточная Азія до Калькутты).

b) Клювъ отъ черепа около 11—12, а отъ ноздрей около 8 м.м.; вся задняя часть брюшка бѣлая (2-ое маховое короче 8-го).....*bicolor* Sykes. (большая часть Индіи, кромѣ юга и сѣверо-запада).

B. Крыло длиннѣе 72 м.м.; плюсна почти всегда длиннѣе 21.5 м.м.

c) Клювъ отъ ноздрей около 10 м.м.; только задняя часть брюшка бѣлая.....*atrata* Kelaart. (горы южной Индіи, Цейлонъ).

d) Клювъ отъ ноздрей около 9 м.м.; вся середина передней части брюшка бѣлая (2-ое маховое длиннѣе 8-го).....*rossorum* Hart. (отъ Закавказья и Туркестана до Кашмира включительно).

Во 2-ой книгѣ „*Journal für Ornithologie*“ помѣщено начало большой статьи Г. Х. Мартенса о птицахъ Фокіена (юго-восточный Китай) по матеріаламъ Гамбургскаго Музея. Авторъ, кромѣ краткой синонимики и списка матеріаловъ, указываетъ въ нѣсколькихъ словахъ и на общее распространеніе формъ, при чемъ въ иныхъ случаяхъ поразительно невѣрно, напримѣръ: *Phylloscopus plumbeitarsus*—„Сѣверная Азія отъ Урала до Амура...“, тогда какъ это—отнюдь не сѣверная птица и вовсе не-

извѣстная для Западной Сибири. Систематическихъ замѣчаній мало, но нѣвыя интересны, напримѣръ, о скрещиваніи синяго и рыжебрюхаго каменныхъ дроздовъ (*Petrophila cyaneus* и *P. manilla*), однако безъ подробнаго описанія.

Своеобразную сову (*Ninox*) авторъ приводитъ подъ именемъ *N. japonica florensis* (Wall.) на томъ основаніи, что какъ особи Малайскаго архипелага (*Athene florensis* Wall.), такъ и материка восточной Азии до юго-восточной Сибири—крупнѣе японской формы. Это совершенно вѣрно; только авторъ забываетъ отмѣтить другой весьма важный и не параллельный признакъ: форму крыла. Въ этомъ отношеніи сѣверныя особи, какъ японскія, такъ и уссурийскія, отличаются значительнымъ развитіемъ 2-го махового (длиннѣе 5-го), чего не замѣчается у тѣхъ южно-азиатскихъ птицъ, которыхъ мнѣ пришлось видѣть. Наконецъ, птицы съ острова Флоресъ, судя по весьма краткимъ замѣчаніямъ г. Мартенса, отличаются и нѣкоторыми цвѣтовыми особенностями. Поэтому, оставляя въ сторонѣ птицъ юго-восточнаго Китая, я полагаю, что былъ правъ, описывая птицъ юго-восточной Сибири, какъ самостоятельную форму (*N. scutulata ussuriensis*), въ виду ихъ сходства по формѣ крыла, окраскѣ и различію въ величинѣ отъ японскихъ.

„Ornithologisches Jahrbuch“.

„Орнитологическій Ежегодникъ“, уже 21-ый годъ издаваемый и редактируемый единолично австрійскимъ орнитологомъ Викторомъ фонъ Чузи—цу—Шмидгоффенъ (Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen) въ Галлейнѣ (Villa Tännenhof bei Hallein, Salzburg), выходитъ теперь три раза въ годъ двойными тетрадами по пяти печатныхъ листовъ каждая, при подписной цѣнѣ въ 10 марокъ. Изданіе это посвящается исключительно палеарктической области, почти половину которой занимаетъ наша родина, почему этотъ журналъ особенно интересенъ для всѣхъ тѣхъ русскихъ любителей птицъ, которые читаютъ по-нѣмецки.

Въ книгахъ за 1908 годъ можно отмѣтить работы слѣдующихъ лицъ.

Шибель подробно описываетъ сборы на островѣ Лезина, въ южной Далмаціи, и, между прочимъ, обстоятельно высказывается за тождество бѣлогорлаго *Saxicola aurita* (albicollis) и черногорлаго *S. stapanina* (melanoleuca).

Г. Гросманъ описываетъ гнѣздованіе тювика (*Astur brevipes*) въ Далмаціи, а А. А. Браунеръ—зимнее гнѣздованіе нѣсколькихъ паръ болотной совы въ южной части Херсонской губерніи (въ 1906—7 г.г.).

Проф. А. Кёнигъ даетъ общее описаніе своей поѣздки на Шпицбергенъ. Г. Э. Юганзенъ приводитъ подробныя данныя о залетахъ фламинго въ центральную Сибирь въ 1907 году; наконецъ, г. Реманъ сообщаетъ свои наблюденія надъ садкою въ Уфимской губерніи.

Въ книгахъ за 1909 годъ имѣется интересная статья г. Циммерманна о фотографированіи, какъ способѣ орнитологическаго изслѣдованія; замѣтка В. М. Артоболевскаго о гнѣздованіи *Cyanistes pleskei* въ Кіевской губерніи; самъ ф.—Чузи описываетъ (тетрадь 1—2, стр. 76—77) шегла изъ Румыніи, *Carduelis carduelis rumæniæ*, отличающагося отъ описаннаго мною *C. s. volgensis* нѣсколько болѣе темной и бурой окраской и болѣшимъ распространеніемъ бураго на бокахъ.

Затѣмъ, Лео фонъ Боксбергеръ пишетъ о естественныхъ границахъ Палеарктической орнитофауны (границахъ фаунистическихъ, а не географическихъ); С. R. Jourdain описываетъ яйца весьма рѣдкой чайки, *Larus audouini*. Г. Гросманъ излагаетъ дальнѣйшія наблюденія надъ тювикомъ.

Наконецъ, Генглеръ и Е. Кавелинъ даютъ работу (болѣе 1½ печ. лист.) о птицахъ Козельска (Калужской губерніи) и его окрестностей. Послѣ краткаго очерка мѣстности идетъ систематическая часть работы: научныя названія, мѣстныя русскія имена, краткія замѣчанія о характерѣ пребыванія, иногда нѣкоторыя даты періодическихъ явленій и нѣкоторыя систематическія замѣчанія. Всего приведено 193 вида, изъ коихъ 34 пролетныхъ, 12 зимнихъ и 11 залетныхъ. Далѣе приводятся въ нѣсколькихъ таблицахъ наблюденія, сдѣланныя съ 1880 по 1908 г.г. надъ временемъ вскрытія рѣкъ, перваго снѣга, перваго появленія весеннихъ или осеннихъ птицъ и т. п.

Изъ болѣе интересныхъ данныхъ отмѣчу неоднократныя весеннія появленія бѣлыхъ аистовъ. Изъ большихъ крохалей авторамъ попался лишь длинноносый, а изъ мелкихъ песочниковъ—*Tringa minuta*, а не *T. temminckii*. Мохноногий сычъ и даже воробыиная совка приводятся, какъ рѣдкіе, но все же гнѣздящіеся виды. Въ качествѣ нормально пролетной птицы упоминается и бѣлозобый дроздъ, *Turdus torquatus* Linn.,—

какая именно форма—авторамъ еще не удалось установить (значитъ ли это, что не было добыто экземпляровъ? Въ такомъ интересномъ случаѣ слѣдовало бы выразиться опредѣленнѣе).

Отмѣчу еще, что въ спискѣ не приводятся *Poesile communis* и *Muscicapa collaris*. Въ качествѣ рѣдкаго гостя упоминается желтоголовая плиска, „*Motacilla citreola*“ (конечно—*M. citreola werae*). Подъ „*Acanthis carduelis major*“, очевидно, надо понимать *Carduelis carduelis volgensis*, а подъ *Sturnus vulgaris*—*S. intermedius*.

Не можетъ быть также никакого сомнѣнія, что гнѣздящійся тамъ малый дятель по недоразумѣнію названъ *Dendrocopus minor* рѣрга, такъ какъ онъ принадлежитъ къ типичной, а не къ сибирской формѣ.

Но я не могу сказать, дѣйствительно ли подъ *Bubo bubo* надо понимать типичнаго филина, или же восточно-русскую форму, въ свое время названную мною и Б. М. Житковымъ *B. b. ruthenus*.

Наконецъ, позволю себѣ отмѣтить непонятность того, что говорится о воронѣ. Вотъ буквальный переводъ: „Это—гнѣздящаяся птица, также находящаяся въ этой мѣстности и въ теченіе зимы. Сѣрый цвѣтъ болѣе свѣтлый, иногда съ охристымъ налетомъ“. *Болѣе свѣтлый, чѣмъ что именно?—или чѣмъ у какой именно птицы?*

Въ первой тетради за 1910 годъ имѣется описаніе поѣздки барона Г. В. Лоудона на западное побережье Эстляндіи. Авторъ подчеркиваетъ, насколько вредны для водяныхъ и болотныхъ птицъ въ этой мѣстности вороны, питающіяся весной въ значительной степени ихъ яйцами. Это бросалось въ глаза и въ первую нашу совмѣстную поѣздку на это побережье.

Интересна статья Эрнеста Шмитца о его сборахъ въ окрестностяхъ Іерусалима. Баронъ Г. В. Лоудонъ даетъ переводъ статьи Н. А. Заруднаго изъ журнала „Семья Охотниковъ“ съ описаніями *Phasianus jabaе* и *Ph. michailovskii*, при чемъ переводчикъ забываетъ указать *годъ, номеръ и страницу* журнала и невѣрно пишетъ имя такого орнитолога, какъ В. Л. Біанки („*Bianki*“, а надо *Bianchi*).

„Ornithologische Monatsberichte“.

Въ „Орнитологическомъ Ежемѣсячникѣ“ за 1910 годъ есть цѣлый рядъ интересныхъ статей и замѣтокъ. Въ № 1 баронъ

Г. В. Лоудонъ даетъ рядъ замѣтокъ о птицахъ Прибалтійскаго края. Между прочимъ, онъ говоритъ, что *Poecile communis meridionalis* встрѣчается здѣсь круглый годъ и въ особенности многочислена зимой, а *P. borealis* наблюдается главнымъ образомъ лѣтомъ, а зимой почти совершенно исчезаетъ. Авторъ приводитъ, какъ особенно интересное свѣдѣнiе, сообщенiе Ф. Штолля о гнѣздованiи *Columbus auritus* на островѣ Эзелѣ. Добавлю, что я ежегодно наблюдаю гнѣздовую колонiю (паръ восемь) этого вида въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города Везенберга. Проф. Коллеттъ сообщаетъ о бѣлобровомъ дроздѣ и крупной формѣ каменки (*Saxicola oenanthe leucogghoa*), добытыхъ 20. X. 1908 на Шпицбергенѣ. Оскаръ Нейманъ описываетъ темную форму луговой тиркушки подъ именемъ *Glaucola fusca fülleborni* изъ восточныхъ частей Южной Африки. Мнѣ уже приходилось сообщать, что въ Южной Африкѣ была найдена гнѣздящаяся луговая тиркушка (*G. pratensis*), и отмѣчать, что гнѣздованiе въ южномъ полушарiи нашихъ сѣверныхъ птицъ является весьма замѣчательной новостью. И вотъ, приходится думать, что и этотъ „фактъ“ распадается въ прахъ и что въ дѣйствительности тѣ гнѣздившiеся птицы, хотя и признанныя редакцiей „Ибиса“ за настоящихъ *G. pratensis*, принадлежали къ установленной теперь Нейманомъ темной мѣстной расѣ. Это—наглядный примѣръ того, какъ неправа консервативная редакцiя „Ибиса“, всегда возстающая противъ того, что она считаетъ современнымъ увлеченiемъ въ дѣлѣ тонкаго различенiя мѣстныхъ формъ.

Въ № 3 баронъ Г. В. Лоудонъ сообщаетъ о добытомъ старомъ самцѣ чернозобаго дрозда, 25. XI. 1909, въ его имѣнiи „Лизденъ“, Вольмарскаго уѣзда, Лифляндской губернiи. Въ другой статьѣ онъ совершенно основательно защищаетъ самостоятельность описанной давно имъ и Н. А. Заруднымъ блѣдной формы болотной совы.

Въ № 4 ф. Мадарашъ (стр. 65) отдѣляетъ подъ именемъ *Astur graecus* малаго ястреба изъ Греции. Отъ типичнаго русскаго тювика (*A. brevipes*) греческая птица отличается болѣе свѣтлой окраской верхней стороны, не темно-аспидно-сѣрой, а свѣтло-голубовато-сѣрой, точь въ точь какъ у восточно-индiйскаго *A. poliopsis*. Но тогда какъ штаны у послѣдняго въ старости всегда чисто-бѣлы, у греческихъ особей они всегда въ поперечныхъ полосахъ. Чѣмъ вновь описываемая

форма отличается отъ сирійскаго *A. guinea*, авторъ не знаетъ, но предполагаетъ, что отличія должны быть (!!).

Въ № 5 Оскаръ Нейманъ (стр. 80) описываетъ подъ именемъ *Meops viridis beludschicus* новую форму зеленой шурки, отличающуюся отъ типичной индійской формы голубоватымъ („бериллово-голубымъ“) оттѣнкомъ брюха у старыхъ птицъ и „прекраснымъ бирюзово-голубымъ“ (а не просто голубымъ) горломъ. Обитаетъ равнину Инда, Белучистанъ и юго-восточную Персію.

Въ № 6 Ф. Тишлеръ сообщаетъ объ экземплярѣ *Osea podgoma leucoghoa*, найденномъ мертвымъ 28. XII. 1908 (нов. ст.) въ восточной Пруссіи (озеро Гезерихъ).

„The Ibis“.

Въ январской книгѣ „Ибиса“ за 1910 годъ по палеарктической фаунѣ есть лишь одна статья (продолженіе) Джона Букнилля объ орнитологій острова Кипра. Авторъ отмѣчаетъ переходный характеръ многихъ птицъ (ласточки, сычи) между западными и восточными формами.

Въ апрѣльской книгѣ напечатана обстоятельная статья Джозефа Вайтекера о большомъ вторженіи клестовъ лѣтомъ и осенью 1909 года въ Западную Европу. Налеты этихъ кочующихъ птицъ повторяются время отъ времени, подобно налетамъ сажки и нѣкоторыхъ другихъ видовъ, но налета въ такихъ огромныхъ размѣрахъ среди клестовъ до сихъ поръ не наблюдалось.

Налетъ клестовъ начался въ іюнѣ, былъ особенно большимъ въ іюлѣ и продолжался до осени, при чемъ во многихъ случаяхъ птицы гнѣздились въ необычныхъ для нихъ мѣстностяхъ (напримѣръ, нѣкоторыя свѣдѣнія изъ Италіи).

Явленіе это наблюдалось во всей Германской Имперіи и во всей Австро-Венгріи, во Франціи больше въ восточныхъ частяхъ, чѣмъ въ западныхъ, и въ Британіи также преимущественно въ юго-восточной части архипелага. Изъ Даніи, Голландіи и Бельгіи есть сообщенія о многочисленности клестовъ, но опредѣленныхъ указаній на вторженіе нѣтъ. Съ Пиринейскаго полуострова также нѣтъ опредѣленныхъ указаній, и тѣ экземпляры клестовъ, которые были оттуда доставлены, оказались принадлежащими къ слегка отличной мѣстной расѣ (*Loxia curvirostra hispana*) и, слѣдовательно, не подтверждаютъ факта налета

(опять примѣръ важности точнаго различенія мѣстныхъ расъ для біологическаго изученія птицъ).

Но особенно многочисленными оказались клесты въ Италіи, считая острова Средиземнаго моря и Мальту, фаунистически сюда же относящуюся, но за исключеніемъ крайняго сѣверо-запада Италіи, т.-е. Пьемонта, что удивительно въ виду горнистаго характера сѣверныхъ частей этой провинціи и ея богатства хвойными лѣсами. Вблизи Болоньи первыя особи клестовъ появились еще въ первой половинѣ апрѣля, затѣмъ значительное количество явилось въ концѣ мая и въ срединѣ іюня. Въ августѣ новыя появленія были незначительны, но птицы попадались до октября. Въ другихъ мѣстахъ появленіе птицъ замѣчено было въ іюлѣ и большое количество ихъ появлялось до начала октября включительно (Тосканья). О количествѣ появившихся птицъ можетъ дать понятіе, напримѣръ, то обстоятельство, что близъ Римини однимъ птицеловомъ въ теченіе мѣсяца было поймано не менѣе тысячи птицъ.

Изъ-подъ Константинополя сообщаютъ, что тамъ ничего особеннаго въ смыслѣ появленія клестовъ не наблюдалось, а изъ другихъ частей Балканскаго полуострова свѣдѣній нѣтъ. Наконецъ, въ Норвегіи клесты наблюдались даже въ южныхъ частяхъ меньше обыкновеннаго и это въ связи съ находками среди массъ обыкновеннаго клеста (*L. curvirostra*) единичныхъ особей бѣлокрылаго (*L. bifasciata*) заставляетъ думать, что это движеніе зародилось ели не въ Сибирѣ, то во всякомъ случаѣ въ восточной половинѣ Европы.

Относительно причинъ этого движенія клестовъ надо сказать, что благодаря климатическимъ условіямъ повсюду въ Европѣ, даже въ Италіи, наблюдалось въ 1908/9 г.г. частью позднее созрѣваніе, а въ значительной степени и совершенное отсутствіе сѣмянъ сосенъ и елей, а въ Норвегіи уже нѣсколько лѣтъ подрядъ не было хорошаго урожая на сѣмена хвойныхъ. Въ связи съ этимъ появившіеся въ родныхъ мѣстахъ клесты кормились сѣменами и даже цвѣтами разныхъ травъ, посѣщая и открытыя поля и даже безлѣсные острова, какъ Капри.

Въ той же апрѣльской книгѣ сообщается, что Дугласъ Каррутерсъ со своими друзьями Миллеромъ и Прайсомъ организовалъ экспедицію для сбора птицъ и другихъ объектовъ, которая весною должна направиться черезъ Минусинскъ къ югу, къ верховьямъ Енисея, гдѣ проведетъ лѣто, а затѣмъ черезъ Кобдо и Джунгарію пройдетъ на Кульджу, а оттуда, вѣроятно,

направится на зимовку въ бассейнъ Тарима и затѣмъ пройдетъ въ Алашань и Ганьсу. Продлится экспедиція годъ или годъ съ четвертью.

Въ этой же книгѣ Паттенъ обращаетъ вниманіе на то что первый лѣтній нарядъ не гнѣздящейся песчанки (*Calidris agapagia*) отличается отъ послѣдующихъ короткостью третьестепенныхъ маховъ, не достигающихъ на нормально сложенномъ крылѣ вершины четвертаго махового.

Въ іюльской книгѣ „Ибиса“, кромѣ окончанія уже упомянутой статьи объ орнитофаунѣ Кипра, имѣется цѣлый рядъ интересныхъ для насъ работъ.

Дугласъ Каррутерсъ пишетъ о птицахъ Заравшанскаго бассейна въ русскомъ Туркестанѣ. Авторъ пріѣхалъ въ Самаркандъ 1. IX. 1907 (нов. ст.) и провелъ цѣлый годъ, изслѣдуя шестисотъ-верстную долину Заравшана и прилегающія горы, причемъ собралъ около 600 шкурокъ птицъ. Авторъ даетъ краткій обзоръ характера и климата мѣстности съ отчетной картой и въ систематической части перечисляетъ всего сто шестьдесятъ девять видовъ птицъ (списокъ для годовой работы въ такой области далеко не весьма полный). Кромѣ того, данъ хорошій рисунокъ Заравшанскаго фазана въ краскахъ.

Что касается систематической части работы автора, то опредѣленія его лишь приблизительны, т.-е. въ большинствѣ случаевъ не доведены до подвидовъ. Во многихъ случаяхъ легко, конечно, догадаться, о какой именно птицѣ говоритъ авторъ подъ непринадлежащимъ ей названіемъ,—напримѣръ: „*Emberiza cia*“ (должно быть *E. cia par*), „*Anthus spinoletta*“ (*A. spinoletta blakistoni*), „*Turdus viscivorus*“ (*T. viscivorus bonapartei*), „*Anser rubrirostris*“ (*A. anser*), „*Ciconia alba*“ (*C. mysteriorhyncha*). Въ другихъ же случаяхъ не легко сказать, съ какою именно и даже со сколькими именно изъ двухъ или трехъ близкихъ формъ имѣлъ дѣло авторъ,—напримѣръ, при упоминаніяхъ: „*Corvus cornix*“, „*Emberiza schoeniclus*“, „*Lanius phoenicuroides*“, „*Sylvia cinerea*“ (я видѣлъ изъ Закаспійской области настоящую *S. cinerea*), „*Dendrocopus leucorpterus*“ и т. п.¹⁾.

1) Впрочемъ, безъ большого риска ошибиться, можно сказать, что подъ именемъ „*Montifringilla sordida*“ скрывается *Fringillauda altaica*, подъ именемъ „*Carpodacus grandis*“—близкій видъ *C. rhodochlamys*, а подъ именемъ „*Regulus himalayensis*“—*R. tristis*. *Азм*

Этотъ недостатокъ отнимаетъ у работы автора значительную долю интереса, такъ какъ, несомнѣнно, авторъ приводитъ цѣлый рядъ новыхъ для Россіи южныхъ и восточныхъ формъ единственно на основаніи неумѣлыхъ опредѣленій,—какъ только что указано въ примѣчаніи.

Въ двухъ случаяхъ, однако, можно полагать, что авторъ не ошибается. Во-первыхъ, онъ приводитъ впервые для нашихъ предѣловъ тибетскаго вьюра *Montifringilla adamsi* (♂. 20. VIII. 1908, нов. ст. Аксайская возвышенность, 12000 ф. н. у. м.). Впрочемъ, птица эта была уже добыта на Памирахъ близъ нашей границы. Затѣмъ, авторъ приводитъ гималайскую пищуху *Certhia himalayensis*, при чемъ прямо оговариваетъ, что производитъ сравненіе экземпляровъ. Приводимые имъ размѣры (клювъ отъ 17 до 23, крыло 66—69 мм.), также не говорятъ за то, чтобы онъ имѣлъ дѣло съ типичной *C. taeniura* Сѣверцова.

Стоитъ еще отмѣтить добычу осотда (♂. 19. X. 1907) у Самарканда, такъ какъ *Regnis arivogus*—очень рѣдкая птица въ Туркестанѣ. Отмѣчу еще, что обыкновенной гнѣздящейся птицей долины авторъ называетъ обыкновенную пволгу *Oriolus galbula*, тогда какъ „туркестанская“ *O. kundo* о попалась ему лишь въ одномъ экземплярѣ.

Далѣе идетъ статья того же Дугласа Каррутерса о коллекціи птицъ съ Мертваго моря и изъ сѣверо-западной Аравіи, при чемъ перечисляются 53 вида. Статья страдаетъ тѣмъ же недостаткомъ, о коемъ упомянуто выше.

Въ этой же юльской книгѣ „Ибиса“ насъ еще ближе касается работа Гарри Витерби (Harry F. Witherby) о коллекціи птицъ южнаго побережья Каспія и хребта Эльбурсъ. Коллекція эта составлена Р. Б. Вуснамомъ, спутникомъ А. Бейльварда и подарена послѣднимъ Британскому Музею; собрана она въ первую половину 1907 года.

Систематическая часть статьи содержитъ краткія біологическія замѣчанія собирателей, а также во многихъ случаяхъ замѣчанія автора систематическаго характера. Опредѣленія свои авторъ доводитъ до подвидовъ и нѣкоторыя указанія его любопытны. Такъ, ворона отнесена имъ къ восточной формѣ (*Corvus cornix sharpii*), горная трясогузка—къ западной (*Motacilla boarula boarula*). Тростниковую овсянку онъ называетъ *Emberiza schoeniclus tschusii*. Однако, нѣкоторыя подвидовыя опредѣленія, къ сожалѣнію, не мотивирован-

ныя, могутъ возбуждать сомнѣнія (напримѣръ, *Columba palumbus*, *Philomela luscini*, *Dendrocopus minor danfordi*, *Linota cannabina fringillirostris*),— другія же, безъ всякаго сомнѣнія, невѣрны (напримѣръ, *Gecin*
us viridis viridis, *Sitta europaea caesia*, *S. neu-*
mayeri neumayeri, *Parus major major*, *P. caeruleus caeruleus*, *Passer montanus*).

Изъ этихъ послѣднихъ птицъ отмѣчу замѣчанія автора о его „*Parus major major*“; онъ положительно отличаетъ прикаспійскую синицу отъ болѣе южной *P. major blanfordi*, на что совершенно справедливо уже указывалъ и Н. А. Зарудный, опровергая упорное, но неправильно отождествленіе этихъ птицъ Хартертомъ. Также справедливо указываетъ авторъ, что цвѣтотыя отличія прикаспійской синицы отъ типичной, указываемыя въ описаніи „*P. caspius*“ Н. А. Заруднымъ и Г. В. Лоудономъ, въ дѣйствительности не существуютъ. Собравъ значительно большій матеріалъ, это долженъ былъ признать и одинъ изъ авторовъ „*P. caspius*“, баронъ Г. В. Лоудонъ. Но..... нашъ авторъ забылъ о размѣрахъ, а по размѣрамъ прикаспійская синица должна быть отдѣляема отъ типичной европейской и, повидимому, относится къ *P. m. aphrodite*. По крайней мѣрѣ, ихъ различій никто еще не сумѣлъ указать.

Надо сказать кое-что и по поводу скалистого поползня, положеніе котораго невѣрно толкуется даже Хартертомъ. Конечно, Хартертъ въ своей большой работѣ о палеарктическихъ птицахъ не дѣлаетъ такой грубой ошибки, какъ нашъ авторъ, и не отождествляетъ прикаспійскаго скалистаго поползня съ западно-балканскимъ. Но онъ называетъ его *S. rupicola* Blauf., что, по моему, также неправильно. Какъ я въ свое время доказать и съ чѣмъ соглашается и Хартертъ, Бланфордъ подъ именемъ *S. rupicola* соединилъ двѣ формы. Такъ какъ видовое единство ихъ отнюдь не доказано, то обѣ онѣ нуждаются въ новыхъ именахъ и получили ихъ: южную, болѣе мелкую, блѣдную Н. А. Зарудный называлъ *S. tschitscherini*, а нѣсколько болѣе крупную, темную, сѣверную—я назвалъ *S. parva* (въ отличіе отъ крупныхъ *syriaca* и *obscura*). Во всякомъ случаѣ, въ перечнѣ экземпляровъ Бланфордъ на первомъ мѣстѣ ставитъ пару птицъ изъ южной Персіи и на рисунокъ изображаетъ блѣдную форму, почему и неправильно приурочивать его названіе къ темной сѣверной формѣ.

О добытомъ дербникѣ (*Falco aesalon*) авторъ замѣчаетъ, что онъ отличался чрезвычайной блѣдностью окраски. Замѣчу, что это могъ быть описанный П. П. Сушкинымъ киргизскій дербникъ *Lithofalco regulus pallidus*.

Дубоносы коллекціи автора также нѣсколько блѣдны, и авторъ обсуждаетъ вопросъ, не слѣдовало ли бы описать ихъ, какъ особую форму, отъ чего, однако, воздерживается. И хорошо дѣлаетъ, такъ какъ эти особи, добытыя въ началѣ февраля (ст. ст.), конечно, просто зимующія особи нашего типичнаго дубоноса. А если на южномъ побережьи Каспія и имѣется мѣстная раса дубоноса, то она окажется не блѣдною, а темною—какъ весьма темны всѣ эндемичныя южно-каспійскія формы птицъ—и въ этомъ случаѣ тождественной съ закавказскимъ дубоносомъ, описаннымъ мною подъ именемъ *Coccothraustes nigricans*.

Авторъ упоминаетъ чернаго дятла, рябинника, королька и *Anthoscopus masgopu* такъ далеко къ западу, какъ Реннъ. Талышскій фазанъ былъ обыкновененъ почти по всему побережью и выше, чѣмъ на 2000 фут. н. у. м., а *Phasianus persicus* отмѣченъ лишь подъ $52\frac{2}{3}^{\circ}$ восточной долготы отъ Гринвича.

Въ іюльской же книгѣ Робертъ Мекензи сообщаетъ съ Синайскаго полуострова, что 19. IV (нов. ст.) подъ $29^{\circ}5'$ сѣверной широты и $30^{\circ}4\frac{1}{4}'$ восточной долготы наблюдалъ пролетъ въ сѣверо-восточномъ направленіи массы бѣлыхъ аистовъ. Онъ съ 3 до $5\frac{1}{2}$ часовъ пополудни со своими помощниками насчиталъ 47 стай, отъ 500 до 600 птицъ въ каждой, всего, значитъ, около 25—30 тысячъ штукъ.

Тамъ же Джозефъ Уайтекеръ сообщаетъ о первомъ европейскомъ экземплярѣ сенегальскаго рябка: взрослая самка была добыта 28. IV (нов. ст.) изъ пары у Санта Кроче Камарина, въ Сициліи (провинція Сиракузы). Въ Алжирѣ и Тунисѣ эта птица (*Pterocles senegalus*)—не рѣдкость.

(Продолженіе слѣдуетъ.—To be continued).



Краткія сообщенія.—Kurze Mittheilungen.

Къ налету кедровокъ.—Zum Tannenheherzug.—Н. Ф. Томкевичъ, занимающійся фаунистическими изслѣдованіями Кѣлецко-Сандомирскаго края, сообщаетъ о массовомъ появленіи здѣсь въ 1911 году кедровокъ [*Nucifraga caryocatactes caryocatactes* (Linn.)]. Птицы эти появились въ концѣ августа и держались главнымъ образомъ въ пихтовыхъ и пихто-буковыхъ насажденіяхъ края. Въ началѣ ноября онѣ исчезли. Ранѣе, въ 1909 и 1910 г.г., несмотря на многочисленныя экскурсіи и охоты, г. Томкевичу ни разу не приходилось наблюдать здѣсь кедровокъ.

А. П. Лавровъ сообщилъ въ редакцію о массовомъ появленіи кедровокъ въ минувшемъ (1911) году въ окрестностяхъ села Новенскаго, въ Змѣиногорскомъ уѣздѣ, Томской губерніи. Птицы эти появились 1. X въ сосновомъ бору, а съ 9. X стали попадаться въ селѣ на огородахъ. 16. X онѣ держались здѣсь еще въ большемъ числѣ. А. П. Лавровымъ прислана въ редакцію пшурка взрослой самки кедровки, добытой въ означенной мѣстности 1. XI. Длина ея клюва отъ передняго края ноздрей 40 м.м.

* * *

Изъ Змѣиногорскаго уѣзда Томской губерніи.—16. VIII. 1911 А. П. Лавровымъ наблюдалась вблизи села Новенскаго стайка камешарокъ [*Agapagia integres* (Linn.)]. Кулички въ числѣ семи особей держались на берегу прѣснаго озера. Пять птицъ (два самца и три самки), добытыя изъ этой стайки, посланы въ Зоологическій Музей Императорской Академіи Наукъ.

Изъ села Алферова Симбирской губерніи.—По сообщенію А. В. Хлѣбникова, здѣсь 9. VI. 1911 были добыты двѣ зеленыхъ пѣ-

ночки (*Phylloscopus viridanus* Blyth.), а 11. VII. 1911 мѣстнымъ охотникомъ убитъ удождъ (*Urupa eops* Linn.) вблизи сосѣдняго села Теплаго-Стана.

Отъ Б. М. Житкова намъ извѣстно, что удождъ въ Симбирской губернии лѣтомъ минувшаго (1911) года встрѣчался необыкновенно часто.

* * *

Орнитологическія изслѣдованія въ Нижегородской губернии.— П. В. Серебровскій при содѣйствіи Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы коллектировалъ съ препараторомъ птицъ съ 17. IV по 31. VIII 1911 года въ окрестностяхъ Нижняго-Новгорода и въ уѣздахъ: Васильскомъ, Лукояновскомъ (на р. Алатырѣ), Арзамасскомъ и Макарьевскомъ. Всего собрано за истекшій годъ 370 птицъ и нѣсколько десятковъ яицъ. Наиболѣе интересныя находки: *Anas strepera* Linn., *Fuligula pygosa* Gtld., *Larus minutus* Pall. (на Волгѣ, во время весенняго пролета), *Urupa eops* Linn., *Coracias garrula* Linn., *Anser segetum* Gm. (въ Васильскомъ уѣздѣ, до 1-го мая), *Hydrochelidon leucoptera* Sch., *Gallinula chloropus* Linn. (въ Арзамасскомъ уѣздѣ, съ 3 по 8. VI), *Motacilla citreola* Pall., *Muscicapa parva* Bechst., *Phylloscopus viridanus* Blyth., *Aquila heliaca* Sav. (3 экземпляра), *Aquila clanga* Pall. (8 экземпляровъ) (въ Лукояновскомъ уѣздѣ, съ 15 по 28. V и съ 20. VII по 5. VIII) и *Ardetta minuta* Linn. (въ Макарьевскомъ уѣздѣ, съ 10 до 31. VIII).

Орнитологическія изслѣдованія въ Калужской губернии.— В. А. Филатовымъ при содѣйствіи Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы въ 1911 году посѣщены уѣзды Калужскій, Перемышльскій и Жиздринскій. Здѣсь, между прочимъ, были найдены имъ на гнѣздовыи *Falco peregrinus*, *Motacilla borealis*, *Pernis apivorus*; въ маѣ добытъ *Lanius excubitor*, а въ августѣ—молодой *Circus macrurus* и одинъ экземпляръ *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*; въ этомъ же мѣсяцѣ наблюдалась *Ardetta minuta*.

Орнитологическія изслѣдованія въ Тамбовской губерніи.—Д. В. Кондыревымъ при содѣйствіи Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы изслѣдовались въ теченіе весны и лѣта 1911 года уѣзды Тамбовскій, Моршанскій, Темниковскій и Кирсановскій. Въ результатъ изслѣдователемъ найдены семь видовъ птицъ, не значащихся въ спискѣ, данномъ С. А. Рѣзцовымъ въ статьѣ „Матеріалы къ изученію орнитологической фауны Тамбовской губерніи“ („Матеріалы къ познанію фауны и флоры Росс. Имп.“, отд. зоологич., выпускъ X).

* * *

Экспедиція на Алтай.—Въ концѣ апрѣля текущаго года профес. П. П. Сушкинъ предпринимаетъ путешествіе въ русскій Алтай съ зоологическими, главнымъ образомъ орнитологическими цѣлями.

* * *

Отмѣтка птицъ кольцами.—21. VI. 1911 въ Гатчинскомъ Ремизѣ Р. Р. Дидомъ, завѣдывающимъ Императорской Охотой, былъ отмѣченъ кольцомъ вальдшнепъ. Въ январѣ получено свѣдѣніе, что эта птица добыта 31. XI на югѣ Франціи, около Тулузы.

* * *

Въ Засѣданіи Отдѣленія Орнитологіи и Клуба Любителей пѣвчей и другой вольной птицы Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній 12-го марта 1912 года было доложено В. Ч. Доргоостайскимъ—„Къ біологич. горнаго дупеля (*Scolorax solitaria* Midd.)“, наблюдавшимъ эту птицу въ верховьяхъ Енисея, и Д. М. Россинскимъ—„Результаты кольцеванія птицъ въ 1911 году въ Россіи по свѣдѣніямъ Отдѣленія Орнитологіи“.

Наиболѣе интереснымъ въ первомъ докладѣ являлось сообщеніе о токованіи горнаго „дупеля“. Судя по свѣдѣніямъ о географическомъ распространеніи этой птицы, докладчикъ имѣлъ дѣло не съ типичной, а восточной формой [*Gallinago solitaria japonica* (Br.)], гнѣздящей въ Сибири, начиная съ Саянъ къ востоку до Камчатки и Японіи.

Д. М. Росситский перечислилъ птицъ, отмѣченныхъ кольцами въ 1911 году ¹⁾ и прочелъ довольно большой списокъ лицъ, заявившихъ Отдѣленію Орнитологiи о своемъ желаніи заняться окольцовываніемъ птицъ въ текущемъ году.

Г. II.



¹⁾ Большинство изъ этихъ птицъ отмѣчено Б. А. Броневскимъ, выписавшимъ кольца изъ Росситтена, о чемъ уже сообщалось подробно въ предшествовавшей книгѣ „Орнитологическаго Вѣстника“. *Ред.*

Хроника. — Chronik.

Новыя изданія Департамента Земледѣлія.—Департаментомъ Земледѣлія выпущены въ свѣтъ: 1) трудъ специалиста—фитопатолога г. Бондарцева—„Грибныя болѣзни культурныхъ растений и мѣры борьбы съ ними“ (Поле.—Огородъ.—Садъ) (цѣна 1 руб. 50 коп.) и 2) брошюра завѣдывающаго Бюро по Энтомологіи г. Порчинскаго „О нѣкоторыхъ паразитахъ майскаго червя, заслуживающихъ у насъ особаго вниманія, и дополнительныя данныя о яйцеѣдѣ плодожорки“ (цѣна 5 коп.).

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества, при коихъ имѣются сельскохозяйственныя библіотеки, могутъ получить по 1 экз. труда и брошюры бесплатно, при чемъ съ просьбами о снабженіи этими изданіями имъ надлежитъ обращаться непосредственно къ мѣстному инспектору сельскаго хозяйства, уполномоченному по сельскохозяйственной части или правительственному агроному, коими эти изданія будутъ предоставляться также и мѣстнымъ казеннымъ учебнымъ заведеніямъ и опытнымъ учрежденіямъ. Прочимъ учрежденіямъ, могущимъ содѣйствовать ознакомленію населенія съ грибными болѣзнями культурныхъ растений и съ названнымъ насѣкомымъ, съ просьбами о бесплатной высылкѣ этихъ изданій надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія, коимъ такого рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по мѣрѣ возможности.

Выставка весенней природы, устраиваемая Харьковскимъ Обществомъ Любителей Природы въ г. Харьковѣ съ 26 марта по 30 апрѣля с. г. (въ помѣщеніи Общества Акклиматизаціи въ Университетскомъ саду). Задача выставки научно-образовательная: познакомить съ весенней природой южной Россіи и параллельно другихъ мѣстностей, въ ея всевозможныхъ проявленіяхъ и отношеніяхъ къ человѣку, и способствовать развитію научно-художественнаго чувства природы. Отдѣлы выставки: 1. Весна, какъ физико-географическое явленіе. 2. Весенняя растительность. 3. Цвѣтоводство. 4. Агрономія, садоводство, огородничество. 5. Животный и растительный міръ весеннихъ водоемовъ. 6. Живот-

ный міръ весной. 7. Охота и рыболовство. 8. Экскурсіонныя пособія и книги. 9. Весна и человѣкъ. 10. Весна въ гигиеническомъ отношеніи.

Къ изученію паразитовъ птицъ.—Докторъ Павелъ Федоровичъ Соловьевъ (Варшава, Университетъ, Зоологическій Кабинетъ) проситъ русскихъ орнитологовъ присылать ему для изслѣдованія матеріалъ по паразитамъ птицъ. Онъ рекомендуетъ слѣдующія правила собиранія матеріала. 1) Вскрывать весь желудочно-кишечный каналъ и отмѣчать, изъ какой части кишечника взяты черви. 2) Желательно, чтобъ осматривалась также печень и другіе органы птицы (полость тѣла, глаза). 3) Червей для опредѣленія нужно сохранять въ винномъ спирту крѣпостью около 95°. 4) Обязательно отмѣчать тушью на бумагѣ, изъ какой птицы, какого органа, когда и гдѣ взяты черви. 5) Каждого червя нужно класть въ отдѣльную посудину (пробирку).—Дополнительныя свѣдѣнія можно получить по вышеуказанному адресу.

Въ № 52-омъ „Русскихъ Вѣдомостей“, отъ 3 марта 1912 года напечатано: „Отдѣленіе Орнитологій Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній, взявъ съ прошлаго 1911 года на себя починъ въ объединеніи русскихъ опытовъ по кольцеванію вольныхъ птицъ въ видахъ опытнаго изученія перелетовъ птицъ, проситъ не отказать помѣстить въ „Русск. Вѣд.“ сообщеніе о томъ, что лица, могущія точно опредѣлить названіе кольцуемой птицы, какъ-то: орнитологи, опытные охотники и любители, желающіе принять участіе въ общей работѣ по кольцеванію птицъ въ предѣлахъ Россіи, приглашаются сообщить свои точные адреса Отдѣленію Орнитологій (Москва, Зоологическій садъ, въ Отдѣленіе Орнитологій) не позже 15-го марта 1912 года, въ тѣхъ видахъ, чтобы Отдѣленіе Орнитологій могло выписать изъ-за границы и разослать желающимъ необходимое для предстоящей весенней кампаніи 1912 года количество колецъ. Кольца выдаются Отдѣленіемъ Орнитологій бесплатно, и наложеніе ихъ на птицу легко и просто по пріемамъ, такъ что доступно каждому. Взявшій кольца получаетъ соотвѣтственное наставленіе по кольцеванію птицы и обязуется о результатахъ своей работы увѣдомлять Отдѣленіе Орнитологій, согласно даннымъ указаніямъ.“

Остальные повременныя изданія Отдѣленіе Орнитологіи проситъ о перепечаткѣ.

Предсѣдатель Отдѣленія Орнитологіи *Д. М. Россинскій*“.

Приобрѣтеніе Имп. Академіей Наукъ коллекціи профес. М. А. Мензбира.—Имп. Академія Наукъ ходатайствуетъ объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на приобрѣтеніе для Зоологическаго Музея коллекціи птицъ преимущественно Европейской Россіи, Сибири и Кавказа, принадлежащей М. А. Мензбину. Въ коллекціи 12,545 экземпляровъ болѣе чѣмъ 900 видовъ птицъ. Особенно интересенъ въ ней подборъ кречетовъ, орловъ и ястребовъ. Владѣлецъ коллекціи уступаетъ ее Академіи за 20,000 руб. Министерство Народнаго Просвѣщенія признало весьма желательнымъ поступленіе означенной коллекціи въ Зоологическій Музей и вошло въ Совѣтъ Министровъ съ представленіемъ объ отпускѣ необходимыхъ для этого средствъ.

Охрана природы.—Професоръ Г. А. Кожевниковъ въ № 70-мъ газеты „Утро Россіи“ отъ 24-го марта 1912 года въ статьѣ подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ, между прочимъ, говоритъ: „Въ прошломъ году основалось *первое въ Россіи* „Общество охранителей природы“. Основалось оно въ мѣстечкѣ Хортица—тамъ, гдѣ была нѣкогда знаменитая Запорожская Сѣчь. Мѣсто самой „Сѣчи“—островъ Хортица, площадью около 3000 дес., имѣетъ маленькій поселокъ всего въ 14 дворовъ нѣмцевъ-колонистовъ изъ Екатеринославской губерніи. А противъ этого острова—большое нѣмецкое село Хортица, дворовъ въ 200.

Нѣмцы составили большинство членовъ перваго въ Россіи „Хортицкаго общества охранителей природы“ (изъ 215 членовъ 10 русскихъ), но инициаторомъ дѣла и его вдохновителемъ явился русскій—Петръ Филипповичъ Бузукъ.

Новое общество существуетъ всего одинъ годъ, но уже проявило энергичную дѣятельность въ смыслѣ проповѣди своихъ идей. Черезъ директора народныхъ училищъ предписано учителямъ внушать школьникамъ, что нельзя разорять птичьихъ гнѣздъ и мучить животныхъ. Черезъ сѣльскія правленія предписано, чтобы на полевая работы не брали собакъ безъ привязи, такъ какъ свободно бѣгающія по полямъ и лѣсамъ собаки наносятъ большой вредъ личи. Къ мѣстному крестьянскому на-

селенію новое общество обратилось съ просьбой не ловить рыбы съ 15-го марта по 15 мая, и къ мѣстнымъ охотникамъ—съ просьбой прекратить весеннюю охоту. По образцамъ Берлепша устроены нѣсколько сотъ искусственныхъ гнѣздъ для птицъ и размѣщены по деревьямъ.

Какъ самое крупное практическое дѣло новаго общества, надо отмѣтить аренду участка для охоты съ тѣмъ, чтобы на немъ совершенно запретить охоту и сдѣлать въ немъ убѣжище для дичи.

Въ смыслѣ охраны мертвой природы хортицкое общество, отстояло существованіе нѣсколькихъ красивыхъ скалъ на Днѣпровскихъ порогахъ, которыя были обречены на истребленіе для ломки камня.

Нельзя не привѣтствовать піонеровъ охраны природы въ Россіи. Надо пожелать, чтобы этотъ примѣръ нашелъ подражателей, особенно, среди населенія большихъ городовъ. Въ частности, наша Москва ни мало не смущается тѣмъ, что роскошные уголки природы, какъ Измайловскій звѣринецъ и Лосинный островъ, нисколько не охраняются и постепенно превращаются въ поселки, а нѣкогда знаменитый Серебряный боръ и вовсе уничтоженъ, какъ лѣсъ, и превращенъ въ рядъ улицъ и переулковъ“.

Поѣздка въ дельту Волги.—Во второй половинѣ марта текущаго года Б. М. Житковъ и С. П. Огневъ, съ препараторомъ, при содѣйствіи Департамента Земледѣлія, Имп. Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи и Имп. Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній посѣтили дельту Волги, Никиткинъ банкъ (рукавъ Волги въ 7-ми верстахъ отъ Каспійскаго моря) и озеро Эльтонъ (проѣздомъ, на обратномъ пути) главнымъ образомъ съ орнитологическими цѣлями. Въ результатъ, приблизительно за 15 дней, было собрано около 190 птицъ. Сборъ этотъ поступилъ въ Зоологическій Музей Имп. Московскаго Университета.



Издакія, присланныя въ редакцію.

Editions parvenus à la rédaction.

Е. И. Исполатовъ: „Обзоръ Симферопольской весны за 1901 годъ“. Оттискъ изъ № 5-го журнала „Естествознание и Географія“ за 1901 г. *Отъ автора.*

Е. И. Исполатовъ: „Обзоръ Симферопольской весны за 1902 годъ“. Оттискъ изъ № 5-го журнала „Естествознание и Географія“ за 1902 г. *Отъ автора.*

Е. И. Исполатовъ: „Фенологическія наблюденія въ Гдовскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губерніи за весну и лѣто 1904 г.“ Оттискъ изъ № 3-го журнала „Естествознание и Географія“ за 1905 годъ. *Отъ автора.*

Е. И. Исполатовъ: „Фенологическія наблюденія въ Гдовскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губерніи за 1905 годъ“. Оттискъ изъ „Ботаническаго Журнала“, изд. Отд. Ботаники Имп. С.-П.Б. Общ. Естествоисп., № 6, за 1906 г. *Отъ автора.*

Е. И. Исполатовъ: „Фенологическія наблюденія въ Гдовскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губерніи за 1906 и 1907 г.г.“. Оттискъ изъ „Ботаническаго Журнала“, изд. Отд. Ботаники Имп. С.-П.Б. Общ. Естествоисп., № 7—8, за 1907 г. *Отъ автора.*

Е. И. Исполатовъ: „Вдовщина“. Оттискъ изъ № 9-го журнала „Естествознание и Географія“ за 1911 г. *Отъ автора.*

В. Д. Андреевъ и В. Л. Віанки: „Къ авифаунѣ Устьсысольскаго уѣзда Вологодской губерніи“. Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Музея Имп. Академіи Наукъ“, т. XV, 1910 г.

Отчеты о Естественнo-Историческомъ Музеѣ Полтавскаго Губернскаго Земства за 1903, 1906, 1907, 1908, 1909 и 1910 г.г.

„Природа Полтавской губерніи“. Оттискъ изъ Полтавскаго Земскаго Календаря, 1908 г.

„Ежегодникъ Русскаго Горнаго Общества“, I и II т. т., 1901 и 1902 г.г.

А. Н. Карамзинъ: „Добавленіе къ статьѣ „Птицы Бугурусланскаго, сопредѣльныхъ съ нимъ частей Бугульминскаго, Вузулукскаго уѣздовъ, Самарской губерніи, и Белебейскаго уѣзда, Уфимской губерніи“. Отпускъ изъ „Матер. къ познанію фауны и флоры Росс. Имп.“, отд. зоолог., выпускъ IX. *Отъ автора.*

Отчеты Кіевскаго Общества Любителей Природы за 1909 и 1910 г.г.

Фр. Герцогъ: „Волѣзни птицъ“. Переводъ съ нѣм. подъ ред. Г. П. Гуріна. 2-ое вновь дополн. изд. Имп. Моск. Общ. Люб. Птицеводства, 1912 г.

„Варшавскія Университетскія Извѣстія“, вып. 1, 2 и 3, 1912 г.

„Записки Императорскаго Новороссійскаго Университета, физико-математическаго факультета“, вып. II, 1911 г.

„Ученія записки Императорскаго Казанскаго Университета“, кн. I, 2 и 3 за 1912 г.

„Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія“, т. XXXI, вып. I, 1911 г.

„Труды Общества Испытателей Природы при Имп. Харьковскомъ Университетѣ“, т. XLIV (Орнитологическая работа: **Аверинъ В. Г.** „Орнитологическія наблюденія лѣтомъ 1909 и 1910 г.г. въ окрестностяхъ станицы Митякинской, Донецкаго округа.“), 1911 г.

„Природа“, журналъ Николаевского Общества Любителей Природы, № 3, 1911 г.

Журналъ „Птицевѣдѣніе и Птицеводство“, выпуски 3 и 4, 1911 годъ (Орнитологическія статьи: **В. К. Анфиловъ.** „Къ біологіи галки (*Columba monedula* L.)“, **К. В. Лауницъ.** „Наблюденія надъ жизнью птицъ въ неволѣ“ (*Sitta europaea* L. и *Ampelis garrulus* L.), **Д. М. Россинскій.** „Дѣятельность Отдѣленія Орнитологіи по кольцеванію птицъ въ цѣляхъ опытнаго изученія перелетовъ весною 1911 года“, **І. К. Пачоскій.** „Замѣтка о гнѣздованіи шилохвости (*Daifila acuta* Linn.).“

В. Л. Віянки: „Птицы“, т. I, полутомъ 1-ый. Фауна Россіи и сопредѣльныхъ странъ, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. С.-П.Б., 1911 г., цѣна 2 руб. 50 коп. *Отъ Императорской Академіи Наукъ.*

А. К. Линко: „Гидроида“, т. I. Ibid. С.-П.Б., 1911 г., цѣна 2 руб. 15 коп. *Отъ Имп. Академіи Наукъ.*

Отчетъ о дѣятельности Саратовскаго Общества Естествоиспытателей за время съ I. IV. 1910 по I. IX. 1911. Саратовъ, 1911.

Прив.-доц. В. И. Таліевъ: „Задачи изслѣдованія природы мѣстнаго края и роль любителей въ немъ“. Приложеніе къ „Бюлле-

теньямъ Харьковскаго Общества Любителей Природы“, № 1, 1912 г., Харьковъ. *Отъ Общества Любителей Природы.*

Бюллетени Харьковскаго Общества Любителей Природы, № 1. Харьковъ, 1912 г.

Записки Императорскаго Харьковскаго Университета. Книга 1-я, 1912 г.

J. H. Kidder: „Birds of Kerguelen Island“. Bul. of the U. S. N. M. № 2, 1875.

R. Ridgway: „Nomenclature of North American birds“. Bul. of the U. S. N. M. № 21, 1881.

Elliott Coues and Webster Prentiss: „Avifauna Columbiana“. Bul. of the U. S. N. M. № 26, 1883.

U. S. Exhibits, London Fisheries Exhibition, 1883, Catalogues and Reports. Bul. № 27.—U. S. N. M. 1884.

F. A. Lucas: „Expedition to Funk Island“. Sm. Inst. U. S. N. M. 1890.

R. Ridgway: „Directions for collecting birds.“ Sm. Inst. U. S. N. M. 1891.

R. Ridgway: „The Humming Birds.“ Sm. Inst. U. S. N. M. 1892.

R. Ridgway: „Description of a new species of ground warbler from Eastern Mexico“. U. S. N. M. vol. XVIII—№. 1045.

Ch. W. Richmond: „Partial list of birds collected at Alta Mira, Mexico, by Mr. Frank B. Armstrong“. Sm. Inst. U. S. N. M. 1896.

Ch. W. Richmond: „Description of a new species of ant thrush from Nicaragua“. Sm. Inst. U. S. N. M. vol. XVIII—№ 1090.

Ch. W. Richmond: „Catalogue of a collection of birds made by doctor W. L. Abbott, in Eastern Turkestan, the Thian—Shan Mountains, and Tagdumbash, Pamir, Central Asia, with notes on some of the species“. Sm. Inst. U. S. N. M. 1896.

Ch. W. Richmond: „Catalogue of a collection of birds made by doctor W. L. Abbott in Kashmir, Baltistan and Ladak, with notes on some of the species, and a description of a new species of *Cyanecula*“. Sm. Inst. U. S. N. M. 1896.

F. A. Lucas: „The tongues of birds“. Sm. Inst. U. S. N. M. 1897.

H. C. Oberholser: „Birds collected by Dr. W. L. Abbott in the Kilimanjaro Region, East Africa“. Sm. Inst. U. S. N. M. 1905.

I. H. Riley: „A new subspecies of ground dove from Mona Island, Porto Rico“. U. S. N. M. 1905.

C. William Beebe: „A contribution to the ecology of the adult hoatzin“. (With plates 1—7). Smit. Report, 1910.

Henry W. Henshaw: „Migration of the Pacific plover to and from the Hawaiian Islands“. Smit. Report, 1910.

Prof. I. E. Duerden: „The plumages of the ostrich“. (With 8 plates). Smit. Report, 1910.

Edgar A. Mearns: „Descriptions of seven new African Grass-Warblers of the genus *Cisticola*“. Smit. Miscel. Collect., v. 56, num. 25.

E. A. Goldman: „A new Kingfisher from Panama“. Smit. Miscel. Collect., v. 56, num. 27.

Edgar A. Mearns: „Description of a new species of Sunbird, *Helionympha raineyi*, from British East Africa“. Smit. Miscel. Collect., v. 56, num. 28.

H. C. Oberholser: „Notes on birds from German and British East Africa“. U. S. N. M. 1906.

R. Ridgway: „The birds of North and Middle America“. Sm. Inst. U. S. N. M. 1907.

A. H. Clark: „Eighteen new species and one new genus of birds from Eastern Asia and the Aleutian Islands“. U. S. N. M. 1907.

Ch. W. Richmond: „Generic names applied to birds during the years 1901 to 1905, inclusive, with further additions to Warterhouse's „Index generum avium“. U. S. N. M. 1907.

H. C. Oberholser: „A revision of the Kingfisher genus *Ramphalcyon* (*Pelargopsis*)“. U. S. N. M. 1909.

E. A. Mearns: „A list of birds collected by Dr. Paul Bartsch in the Philippine Islands, Borneo, Guam, and Midway Island, with descriptions of three new forms“. U. S. N. M. 1909.

E. A. Mearns: „Additions to the list of Philippine birds, with descriptions of new and rare species“. U. S. N. M. 1909.

R. Ridgway: „Preliminary description of some new birds from the Galapagos Archipelago“. U. S. N. M., vol. XVIII—№. 1067.

R. Ridgway: „Description of a new subspecies of the genus *Peucedramus*. Coues“. U. S. N. M., vol. XVIII—№. 1074.

A. H. Clark: „Report on a collection of birds made by Pierre Louis Jouy in Korea“. U. S. N. M. 1910.

A. H. Clark: „The birds collected and observed during the cruise of the United States Fisheries steamer „Albatross“ in the North Pacific Ocean, and in the Bering, Okhotsk, Japan, and Eastern Seas, from April to December 1906“. U. S. N. M. 1910.

P. L. Jouy: „The Paradise Elycatchers of Japan and Korea“. U. S. N. M. 1910.

H. C. Oberholser: „A revision of the forms of the ladder-backed woodpecker [*Dryobates scalaris* (Wagler)]“. U. S. N. M. 1911.

H. C. Oberholser: „A revision of the forms of the hairy woodpecker [*Dryobates villosus* (Linnaeus)]“. U. S. N. M. 1911.

H. A. Oberholser: „A monograph of the elycatcher genera *Hypothymis* and *Cyanonympha*“. U. S. N. M. 1911.

H. C. Oberholser: „A revision of the forms of the edible-nest swiftlet, *Collocalia fuciphaga* (Thunberg)“. № 1881.—From the Proceedings of the U. S. N. M., vol. 42, pages 11—20. Published March 6, 1912.



Въшелъ изъ печати 21 апрѣля (ст. ст.) 1912 г.—Ausgegeben am 21 April (a. St.) 1912.

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляковъ. Le rédacteur: G. I. Poliakov.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1912 годъ на:

Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета.

Въ Ученыхъ Запискахъ заключаются: I. Отдѣлъ Наукъ. II. Отдѣлъ критики и библиографіи. III. Университетская летопись. IV. Приложения: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей, памятники историческіе и литературные, съ научными комментаріями, и памятники, имѣющие научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученые Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не менѣе 13 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложений.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложениями съ пересылкою 7 р. Подписка принимается въ Правленіи Университета.

Редакторъ А. Пюгтковский.

„Естествознаніе и Географія“. Годъ изданія XVII-й. Выходить ежемѣсячно, за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (іюня—іюля), книжками въ 5—6 печатныхъ листовъ. Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библиотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній и для учительскихъ библиотекъ, учительскихъ институтовъ и семинарій и городскихъ училищъ; Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ ОДОБРЕНЪ за всѣ годы существованія и допущенъ на будущее время въ библиотеки подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеній; Учебнымъ Комитетомъ Министерства Торговли и Промышленности РЕКОМЕНДОВАНЪ въ библиотеки коммерческихъ учебныхъ заведеній.

Журналъ ставитъ себѣ задачей удовлетворять научному интересу читателей въ области естествознанія и географіи, а также способствовать правильной постановкѣ и разработкѣ вопросовъ по преподаванію естествознанія и географіи. Въ журналѣ имѣются отдѣлы: 1) научно-популярныя статьи по всѣмъ отраслямъ естествознанія и географіи, статьи по вопросамъ преподаванія естествознанія теоретическаго и прикладнаго (садоводство, пчеловодство и т. под.) и географіи; 2) аквариумъ и терраріумъ; 3) библиографія (обзоръ русской и иностранной литературы по естествознанію и географіи); 4) хроника; 5) смѣсь; 6) вопросы и отвѣты по предметамъ программы.

Въ журналѣ были помѣщены статьи: И. Я. Акинфьева, А. П. Артари, проф. П. И. Бахметьева, В. Н. Бодырева, Л. И. Бородавскаго, проф. А. Θ. Брандта, В. В. Богданова, П. Вольногорскаго, Н. Н. Вакуловскаго, проф. С. П. Глазенапа, М. Н. Голеникина, проф. А. С. Догеля, М. П. Демкова, Л. Н. Елагина, Е. В. Жадовскаго, Б. М. Житкова, В. Р. Заленскаго, проф. Н. Ю. Зографа, Н. Θ. Золотницкаго, А. П. Иванова, проф. Н. Θ. Кащенко, Н. М. Книповича, проф. Н. П. Кузнецова, проф. И. А. Каблукова, проф. Н. М. Кулагина, проф. Г. А. Кожевникова, М. А. Кожевниковой, проф. А. Н. Краснова, А. Ф. Лайстера, М. Э. Мендельсона, С. П. Меча, проф. Н. В. Насоновъ, Г. А. Наслова, проф. А. М. Никольскаго, К. Д. Нослова, проф. А. П. Павлова, А. Н. Рождественскаго, проф. В. В. Сапожникова, К. А. Сатунина, К. К. Сент-Илера, М. М. Сязова, В. П. Таліева, проф. К. А. Тимирязева, проф. А. А. Тихомирова, П. Р. Фрейберга, проф. Н. А. Холодовскаго, проф. В. М. Шмекевича, П. Ю. Шмидта, проф. Я. П. Щелкановцева, проф. А. Эйхенвальда, Э. В. Эрпксона и нѣкоторыхъ другихъ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 р. 50 коп., на полгода съ пересылкою и доставкою 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цѣну можно получить журналъ за 1903—1910 гг.; за остальные годы (1896—1902) по 4 р. за каждый годъ съ пересылкой. Выписывающіе всю серію за первыя 10 лѣтъ платятъ 35 руб. съ пересылкой. Книжки журнала въ отдѣльной продажѣ стоятъ 75 коп. нажда.

Книжные магазины, доставляющие подписку, могут удерживать за комиссию и пересылку денег только 20 к. съ каждого годового полного экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается. При непосредственномъ обращеніи въ контору допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб. 50 коп. и къ 1-му іюня 2 руб. Другихъ условій разсрочки не допускается.

Контора редакціи: Москва, Донская ул., д. Даниловой, кв. № 3.

Редакторъ-издатель *М. П. Варавва*.

„Труды Бюро по прикладной ботаникѣ“. 5-й годъ изданія.

Подписная цѣна на годъ 3 руб. съ доставкой и пересылкой. „Труды“ выходить по возможности ежемѣсячно (12 номеровъ въ годъ) подъ редакціей Р. Э. Регеля.

Въ складѣ изданій Бюро имѣются въ продажѣ:

„Труды Бюро“ т. т. I, II (1908 и 1909 г. г.) 3 руб.

„ „ т. III, (1910 г.) . . . 3 руб.

„ „ т. IV (1911 г.) . . . 3 руб.

А. Мальцевъ. Изученіе воздѣлываемыхъ растеній, какъ основа развитія отраслей сельскаго хозяйства..... 45 коп.

А. Мальцевъ. Пивоваренные ячмени въ Россіи и настоящее положеніе ихъ въ хозяйствѣ и въ отпускной торговлѣ..... 50 коп.

Р. Регель, К. Фляксбергъ и А. Мальцевъ. Важнѣйшія формы пшеницъ, ячменей и сорныхъ растеній Россіи, съ рис..... 10 коп.

Н. Скалзубовъ. Какъ выводятся новые сорта культурныхъ растеній. Происхожденіе формъ растеній, какъ основа практики сѣменоводства, съ 35 рис. 25 коп.

Дж. Шулль. Иллюстрація закона Менделя 10 коп.

Отдѣльные выпуски „Трудовъ“ по 1 руб.

Цѣны обозначены съ пересылкой. Выписать можно или черезъ редакцію (СПБ., Бабуринъ пер., д. 5) или черезъ книжный магазинъ, Киммеля въ Ригѣ; пробные номера высылаются по требованію бесплатно.

Въ „Трудахъ“ помѣщаются научныя работы изъ области прикладной ботаники, куда относятся всякаго рода изслѣдованія, матеріалы и замѣтки по спеціальному изученію хлѣбовъ, кормовыхъ, огородныхъ, плодовыхъ и прочихъ воздѣлываемыхъ, а также и сорныхъ растеній. Въ „приложеніяхъ“ къ „Трудамъ“ будутъ помѣщаться общедоступныя работы, излагающія современное положеніе нашихъ познаній по различнымъ отдѣльнымъ вышеуказаннымъ отраслямъ. Работы по мѣрѣ необходимости и возможности иллюстрируются. Научныя статьи сопровождаются резюме на одномъ изъ иностранныхъ языковъ, въ которыхъ подробно и по возможности дословно сообщается все то, что представляется новымъ въ данной работѣ. Цифровыя таблицы снабжаются заголовкомъ, а рисунки объяснительнымъ текстомъ на двухъ языкахъ.

Весь доходъ отъ подписки на „Труды Бюро по прикладной ботаникѣ“ обращается на улучшеніе самаго изданія.

Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института.

Извѣстія выходятъ четыремя книжками въ годъ, составляющимъ не менѣе 35 листовъ текста in 8^о.

Программа Извѣстій. Офіціальный отдѣлъ. Правительственныя распоряженія, касающіяся М. С. Х. Института.

Постановленія Совѣта Института и относящіяся къ нимъ приложенія. Работы комиссій, назначаемыхъ Совѣтомъ Института для разслѣдованія различныхъ вопросовъ. Отчеты о командировкахъ членовъ совѣта и другихъ лицъ, служащихъ въ Институтѣ.

Нѣкоторые изъ журналовъ засѣданій Сельско-хозяйственнаго комитета, состоящаго при Институтѣ, а именно тѣ, которые имѣютъ особенное значеніе для учебной и ученой дѣятельности Института.

Годичный отчетъ о состояніи Института (въ приложеніи).

Неофіціальный отдѣлъ. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студентовъ Института и постороннихъ лицъ.

Какъ отдѣльныя самостоятельныя изслѣдованія, такъ и совмѣстныя работы, исполненныя въ лабораторіяхъ, кабинетахъ, на опытномъ полѣ, или на опытной станціи, пастѣхъ, въ лѣсной дачѣ, огородѣ, питомникѣ, саду и пр.

Метеорологическія наблюденія, произведенныя на обсерваторіи Института.

Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, чертежами, діаграммами и пр. и, по желанію автора, краткимъ резюме на какомъ-либо иностранномъ языкѣ (резюме должно быть составлено самимъ авторомъ и прислано въ редакцію одновременно со статьею).

Подписка принимается въ канцеляріи Московскаго Сельскохозяйствен. Института и въ книж. магаз. Карбасникова (Москва, Варшава, Вильна, С.-Петербургъ).

Подписная цѣна въ годъ, за четыре книги, 5 р.; для студентовъ высшихъ учебныхъ заведеній 2 р. 50 к.; цѣна отдѣльной книги 1 р. 50 к.

Редакторы *С. П. Ростовцевъ.*
Д. Н. Прянишниковъ.

„Извѣстія Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера“

Годъ изданія четвертый. (Журналъ жизни сѣвернаго края)
Выходить 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца. Задачи и цѣли общества опредѣляютъ и задачи „Извѣстій“.

Программа журнала: Указанія. Распоряженія и постановленія правительственныхъ и общественныхъ учрежденій центральныхъ и мѣстныхъ, имѣющія отношенія къ жизни Сѣвера. Текущая дѣятельность Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера. Отдѣльныя статьи и доклады по изученію Сѣвера и выясненію условій его развитія. Обсужденіе предположеній, направленныхъ къ измѣненію условій жизни и производительности Сѣвера. Хроника частной, правительственной и общественной инициативы въ дѣлѣ изученія Сѣвера, развитія его производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя замѣтки и сообщенія о жизни края и ея изученія. Очерки жизни. Сообщенія изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами Сѣвера. Обзоръ литературы о Сѣверѣ. Справочный отдѣлъ. Консультанія по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества (отвѣты редакціи). Объявленія.

Подписная плата: 1) для членовъ Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера 3 руб. въ годъ; 2) для прочихъ подписчиковъ 4 руб. въ годъ. Допускается разсрочка по полугодіямъ и по четвертямъ года, при взносѣ денегъ впередъ. Плата за объявленія на первой страницѣ журнала—20 коп. за строку цѣвта, на послѣдней—10 коп.

Подписка на „Извѣстія А. О. П. Р. С.“ принимается во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Имперіи безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ.

Въ Архангельскѣ подписка и объявленія принимаются: въ Библіотекѣ, въ Обществѣ въ зданіи Городской Думы, въ Городск. Публичной библіотекѣ, въ Магази́нѣ Об-ва Потребителей и въ книжныхъ магазинахъ: Булычевой, Машковской и Копанъ.

Гг. иногородніе публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по адресу: Архангельскъ, Правленіе Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера. Рукописи слѣдуетъ направлять по адресу редакціи. Статьи и корреспонденціи оплачиваются по усмотрѣнію редакціи. Пробныя №№ высылаются за 4 семикоп. маркы. За перемѣну адреса взимается 4 семик. маркы.

Издатель *Архангельское Общество
изученія Русскаго Сѣвера.*

Редакторъ *В. Ленгауэръ*

„Любитель Природы“. Годъ VII-й. Популярный ежемѣсячный журналъ для любителей и учащихся. Органъ Общества Любителей Природы въ С.-Петербургѣ. Утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія мѣсячнѣмъ Ученаго Комитета опредѣлено ввести журналъ въ списокъ издавій, заслуживающихъ вниманія при пополненіи ученическихъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Утвержденнымъ Г. Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ являемъ Ученаго Комитета журналъ за 1906 годъ одобренъ для библиотекъ подвѣдомственныхъ Главному Управленію учебныхъ заведеній.

Журналъ рекомендованъ въ циркулярѣ по военно-учебнымъ заведеніямъ для фундаментальныхъ и ротныхъ библиотекъ военно-учебныхъ заведеній.

Постановленіемъ Ученаго Комитета Министерства Торговли и Промышленности журналъ рекомендованъ для библиотекъ коммерческихъ училищъ.

Программа журнала: Растеніе и его жизнь въ естественныхъ и искусственныхъ условіяхъ (комнатная культура, оранжерейная и проч.). Животное царство—акваріумъ, терраріумъ и виваріумъ; пѣвчія и декоративныя птицы. Изготовленіе коллекцій по растительному и животному царствамъ.

Кромѣ оригинальныхъ и переводныхъ статей по перечисленнымъ рубрикамъ, въ журналѣ помѣщаются также: 1) соотѣты начинающимъ любителямъ; 2) мелкія замѣтки; 3) свѣдѣнія о дѣятельности Общества Любителей Природы и другихъ обществъ и учрежденій, преслѣдующихъ аналогичныя задачи; 4) критика и библиографія; 5) вопросы и отвѣты; 6) объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками, въ 2 печатныхъ листа, съ рисунками и чертежами въ текствѣ и на отдѣльныхъ листахъ.

Въ 1912 году при журналѣ будутъ разосланы сѣмена растеній годныхъ для комнатной и воздушной культуры.

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкою 3 руб. На пересылку подъ заказной бандеролью прилагаемыхъ къ журналу цвѣтвыхъ таблицъ къ подписной платѣ слѣдуетъ прибавлять 21 коп. За перемѣну адреса высылатъ 25 коп. (можно марками). Члены Общества Любителей Природы, уплатившіе годовой членскій взносъ (5 руб.), получаютъ журналъ бесплатно. Журналъ за 1-ый годъ изданія (1906 г.) разошелся сплошн. Полный годовой комплектъ журнала за 1907 г. со всеми приложеніями (въ томъ числѣ 3 цвѣтвыхъ таблицы) высылается за 4 руб.; за 1908 и 1909 и 1910 гг.—по 3 руб. 50 коп. съ пересылкой. Объявленія, для помѣщенія въ журналъ, принимаются въ конторѣ редакціи за плату: по 10 руб. за страницу, 6 руб. за $\frac{1}{2}$ страницы, 4 руб. за $\frac{1}{4}$ страницы, 2 руб. 50 коп. за $\frac{1}{8}$ страницы и 1 руб. 50 коп. за $\frac{1}{16}$ страницы—за одинъ разъ. При повтореніи—скидка по соглашенію.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ конторѣ редакціи у В. И. Разумова (Спб., Екатерининская ул., 3, кв. 65), а также во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: Спб., Петербургская Сторона, Звѣрнская ул., 17А, кв. 7.

Редакторъ И. Мамонтовъ.

„Птицеводное Хозяйство“. Органъ Императорскаго Россійскаго Общества Сельско-Хозяйственнаго Птицеводства. Годъ изданія 14-й. Подписная цѣна: въ годъ—3 р., на $\frac{1}{2}$ года—1 р. 50 к., на 3 мѣс.—75 к. Для членовъ Общества и Отдѣловъ, а равно и для сельскихъ школъ, народныхъ учителей и духовенства на годъ—2 р. съ доставкой и пересылкой во всѣ мѣстности Россійской Имперіи.

Цѣна отдѣльнаго номера 15 к. За перемѣну адреса—7 к. Программа журнала включаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: I.—Оффиціальныя: распоряженія правительства, извѣщенія отъ Общества, протоколы засѣданій Совѣтовъ и общахъ собраній Центрального Общества и Отдѣловъ. II.—Отчеты о дѣятельности Общества и Отдѣловъ. III.—Отчеты о птицеводныхъ выставкахъ Центрального Общества, Отдѣловъ и другихъ Обществъ. IV.—Оригинальныя и переводныя статьи по птицеводству. V.—Описаніе птицеводныхъ хозяйствъ. VI.—Новости Птицеводства. VII.—Замѣтки по птицеводству.

VIII.—Корреспонденция. IX.—Среди газет и журналов. X.—Хроника. XI.—Вопросы и ответы. XII.—Объявления.

Кроме того, будут помещаться статьи по голубеводству, кролиководству и козоводству.

Подписка принимается в конторѣ редакціи журнала „Птицеводное Хозяйство“—Москва, Театральная площадь, Музей птицеводства.

Редакторъ Д. Халтуринъ.

„Наша Птицеводная Жизнь“. Открыта подписка на 1912 годъ на единственный въ Россіи большой частный иллюстрированный ежемѣсячный журналъ прогрессивнаго птицеводства, кролиководства и козоводства. (Подписной годъ считается съ Октября по Октябрь). VI-й г. издаваемый съ 1906 г. въ Клишинево при ближайшемъ участіи извѣстныхъ отечественныхъ дѣателей по названнымъ выше отраслямъ сельскаго хозяйства (съ отдѣломъ собаководства). Программа журнала прежняя:

Подписная цѣна: а) съ пересылкой и доставкой во все города и мѣстности Россіи на годъ 3 руб. Отдѣльные номера 25 к.; б) за границу на годъ 5 руб. Для земствъ, народныхъ учителей и сельскаго духовенства и крестьянъ 2 руб. въ годъ. При выпискѣ 10 экземпляровъ—одиннадцатый бесплатно. Новые подписчики получаютъ все номера отъ начала года. Подписные деньги адресовать: г. Кіевъ, Кадетскій корпусъ, барону Гейкингу.

Ответственный редакторъ-издатель, сотрудникъ Департамента Земледѣлія по птицеводству, баронъ Г. А. Гейкинъ.

„Сельское хозяйство и лѣсоводство“. Открыта подписка на ежемѣсячный журналъ Главнаго управленія землеустройства и земледѣлія 1912 г. LXXII г. Журналъ ставитъ себѣ задачей—служить проводникомъ агрономическихъ знаний и быть органомъ дѣателей въ области сельскаго хозяйства, какъ научной, такъ и практической. Съ этою цѣлью на страницахъ „Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства“ будутъ помещаться: 1. Оригинальныя статьи техническаго и экономическаго характера по всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, не исключая землеустройства, переселенія, колонизаціи, рыбныхъ и звѣринныхъ промысловъ, а равно и лѣсоводства. 2. Обзоры русской и иностранной литературы по сельскому хозяйству. 3. Библіографія изданій, отвѣчающихъ характеру и программѣ журнала. 4. Переводы навболѣе выдающихся произведеній иностранной сельско-хозяйственной литературы въ видѣ приложеній къ журналу отдѣльными листами. 5. Объявленія. „Сельское Хозяйство и Лѣсоводство“ выходитъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ 15 печатныхъ листовъ, съ рисунками. Подписная цѣна на журналъ съ доставкой и пересылкой: въ Россіи на годъ 6 руб., на полгода 3 руб., въ государствахъ почтоваго союза на годъ 8 руб., на полгода 4 руб. Отдѣльный номеръ 1 руб. За квитанцію въ приемъ подписной платы доплачивается 5 коп.

Полные комплекты журнала за 1901—1905 гг. продаются по 7 р., за 1906 г.—по 3 р., за 1909 г. (съ двумя книжками за 1908 г. и приложеніемъ: В. Гарвудъ — „Созданіе новыхъ растительныхъ формъ. Очеркъ жизни и дѣятельности Л. Бербенка“), за 1910 годъ съ приложеніемъ: Г. Де-Фризъ — „Племенное растениеводство (сортосоводство)“—по 6 руб. за годовой экземпляръ съ пересылкой, и за 1911 годъ съ приложеніемъ: В. А. Генри — „Корма и кормленіе“.

Подписка принимается в конторѣ журнала „Сельское Хозяйство и Лѣсоводство“—С.-Петербургъ, Вас. Остр., 10 л., д. 23, кв. 31.

Редакторъ П. М. Дубровскій.

„Плодоводство“ принимается подписка на 1912 годъ на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ. Издаваемый Императорскимъ Россійскимъ Обществомъ Плодоводства 1912 годъ—XXIII годъ изданія.

Журналъ содержитъ слѣдующіе отдѣлы: I. Извѣстія о дѣятельности Общества. II. Статьи: а) по плодоводству. б) по огородничеству и спеціальнымъ культурамъ, в) по садоводству при народныхъ школахъ. III. Корреспонденція. IV. Обзоръ спеціальныхъ журналовъ. V. Разныя извѣстія. VI. Библиографія. VII. Вопросы и отвѣты. VIII. Объявленія.

Въ 1912 г. подписчики, кромѣ хромофотограф. табл. плодовъ и сѣмянъ полезныхъ растений, получаютъ въ видѣ **безплатныхъ приложеній**: 1) Новое иллюстрированное сочиненіе П. М. Еремѣева, подъ редакціей А. С. Вондарцева: Грибныя болѣзни плодовыхъ и огородныхъ растений. Часть I. Болѣзни плодовыхъ гераней и борьба съ ними. 2) иллюстриров. книжку, составл. по сочиненію всемірно извѣстнаго пловоода Р. Гете „Использованіе стѣнъ для шпалерной культуры плодовыхъ деревьевъ и винограда“ и 3) новое иллюстриров. сочиненіе К. П. Сахновскаго: „Доходный садъ и огородъ русскаго крестьянина“, удостоенное 1-й преміи имени П. С. Крюкова, за лучшія брошюры по плодоводству для народа.

Въ 1912 г. въ журналъ „Плодоводство“ будетъ напечатанъ рядъ статей по плодоводству въ популярномъ изложеніи, приуроченномъ для народной школы и хуторянъ.

Подписная плата съ доставкой и пересылкой два рубля въ годъ (за границу три рубля).

Подписка принимается въ конторѣ редакціи—С.-Петербургъ. Чернышевъ пер., № 16.

За объявленія взимается: за 1 страницю—15 р., $\frac{3}{4}$ стран.—12 р., $\frac{1}{2}$ стран.—9 р., $\frac{1}{4}$ стран.—5 р., $\frac{1}{8}$ стран.—3 р. Если объявленіе печатается 6 разъ, то дѣлается скидка въ 100%, а если 12 разъ, то 200%. За разсылку приложеній, вѣсомъ не болѣе лота, съ каждой 1000 экз. платится 8 р. и за каждый лишній лотъ по 4 руб.

Редакторъ В. Эндерс.

„Лѣсной Журналъ“. XLII годъ изданія. Изданіе Лѣсного Общества въ С.-Петербургѣ. Въ 1912 году будетъ выходить 10 выпусками въ общемъ свыше 80 печатныхъ листовъ съ таблицами, планами, картами, рисунками и портретами. Журналъ печатается въ количествѣ 2000 экземпляровъ.

ПРОГРАММА: I. Оригинальныя статьи по всемъ отраслямъ лѣсного хозяйства: лѣсовѣдѣнію и лѣсоводству, методикѣ изученія лѣсоводственныхъ вопросовъ и лѣсной таксаціи, экономикѣ и организаціи лѣсного хозяйства, оцѣнкѣ лѣсовъ, лѣсной статистикѣ, исторіи лѣсного хозяйства и вопросамъ государственнаго лѣсного хозяйства. II. Рефераты и переводныя статьи по тѣмъ же отраслямъ лѣсного хозяйства. III. Извѣстія о дѣятельности Лѣсныхъ Обществъ. IV. Правительственныя распоряженія. V. Лѣсоторговля замѣтки. VI. Хроника. VII. Библиографія и новыя книги. VIII. Вопросы и отвѣты. IX. Письма въ Редакцію.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 6 рублей въ годъ, съ пересылкой и доставкой. Учащіеся при непосредственномъ обращеніи къ г. Казначею Общества (а не черезъ книжные магазины) могутъ получать журналъ за половинную плату, т. е. за 3 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Лѣсномъ Обществѣ (у Спснаго моста, д. Министерства Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ).

Статьи и письма въ редакцію просить адресовать на имя редактора: Спб. Императорскій Лѣсной Институтъ, проф. Г. О. Морозову. Подписныя же деньги и плату за объявленія г. Казначею Лѣсного Общества Леониду Петровичу Серебрякову. Спб. Лѣсной Департаментъ.

Полныя экземпляры Лѣснаго Журнала за прошлые годы продаются по слѣдующимъ цѣнамъ: 1) до 1905 года—по 3 руб. за годъ. 2) съ 1905 года по 6 руб. за годъ. 3) Полный же комплектъ за всѣ годы, исключая: 1871, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 96, 97, 98, 1904, 1908 и 1909, которыхъ уже нѣтъ, продается за 28 руб. 4) Отдѣльные №№ Л. Ж.—до 1905 г. по 50 к., а съ 1905 по 1 руб.

Такса для объявлений. Позади текста: за 1 стр. (in 8⁰) 12 р., 1/2 стр. 7 р., 1/3 стр. 4 р., 1/8 стр. 2 р. 50 к., 1/16 стр. 1 р. 50 к. Впереди текста: за 1 стр. (In 8⁰) 18 р., 1/2 стр. 10 р., 1/3 стр. 6 р., 1/8 стр. 4 р., 1/16 стр. 2 р. За повторный объявление дѣлается уступка: за 3 раза—20⁰/о за 6 разъ—30⁰/о и за 10 разъ—50⁰/о. За разсылку при журналѣ объявленій пѣсомъ каждое отдѣльно не тяжелѣе одного лота, взимается восемь рублей съ тысячи экземпляровъ. За каждый лишній лотъ приплачивается 5 рублей съ тысячи. Деньги уплачиваются при заказѣ всѣ сполна.

Редакторъ проф. Г. О. Морозовъ.

„СЕМЬЯ ОХОТНИКОВЪ“. V годъ изданія. Открыта подписка на вѣнанный журналъ Выходить два раза въ мѣсяцъ. 24 №№ 4 р. 50 к. Допускается подписка по четвертямъ года и по полугодию (1 р. 25 к. и 2 р. 50 к.).

Программа изданія отвѣчаетъ всѣмъ запросамъ охотничьей жизни, обнимаетъ собой всѣ виды нашихъ разнообразныхъ охотъ—пеовой, ружейной, охоты съ ловчими птицами.

Спеціальныя отдѣлы по вопросамъ: охотничье оружіе, собаководство, диче-разведение, орнитологія, маммологія, рыболовство, беллетристика, описаніе различныхъ способовъ охоты, обзоръ выставокъ, сѣдокъ и полевыхъ испытаній, хреника, корреспонденція, вопросы и отвѣты.

Подписчики журнала получаютъ безплатную премію: „Детвыя Собаки“, при участіи лучшихъ знатоковъ охотничьей собаки. Дича, внесенная деньгами частими, получать указанную премію при последнемъ взносе.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Алферики С. Н., Бутурлинъ С. А., Бровцевъ И. С., Владиміевъ Д. А., Востриковъ Б. Д., Гешель Л. К., Даниловъ А. О., Де-Конинъ Л. В., Диковъ В. И., Донникъ П. Я., Дмитріева-Сулима М. Н., Дубенскій Э., Зарудный Н. А., Жбановъ К. М., Елицуръ В. Г., Ивашенцевъ А. П., Калитовскій Г. З., Карповъ А. К., Карчевъ С. А., Карчевъ С. С., Качиони С. С., Кияш-ташъ, Кашенскій Н. П., Корчемкинъ Г. Г., Коныловъ П. Н., Ланге П. В., Лебедевъ В. А., Лейдекеръ С. К., Леоповъ А. П., Ляливъ А. Н., Ливницкій К., Мамонтовъ В. С., Оглоблинъ Н. А., Опочининъ Е. Н., Орнатскій И. В., Пачоскій П. К., Песчанскій І. П., Поздниковъ А. А., Полторацкій А. В., Поплавскій І. Я., Проккура К. А., Разевигъ В. А., Разуваевъ В. Н., Рашевскій Н. Н., Романовскій Л. Н., Саблинъ П. Н., Санчо Г., Сатушинъ К. А., Селастенниковъ А., Скрипкинъ В. О., Столировъ А. В., Сумароковъ К. В., Тарвевскій Г. В., Терещенко К. І., Тюльпановъ А. С., Ушаковъ В. Е., Шиповъ Н. А., Финогеновъ В. П., Эвельмейеръ А. К., Эмке А. О., Яблонскій Н. І., и другіе.

Подписка принимается: въ редакціи (Москва, Суцескскій туникъ, д. № 11, кв. 2, телефонъ № 166-38); въ оружейныхъ и книжныхъ магазинахъ г. Москвы и во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи.

Пробный № высылается за 14 к. почтовыми марками.

Рыболовъ и Охотникъ, открыта подписка на 1912 годъ на двухнедѣльный иллюстрированный журналъ, издаваемый въ Ваткѣ съ 1909 года.

Журналъ издается по типу лучшихъ французскихъ спортивныхъ журналовъ, по программамъ: Законы и правительственныя распоряженія по рыболовству и охотѣ.—Поѣвствіа, рассказы, стихотворенія, описанія.—Спеціальныя статьи по руж. техникѣ, собаководству.—Наши прѣсноводныя рыбы: ихъ описаніе и способы ловли.—Рыболовныя снасти: удлища, кружки, лески и т. д.—Приманки и прикормки. Галерея писателей рыболововъ и охотниковъ.—Рыболовство.—Изъ жизни общества и кружковъ.—Хроника.—За границей.—По Россіи.—Смѣсь.—Отвѣты на вопросы.—Рисунки, каррикатуры.—Особые приложенія—картины съ фотографій С. А. Лобовикова. Доплатная премія—„Запаски объ ужении рыбы“ С. Т. Аксакова съ портретомъ и биографіей автора.

Подписная цена: без премия на годъ 2 р., $\frac{1}{2}$ года—1 р. 10 к., съ премией на годъ—2 р. 50 к., $\frac{1}{2}$ г.—1 р. 60 к. Проб. № за 7 к. марку.

Подписка принимается: въ редакціи, Витка, Николаевская, д. Берманъ и во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи.

Ред.-издатель *О. Куниловъ*.

Физикъ-Любитель. Изд. съ 1904 г. Общеизвестный журналъ по физическимъ наукамъ и ихъ приложеніямъ въ школь, технику любительской практикѣ.

Постоянные отдѣлы журнала: астрономія, радиоактивные явленія и электронная теорія, самодѣльные приборы, химія любителя, воздухоплаваніе, домашняя электротехника, любительская фотографія, переписка читателей, запросы и отвѣты.

Подписной годъ учебный (съ августа по май). 20 № въ годъ. Цена: 3 руб. въ годъ. Наложениемъ платежомъ на вышедшіе №№ 3 р. 20 к.

Отзывы печати, подробная программа, образцы рисунковъ, содержаніе за прошлые годы и каталоги изданій и діапозитивовъ высылаются бесплатно по первому требованію.

При конторѣ журнала: 1) складъ изданій „Физика-Любитель“. 2) Складъ діапозитивовъ для волшебнаго фонаря. Гор. Николаевъ, Херс. губ.

„Литературно-Медицинскій Журналъ“ Открыта подписка на ежемѣсячное изданіе въ 1912 г. подъ редакціей д-ра Б. А. Окса. Пятнадцатый годъ изданія. Учебнымъ отдѣломъ Министерства Торговли и Промышленности рекомендованъ для фундаментальныхъ библиотекъ подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеній. Подписчики „Литературно-Медицинскаго Журнала“ получаютъ бесплатно ежемѣсячный народный медицинскій Журналъ „Домашній Докторъ“ подъ редакціей д-ра Б. А. Окса. Въ журналѣ общепонятнымъ языкомъ излагается все, что способствуетъ охраненію здоровья и продленію жизни.

Болезни, предупрежденіе и лѣченіе ихъ.—Домашній лѣчебникъ.—Домашняя ветеринарія.—Растительный столъ.—Практическая медицина.—Общественная медицина.—Медицинскія замѣтки.—Почтовый ящикъ для отвѣтовъ на вопросы читателей. Въ 1912 году въ „Литературно-Медицинскомъ Журналѣ“ будутъ напечатаны:

1. Научный отдѣлъ. Проф. Заблудовскій. „Техника массажа“. Переводъ съ 3-го нѣмецк. изданія (1911 г.), измѣненнаго и дополненаго д-ромъ Г. Эйгеромъ, главнымъ врачомъ амбулаторіи для массажа въ Берлинѣ. Съ 80 рисунками въ текстѣ.—Д-ръ Е. А. Аркинъ. „Мозгъ и душа“.—Д-ръ мед. В. Гаммеръ. „Половое несчастье женщины“ (перев. съ нѣм.)—Д-ръ мед. С. М. Аренскій. „Домашнія лѣчебныя средства“.—Магистръ Г. Миндесъ. „Несовмѣстимыя лѣкарственные средства и неразумные рецепты“.—Проф. А. Келлеръ. „Первая врачебная помощь при поврежденіяхъ“.—Проф. А. Форель. „Гипнотизмъ и лѣченіе внушеніемъ“ (окончаніе).—Женщина-врачъ М. Ф. Мохначева. „Болезни дѣтей и уходъ за больными дѣтьми“ (окончаніе).—„Санитаръ“. Первая помощь при внезапныхъ заболѣваніяхъ и въ несчастныхъ случаяхъ. Съ 104 рис. въ текстѣ. Перев. съ 2-го изданія прусскаго министерства внутреннихъ дѣлъ.

II. Литературный отдѣлъ: Д-ръ А. Н. Муморцевъ. „Страхъ смерти въ произведеніяхъ Льва Толстого“.—Д-ръ В. М. Бурлаковъ. „Л. Н. Толстой—великій психологъ интуиціи“.—М. Цитронъ. 1) „Незамѣтное“. 2) „Этотъ служить будетъ“ (изъ фельдшерскаго быта).—Н. Савета. „Бунтъ сумасшедшихъ“.—Н. К. Бѣлецкій. „Товарищи по несчастью“ (разсказъ).—Бор. Фромметъ. „Самоубійства, какъ барометръ“.—Д-ръ Н. Филончиковъ. „Сила внушенія“.—В. Бруснянъ. „Литературное обозрѣніе“; разборъ новыхъ книгъ и произведеній, соприкасающихся съ медициной и появляющихся въ текущей журнальной литературѣ.

III. Библиографія.

IV. Двѣнадцать №-ровъ Журнала „Домашній Докторъ“ съ разнообразнымъ содержаниемъ.

Цѣна „Литературно-Медицинскаго Журнала“: четыре рубля за годъ, два рубля за полгода и одинъ рубль за 3 мѣсяца съ перес.

Подписка на „Литературно-Медицинскій Журналъ“ принимается во всѣхъ почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Россійской Имперіи, безъ всякой надбавки подписной цѣны, а также въ конторѣ редакціи (С.-Петербургъ, Офицерская, 26). Желающіе воспользоваться разсрочкой обращаются исключительно въ контору журнала. Редакція отвѣчаетъ за исправную доставку своихъ изданій при подпискѣ чрезъ контору редакціи, а также чрезъ всѣ почтово-телеграфныя учрежденія въ Россіи.

С.-Петербургъ, Офицерская, 26.

Редакторъ-издатель д-ръ Б. А. Оксз.

„Вѣстникъ Любителя Акваріума и Терраріума“,

двухнедельный журналъ, издаваемый Кіевскимъ Обществомъ любителей природы.

Въ журналѣ помѣщаются статьи о содержаніи рыбъ и другихъ водныхъ животныхъ въ акваріумѣ и на открытомъ воздухѣ,—объ обитателяхъ терраріума и уходѣ за ними, о комнатной культурѣ растений. Кромѣ того ведутся постоянные отдѣлы: Обзоріе русской и иностранной литературы по акваріуму и терраріуму, любительская хроника и сезонныя замѣтки, заключающія въ себѣ описаніе всѣхъ работъ любителя акваріума и комнатныхъ растений. Особое вниманіе редакція обращаетъ на школьный отдѣлъ, впервые въ Россіи введенный при нашемъ журналѣ.

Кромѣ художественныхъ приложений на отдѣльныхъ листахъ, какъ черныхъ, такъ и въ краскахъ, въ 1912 г. всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ разсылаться и литературныя приложенія, въ томъ числѣ монографія, посвященная лабиринтовымъ рыбамъ, кромѣ того подписчикамъ будетъ разсылаться вторая часть монографіи „Семейство Cyprinodontidae, зубатые карпы“, заключающая въ себѣ описаніе всѣхъ введенныхъ когда-либо въ Европу живородящихъ рыбокъ этого семейства.

Первую часть г. подписчики могутъ получать при уплатѣ 75 копѣекъ.

Вѣстникъ Любителя Акваріума и Терраріума Ученымъ Комитетомъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія (Журналъ Ученаго Комитета за № 351) признаетъ заслуживающимъ вниманія при пополненіи библіотекъ, подѣдомственныхъ Главному Управленію учебныхъ заведеній.

Подписная цѣна, со всѣми приложеніями, остается прежняя 3 руб. 50 коп. въ годъ.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 1 руб. 50 коп. къ 1 Апрѣля 1 руб., къ 1 Августа 1 руб. Проспекты бесплатно.

Подписной годъ съ 1-го Января 1912 года по 1-е Января 1913 года.

Такъ какъ, вѣдъ навстрѣчу желаніямъ г.г. подписчиковъ, мы переимѣнили срокъ подписки съ 1 Марта на 1 Января и старые подписчики благодаря этому получаютъ въ 1912 году не 24 №№, а 20 (т. е. до 1 Марта пми уже уплачено), то подписная цѣна для старыхъ подписчиковъ, со всѣми приложеніями, назначается не 3 руб. 50 коп., а 2 руб. 95 коп. въ годъ съ доставкой и пересылкой.

Адресъ редакція и конторы; Кіевъ, Львовская, д. № 45.

Редакторъ Б. Тимофѣевичъ.



„Энтомологическій Вѣстникъ“. Журналъ прикладной и чисто-научной энтомологіи, издаваемый Киевскимъ Обществомъ Любителей Природы подъ редакціею приватъ-доцента университета св. Владиміра **В. П. Поспѣлова** и реподавателя Киевск. Политехн. Инстит. **А. Г. Лебедева**.

Въ программу журнала входятъ оригинальныя и переводныя статьи по біологіи вредителей и выработкѣ мѣръ борьбы съ ними; по испытанію приборовъ, употребляемыхъ для борьбы съ вредителями, а также инсектицидовъ; оригинальныя статьи по фаунѣ, біологіи, и анатоміи насѣкомыхъ вообще; рефераты наиболѣе интересныхъ новостей русской и иностранной литературы по энтомологіи; свѣдѣнія о дѣятельности энтомологическихъ обществъ, станцій, музеевъ, какъ русскихъ, такъ и заграничныхъ; отчеты объ экскурсіяхъ; практическія замѣтки по коллектированію насѣкомыхъ. Кромѣ того въ журналѣ будутъ помѣщаться протоколы засѣданій энтомологической секціи Киевскаго Общества Любителей Природы.

Изъ оригинальныхъ статей въ первомъ № журнала будутъ, между прочимъ, помѣщены: **И. Я. Шенывева:** Паразиты и сверхпаразиты изъ міра насѣкомыхъ (со многими оригинальными рисунками). **В. В. Остермана:** Сосновый шелкокрыль (*Gastropachus pini*) въ Заблужинскомъ лѣсничествѣ (Полтавск. губ.). **Н. В. Курдюмова:** Новый сѣмяѣдъ на клеверѣ (*Eurytoma gibba*). Его же. Особенности превращенія у колбопопныхъ насѣкомыхъ (съ оригин. рисунк.). **А. А. Хохрякова.** Результаты испытанія нѣкоторыхъ конныхъ опрыскивателей на Станціи испытанія земледѣльческихъ машинъ и орудій Киевскаго Политехническаго Института (съ чертежами, рисунками и диаграммами) и др.

Журналъ выходитъ два раза въ годъ, въ мартѣ и сентябрѣ. Подписная цѣна: 2 р. за выпускъ.

Подписку принимаетъ Правленіе Киевскаго Общества Любителей Природы (Кіевъ, Большая Владимірская ул. 51. Тамъ же принимаются объявленія.

Все же касающееся редакціи просить посылать по адресу: *Кіевъ*, Вульварная ул., 9. Энтомологическая Станція при Земледѣльскомъ Синдикатѣ.

Записки ИМПЕРАТОРСКАГО Харьковскаго Университета на 1912 годъ,

выходятъ 4 раза въ годъ книжками въ объемѣ отъ 20 до 25 печатныхъ листовъ.

Содержаніе книжекъ: I. Оффиціальныи отдѣлъ (годинныи отчетъ университета, отчеты объ ученыхъ командировкахъ, отзывы о диссертацияхъ и сочиненіяхъ). II. Научный отдѣлъ (статьи и изслѣдованія). III. Критика и библіографія. IV. Научныи извѣстія. V. Лѣтопись университета. VI. Приложенія (курсы профессоровъ; результаты наблюденій метеорологической станціи при Харьковскомъ Университетѣ).

Подписная цѣна: 5 рублей въ годъ съ пересылкой, 4 рубля безъ пересылки; для студентовъ Харьковскаго Университета 2 рубля.

Адресъ редакціи „Записокъ Харьковскаго Университета“: Харьковъ, въ зданіи Университета.

Редакторъ проф. С. Кульбанинъ.

„Природа“

Открыта подписка на 1912 г. на журналъ Николаевскаго Общества Любителей Природы.

Программа журнала: I. Оригинальныя и переводныя статьи по научному и прикладному естествознанію. II. а) Популярныя лекціи по различнымъ предметамъ естествознанія; б) доклады, читанныя въ собраніяхъ Общества; с) рефераты докладовъ, читанныхъ въ собраніяхъ Общества, и не поступившихъ въ печать; д) отчеты Общества. III. Научная хроника. Научныя новости. Новыя книги. Критика и библіографія. IV. Совѣты начинающимъ любителямъ. Вопросы и отвѣты по предметамъ естествознанія. Объявленія.

Въ 1912 году выйдетъ 6 выпусковъ. Подписная плата на годъ съ пересылкой 2 руб. 30 коп. Для г.г. членовъ общества 1 рубль.

Подписка принимается въ редакціи (Николаевъ, Херс. губ., Алексѣевская 82).

Редакторъ А. П. Сапонниковъ.

Ветеринарно-Фельдшерская Жизнь. Годъ изданія 1-ый.

Двухнедѣльный журналъ, посвященный разработкѣ вопросовъ профессиональной жизни ветеринарныхъ фельдшеровъ. I. Статьи по вопросамъ ветеринарно-фельдшерскаго образованія. II. Правовыя, общественныя, матеріальныя и бытовыя условія дѣятельности ветеринарныхъ фельдшеровъ. III. Статьи, рефераты, замѣтки и сообщенія научнаго характера, имѣющія интересъ для практической дѣятельности ветеринарныхъ фельдшеровъ. IV. Замѣтки о народной ветеринаріи. V. Письма читателей. VI. Библіографія. VII. Хроника.

Журналъ „Ветеринарно-Фельдшерская Жизнь“ выходитъ 1-го и 15 числа каждаго мѣсяца въ объемѣ отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ въ каждомъ номерѣ.

Въ 1912 году всѣ подписчики получаютъ слѣдующія шесть бесплатныхъ приложений подъ общимъ заглавіемъ „Библіотека Ветеринарнаго Фельдшера“: I. Руководство по молочному хозяйству. II. Опредѣленіе возраста лошадей по зубамъ. III. Главнѣйшія болѣзни птицъ и ихъ лѣченіе. IV. Кастрація лошадей. V. Копытныя болѣзни. VI. Сборникъ разсказовъ русскихъ писателей изъ жизни ветеринарныхъ фельдшеровъ.

Годовая плата на журналъ съ доставкой и пересылкой 2 р. Разсрочка не допускается.

Объявленія принимаются по 10 к. за 1 строку петита въ одинъ столбецъ.

Ветеринарные фельдшера, ищущіе занятій по специальности, помѣщаютъ объявленія въ журналъ „Ветеринарно-Фельдшерская Жизнь“ бесплатно.

Адресъ Редакціи и Конторы: С.-Петербургъ, Херсонская, 10.—Телеф. № 165—61.

Матеріальную отвѣтственность принимаетъ на себя издательство журнала „Животноводство“.

Издатель В. Истоминонъ.

Редакторъ Ѳ. Платоновъ.



ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

„НОВАГО ВРЕМЕНИ“

поступила въ продажу книга (съ рисунками):

В. Дементьевъ и А. Троицкій.

Рациональное разведеніе,

естественные способы добыванія и сбытъ въ Россіи и
заграницей муравьиныхъ яицъ, мурашки и мучныхъ червей.

Цѣна 50 коп.



Открыта подписка на 1912 г.

НА

„ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ“.

„Messager Ornithologique“.— „Ornithologische Mitteilungen“.

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ.

Выходить въ годъ четыре книжки, объемомъ каждая не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ, двѣ до и двѣ послѣ лѣтняго сезона.

Журналъ имѣетъ своей цѣлью объединять орнитологическія работы русскихъ ученыхъ, способствовать ознакомленію охотниковъ и любителей съ нашей фауной птицъ и привлекать ихъ къ совмѣстной дѣятельности по ознакомленію съ литературой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изученіемъ. Въ журналѣ имѣются слѣдующіе отдѣлы: 1) Статьи и замѣтки по систематикѣ и биологій птицъ; 2) Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и библиографія; 4) Корреспонденція; 5) Хроника; 6) Заявленія гг. подписчиковъ о взаимномъ обмѣнѣ шкурками, гнѣздами и яйцами птицъ; 7) Вопросы и отвѣты.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: В. Г. Аверинъ, С. Н. Алфараинъ, В. М. Артоболевскій (предс. Киевск. Орнит. Общ. им. Н. В. Кесслера), В. Л. Бѣани, С. І. Билькевичъ, В. Н. Бостанинъ, А. А. Браунеръ, С. А. Бутурлинъ, А. М. Быковъ, Б. С. Вальхъ, К. М. Дерюгинъ (прив.-доц. Имп. С.-Пет. Унив.), Б. А. Домбровский, Б. М. Житновъ (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. Зарудный, Г. Э. Іоганзенъ, Е. И. Исполотовъ, Д. Н. Кайгородовъ (профес. Лѣтн. Инст.), А. Н. Карамзинъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожевніковъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. Ф. Котсъ, Г. В. баронъ Леудонъ, Р. С. Магницкій, Л. А. Молчановъ, П. В. Нестеровъ, С. И. Огневъ, Бенно Отто, І. К. Пачоскій, Ф. Д. Плесске, Г. И. Поляновъ, Д. М. Россинскій, К. А. Сатунинъ, А. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій, П. Ф. Соловьевъ, В. В. Станчинскій, П. П. Сушкинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. И. Стѣницкій, И. К. Таргани (проф. Н. Алекс. Инст. С.-Х. и Лѣс.), А. Я. Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ, Э. Шарлеманъ и др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

съ пересылкой въ Россіи и за границу: на 1 годъ—4 руб., на 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб.

Полные годовые комплекты журнала за 1910 и 1911 г. г., имѣющіяся въ настоящее время въ небольшомъ числѣ, высылаются по 4 р. за годъ.

Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка“ Московск. губ., имѣніе „Саввино“. Телефонъ № 7—51.

Кромѣ конторы редакціи, подписка принимается въ Москвѣ и С.-Петербургѣ въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, Карбасникова и „Новаго Времени“.

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляновъ.

Le rédacteur: G. I. Polnakow.

Тип. Импер. Моск. Унив.



О РНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN

№ 3

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

troisième ANNÉE

1912 г.



Отъ Редакціи.

1. Редакція не принимаетъ на себя отвѣтственности за своевременную доставку журнала, если подписка не была адресована непосредственно на ея имя.

2. При сообщеніи адреса подписчиковъ просятъ разборчиво обозначать имя, отчество, фамилію, а также губернію, уѣздъ и ближайшее почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяются Редакціей только въ тѣхъ случаяхъ, если таковыя поступаютъ отъ подписчиковъ не позже полученія ими слѣдующаго номера и съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы.

3. При заявленіи о неполученіи журнала и о перемѣнѣ адреса просятъ прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №. При заявленіи о перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4. Лицъ, обращающихся письменно въ Редакцію съ запросами, для полученія отвѣта просятъ прилагать почтовую марку. На вопросы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5. Наложеннымъ платежомъ выпуски журнала не высылаются.

6. Рукописи, присылаемые въ Редакцію, должны быть четко написаны, обязательно за полной подписью автора и съ указаніемъ его точнаго адреса. При этомъ авторовъ просятъ писать на одной сторонѣ листа и оставлять поля. Желательно, чтобы статьи снабжались авторами, кромѣ русскихъ названій названіями на какомъ либо западно-европейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя наименованія птицъ въ работахъ были подчеркнуты авторами одинъ разъ. За номенклатуру въ научныхъ статьяхъ отвѣтственность лежитъ на авторахъ.

7. Непринятые рукописи возвращаются за счетъ авторовъ въ видѣ посылки или подъ заказной бандеролью.

8. Для библиографическихъ отзывовъ просятъ присылать по два экземпляра работъ.



MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Орнитологическій Вѣстникъ.

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Выходить четыре раза въ годъ: два №№ до и два — послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна за 1 г.— 4 руб., за 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу— 8 р., за 1/2 страницы—4 р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половиною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просить адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle) l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (tranco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakov, Russie, Chemin de fer Moscou — Nijninovgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein) jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mittheilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poliakov, Russland, Postabteilung «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>Стр.</i>
1. Замѣтки по орнитологiи Туркестана (Продолженіе). <i>Н. А. Зарудный</i>	197
2. Перечень птицъ Кѣлецкой губерніи. <i>Е. Я. Капкинъ</i>	229
3. Новыя данныя къ распространенію птицъ въ русскомъ Алтаѣ и по Абакану. Профес. <i>П. П. Сушкинъ</i>	237
4. Туркестанская рыжепоясничная ласточка. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	242
5. Замѣтка о персидской горихвосткѣ (<i>Phoenicurus semenovii</i> Zar.). <i>Н. А. Зарудный</i>	244

	<i>Стр.</i>
6. Новая для Россіи птица: кашмирская чечетка. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	248
7. Къ налету бѣлокрылаго клеста (<i>Loxia bifasciata</i>) осенью 1911 года. <i>Б. Р. Отто</i>	249
8. Къ вопросу о летѣ птицъ противъ вѣтра. <i>С. А. Бутурлинъ</i>	251
9. Хроника.....	253
Изданія, присланныя въ редакцію.....	257
Объявленія.	

10. Поѣздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году <i>Г. И. Поляковъ</i>	1—32.
---	-------

SUJET.—INHALT.

	<i>P.</i>
1. Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan (Fortsetzung). Von <i>N. A. Sarudny</i>	197
2. Verzeichnis der Vögel des Kjelzer Gouvernements. Von <i>E. J. Katin</i>	229
3. Neue Tatsachen der geographischen Verbreitung der Vögel im russischen Altai und am Abakan. Von Prof. <i>P. P. Suschkin</i>	237
4. <i>Cecropis rufula ferghanensis</i> subsp. nov. By <i>S. A. Buturlin</i>	242
5. Mitteilung über <i>Phoenicurus semenowi</i> Zar. Von <i>N. A. Sarudny</i>	244
6. <i>Acanthis flavirostris stoliczkae</i> Hart., new for Russia. By <i>S. A. Buturlin</i>	248
7. Zum Herbstzuge des Weissbinden—Kreuzschnabels (<i>Loxia bifasciata</i>) im Jahre 1911. Von <i>B. R. Ottow</i>	249
8. On the flight of birds against the wind. By <i>S. A. Buturlin</i>	251
9. Chronik	253
Éditions parvenus à la rédaction.....	257
Inserate.	

10. Ein ornithologischer Ausflug nach den Seen Saissan-nor und Marka-kul (in West-Sibirien) im Jahre 1909. Von <i>G. I. Poljakow</i>	1—32.
--	-------

Замѣтки по орнитологіи Туркестана.

Н. А. Зарудный.

Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan.

Von N. A. Sarudny.

(Продолженіе.—Fortsetzung ¹⁾).

148. *Myiophoneus temminckii turcestanicus* Zar.

(2-ая замѣтка ²⁾).

Среди русскаго населенія—*«синяя птица»*, *«большой синій дроздъ»*, *«синяя галка»*.

У сартовъ—*«майиъ»*, *«тау-майиъ»*.

У таджиковъ—*«загоуи»* (водяная галка), *«дѣфиръ-дѣфиръ»*, *«шастъ»*.

Для Туркестана впервые обнаружена Н. А. Сѣверцовымъ (*„Вертикальное и Горизонтальное распредѣленіе Туркестанскихъ животныхъ“*, 1873 г.), который приводитъ ее для двухъ зоологическихъ участковъ края, именно сѣверо-западнаго (III) и юго-западнаго (IV). Судя по этимъ даннымъ, синяя птица въ сѣверо-западномъ участкѣ не была найдена сѣвернѣе южныхъ склоновъ Таласскаго Ала-тау и Сусамыръ-тау и, можетъ быть, попадалась въ Кара-тау, а въ юго-западномъ найдена въ горахъ между Сыръ-Дарьей и Заравшаномъ.—(Къ сожалѣнію, списокъ громадной орнитологической коллекціи Н. А. Сѣверцова со времени его кончины, послѣдовавшей въ 1885 году, до сихъ поръ остается еще неопубликованнымъ, а между тѣмъ даже простой перечень экземпляровъ съ указаніемъ мѣста и времени добычи могъ бы быть чрезвычайно полезнымъ для уясненія границъ распростра-

¹⁾ См. кн. II «Орнит. Вѣстн.» за 1912 г., стр. 111—123.

S. B. II «Ornit. Mitteil.», 1912, S. 111—123.

²⁾ См. № 51 (кн. II «Орнит. Вѣстн.» за 1910 г., стр. 115).

ненія того или другого вида ¹⁾).—Для нынѣшней Семирѣченской области, занимающей весь сѣверо-восточный участокъ и восточную часть участка II, синія птица Н. А. Сѣверцовымъ не указывается. Тѣмъ не менѣе она встрѣчается несомнѣнно и здѣсь, такъ какъ Ernst Hartert („Die Vögel der paläarktischen Fauna“) въ числѣ ея мѣстонахожденій приводитъ Иссыкъ-куль и Акъ-су (одинъ изъ истоковъ Тарима). Такъ ли, иначе ли, но до сихъ поръ остается еще невыясненнымъ, какъ далеко къ западу и востоку тянется сѣверная граница распространенія нашей птицы и насколько къ сѣверу она должна быть отодвинута въ Семирѣченской области. Насколько мнѣ извѣстенъ Кара-тау, синія птица въ немъ отсутствуетъ, а въ области бассейна Чирчика не распространяется на сѣверный склонъ Таласскаго Ала-тау.—Что касается до южной границы, то, относя въ предѣлы Туркестана бухарскія владѣнія, я, на основаніи собственныхъ наблюденій, долженъ провести ее черезъ среднюю часть меридіональнаго хребта Куги-тангъ на западѣ и черезъ горы юго-восточнаго угла Кулябскаго бэкства, около Пянджа, на востокѣ. Куги-тангъ въ Туркестанѣ представляетъ несомнѣнно самое западное мѣстонахожденіе нашей птицы. Для русскаго Памира не указана (Н. А. Сѣверцовъ: „Замѣтки о фаунѣ позвоночныхъ Памира“ ²⁾), какъ и вообще для „Крыши міра“ ³⁾. Не извѣстны ея мѣстонахожденія къ востоку отъ Куляба, именно въ Рошанѣ, Шугнанѣ и Ваханѣ, и, если откроются таковыя, надо будетъ убѣдиться, принадлежатъ ли они туркестанской формѣ или типичной гималайской.—Замѣчу еще, что какая-то *Muiphoneus* въ качествѣ случайно залетной птицы была добыта мною 15. XI. 1900 въ садахъ селенія Дызъ (между селеніями Гульмирунъ и Ахангерунъ) въ Кухистано-Керманскомъ участкѣ Персіи⁴⁾. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что она относилась не къ туркестанской формѣ (этотъ экземпляръ болѣе не находится въ моихъ рукахъ), а къ гималайской или какой-либо другой, проникающей на Парампизъ (Афганская разграничительная коммиссія нашла синюю птицу обыкновенной въ фисташковыхъ лѣсахъ страны Бадгизъ

¹⁾ Пока обработаны и вышли въ свѣтъ только туркестанскія хищныя птицы, но и здѣсь въ перечнѣ матеріаловъ не упоминается времени добычи. *Авт.*

²⁾ «Записки Туркестанскаго Отдѣла Императорскаго Общества Любителей Естествознанія», Ташкентъ, 1879 г. *Авт.*

³⁾ Report on the Proceedings of the Pamir bound. Commission, Calcutta, 1897. *Авт.*

⁴⁾ Неопубликованныя записки мои, также мой «Verzeichnis der Vögel Persiens». *Авт.*

на Бала-Мургабъ и между Palounda и Karez-darra ¹⁾. Моя персидская находка вообще для рода *Muio rhoneus* должна считаться самою западною.

Внутри сейчасъ указанныхъ туркестанскихъ границъ распространения сняя птица служила объектомъ наблюденія и добычи лишь небольшого числа лицъ. Т. И. Бареи (J. Stolzmann — „Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1897, № 1) въ 1892—1895 годахъ обнаружилъ ее въ восточныхъ частяхъ Ферганы, именно по несомнѣннымъ мѣстамъ гнѣздованія на сѣверныхъ склонахъ хребтовъ Туркестанскаго (Зордали) и Алайскаго (Исфайрамъ, Шахи-марданъ, Акъ-богузъ, Саваярдинъ и Тартъ-куль), а также на зимовьѣ около городовъ Кокандъ (ноябрь), Ошъ (декабрь) и Маргеланъ (сентябрь—ноябрь).—Русовъ еще въ 1878 году нашелъ ее на гнѣздовьяхъ по сѣвернымъ склонамъ Гиссарскаго хребта и составляющихъ его западное продолженіе горъ Хазретъ-султанъ, именно около озеръ Искандеръ-куль и Кара-куль, а также въ м. Маргузаръ (T. Pleske: „Revision der Turkestanischen Ornith.“ ²⁾). Имъ же добыта пролетная 17. III подъ Чиназомъ въ долинѣ Чирчика (l. c.).—Въ 1885 году г.г. Грумъ-Гржимайло собрали довольно длинный рядъ мѣстовыхъ экземпляровъ на южныхъ склонахъ хребта Каратегинскаго, на обоихъ склонахъ хребта Петра 1-го и въ горахъ западнаго Дарваза (V. Bianchi: „Zur Ornithologie der westlichen Ausläufer des Pamir und des Alai“ ³⁾ ⁴⁾).

Къ сожалѣнію, почти никто изъ перечисленныхъ выше лицъ ничего не сообщаетъ относящагося къ образу жизни нашей любопытной и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ загадочной птицы. Только Н. А. Сѣверцовъ (l. c.), въ бумагахъ котораго несомнѣнно содержатся многія біологическія данныя, упоминаетъ въ своихъ таблицахъ о ея гнѣздованіи въ III и IV зоологическихъ участкахъ Туркестана (см. выше), именно въ 3-мъ поясѣ высоты (отъ 4000 до 4500', мѣстами 7—8000', а вообще до 6000'); какъ сомнительно пролетный видъ, онъ приводитъ ее для 2-го пояса (отъ

¹⁾ Aitchison—Zoolog. of the Afghan Delimit. Commission (Trans. Linn. Soc., S. 2, v. V, p. 75). *Асм.*

²⁾ «Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg», t. XXXVI, № 3. *Асм.*

³⁾ Mélanges biologiques, Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, t. XII. *Асм.*

⁴⁾ Карнакъ (между Бальджуанъ и Табдидаръ), Сагри-Даштъ, р. Чингобъ, (Ихтіунъ, Ляйранъ, Носани), Синде-куль, Оби-Гармъ. *Асм.*

1000 до 3—4000'). *Йио* (!) туркестанской синей птицы недавно описано Е. Hartert'омъ (l. c.) по экземпляру съ Исыкъ-куля.

Во время своихъ странствованій по Туркестану мнѣ очень часто случалось встрѣчаться съ синей птицей. Это настоящій горный видъ, который лишь въ холодное время года спускается на сравнительно невысокія равнины, да и то въ томъ только случаѣ, если онѣ не слишкомъ удалены отъ горъ и если на ихъ поверхности имѣются болѣе или менѣе пересѣченныя пространства съ незамерзающими водами. Осенніе и весенніе ея перелеты носятъ скорѣе характеръ кочеваній, при чемъ они совершаются главнымъ образомъ горами и предгоріями. Въ центральныхъ широкихъ частяхъ Ферганской долины ее никогда не примѣчали когда бы то ни было въ прохладное время года. но изрѣдка наблюдали между Ходжентомъ и Ура-тюбѣ на западѣ, а также между Андижаномъ и Ошемъ на востокѣ, какъ осенью и весною, такъ и, въ меньшемъ числѣ, зимою. Въ нѣкоторыя зимы бываетъ довольно многочисленной около городовъ Наманганъ (1340'), Маргеланъ (2000'), Ошъ (3330'), Гульча (5140'), Риштанъ (1600') и Кокандъ (1300'). Многіе экземпляры благополучно проводятъ всю зиму по укротнымъ, теплымъ горнымъ долинамъ и ущельямъ, высоко поднятымъ надъ уровнемъ сейчасъ перечисленныхъ городовъ. Изрѣдка наблюдается зимою въ окрестностяхъ Ташкента. Въ послѣдней трети февраля и въ первыхъ двухъ третяхъ марта замѣчается, въ нѣкоторые годы весьма ясное, движеніе въ предгоріяхъ, окаймляющихъ восточную окраину Чирчикской долины, къ гнѣздовымъ участкамъ въ бассейнахъ Чаткала, Пскема и Угама, въ низовыхъ частяхъ которыхъ частью остается на зиму. Здѣсь же наблюдается и осеннее движеніе, совершающееся уже съ начала второй половины сентября и притомъ по высотамъ, имѣющимъ болѣе значительное поднятіе.

Любимыя лѣтнія мѣстообитанія синей птицы представляютъ глубокія, крутобокія ущелья и узкія долины, по дну которыхъ стремятся шумные, бурливые потоки и которые поросли не слишкомъ густыми древесными и кустарными зарослями. Необходимымъ условіемъ ея полного благополучія слѣдуетъ считать присутствіе крупныхъ и мелкихъ каменныхъ глыбъ, скатившихся когда-то съ горныхъ склоновъ, нагромодившихся кучами среди зарослей и мѣстами завалившихъ воду.—Наиболѣе низкія лѣтнія мѣстообитанія были обнаружены мною около кишлака Бричь-мулла на потокѣ Коқъ-су (2600'), впадающемъ въ Чат-

каль¹⁾. Поднимаясь отсюда вверхъ по долинь рѣки Пскемъ, я нашелъ гнѣздящуюся парочку около к. Нанай. Выше этого послѣдняго наша птица становилась все болѣе и болѣе обыкновенною и, наконецъ, сдѣлалась очень обыкновенною въ Пскемской котловинѣ, какъ по самому Пскему, такъ и по ущельямъ, сбѣгающимъ къ нему съ разныхъ сторонъ. Часто встрѣчая ее въ ущельѣ Анаульганъ, уже въ зонѣ древовиднаго можжевельника (арча), я имѣлъ удовольствіе знакомиться съ нею еще на дальнѣйшемъ нашемъ поднятіи къ кореннымъ массамъ Таласкаго Ала-тау: замѣченная въ разныхъ мѣстахъ потока Майданъ-талъ (истокъ Пскема), она въ послѣдній разъ попалась мнѣ 15. VI гнѣздившейся парочкой на рѣчномъ островѣ, заросшемъ березой и заваленномъ крупнымъ камнемъ, невдалекѣ отъ устьевъ Аю-туръ и Курумъ-туръ, т.-е. немного не доходя до верхняго предѣла древесной лиственной растительности. Упомянутый островъ лежитъ на высотѣ, не меньшей 7000'.—По Чаткалу также лишь немного не доходитъ до верхней границы распространенія березы.—Въ горахъ, окружающихъ Ферганскую долину, я наблюдалъ синюю птицу и на сѣверѣ, и на югѣ. Въ первомъ направленіи она оказалась весьма обыкновенной на гнѣздовьяхъ въ горахъ бассейновъ рѣкъ Падша-ата и Итокаръ, а также въ горахъ Кукъ-сарай. Въ Падша-атинскомъ бассейнѣ, выше ущелья Капчагай, она широко распространена по всѣмъ саямъ съ бурливою водою на каменистыхъ днищахъ и съ древесною растительностью (арча, береза, ель); поднимается, какъ и по Итокару, включительно до верхней границы ельниковъ. Обыкновенна около озера Сары-чилекъ²⁾. Въ южной Ферганѣ въ изобиліи найдена на южныхъ склонахъ хребта Туркестанскаго, именно въ верховыхъ частяхъ бассейна рѣки Исфара (около к. Варухъ, на нижнемъ Чичакѣ, по Кшемышу и Нурлоу). Здѣсь безъ малаго не доходитъ до верхней границы древовидной арчи.—Въ бухарскихъ владѣніяхъ мы нашли ее мѣстами многочисленной по восточнымъ склонамъ хребта Куги-тангъ, въ зонѣ древовидной арчи, главнымъ образомъ въ глубокихъ, тѣнистыхъ лѣсныхъ ущельяхъ къ западу отъ к. Кампыръ-тепе на высотѣ отъ 1300 до 1520 метровъ. Отсутствіе синей птицы на хребтѣ Баба-тагъ при наличности обилія камня, порою весьма порядочныхъ фи-

¹⁾ Это главный истокъ Чирчика. *Авт.*

²⁾ Въ полосѣ ельниковъ. *Авт.*

сташковыхъ лѣсовъ и подходящихъ высотъ (могила Хазретъ-бабѣ, около которой мы производили свои изысканія, находится на высотѣ 1474 м.)—я объясняю исключительно скудностью и дурнымъ качествомъ здѣшнихъ водъ. Въ восточныхъ частяхъ Кулябскаго бэкства мы встрѣтили ее въ небольшомъ числѣ около к. Писта-мазаръ (935 м.) и Бале-дивдаръ (1871 м.), а также вообще по ущельямъ верхняго Орнехо. Держится она здѣсь, за отсутствіемъ дикой древесной растительности, по садамъ, выбирая наиболѣе уединенные и, конечно, такіе, которые находятся въ непосредственной близости къ рѣчкѣ съ каменистымъ русломъ. Обыкновенною показалась, все въ то же гнѣздовое время, далѣе къ востоку въ горахъ, идущихъ изъ Дарваза, именно около к. Чешме-гованъ (1793 м.), к. Хирманджау (946 м.), к. Юль (1355 м. ¹⁾), к. Мильоль, а также въ мѣстахъ Гами-дара и Шуробъ-дара. Въ этихъ мѣстностяхъ она встрѣчалась по горнымъ потокамъ среди очень часто весьма пышныхъ, хотя и невысокихъ, древесныхъ зарослей, состоявшихъ изъ самыхъ разнообразныхъ породъ (кромѣ Семирѣчья, такого разнообразія нигдѣ больше въ Туркестанѣ не замѣчается). Замѣчу, что въ сейчасъ перечисленныхъ мѣстностяхъ бухарскихъ владѣній наша птица въ общемъ встрѣчается замѣтно рѣже, чѣмъ, напримѣръ, въ горахъ, окружающихъ Ферганскую долину.

Синяя птица представляетъ красивое, бойкое и умное существо, которое даже при нѣкоторомъ знакомствѣ кажется страннымъ и загадочнымъ. Необыкновенно—хотя и совсѣмъ не похожа на оляпку или на удивительную по своему образу жизни *Miscoscoptes*—привязана къ водѣ, отъ которой на лѣтнихъ своихъ квартирахъ не отлетаетъ далѣе нѣсколькихъ сотъ шаговъ. Летаетъ она не тише галки, при чемъ сильно вытягиваетъ крылья, поспѣшно машетъ ими и широко распускаетъ маховыя перья. Я никогда не видѣлъ ее летящею на большой высотѣ, если исключить, конечно, тѣ случаи, когда она проносится надъ глубокимъ ущельемъ съ одного горнаго шпилья на другой; перемѣщается она съ мѣста на мѣсто обыкновенно лишь на недалекія разстоянія. Даже во время своихъ весеннихъ и осеннихъ кочеваній она за одинъ разъ не пролетаетъ такъ много, какъ, напримѣръ, удоу и др. гія не особенно хорошо летающія

¹⁾ Гипсометрическія измѣренія въ Бухарѣ были произведены мною совершенно независимо отъ полковника П. К. Залѣскаго, при чемъ оказались почти одинаковыми съ полученными имъ. *Авт.*

птицы. На деревья садится весьма охотно, но далеко не такъ, какъ на землю или на камни. По землѣ передвигается мелкими шагами или быстрыми, широкими скачками. Стоя на своихъ высокихъ ногахъ, часто покачиваетъ хвостомъ и все время производитъ впечатлѣніе воплощеннаго вниманія. Обыкновенно видишь ее на камняхъ около самой воды, въ которую въ поискахъ за кормомъ она заходитъ по самое брюхо. Добровольно никогда не пускается вплавь, но, будучи подстрѣленной, справляется съ водою гораздо лучше, чѣмъ многія другія птицы.

Фуражируетъ часто по прибрежнымъ камнямъ и скаламъ, внимательно обслѣдуя трещины и заглядывая въ каждую щелку; появляется съ этой цѣлью на лѣсныхъ полянкахъ, если онѣ поросли приземистой травой, обшариваетъ груды валежника, нанесеннаго силемъ¹⁾, и посѣщаетъ выючныя тропы ради скотскаго помета, въ которомъ также находитъ себѣ пищу. Пища синей птицы составляется самыми разнообразными насѣкомыми и ихъ личинками, главнымъ образомъ такими, которыя живутъ въ сырыхъ мѣстахъ и въ водѣ. Однако далеко не рѣдкость добыть экземпляръ съ желудкомъ, набитымъ такими насѣкомыми, какъ *Silpha*, *Lethrus*, *Cetonia*, *Aphodius*, *Onthophagus* и другими чисто сухопутными. Часто вѣсть она ягоды, но съ особеннымъ удовольствіемъ лакомится червями и улитками. Между камнями около гнѣздъ мнѣ случалось находить опустошенныя и разбитыя ракушки въ такомъ множествѣ, что ихъ можно было брать полными горстями.

Пѣніе синей птицы великолѣпно. Оно громкое, вызывающее и въ тоже время удивительно нѣжное и мелодичное. Въ силу разнообразія акустическихъ условій горныхъ ущелій, оно слышится не всегда въ одинаковомъ тембрѣ и напряженіи, но всегда остается пріятнымъ среди той обстановки, въ которой обитаетъ обыкновенно синяя птица. Поющій самецъ большею частью усаживается либо на вершину крупнаго камня, либо на дерево или гдѣ-нибудь на скалу, всегда такимъ образомъ, чтобы шумъ и грохотъ потока не заглушалъ пѣнія. Это послѣднее представляетъ часто первые звуки пробуждающагося утра; развѣ только, когда еще царитъ сумракъ въ ущельѣ, гдѣ-нибудь въ высотѣ, близъ засвѣтлѣвшихъ снѣговъ, раздадутся громкіе крики уларовъ. Начала брачнаго пѣнія синей птицы мнѣ до сихъ поръ

1) Бурные, стремительные потоки, образующіеся во время дождей. Авт.

не удавалось застать. Однако еще въ дни 19—21. V, на порядочномъ уже югѣ, именно по ущельямъ восточнаго склона хребта Куги-тангъ мы слышали не мало самцовъ, звучными пѣснями призывающихъ къ любви свободныхъ самокъ. Замѣчу, что здѣсь же 20. V нами было добыто три самки, уже порядочно давно отложившихъ яйца, а 10. VI, далеко отсюда на сѣверѣ, въ саѣ Кара-кызъ (бассейнъ Пскема) намъ попались молодья, еще куцыя, но уже весьма порядочно летавшія. Въ гнѣздѣ, найденномъ 15. VI на Кшемышѣ (бассейнъ Исфара), птенцы были еще полуоперенными. Въ долину этой же рѣки съ 16. VI на болѣе значительныхъ высотахъ во множествѣ попадались хорошо летавшія молодья, хотя и далеко еще не достигшія полного роста. Такія же птицы найдены въ горахъ Кукъ-сарай (сѣверная Фергана) 5. VI. Сопоставляя время этихъ находокъ съ ихъ вертикальнымъ положеніемъ, я прихожу къ тому заключенію, что большая или меньшая высота мѣстности не оказываетъ вліянія на гнѣздовые сроки. Мнѣ кажется, что синія птица выводитъ только одинъ разъ въ годъ, хотя нѣкоторыя парочки и удивительно поздно приступаютъ къ гнѣздованію.

Гнѣзда свои синія птица закладываетъ всегда или почти всегда около воды и не высоко надъ нею, частью въ глубокихъ промежуткахъ между громоздящимися другъ на друга камнями, частью въ глубокихъ и узкихъ трещинахъ, частью въ маленькихъ выбоинахъ скалъ. Лишь немногія изъ обнаруженныхъ могутъ сдѣлаться добычей натуралиста: то невозможно пролѣзть человѣку между камнями или по крайней мѣрѣ разобрать ихъ, то онъ видитъ передъ собой отвѣсную стѣну, спускающуюся въ бурливую, стремительно несущуюся воду, которая съ глухимъ гуломъ поворачиваетъ громадные каменные глыбы на днѣ. Только немногія гнѣзда остаются видными снаружи и это именно такія, подобраться къ которымъ прямо таки невозможно. Одно изъ таковыхъ было расположено на высотѣ полуторыхъ саженей отъ поверхности бурливаго потока на отвѣсной стѣнѣ и въ 15 шагахъ отъ тропы, вившейся по узкому карнизу противоположной стороны ущелья (гнѣздо располагалось на уровнѣ этой тропы). Гнѣздо, найденное мною на устьѣ р. Минъ-Джилке (бассейнъ Падша-ата, въ сѣверной Ферганѣ) 16. VI и заключавшее четыре весьма сильно насиженныхъ яйца, было осмотрѣно прямо таки съ рискомъ быть сбитымъ съ ногъ этимъ стремительнымъ потокомъ и унесеннымъ имъ къ грудѣ камней, около которыхъ

вода превращалась въ пѣну. Оно помѣщалось совсѣмъ на виду въ плоской выбоинѣ громаднаго камня, однимъ бокомъ прислонившагося къ отвѣсной стѣнѣ и съ трехъ сторонъ омывавшагося бурливою водою, которая доходила мнѣ до пояса. Гнѣздо это находилось на сторонѣ, обращенной внизъ по теченію, въ аршинѣ отъ воды, имѣвшей здѣсь болѣе низкій уровень, чѣмъ по ту сторону камня, отъ которой главной своей массой она отбрасывалась въ сторону. Въ тотъ же день и на той же рѣчкѣ, но выше, за снѣговыми черезъ нее мостами, я нашелъ еще два гнѣзда (одно съ тремя сильно насиженными яйцами, другое съ пятью птенцами, готовыми покинуть свое жилище). Эти гнѣзда располагались въ пещеркахъ между крупнымъ каменнымъ ломомъ около самой воды и въ сажени надъ нею; пространства между отдѣльными камнями сверху были прикрыты толстымъ дерномъ съ травой.—Гнѣздо съ пятью свѣжими яйцами попалось мнѣ 5. VI въ долинѣ рѣки Пскемъ между мѣстами Майданъ-талъ и Ланкатъ. Оно заключало четыре чуть насиженныхъ яйца и помѣщалось въ низенькой нишкѣ отвѣсной скалы, немного въ сторонѣ отъ воды и футахъ въ пяти отъ земли; отверстіе нишки было прикрыто широкою плакучею прядью стеблей какого-то травянистаго растенія, росшаго въ выше лежащей трещинѣ.—Гнѣздо съ пятью недавно вылупившимися птенцами и однимъ яйцомъ болтуномъ найдено мною 15. VI въ мѣстѣ Чатъ (немного выше устья рѣки Нурлоу, въ южной Ферганѣ); оно помѣщалось на днѣ пещерки между камнями и корнями старой рябины такъ низко отъ воды, что ея брызги смачивали его наружный слой.—На ручьѣ Дарсъ около к. Бричъ-мулла (бассейнъ Чаткала) 28. V С. А. Алексѣевъ нашелъ пустое гнѣздо синей птицы; 1. VI въ немъ оказалось три совершенно свѣжихъ яйца. Мѣстоположеніе этого гнѣзда казалось весьма оригинальнымъ. Свитое въ пещеркѣ, представлявшей пространство между нѣсколькими камнями, завалившими русло въ мѣстѣ выхода его изъ узкой щели. оно во входѣ въ эту пещерку почти совсѣмъ прикрывалось завѣсою образовавшагося здѣсь водопада.

Устройство гнѣздъ синей птицы болѣе или менѣе одинаково. Это громоздкія, плотныя, довольно прочныя, нигдѣ непросвѣчивающіяся постройки, имѣющія видъ неглубокихъ и весьма толстостѣнныхъ чашъ. Наибольшая толщина гнѣздовыхъ стѣнокъ на днѣ и въ нижнихъ частяхъ боковыхъ сторонъ. Наружная поверхность оглаженная, безъ „топорщагося“ матеріала;

лотовекъ плотно умятый, гладкій. Главныи гнѣздовыи матеріалъ составляютъ тонкіе упругіе корешки и мохъ. Лотовекъ и стѣнки сейчасъ же въ глубь отъ него состоятъ изъ самыхъ тонкихъ и упругихъ корешковъ и самаго нѣжнаго мха. Мха особенно много въ нижнихъ и наружныхъ частяхъ гнѣзда, гдѣ онъ часто представляетъ какъ бы самостоятельный слой, легко отдѣляющійся отъ остальной части и въ большинствѣ случаевъ не доходящій до высоты гнѣздового отверстія на 20—40 м.м.; здѣсь корешки наиболѣе грубы, достигающіе въ толщину до 5—6 м.м., и притомъ часто употребляются цѣлыми прядями. Гнѣздо въ томъ видѣ, какъ оно сейчасъ описано, часто лежитъ на толстомъ слоѣ изъ мха съ его нижними отмершими частями и корешковъ. Въ такомъ случаѣ вся гнѣздовая постройка представляется ясно стягивающеюся снизу вверхъ.—Иногда наша птица, строясь на отвѣсной стѣнѣ ущелья, выбираетъ такую нишку, дно которой слишкомъ полого и не можетъ помѣстить гнѣзда; въ такомъ случаѣ она умудряется, пользуясь тѣми или другими шероховатостями и трещинками, устроить соответствующій помостъ изъ корешковъ; въ двухъ находкахъ этотъ помостъ былъ смазанъ грязью и глиной, благодаря чему прочно соединялся съ камнемъ стѣны.

Вотъ размѣры въ миллиметрахъ наиболѣе правильныхъ гнѣздъ:

Высота	127	130	130	140	135	125
Глубина	61	65	65	68	65	62
Ширина	260	250	240	265	255	260
Діаметръ отверстія..	125	120	120	128	125	127

Яйца имѣютъ довольно блестящую поверхность, которая кажется на ощупь не гладкою въ свѣжихъ экземплярахъ и гладкою въ наспяженныхъ. Въ однихъ кладкахъ основной фонъ блѣлый (иногда съ легкой розовой примѣсью на тупомъ концѣ одного яйца или нѣсколькихъ), въ другихъ—розоватый, въ третьихъ—блѣдно-зеленоватый или блѣдно-сѣроватый. Онъ испещряется многочисленными отмѣтинами, имѣющими видъ точекъ и мельчайшихъ кругловатыхъ пятнышекъ, нигдѣ ими не затемняясь, даже на тупыхъ концахъ яицъ, гдѣ ихъ всего больше и гдѣ они чуть крупнѣе. Поверхностныя отмѣтины окрашены въ блѣдный красновато-коричневый цвѣтъ; внутреннія—либо въ такой же, но еще болѣе блѣдный, либо въ очень блѣдный красновато-сѣ-

рый; эти внутреннія отмѣтины весьма часто расплывчаты и иногда чуть замѣтны.

Размѣры яицъ таковы.

	Длина.	Ширина.
	m.m.	m.m.
1). 5. VI. 1907; р. Пскемъ	$\left\{ \begin{array}{l} 38,2 \\ 35,2 \\ 35,5 \\ 35,3 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 22,4 \\ 26,5 \\ 25,8 \\ 25,5 \end{array} \right.$
2). 16. VI. 1909; р. Мингъ-Джилке	$\left\{ \begin{array}{l} 36,9 \\ 40 \\ 41,2 \\ 40 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 25,5 \\ 25 \\ 25 \\ 25 \end{array} \right.$
3). Ib.....	39	24,9
4). I. VI. 1909; р. Дарсъ	$\left\{ \begin{array}{l} 35,4 \\ 32 \\ 36 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 26,3 \\ 26,6 \\ 25,3 \end{array} \right.$

Е. Hartert (l. c.) для типичной синей птицы (*Mniophanes temminckii* Vig.) приводит такіе размѣры яицъ:

maximum—40,1×25 и 35,5×26,6 m.m.

minimum—33×24,6 и 25,2×22,5, „

а для моей *M. turcestanicus* (съ Иссыкъ-куля одно яйцо) 36,9—25,4 m.m.

Около гнѣздъ и молодыхъ птицъ, умѣющихъ уже перелетать съ мѣста на мѣсто, родители подаютъ слабый (не соответствующій ихъ росту) пискъ, за которымъ слышится тихое же, короткое щебетаніе. Это послѣднее иногда замѣняется звуками, которые я могу обозначить какъ свистящее трещаніе. Подавая этотъ голосъ въ разныхъ степеняхъ звучности и притомъ поворачиваясь въ разныя стороны, птица вводитъ наблюдателя въ заблужденіе: ему кажется, что она представлена здѣсь многими особями, разсѣвшимися въ разныхъ мѣстахъ. Молодые отличаются любопытствомъ и не малою безпечностью. Разъ на Кшемышѣ раннимъ утромъ я былъ разбуженъ шорохомъ и пискомъ.

Высунувъ голову изъ-подъ одѣяла, я увидѣлъ сѣдующую картину: нѣсколько молоденькихъ синихъ птицъ стояло на выючныхъ ящикахъ внутри моеѣ палатки, высоко поднявъ головы и съ изумленіемъ озираясь кругомъ; нѣсколько особей толпилось у входа въ нее..., а совсѣмъ около, съ сосѣднихъ арчей, раздавались настойчивые призывные крики стариковъ. Здѣсь было два соединившихся выводка.

Считаю полезнымъ привести здѣсь размѣры тѣхъ экземпляровъ изъ числа собранныхъ нами въ южной Бухарѣ, которые находятся въ хорошемъ (хотя уже и нѣсколько *потрепанномъ*) опереніи.

	Клювъ отъ угла рта.	Крыло.	Хвостъ.
	m.m.	m.m.	m.m.
♂♂.			
1). 4. VI; Хирманджау	40,3	191,6	157,5
2). 20. VI; Кампыръ-тюбэ.	40,5	198	161
3). 19. VI; ib.	39	195	159
4). 6. VI; Іюль	40,2	190	158
5). 20. VI; Сіунъ.	39,8	192	158
♀♀.			
1). 20. VI; Кампыръ-тюбэ.	36,9	182,5	150,5
2). 6. VI; Іюль	36,8	180,5	150,4
3). 19. VI; Амрынъ	38,8	180,3	142,6
4). 20. VI; Сіунъ.	37	177	137
5). 4. VI; Хирманджау.	38	175,5	def.
6). 19. VI; Амрынъ.	36,3	176	140
7). 18. VI; Сіунъ.	39	172	def.

Такимъ образомъ оказывается, что и южно-бухарскія синія птицы относятся къ установленной мною формѣ—*M. turcestanicus*, а не къ типичной *M. temminckii* Vig.. E. Hartert (l. c.) для этой послѣдней приводитъ такіе размѣры крыла: у ♂♂: 178—185 m.m., у ♀♀: 161—172 m.m.. Culmen у ♂♂: 37—38 m.m.—По E. Hartert'у, у *M. turcestanicus* длина

крыла у ♂♂ : 190—200 м.м., у ♀♀ : 180—184. Длину клюва своих птицъ я измѣрялъ отъ угла рта. Измѣряя только culmen, получаемъ размѣры меньшіе, чѣмъ у *M. temminckii*, что вполне согласно съ данными моего перваго описанія („Ornithologische Monatsberichte“, 1909, p. 168)

Взрослые экземпляры, добытые въ іюнѣ въ системахъ горъ Таласскій Ала-тау и Чаткаль-тау, а также въ хребтахъ Туркестанскомъ и Алайскомъ, находились въ сильно изношенномъ опереніи, которое въ весьма значительной степени утратило свой великолѣпный синій цвѣтъ. Наружные края маховъ и рулевыхъ у нихъ были сильно рассучены и круто подняты вверхъ (на среднихъ руляхъ оба края). Многіе изъ этихъ экземпляровъ, именно убитые въ самыхъ послѣднихъ числахъ іюня, обнаруживали первыя стадіи линянія мелкаго пера и лишь немногіе, кромѣ того, и крупнаго. Въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ линька начинается раньше. Птицы, добытыя въ разныя числа первой трети іюля въ горахъ Кулябскаго бѣкства (около Хирманджау, Јола, Гамн-даръ, Шуробъ-даръ), находились большею частью въ сильнѣйшемъ линянніи всего оперенія. Въ этихъ странахъ линяніе заканчивается уже въ послѣднихъ числахъ іюля и въ первыхъ августа.—Молодыя птицы начинаютъ смѣнять гнѣздовой нарядъ на нарядъ первой осени въ большинствѣ случаевъ уже въ послѣдней трети іюня. Однако и въ Кулябскомъ бѣкствѣ нами наблюдались въ средней трети іюля вполне возросшія молодыя, еще не приступавшія къ линянію. Экземпляры изъ бассейна рѣки Пскемъ отъ 26. VIII имѣли уже цѣликомъ обновленное мелкое опереніе (рули и махи оставались старыми). Замѣчательно, что молодыя птицы очень долго сохраняютъ пуховыя окончанія (первичныя перья) на перьяхъ верхней стороны, особенно на головѣ и плечахъ, гдѣ они достигаютъ 15 м.м. длины даже на такихъ, которыя вполне или почти вполне возросли.

149. *Miliaria calandra buturlini* Joh.

Просянки,—обитающія въ Семирѣченской. Сыръ-Дарынской, Самаркандской и Ферганской областяхъ, а также въ бухарскихъ владѣніяхъ—, должны быть отнесены отнюдь не къ типичной, а именно къ этой формѣ. Матеріалъ по Закаспійской области у меня въ настоящее время ничтоженъ, и потому о просянкахъ изъ этой страны я пока говорить не буду.

Прежде всего остановлюсь на размѣрахъ.

	Клювъ (отъ передняго края ноздри).	Крыло.	Хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы).	Плюсна (сзиди до основанія задняго пальца).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂ ♂.				
1). 29. V. 1907; Ходжакентъ.....9,8		104,2	81	23,8
2). Ib.9		103,8	80	23,5
3). 2. VI. 1907; Бричь-мулла.....9,2		103,5	80,2	23,2
4). 11. I. 1908; Ташкентъ8,3		102,3	79,4	22,5
5). 27. VII. 1909; Туркестанъ.....9		102,3	80,2	23,2
6). Ib.....8,2		102,2	79,6	22,3
7). 15. V. 1907; Самаркандъ8,2		102,2	80,6	23,6
8). 29. XII. 1907; Талды-булакъ.....8,2		102	79,2	23,6
9). Ib.....10		101,5	80	23
10). 2. II. 1909; Термезъ.....8,2		101,3	79,5	22,5
11). 28. I. 1910; постъ Никольскій.8,8		99,8	77,5	21,3
12). Зима съ 1888 на 1889 г.; Караколь9,8		98,5	74,5	23
13). 19. XI. 1908; Кокандъ.....8,2		98,3	75	22,8
♀ ♀.				
1). 2. III. 1910; Ташкентъ.....8		93,6	76,6	22
2). 19. XII. 1908; Катта-курганъ8,6		93,5	75	22,6

	<i>Клювъ</i> (отъ передняго края ноздри).	<i>Крыло.</i>	<i>Хвостъ</i> (отъ основанія кобчиковой железы).	<i>Плюси</i> (сзиди до основанія задняго пальца).
♀ ♀.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
3). 30. XII. 1907; Талды-булакъ.....	8,7	92,3	71	23
4). 5. III. 1910; Ташкентъ.....	8,6	91,6	72	22,2
5). 2. III. 1910; ib.....	8,3	91	72	22,5
6). 28. I. 1910; постъ Никольскій..	8	91	70,3	def.
7). 10. III. 1910; Ташкентъ.....	8,2	91	72,7	21,3
8). 2. II. 1909; Термезъ.....	8	91	70,2	22,5
9). 11. I. 1908; Ташкентъ.....	8	90,3	73	22,4
10). 31. I. 1910; постъ Никольскій..	8,5	89	70,5	21,6
11). 19. XI. 1908; Кокандъ.....	8	89	70	22
12). 2. II. 1909; Термезъ.....	8,3	89	72	22
13). 5. III. 1907; Ташкентъ.....	8,2	88,3	70,2	23
14). Ib.....	8,8	88	70	23
15). 10. II. 1909; ib.....	8,3	87,8	72	22,5
16). Ib.....	8	87,6	71,8	22,7
17). 27. XI. 1908; Паркентъ.....	8,2	87,5	70	22
18). 31. I. 1910; постъ Никольскій..	8,5	87,4	71,7	22

По размѣрамъ крыла наша птица совпадаетъ съ типичной европейской, хвостъ же ея, какъ и говоритъ Г. Э. Юганзенъ, оказывается дѣйствительно болѣе длиннымъ.

Приведу еще размѣры просянокъ своей, къ несчастію, сильно уменьшившейся персидской коллекціи (отъ южнаго побережья Каспійскаго моря почти до вершины Персидскаго залива и далеко на югъ отъ хорасанской границы).

	Клювъ.	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂ ♂.				
1). 22. X. 1903; Дамганъ.....	8	105,2	80,9	def.
2). 14. X. 1903; Ташъ-паннъ.....	8,3	105	81,5	22,3
3). 22. X. 1903; Дамганъ.....	8	102	80,5	def.
4). 7. XII. 1903; Исфаганъ.....	8,3	101	76	23
5). Ib	8,2	100,8	81,4	22,3
6). 26. II. 1904; г. Насріэ.....	8,1	100,7	76	23,3
7). 7. XII. 1903; Исфаганъ.....	8,7	100,3	76,7	23
8). Ib.....	8,6	100,3	77,7	22,4
9). 3. I. 1904; Сальми.....	8	98,8	75,3	21,4
10). 23. II. 1904; г. Насріэ.....	8,2	98,5	75	22 4
♀ ♀.				
1). 7. XI. 1903; Джандакъ.....	8,4	94	70,5	21
2). 27. II. 1904; г. Насріэ.....	8,3	93,8	69,3	22,5
3). 31. X. 1903; Гулукъ.....	8,3	93,3	72,2	22,5
4). Ib.....	8	93	72,4	22,8
5). 9. XII. 1903; Исфаганъ.....	9	92,4	72,5	22,8
6). 9. X. 1903; Гермабъ-даштъ....	8,2	92	70,3	21,5

	Клювъ.	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♀ ♀.				
7). Ib.....	7,6	92	70,3	21,4
8). 17. II. 1904; г. Насріз.....	8,4	91,3	72	22,7
9). 6. XI. 1900; Тизъ-бадь.....	7,6	90,4	67	21,6
10). 31. XII. 1904; Чешме-роганъ.....	6,7 (!)	88	68,8	21,7
11). Ib.....	8,3	def.	72,5	22,8

Какъ видно изъ этой таблицы, персидскія просянки по размѣрамъ отъ туркестанскихъ не отличаются.

Г. Э. Юганзенъ отличилъ туркестанскую просянку (*Miliaria calandra buturlini*) на основаніи сравненія ея съ экземплярами изъ Сардиніи и съ Канарскихъ острововъ. Однако просянки изъ Сардиніи относятся къ особой породѣ—*Miliaria calandra insularis* Parrot, а канарскія къ совершенно другой—*M. calandra thanneri* Tschusi, т.-е. во всякомъ случаѣ не къ типичной европейской. Отъ этихъ породъ наши туркестанскія дѣйствительно отличаются всѣми признаками, указываемыми Г. Э. Юганzenомъ. Но при сравненіи съ типичными материковыми большинство этихъ признаковъ отпадаетъ (сравниваю съ экземплярами изъ Харьковской и Полтавской губерній), такъ какъ налицо остается только болѣе блѣдная окраска мелкаго оперенія верхней стороны всего тѣла, особенно туловища, да еще вышеупомянутая нѣсколько большая длина рулевыхъ. Основной цвѣтъ этого оперенія въ громадномъ большинствѣ случаевъ имѣетъ болѣе сѣроватый оттѣнокъ, и лишь немногіе экземпляры по своей окраскѣ являются вполне сходными съ европейскими.

Персидскія просянки, повидимому, не отличаются отъ европейскихъ и во всякомъ случаѣ въ длинной серіи экземпляровъ разнятся отъ туркестанскихъ не сѣроватымъ, а болѣе буроватымъ¹⁾ оттѣнкомъ основного фона верхней стороны. Лишь рѣдкіе экземпляры, даже съ гнѣздовыхъ мѣстъ близъ вершины

¹⁾ Или рыжеватымъ. *Авт.*

Персидскаго залива, по своей окраскѣ являются неотличимыми отъ туркестанскихъ. Нѣкоторые другіе, также рѣдкіе, совсѣмъ походя на этихъ послѣднихъ, разнятся лишь болѣе рыжеватымъ оттѣнкомъ на свѣтлыхъ коймахъ самыхъ внутреннихъ маховыхъ и перьевъ плечевыхъ партій, а также большихъ и среднихъ верхнихъ кроющихъ крыла.

150. *Cinclus leucogaster* Br. et C. l. *triznae* Zar.

(2-ая замѣтка ¹⁾).

И

151. *Cinclus tenuirostris* Br. et C. t. *korejewi* Zar.

(2-ая замѣтка ²⁾).

У киргизовъ горъ Кара-тау—«*биръ-тартаръ*».

» » » Таласскій Ала-тау—«*кара-чулдукъ*».

» » » Чаткаль-тау—«*сучкара*».

У таджиковъ—«*чиличйкъ-обй*».

По Б. П. Корѣву, у киргизовъ Семирѣчья—«*безилдыкъ*». Это названіе кажется мнѣ страннымъ и сомнительнымъ: имъ обыкновенно обозначаютъ стрепета (также—«*безгелъдекъ*»).

Е. Hartert („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, S. 796 und 798), изучившій очень длинныя серіи бѣлобрюхой и бурой оляпокъ, отказывается признавать существованіе отмѣченныхъ мною для Туркестана формъ: *C. triznae* и *C. korejewi*. Быть можетъ дѣло обстоитъ именно такъ, но пока, основываясь на своихъ многочисленныхъ экземплярахъ, я не могу согласиться съ этимъ мнѣніемъ, особенно по отношенію къ *C. triznae*, у которой я никогда не видѣлъ такого сильнаго развитія чешуйчатости на задней части спины, крестцѣ и верхнихъ кроющихъ хвоста, какъ у семирѣченской, тарбагатайской и дзунгарской *C. leucogaster*. Что касается до *C. tenuirostris*, то въ длинной серіи экземпляровъ изъ горъ, лежащихъ къ югу отъ долины Ферганы, лишь рѣдко встрѣчаются блѣдно окрашенные особи, тогда какъ эти послѣднія рѣшительнымъ образомъ преобладаютъ въ болѣе сѣверныхъ горахъ; птицъ изъ самыхъ восточныхъ частей Ферганы я знаю пока очень мало.

¹⁾ „Орнитолог. Вѣстникъ“ за 1910 г., кн. II, замѣтка № 48. *Авт.*

²⁾ *Иб.*, замѣтка № 47. *Авт.*

Оба вида оляпокъ считаются Н. А. Сѣверцовымъ („Вертикальное и Горизонтальное распредѣленіе Туркестанскихъ животныхъ“) въ Туркестанѣ одинаково распространенными въ горизонтальномъ направленіи и приводятся имъ для всѣхъ четырехъ зоологическихъ участковъ (включительно отъ Семирѣчья и включительно до долины Заравшана съ ея горами). Въ вертикальномъ распространеніи онъ считаетъ ихъ осѣдлыми въ 3-мъ поясѣ высоты (отъ 4000 до 4500 и мѣстами даже до 7—8000, а вообще до 6000'); для 4-го пояса (поясъ хвойныхъ и березы до 8500—10500', т.-е. на Тянь-Шанѣ до верхнихъ можжевельниковъ) *C. leucogaster* приводится имъ осѣдлою, а *C. tenuirostris* рѣдкою гнѣздящеюся и зимнею; для 5-го пояса (подснѣжный поясъ альпійскихъ травъ до вѣчнаго снѣга, т.-е. до 10500—14000') оба вида считаются лѣтними, а *C. tenuirostris* быть можетъ гнѣздящеюся. — На Памирахъ оляпки не найдены ни Н. А. Сѣверцовымъ („Замѣтки о фаунѣ позвон. Памира“¹⁾), — который, совсѣмъ не упоминая о *C. tenuirostris*, сообщаетъ, что *C. leucogaster* не попала даже на Башъ-Алаѣ, — ни Памирской разграничительной комиссіей (Report on the Proceed. of the Pamir bond. Comm. Calcutta, 1896). Однако, Н. Schalow въ статьѣ своей „Beiträge zur Vogelfauna Centralasiens“²⁾ вводитъ оба вида, какъ мѣстовыхъ птицъ, и для фауны этой страны, но на основаніи какихъ именно источниковъ — мнѣ неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ *C. tenuirostris* бываетъ здѣсь лѣтомъ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ имѣющийся у меня экземпляръ отъ 12. VII. 1907 съ рѣки Гунтъ (10400'), вытекающей изъ альпійскаго озера Яшилъ-куль³⁾.

C. tenuirostris, широко распространенная въ горахъ сѣверной Индіи, находитъ сѣверную границу своего распространенія въ Семирѣченской области, но гдѣ именно — пока еще не выяснено. — Н. Schalow (l. c.) упоминаетъ о двухъ экземплярахъ, добытыхъ профессоромъ Мерцбахеромъ въ ноябрѣ въ Карановскомъ проходѣ и сообщаетъ, что Ротшильдъ получилъ ее съ сѣвернаго Исыкъ-куля. — Рядъ экземпляровъ, собранныхъ на верхнемъ Нарынѣ (выше и ниже укрѣпленія Нарынскаго) я видѣлъ у г. Неживого во время остановки его въ Ташкентѣ на

1) «Записки Туркестанскаго Отдѣла Императорскаго Общества Любителей Естествознанія» etc., т. I, вып. 1-ый. Ташкентъ, 1879. Авт.

2) Journal für Ornithologie, 1908, p. 245—246. Авт.

3) Для Туркестана до сихъ поръ это самая южная находка. Авт.

пути въ Германію, куда онъ везъ транспортъ живыхъ звѣрей и большую коллекцію птицъ.—Въ Кара-тау не найдена ни Б. П. Тризна, ни мною.—Какъ обыкновенная гнѣздящаяся птица найдена мною на южныхъ склонахъ Таласскаго Ала-тау, именно въ высокихъ частяхъ бассейна рѣкъ Пскемъ и Чаткаль, гдѣ, какъ мнѣ показалось, забирается отдѣльными парами для гнѣздовья выше, чѣмъ бѣлобрюхая оляпка, а вообще встрѣчается рѣже, чѣмъ послѣдняя. Въ холодное время года рѣдкими экземплярами появляется въ долинѣ Чирчика, но не ежегодно. Въ горахъ же въ это время бываетъ обыкновенной въ такихъ низкихъ мѣстахъ, гдѣ лѣтомъ не встрѣчается, напримѣръ, подъ Хаджикентомъ, Бричъ-мулла и Паркентомъ, а также на Ангренѣ подъ Тилляу. — Весьма обыкновенна въ бассейнахъ верхняго теченія рѣкъ Падша-ата (выше ущелья Капчагай) и Итокаръ (горы Чаткаль-тау) въ сѣверной части Ферганской области. Экземпляры, въ небольшомъ числѣ показывающіеся зимою около Намангана, происходятъ отсюда.—Весьма обыкновенна, на гнѣздовья же, въ горахъ южной Ферганы, именно по сѣвернымъ склонамъ хребтовъ Туркестанскаго и Алайскаго. Здѣсь я нашелъ ее во множествѣ въ бассейнѣ рѣки Исфара (впервые попалась верстахъ въ шести выше кишлака Исфара), главнымъ образомъ по рѣкамъ Варухъ, Чичакъ, Кшемышъ, Биръ-су и Нурлоу; нѣсколько парочекъ гнѣздились въ окрестностяхъ озера Кара-куль-катта около самаго снѣга (тоже на Кшемышѣ и Биръ-су).—Къ востоку отъ Исфаринскаго бассейна наша птичка была найдена Т. П. Бареемъ (J. Stolzmann: „Oiseaux de la Ferghana“ ¹⁾) въ бассейнѣ рѣки Сохъ около Зардалы (въ маѣ, іюнѣ, августѣ и сентябрѣ 1892 года), въ бассейнѣ рѣки Исфайрамъ (въ апрѣлѣ и сентябрѣ 1893 года) и по рѣкѣ Акъ-богузъ, представляющей одинъ изъ истоковъ Кара-дарьи (въ августѣ 1894 года).—Въ Самаркандской области, по словамъ Ф. Д. Плеске („Revision der Turkestanischen Ornis“ ²⁾), бурая оляпка найдена Руссовымъ въ 1878 году въ горахъ Урюкли-тау (къ югу отъ г. Зааминъ и по сѣверному склону хребта Туркестанскаго) 2. VI, затѣмъ по сѣвернымъ склонамъ горъ Хазретъ-султанъ и хребта Гиссарскаго, именно въ урочищѣ Куликаланъ 7. VII и на озерѣ Искандеръ-куль 15. VIII. Одинъ лѣтній экземпляръ я имѣю съ рѣки Хырсь-хана, бѣгу-

¹⁾ „Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1897, № 1. *Авт.*

²⁾ „Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg“, т. XXXVI, № 3. *Авт.*

щей въ Заравшанъ съ южнаго склона Туркестанскаго хребта; *это самая западная находка* нашей птички.—Что касается до той части Туркестана, которая занята бухарскими владѣніями, то здѣсь она была добыта братьями Грумъ-Гржимайло въ 1885 году (V. Bianchi: „Zur Ornithologie der westlichen Ausläufer des Pamir und des Alai“ ¹⁾) въ системѣ хребта Петра 1-го, именно около Ихтіунъ (на рѣкѣ Чингобъ) 23. VI и въ горахъ Тупчекъ 30. VI. Во время нашего путешествія лѣтомъ 1910 года по южной части восточной Бухары (на востокъ до мѣста Шуробъ-дара на Пянджѣ въ Кулябскомъ бэкствѣ) бурая оляпка намъ не попалась по недостатку подходящихъ станцій. Зимніе экземпляры были доставлены мнѣ для просмотра изъ окрестностей Сары-джуй и Каратагъ. Это даетъ право думать, что бурая оляпка распространена на гнѣздовьяхъ и въ системѣ южнаго склона Гиссарскаго хребта. По свѣдѣніямъ, полученнымъ мною отъ г-дѣ пограничныхъ офицеровъ, въ зимнее время она бываетъ на рѣкѣ Пянджъ между укрѣпленіемъ Кала-и-Хумъ и мѣстомъ Шуробъ-дара. Слѣдовательно она должна гнѣздиться и въ горахъ страны Дарвазъ. Вообще же, насколько я могъ узнать, ея гнѣздовья отсутствуютъ въ Бухарѣ южнѣе линіи, проведенной черезъ Яккабагъ, Сары-джуй и Кулябъ, но имѣются въ странахъ Рошанъ и Шугнанъ.

C. leucogaster въ Семирѣченской области встрѣчается несравненно чаще, чѣмъ предыдущая оляпка, и вообще можетъ считаться обыкновенною мѣстовою птицею. Въ коллекціи г-на Неживого (см. выше) я видѣлъ шесть экземпляровъ, собранныхъ на рѣкѣ Нарынъ выше и ниже укрѣпленія Нарынскаго.—H. Schallow (l. c.) упоминаетъ о двухъ экземплярахъ, собранныхъ профессоромъ Мерцбахеромъ 23—29. XI. 1902 въ Карановскомъ ущельѣ.—Два же экземпляра было собрано въ 1902 году экспедиціей профессора В. В. Сапожникова: 26. V въ мѣстѣ Сары-джазыкъ и 2. VIII на верховьяхъ рѣки Кокъ-су ²⁾.—Б. П. Корѣевъ (l. c.) считаетъ ее гнѣздящеюся въ третьемъ и четвертомъ поясахъ высоты (въ смыслѣ Н. А. Сѣверцова).

Типами *C. leucogaster tristis* я считаю оляпокъ, происходящихъ изъ горнаго хребта Кара-тау. Здѣсь наша птичка обитаетъ на обоихъ его склонахъ, именно: въ Суюндукскомъ ущельѣ, по Иканъ-су и по ущельямъ Кокъ-булакъ и Чиркійли (по ту

¹⁾ «Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg», t. XII. *Ann.*

²⁾ Г. Э. Юганзенъ: «Птицы Семирѣчья и Туркестана». Томскъ, 1908 г. *Авт.*

сторону Хантагской щели). Конечно встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ этихъ горъ, нами еще не обследованныхъ. Въ суровыя зимы спускается въ предгорія. Одинъ экземпляръ былъ добытъ 27. XII. 1908 на берегу Бешъ-арыкской рѣчки въ мѣстѣ, гдѣ она выбѣгаетъ на равнину.—Къ этой же формѣ я отношу бѣлобрюхихъ оляпокъ, обитающихъ къ югу отъ горныхъ хребтовъ: Таласскаго Ала-тау и Сусамыръ-тау. На южныхъ склонахъ Таласскаго Ала-тау весьма обыкновенна въ высокихъ частяхъ бассейновъ рѣкъ Пскемъ и Чаткаль. Въ зимнее время спускается въ низовыя части этихъ послѣднихъ, при чемъ лишь рѣдкіе экземпляры, и не ежегодно, объявляются въ долину Чирчика, какъ по самой рѣкѣ, такъ и по быстро текущимъ капитальнымъ оросительнымъ каналамъ. 27. I. 1909 одинъ экземпляръ былъ добытъ подъ Чиназомъ, т. е. всего лишь въ нѣсколькихъ верстахъ отъ устья Чирчика. Зимой встрѣчается изрѣдка и тоже не ежегодно въ долину Ангрена между Тилляу и Канджигалы ¹⁾.—Въ горахъ сѣверной Ферганы, именно въ Чаткаль-тау, я нашелъ ее въ бассейнахъ рѣкъ Итокаръ и Падша-ата, гдѣ она встрѣчалась гораздо рѣже, чѣмъ *S. tenuirostris*. Въ зимнее время изрѣдка попадаетъ въ окрестностяхъ г. Наманганъ.—Что касается до южной Ферганы, то J. Stolzmann (l. c.) приводитъ экземпляры, добытые Т. И. Бареемъ на сѣверныхъ склонахъ хребта Алайскаго: въ іюнѣ 1893 года, Кара-карыкъ; въ августѣ 1893 года, Исфайрамъ; въ августѣ 1894 года, Акъ-богузъ; въ сентябрѣ 1894 года, Гульча, и въ маѣ—іюнѣ 1895 года, Тартъ-куль. Судя по данному Stolzmann'омъ списку экземпляровъ обоихъ видовъ, можно думать, что въ тѣхъ мѣстахъ Алайскаго хребта, которыя были посѣщены Бареемъ, бѣлобрюхая оляпка встрѣчается чаще, чѣмъ бурая. Не могу сказать того же относительно сѣверныхъ склоновъ хребта Туркестанскаго, въ которомъ я достаточно хорошо обследовалъ область бассейна рѣки Исфара: здѣсь по Варуху, Чичаку, Биръ-су, Кшемышу и Нурлоу бѣлобрюхая оляпка встрѣчалась въ самомъ ничтожномъ числѣ, почти совсѣмъ незамѣтномъ среди множества ея бурого сородича.—Для Самаркандской области Ф. Д. Плеске (l. c.) указываетъ находки Русова по сѣверному склону Туркестанскаго хребта 30—31. V. 1878 въ горахъ Урюкли-тау (къ югу отъ г. Зааминъ), по сѣверному склону горъ Хазретъ-султанъ на озерахъ Маргузаръ 10. VII. 1878

¹⁾ Очевидно гнѣздится въ верховьяхъ этой рѣки *Амт.*

(къ югу отъ г. Джизакъ) и по сѣвернымъ склонамъ западнаго окончанія хребта Гиссарскаго на озерѣ Искандеръ-куль.—Относительно бухарскихъ владѣній, гдѣ *блѣбрюхая оляпка находитъ южную границу своего распространія* (въ Индіи она неизвѣстна), сказать приходится очень мало. В. Л. Біанки (l. c.) упоминаетъ всего лишь объ одномъ экземплярѣ, добытомъ братьями Грумъ-Гржимайло 28. VI въ горахъ Тупчекъ (система хребта Петра 1-го). Въ горахъ южной Бухары на востокъ до мѣста Шуробъ-дара на рѣкѣ Пянджъ (въ Кулябскомъ бѣкствѣ) лѣтомъ я нигдѣ ее не видѣлъ. Не нашелъ ее въ Бухарѣ и С. М. Алексѣевъ, ѣздившій сюда лѣтомъ 1911 года специально ради сбора орнитологической коллекціи. Въ грубыхъ чертахъ его маршрутъ изъ Самарканда таковъ: черезъ пункты Яккабагъ, Гузаръ, Байсунъ, Денау, Каратагъ, Гиссаръ. Дюшамбе, Курганъ-тюбе, Кулябъ, Шуробъ-дара и Чубекъ (возвратился же онъ странами, въ которыхъ нельзя ожидать оляпокъ даже въ зимнее время). На гнѣздовѣ встрѣчается, конечно, и по южнымъ склонамъ Гиссарскаго хребта, такъ какъ я видѣлъ пару зимнихъ экземпляровъ изъ окрестностей Сары-джуй. Изъ всего сказаннаго видно, что южная граница распространія блѣбрюхой оляпки далеко еще не выяснена.

Оба вида оляпокъ ведутъ одинаковый образъ жизни. Любимыя лѣтнія ихъ мѣстообитанія представляютъ прозрачноводные, быстрые, неширокіе потоки, обрамленные деревьями и усыянные крупными камнями, изъ которыхъ нѣкоторые выдаются наружу. Рѣже селятся онѣ въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ,—выбирая въ такихъ случаяхъ скалистые берега потоковъ, засыпанные крупнымъ каменнымъ ломомъ—, или по берегамъ горныхъ озеръ ¹⁾. На гнѣздовѣ встрѣчаются и выше предѣловъ лѣсной растительности, куда охотно забираются по окончаніи гнѣздовыхъ заботъ, достигая ледниковъ и нестаявшихъ снѣговъ. Зимніе холода, а главнымъ образомъ замерзаніе водъ, гонятъ ихъ въ нижнія области горъ, при чемъ онѣ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и въ самомъ небольшомъ количествѣ выбираются изъ нихъ на близъ лежащія равнины, да и то въ томъ только случаѣ, когда на этихъ послѣднихъ имѣются крутобокія лощины съ быстрыми водами на днѣ. Изъ всѣхъ нашихъ туркестанскихъ птицъ, вмѣстѣ съ поганками и гагарами, оляпки связаны съ водою особенно сильно. Можно даже сказать, что онѣ немыслимы безъ

¹⁾ Около впадающихъ въ нихъ бурливыхъ ручьевъ. *Авт.*

непосредственной ея близости: поганки и гагары дѣлають перелеты на многіе десятки верстъ черезъ безводныя пространства, тогда какъ оляпки никогда не отлучаются отъ воды далѣе сотни шаговъ или немного больше. Перелѣтая съ мѣста на мѣсто, онѣ почти всегда летятъ надъ самою поверхностью воды, слѣдуя вдоль всѣхъ излучинъ потока и лишь изрѣдка, когда излучина слишкомъ крута, пересѣкають ее по хордѣ. Вѣроятно, никто не видалъ у насъ оляпку, которая летѣла бы на высотѣ, превосходящей нѣсколько десятковъ аршинъ. Полетъ ея сильный, стремительный и какъ-то неожиданно изворотливый; летя она все время очень быстро машетъ крыльями. Пролетѣвъ нѣкоторое пространство, оляпка также какъ-то неожиданно усаживается на мѣсто и тутъ-же, порою, вдругъ камнемъ булькаетъ въ воду, чтобы или очутиться на противоположномъ берегу, или всплыть на поверхность и направиться къ прежнему пункту лѣтомъ или вплавъ. Проходя осторожно вдоль водъ, на которыхъ живутъ оляпки, обыкновенно видишь ихъ сидящими на камняхъ береговъ или на камняхъ, выдающихся изъ потока, на выставившихся частяхъ затопленныхъ и придавленныхъ камнями древесныхъ стволовъ, въ укромныхъ мѣстечкахъ подъ подмытыми дернистыми берегами и на полоскающихся корняхъ прибрежныхъ деревьевъ. Зорко оглядывая воду, оляпка то сбѣгаетъ къ ея урѣзу, чтобы схватить замѣченный кормъ, то для той же цѣли бросается подъ ея поверхность, то вздымается вверхъ и, мгновенно упавъ, умудряется овладѣть кормомъ не только тѣмъ, что плыветъ снаружи, но и такимъ, ради котораго надо временно затонуть. Случалось мнѣ видѣть оляпокъ на не совсѣмъ обычныхъ мѣстахъ, именно гдѣ-нибудь совсѣмъ вблизи отъ ручья на маленькихъ плоскостяхъ, съ поверхности которыхъ, обыкновенно около подножія скалистой стѣны, били роднички и превращали эти плоскости въ мелкія болотца съ каменистымъ дномъ; здѣсь густо развивались водоросли и кишѣли мелкіе рачки, черви, личинки стрекозъ, комаровъ и другихъ насѣкомыхъ, водяные жуки, мелкіе моллюски и т. под. Наши птички расхаживали по такимъ болотцамъ медленно, безъ обычнаго напряженнаго вниманія и съ какими то, я бы сказалъ, самодовольными минами. Обычно здѣсь можно было застать только парочку или выводокъ оляпокъ.

Пища оляпки составляетъ сейчасъ перечисленными животными. Кромѣ того она охотно ѣстъ рыбы мальки, мелкія ракушки и разныя сухопутныя насѣкомыя, случайно попадающія

въ воду, а для того, чтобы помочь пищеваренію, заглатываетъ песчинки.

Внѣ брачнаго времени и вывода дѣтей оляпки живутъ одиночками или отдѣльными парами, при чемъ узы, связывающія членовъ этихъ послѣднихъ, во всякомъ случаѣ не могутъ быть названы прочными. — Относясь весьма нѣжно къ гнѣздовымъ птенцамъ, а также въ первое время къ такимъ, которые уже покинули гнѣздо, родители вскорѣ предоставляютъ ихъ на волю судьбы, и выводокъ, какъ только молодые поднимутся на крылья, быстро разсѣивается. Оба вида оляпокъ иногда поселяются на одномъ и томъ же потокѣ. Въ такихъ случаяхъ страдательной стороной является болѣе слабая *C. leucogaster*, на долю которой достаются менѣе удобные гнѣздовые участки.

Къ человѣку наши оляпки относятся вообще довѣрчиво, а въ глухихъ мѣстахъ даже съ нѣкоторымъ любопытствомъ. Во всякомъ случаѣ онѣ чрезвычайно скоро отличаютъ человѣка, со стороны котораго имъ можетъ грозить опасность, и дѣлаются въ достаточной мѣрѣ осторожными. Занимая отдѣльные гнѣздовые и охотничьи участки и вообще избѣгая близости себѣ подобныхъ, оляпки относятся къ другимъ мелкимъ птицамъ совершенно безразлично; это быть можетъ объясняется тѣмъ, что способы ловли добычи у нихъ своеобразны, и потому въ другихъ птицахъ онѣ не видятъ конкурентовъ. — На тихихъ участкахъ воды оляпки охотно плаваютъ и ныряютъ; ныряя, дѣйствуютъ не только ногами, но и крыльями, которыми производятъ какъ-бы летательныя движенія. Подстрѣленная птичка также пытается нырять и въ концѣ концовъ забивается въ береговую нору, въ промежутки между камнями, подъ подмытый дернъ и въ другія укромныя мѣста.

Пѣніе оляпокъ звучно и мелодично. У *C. tenuirostris* оно громче, а у *C. leucogaster* кажется болѣе разнообразнымъ. Поютъ главнымъ образомъ, конечно, весной. Часто голоса ихъ слышишь и въ зимнее время среди снѣговъ и льдовъ. Въ іюнѣ и іюлѣ онѣ становятся молчаливыми (въ августѣ и сентябрѣ наблюденій не производилъ), ограничиваясь лишь обычными тихими криками, похожими на звуки: „сррр“, „церрр“, „спррр“, „циррр“.

По наблюденіямъ Б. П. Корѣва (l. c.) надъ *C. leucogaster*, во второй трети ноября отдѣльныя парочки и главнымъ образомъ одиночки стали изрѣдка показываться на Усекѣ около

Джаркента. Весь декабрь 1899 года и въ январѣ и февралѣ 1900 года наша птичка была здѣсь очень обыкновенна, а къ концу второй трети марта отлетѣла въ горы къ мѣстамъ гнѣздовья. Около Пржевальска (въ Каракольской щели) 22. IV. 1899 наблюдались брачныя игры нѣсколькихъ парочекъ. Громко распѣвая, самцы поднимались почти вертикально на ногахъ, широко распускали хвостъ, подергивали полураскрытыми крыльями впередъ и внизъ и вслѣдъ за тѣмъ низко присѣдали передъ самочками, которыя сидѣли возлѣ. Въ Тышканской щели 3. V найдено строящееся гнѣздо, основаніе котораго было уже почти готово. Въ работѣ по постройкѣ принимали участіе оба пола. Когда это гнѣздо вскорѣ было смыто ливнемъ, парочка немедленно приступила къ постройкѣ новаго, выбравъ для этого другое мѣсто въ нѣсколькихъ шагахъ отъ перваго, въ нѣсколько болѣе защищенной впадинѣ. 2. VI самочка сидѣла уже на яйцахъ, добыть которыя не было возможности: гнѣздо располагалось на крутой скалѣ въ шести футахъ отъ поверхности рѣчки, которая обладала здѣсь значительной глубиной и весьма сильнымъ теченіемъ. Въ урочищѣ Тышканъ, на высотѣ 5000', 12. V. 1900 найдено гнѣздо, только что оконченное, но еще не содержавшее яицъ. Оно помѣщалось въ небольшой выбоинѣ въ скалѣ,—которая была отвѣсна и подошвой уходила въ рѣчку—, и располагалось отъ уровня воды въ 6½ футахъ. Эти гнѣзда имѣли болѣе или менѣе шарообразную форму съ боковымъ входомъ, обращеннымъ перпендикулярно къ рѣкѣ и имѣвшимъ видъ сверху внизъ сдавленного отверстія. Въ первомъ гнѣздѣ это послѣднее было видно только при разсматриваніи снизу, такъ какъ прикрывалось сильно нависавшею верхнею гнѣздовою частью.

Въ іюнѣ 1907 года въ разныхъ мѣстахъ бассейна рѣки Пскемъ мнѣ посчастливилось найти цѣлый рядъ гнѣздъ *C. leucogaster* (triznae) и только одно *C. tenuirostris*. Изъ гнѣздъ перваго вида три были свиты при исключительныхъ условіяхъ. Два изъ нихъ располагались въ выбоинѣ каменной глыбы, торчавшей изъ середины потока, при чемъ эта выбоина находилась на сторонѣ, обращенной внизъ по теченію и притомъ *ниже уровня воды* (!) въ томъ свободномъ пространствѣ, которое образовывалось вслѣдствіе раздвоенія водной струи, съ силой бывшей о противоположную сторону камня; порою вода окачивала этотъ послѣдній сверху и образовывала надъ гнѣздомъ родъ тонкаго воднаго купола. Эти гнѣзда казались полушарообраз-

ными наростами зеленого мха и имѣли входныя отверстія, обращенныя внизъ по теченію. Мнѣ не удалось изслѣдовать ихъ ближайшимъ образомъ, такъ какъ русло потока падало слишкомъ круто, а вода неслась съ бѣшеной, головокружительной стремительностью. Третье гнѣздо располагалось на высотѣ пяти футовъ отъ поверхности воды быстрого ручья и висѣло надъ нею подъ прикрытіемъ горизонтально нависшаго пласта дерновой земли; дернъ скрѣплялся корнями дерева, росшаго тутъ же около самаго обрыва, при чемъ многіе изъ нихъ свисали внизъ и, вѣдряясь въ стѣнки гнѣзда, поддерживали его въ всячемъ положеніи. Форма этого гнѣзда правильно-шарообразная; входное отверстіе имѣло видъ короткой поперечной щелки и было обращено не прямо къ ручью, а слегка вверхъ по теченію; оно представляло шарообразный мѣшокъ, въ нижнюю половину котораго уложено собственно гнѣздо. Стѣнки мѣшка очень толсты¹⁾ и выстроены почти исключительно изъ зеленого мха. Собственно гнѣздо плотно, нигдѣ не просвѣчиваетъ, довольно прочно и имѣетъ видъ глубокой чаши. Выстроено оно изъ соломинокъ и сухихъ листьевъ злаковъ, перемѣшанныхъ съ сухими листьями ивы. Гнѣздовая выстилка состоитъ изъ плотно умятыхъ листьевъ ивы и длинныхъ, широкихъ кусковъ листьевъ злаковъ. Соломины и эти послѣдніе тамъ и здѣсь отходили отъ наружнаго слоя гнѣзда и, вѣдряясь въ стѣнки мѣшка, высоко поднимались по ихъ толщѣ вверхъ. Входное отверстіе помѣщалось въ средней части мѣшка и вело непосредственно на край собственно гнѣзда.

Размѣры (въ миллиметрахъ) гнѣзда:

Вертикальный діаметръ.....	250
Горизонтальный „.....	275
Высота собственно гнѣзда.....	90
Глубина „ „.....	65
Ширина „ „.....	115
Діаметръ от- верстія „ „.....	80.

Въ этомъ гнѣздѣ 5. VI заключалось пять сильно насижен-ныхъ яицъ. Въ другихъ искоемыхъ гнѣздахъ (объ ихъ устройствѣ ниже) я нашелъ: 6. VI четыре птенца возраста полуторыхъ

¹⁾ Особенно на днѣ. *Авт*

недѣль, 7. VI четыре очень сильно насиженныхъ яйца и одно болтунъ, 7. VI четыре птенца возраста двухъ недѣль, 8. VI четыре только что вылупившихся птенца и яйцо болтунъ, 9. VI четыре птенца возраста 6—7 дней и 11. VI пять птенцовъ, готовыхъ покинуть гнѣздо. Въ гнѣздѣ *C. tenuirostris* 10. VI находилось четыре такихъ же птенца.—Въ сѣверной Ферганѣ, именно въ бассейнѣ рѣки Падша-атъ, и въ южной, въ бассейнѣ рѣки Исфара, гнѣздъ *C. leucogaster* мнѣ не удалось обнаружить. Е. Л. Шестоперовъ сообщилъ мнѣ, что 24. IV. 1908 на рѣкѣ Чигирчикъ видѣлъ парочку, строившую гнѣздо, и что 7. V въ этомъ послѣднемъ заключалось четыре совершенно свѣжихъ яйца. Что касается до *C. tenuirostris*, то ея гнѣзда я находилъ неоднократно въ бассейнахъ какъ Падша-атъ, такъ и Исфара. Къ сожалѣнію, ко времени моихъ здѣсь странствованій громадное большинство ихъ было частью уже покинуто, частью заключало птенцовъ (отъ 3 и до 5 въ каждомъ, всего чаще—4). Только въ двухъ я нашелъ по четыре очень сильно насиженныхъ яйца (7. VI на Итокарѣ), да въ одномъ три испорченныхъ яйца при одномъ птенцѣ возраста примѣрно десяти дней (8. VI на рѣкѣ Чичакъ, въ бассейнѣ Исфары).

Гнѣзда обоихъ видовъ совершенно одинаковы по своему устройству и по мѣстоположенію. Они всегда устраиваются въ самомъ близкомъ соседствѣ къ водѣ: въ выбоинѣ береговой скалы; въ промежуткахъ между камней, обрушившихся въ воду; между камнями, составляющими устой мостовъ черезъ горныя рѣчки; въ углубленіяхъ между подмытыми корнями береговыхъ деревьевъ и въ грудахъ камней и древесныхъ стволовъ, нанесенныхъ силевыми водами. Во всѣхъ этихъ случаяхъ гнѣзда, хотя бы нѣкоторою своею частью, выдаются наружу, а такъ какъ внѣшнія ихъ части всегда отдѣланы зеленымъ мхомъ, то весьма часто, даже на близкомъ разстояніи, они представляются въ видѣ моховыхъ наростовъ или выпуклыхъ частей камня, густо обросшихъ мхомъ. Если избранная для гнѣзда полость достаточно просторна, то оно выстроено приблизительно такимъ же образомъ, какъ вышеописанное висячее, т.-е. состоитъ изъ шарообразнаго (иногда нѣсколько сплюснутаго сверху внизъ, иногда нѣсколько вытянутаго по вертикальной оси) мохового мѣшка, въ нижней половинѣ котораго заложено собственно гнѣздо. Въ противномъ случаѣ этотъ моховой мѣшокъ со стороны внутренней части полости можетъ быть весьма утоньшеннымъ и даже можетъ вовсе

отсутствовать, замѣняясь стѣнкою полости. Часто также собственно гнѣздо лежитъ въ мелкой выбоинѣ камня и притомъ лишь половиной или даже менѣе чѣмъ половиной всего своего объема. Въ такомъ случаѣ мохъ очень толстымъ слоемъ закутываетъ все открытое пространство, образуя надъ собственно гнѣздомъ высокій полукуполь или иногда почти полный куполь. Иногда внутренняя поверхность этого послѣдняго устилается упругими соломинками, не позволяющими ему осѣсть. Входное отверстіе почти всегда обращено либо прямо къ ручью, либо нѣсколько вверхъ по его теченію. Оно выдѣляется въ стѣнкѣ мохового мѣшка то на уровнѣ края собственно гнѣзда, то гдѣ-нибудь выше. Очень часто это отверстіе составляется незадѣланнымъ промежуткомъ между камнемъ и прислоненнымъ къ нему краемъ купола, т.-е. находится прямо надъ гнѣздомъ. Устройство этого послѣдняго такое же, какъ вышеописаннаго, но листья нвы могутъ замѣняться березовыми, рябиновыми и другими. Замѣчу еще, что въ большинствѣ моихъ находокъ моховыя части, благодаря близости построекъ къ водѣ, были сырыми и часто даже совсѣмъ мокрыми, тогда какъ собственно гнѣзда оставались почти всегда сухими.

Вотъ размѣры нѣсколькихъ наиболѣе правильныхъ гнѣздъ:

	Вертикальный діаметръ.	Горизонталь- ный діаметръ.	собственно гнѣзда.				Ширина вход- наго отверстія.	Его высота.
			Высота	Глубина	Ширина	Діаметръ отверстія		
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
<i>C. leucogaster:</i>								
1).....	195	240	88	60	112	80	70	45
2).....	180	225	100	64	120	80	80	40
3).....	220	250	80	53	130	85	60	40
4).....	250	225	90	65	125	80	75	45
5).....	190	230	90	60	115	78	100	48
6).....	240	300	89	63	132	84	75	45
<i>C. tenuirostris:</i>								
1).....	250	290	100	70	140	92	90	55
2).....	280	360	110	75	145	94	85	53
3).....	300	380	110	75	150	90	90	50
4).....	270	310	95	72	135	88	85	55
5).....	265	305	105	70	138	90	88	50

Основной цвѣтъ яицъ обоихъ видовъ чисто-бѣлый, со временемъ приобретающій грязный желтоватый оттѣнокъ. Поверхность гладкая, блестящая. Форма измѣняется отъ яйцевидной до слегка грушевидной (иногда въ одной и той же кладкѣ).

Размѣры яицъ.

C. leucogaster:

	<i>Длина.</i>	<i>Ширина.</i>
	26,4 m.m.	17,7 m.m.
	26,4 "	17,7 "
1). Рѣка Пскемъ; 5. VI..	25,4 "	17,9 "
	25 "	18,4 "
	25 "	18,4 "
	27 "	18,8 "
	26,6 "	19 "
2). Ib.; 7. VI.....	26 "	18,9 "
	26 "	19 "
	25,4 "	17,7 "
3). Ib.; 8. VI.....	28,1 "	19,2 "
	26,3 "	17,8 "
4). Р. Чигирчикъ; 7. V...	25,4 "	17,7 "
	25 "	18,4 "

C. tenuirostris:

	<i>Длина.</i>	<i>Ширина.</i>
	28,4 m.m.	18,5 m.m.
	28,3 "	18,6 "
1). Р. Итокаръ; 7. VI....	28,3 "	18,6 "
	26,8 "	19 "
	28,5 "	18,4 "
	28,3 "	18,6 "
2). Ib.....	28,3 "	18,6 "
	27,8 "	18,6 "
	28 "	18,9 "
3). Р. Чичакъ; 8. VI.....	27,8 "	19 "
	27,8 "	18,7 "

Интересное наблюдение удалось произвести С. М. Алексѣву на рѣкѣ Пскемѣ, гдѣ однажды онъ видѣлъ выводокъ изъ четырехъ молодыхъ, державшихся еще вмѣстѣ и получавшихъ кормъ какъ отъ бурой оляпки, такъ и отъ бѣлобрюхой.

Что касается до линянiя, то я нахожу свои наблюденiя еще крайне недостаточными. Молодая *C. tenuirostris*, добытая въ сѣверной и южной Ферганѣ въ промежутокъ времени между 2 и 26. VI, были одѣты въ вполне развитой первый нарядъ, частью безъ всякаго признака перехода въ нарядъ первой осени (даже у экземпляра отъ 26. VI), частью лишь съ самыми ничтожными его слѣдами въ мелкомъ оперенiи. Взрослая этого вида въ экземплярахъ изъ сѣверной Ферганы (рѣки Падша-атъ, Итокаръ) отъ 1 до 30. VI либо совсѣмъ еще не обнаруживали линянiя, либо только его начинали въ немногихъ перьяхъ мелкаго оперенiя и въ самыхъ заднихъ маховыхъ (таковые экземпляры добывались послѣ 15. VI). Взрослая изъ южной Ферганы (бассейны рѣкѣ Исфаръ и Сохъ) въ моихъ экземплярахъ начинаютъ линьку раньше: у птицъ, добытыхъ, напримѣръ, 8. VI, уже наблюдалось сильное линянiе не только мелкаго, но и крупнаго оперенiя, а у одной отъ 30. VI (съ Биръ-су) мелкое перо почти все смѣнилось; смѣнились и махи съ рулями, но еще большею частью значительно не отросли. Однако и здѣсь въ концѣ iюня мы добывали птицъ, только что начинавшихъ линьку. Экземпляры, добытые въ первой трети сентября на Угамѣ, Пскемѣ и Чаткалѣ большею частью находились въ вполне развитомъ, великолѣпномъ осеннемъ нарядѣ: лишь немногие изъ нихъ имѣли еще не вполне отросшія перья на головѣ.—Что касается до *C. leucogaster*, то ея молодая, добытая на Пскемѣ и Чаткалѣ во второй половинѣ iюня, еще не приступали къ линянiю; нѣсколько экземпляровъ отъ первой трети сентября съ нижняго Чаткала *только что его начали* (въ мелкомъ оперенiи). Изъ взрослыхъ птицъ этого вида (и изъ тѣхъ же рѣчныхъ бассейновъ) начало линьки наблюдалось только у тѣхъ, которыя добывались въ послѣдней трети iюня. Экземпляры, убитые здѣсь въ первой трети сентября, частью покончили съ линянiемъ, частью оканчивали его (какъ въ мелкомъ, такъ и въ крупномъ оперенiи).

152. *Periparus ater chorassanicus* Zar. & Bilk.

Въ дополненiе къ описанiю хорасанской черной синицы ¹⁾ слѣдуетъ замѣтить, что и ея молодая особи (въ первомъ, вполне

¹⁾ „Орнит. Вѣстн.“ за 1911 г., №№ 3—4, стр. 307—310. *Авт.*

развитомъ, нарядѣ) очень хорошо отличаются отъ таковыхъ же южно-каспійской формы (*Periparus ater gaddi* Zag.). Желтизна щекъ, груди и брюшка у нихъ развита далеко въ меньшей степени, а на затылочномъ пятнѣ часто вовсе отсутствуетъ. Оливковый оттѣнокъ спины, плечевыхъ, крестца, верхнихъ кроющихъ крыла, а также бордюровъ на внѣшнихъ опахалахъ маховыхъ и рулевыхъ развитъ значительно слабѣе, при чемъ онъ не такой чистый и болѣе сѣроватый. Мнѣ кажется, что молодыхъ птицъ названныхъ формъ можно отличать даже безъ сравненія другъ съ другомъ.

Ташкентъ.
18 ноября 1911 г.



Перечень птиц Кѣлецкой губерніи.

Е. Я. Катинъ.

Verzeichnis der Vögel des Kjelzer Gouvernements.

Von E. J. Katin.

Въ орнитологическомъ отношеніи Кѣлецкую губернію можно раздѣлить на три части: 1) сѣверную, занимающую болѣе $\frac{3}{4}$ всего ея пространства отъ сѣвера къ югу, 2) юго-восточную—по рѣкѣ Вислѣ, на всемъ ея протяженіи по границѣ съ Австріей, и 3) юго-западную—по остальной сухопутной границѣ.

Сѣверная часть, при небольшомъ количествѣ озеръ и болотъ, представляетъ довольно холмистую и мѣстами гористую поверхность, со значительными преимущественно хвойными лѣсами. Юго-восточная часть въ 10—15 верстахъ отъ рѣки Вислы представлена такъ называемой „Привислинской низменностью“, съ небольшими, кое-гдѣ разбросанными лѣсами и значительными зарослями лозы и ивняка по побережью рѣки; въ этой части имѣются кромѣ того довольно большія болота и много искусственныхъ прудовъ, осушаемыхъ осенью. Юго-западная часть очень гориста и мѣстами имѣетъ чисто скалистыя пространства.

Климатъ губерніи умѣренный. Обыкновенно осенью до конца октября здѣсь бываетъ хорошая погода. Зима устанавливается къ концу декабря и бываетъ обычно съ частыми оттепелями, такъ что рѣка Висла замерзаетъ не каждый годъ. Весна начинается съ половины февраля, но устанавливается не ранѣе середины апрѣля. Лѣто до конца августа бываетъ здѣсь обыкновенно дождливое.

Въ настоящій перечень я помѣщаю только тѣхъ птицъ, которыя были добыты мною или при мнѣ въ теченіе моихъ шестнадцатилѣтнихъ наблюденій.

Объясненіе знаковъ, употребленныхъ въ нижеслѣдующей таблицѣ съ цѣлью обозначенія степени распространенности наблюдававшихся птицъ:

- ±—очень обыкновенная птица,
- +—болѣе или менѣе обыкновенная,
- +р.—рѣдкая.

Всѣ даты приведены по старому стилю.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ.	Оседлы.	Лѣтнюю- щія.		Зимую- щія.		Пролетныя.	Залетныя.	Самое раннее нахожденіе полныхъ кла- докъ.	Число яицъ въ кладкѣ.
			Гнѣздятся постоянно.	Гнѣздятся случайно.	Постоянно.	Случайно.				
1.	<i>Turdus viscivorus</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	13. IV. 1906.	3—5.
2.	„ <i>pilaris</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	8. IV. 1905.	5, рѣдко 6.
3.	„ <i>muscius</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	24. IV. 1905.	5, рѣдко 6.
4.	„ <i>iliacus</i> L.	—	—	—	—	—	+	—	—	—
5.	<i>Merula merula</i> L. ¹⁾	—	+	—	—	+	—	—	15. IV. 1906.	4—5.
6.	„ <i>torquata alpestris</i> Brehm. ²⁾	—	—	—	—	—	—	+	—	—
7.	<i>Monticola saxatilis</i> L. ³⁾	—	+ p.	—	—	—	—	—	15. IV. 1909.	4—5.
8.	<i>Cinclus aquaticus</i> Bechst.	+	—	—	—	—	—	—	4. IV. 1910.	5—6.
9.	<i>Ruticilla tithys</i> Scop.	—	+	—	—	—	—	—	20. IV. 1903.	5, рѣдко 6.
10.	„ <i>phoenicurus</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	8. V. 1908.	6, рѣдко 7.
11.	<i>Pratincola rubetra</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	6. V. 1905.	6, рѣдко 7.
12.	„ <i>rubicola</i> L.	—	+ p.	—	—	—	—	—	21. V. 1909.	5—6.
13.	<i>Saxicola oenanthe</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	24. IV. 1905.	5, рѣдко 6.
14.	<i>Erithacus rubecula</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	1. V. 1903.	5—6.
15.	<i>Daulias luscini</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	10. V. 1904.	5—6.
16.	„ <i>philomela</i> Bechst.	—	+	—	—	—	—	—	9. V. 1902.	5—6.
17.	<i>Cyanecula leucocyana</i> Brehm.	—	+ p.	—	—	—	—	—	2. V. 1902.	5—6.
18.	<i>Sylvia nisoria</i> Bechst.	—	+	—	—	—	—	—	13. V. 1905.	5.
19.	„ <i>hortensis</i> Bechst.	—	+	—	—	—	—	—	9. V. 1908.	5.
20.	„ <i>curruca</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	5. V. 1908.	5—6.
21.	„ <i>cinerea</i> Bechst.	—	+	—	—	—	—	—	30. IV. 1905.	5—6.
22.	„ <i>atricapilla</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	5. V. 1909.	5.
23.	<i>Regulus cristatus</i> Vieill.	+	—	—	—	—	—	—	4. V. 1906.	8—11.
24.	„ <i>ignicapillus</i> Brehm ⁴⁾	—	—	—	—	—	+	—	—	—
25.	<i>Phylloscopus sibilator</i> Bechst.	—	+	—	—	—	—	—	7. V. 1904.	5—6.
26.	„ <i>trochilus</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	3. V. 1905.	5—7.
27.	„ <i>rufus</i> Bechst.	—	+	—	—	—	—	—	5. V. 1908.	5—6.
28.	<i>Hypolais philomela</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	20. V. 1904.	5.
29.	<i>Acrocephalus aquaticus</i> Gmel.	—	+	—	—	—	—	—	20. V. 1909.	5—6.
30.	„ <i>schoenobaenus</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	15. V. 1907.	5—6.
31.	„ <i>streperus</i> Vieill.	—	+	—	—	—	—	—	23. V. 1905.	4—5.
32.	„ <i>palustris</i> Bechst.	—	+	—	—	—	—	—	16. V. 1908.	4—6.
33.	„ <i>arundinaceus</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	23. V. 1904.	5.
34.	<i>Locustella fluviatilis</i> Wolf.	—	+ p.	—	—	—	—	—	27. V. 1905.	4—5.
35.	„ <i>luscinioides</i> Savi.	—	+	—	—	—	—	—	25. V. 1909.	4—5.
36.	„ <i>naevia</i> Bodd.	—	+ p.	—	—	—	—	—	27. V. 1902.	5—6.
37.	<i>Accentor modularis</i> L.	—	—	+	—	—	+	—	24. V. 1908.	5—6.
38.	<i>Lophophanes cristatus</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	8. IV. 1907.	6—8.
39.	<i>Parus major</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	30. IV. 1906.	8—14.
40.	<i>Periparus ater</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	20. IV. 1906.	7—10.
41.	<i>Poecile palustris</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	22. IV. 1908.	6—10.
42.	<i>Cyanistes caeruleus</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	2. V. 1909.	11—15.
43.	<i>Acredula caudata</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	2. V. 1906.	9—15.
44.	<i>Aegithalus pendulinus</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	3. V. 1908.	7—8.
45.	<i>Certhia familiaris</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	28. IV. 1906.	7—9.
46.	<i>Sitta caesia</i> Wolf.	+	—	—	—	—	—	—	22. IV. 1906.	6—8.
47.	<i>Troglodytes parvulus</i> L.	+	—	—	—	—	—	—	7. V. 1905.	6—7.
48.	<i>Motacilla flava</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	8. V. 1906.	5—6.
49.	„ <i>alba</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	14. IV. 1907.	5—7.
50.	<i>Calobates boarula</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	16. IV. 1909.	5—6.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ.	Осѣдлы.	Лѣтующія.		Зимующія.		Пролетныя.	Залетныя.	Самое раннее нахождение полныхъ кла- докъ.	Число яицъ въ кладкѣ.
			Гнѣздятся постоянно.	Гнѣздятся случайно.	Постоянно.	Случайно.				
51.	<i>Anthus spinoletta</i> L. 5).....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
52.	„ <i>trivialis</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	6. V. 1906.	5—6.
53.	„ <i>pratensis</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	2. V. 1907.	5—6.
54.	„ <i>campestris</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	4. VI. 1907.	4—5.
55.	<i>Lanius excubitor</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	16. IV. 1906.	6—7.
56.	„ <i>minor</i> Gmel.....	—	+	—	—	—	—	—	14. V. 1905.	5—6.
57.	„ <i>collurio</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	15. V. 1906.	6.
58.	<i>Ortolus galbula</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	13. V. 1909.	4—5.
59.	<i>Ampelis garrulus</i> L.....	—	—	—	+	—	—	—	—	—
60.	<i>Muscicapa parva</i> Bechst. 6)...	—	—	+	—	—	—	—	?	?
61.	„ <i>grisola</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	14. V. 1905.	4—6.
62.	„ <i>atricapilla</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	3. V. 1906.	6—7.
63.	<i>Clivicola riparia</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	2. V. 1906.	5—6.
64.	<i>Chelidon urbica</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	17. V. 1905.	5.
65.	<i>Hirundo rustica</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	7. V. 1906.	5—6.
66.	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	14. V. 1909.	4—5.
67.	<i>Ligurinus chloris</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	20. IV. 1909.	5—6.
68.	<i>Fringilla coelebs</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	13. IV. 1907.	5.
69.	„ <i>montifringilla</i> L.....	—	—	—	—	+	—	—	—	—
70.	<i>Carduelis carduelis</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	21. V. 1905.	5.
71.	<i>Linota cannabina</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	18. IV. 1908.	5—6.
72.	„ <i>exilipes</i> Coues.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
73.	„ <i>linaria</i> L.....	—	—	—	+	—	—	—	—	—
74.	<i>Chrysomitris spinus</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	27. IV. 1911.	5.
75.	<i>Serinus hortulanus</i> Koch....	—	+	—	—	—	—	—	13. V. 1909.	4—5.
76.	<i>Passer montanus</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	16. IV. 1904.	5, рѣдко 6.
77.	„ <i>domesticus</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	18. III. 1906.	5, рѣдко 6.
78.	<i>Loxia curvirostra</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	3. IV. 1904.	3—4.
79.	„ <i>pityopsittacus</i> Bechst..	+p.	—	—	—	—	—	—	13. IV. 1908.	3—4.
80.	<i>Carpodacus erythrinus</i> Pall..	—	—	—	—	+p.	—	—	—	—
81.	<i>Pyrhula europaea</i> Vieill. 7)...	—	—	—	—	—	+	—	—	—
82.	„ <i>rubicilla</i> Pall.....	—	—	—	+	—	—	—	—	—
83.	<i>Emberiza schoeniclus</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	27. IV. 1906.	5—6.
84.	„ <i>hortulana</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	30. IV. 1905.	4—6.
85.	„ <i>miliaria</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	7. V. 1906.	4—5.
86.	„ <i>citrinella</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	22. IV. 1902.	5.
87.	<i>Plectrophanes nivalis</i> L.....	—	—	—	—	+	—	—	—	—
88.	<i>Galerida cristata</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	13. IV. 1905.	4—5.
89.	<i>Alauda arvensis</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	15. IV. 1905.	5.
90.	„ <i>arborea</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	20. IV. 1903.	4—5.
91.	<i>Sturnus vulgaris</i> L.....	—	—	+	—	—	+	—	7. V. 1909.	5.
92.	„ <i>intermedius</i> Praz....	—	+	—	—	—	—	—	19. IV. 1908.	5—6.
93.	<i>Corvus corax</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	9. III. 1908.	5—7.
94.	„ <i>cornix</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	1. IV. 1903.	5—6.
95.	„ <i>frugilegus</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	4. IV. 1909.	4—5.
96.	„ <i>monedula collaris</i> Drum.....	+	—	—	—	—	—	—	14. IV. 1909.	5—6.
97.	<i>Pica pica</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	21. IV. 1904.	6—7.
98.	„ „ <i>var. leucoptera</i> Gould. 8).....	+	—	—	—	—	—	—	25. IV. 1904.	6—7.
99.	<i>Garrulus glandarius</i> L.....	+	—	—	—	—	—	—	25. IV. 1907.	6—7.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ.	Осѣдлыя.	Лѣтующія.		Зимующія.		Пролетныя.	Залетныя.	Самое раннее нахождение полныхъ кла- докъ.	Число яицъ въ кладкѣ.
			Гнѣздятся постоянно.	Гнѣздятся случайно.	Постоянно.	Случайно.				
100.	Nucifraga caryocatactes L...	—	—	—	—	+	—	—	—	—
101.	Coracias garrula L.....	—	+	—	—	—	—	—	18 V. 1905.	4—5.
102.	Caprimulgus europaeus L...	—	+	—	—	—	—	—	16 V. 1905.	2.
103.	Microtus apus L. ⁹⁾	—	+	—	—	—	—	—	22 V. 1909.	2—4.
104.	Alcedo ispida L.....	+	—	—	—	—	—	—	28 IV. 1909.	6—8.
105.	Upupa epops L.....	—	+	—	—	—	—	—	2 V. 1907.	5—8.
106.	Dryocopus martius L.....	+	—	—	—	—	—	—	20 IV. 1904.	3—4, рѣдко 5.
107.	Gecinus viridis L.....	±	—	—	—	—	—	—	21 IV. 1908.	6—8.
108.	" canus Gmel.....	+	—	—	—	—	—	—	9 V. 1905.	6—7.
109.	Dendrocopus major L.....	±	—	—	—	—	—	—	6 V. 1906.	5—6.
110.	" leuconotus Bechst.	—	—	—	—	+	—	—	—	—
111.	" medius L.....	+	—	—	—	—	—	—	8 V. 1909.	5—6.
112.	" minor L.....	+	—	—	—	—	—	—	7 V. 1906.	5—6.
113.	Jynx torquilla L.....	—	+	—	—	—	—	—	20 V. 1907.	8—11.
114.	Cuculus canorus L.....	—	+	—	—	—	—	—	14 V. 1906.	1, рѣдко 2.
115.	Glaucidium passerinum L. ¹⁰⁾	+p.	—	—	—	—	—	—	?	?
116.	Athene noctua Retz.....	+	—	—	—	—	—	—	16 IV. 1903	4—5.
117.	Strix flammea L.....	+	—	—	—	—	—	—	20 V. 1908.	4—6.
118.	Asio otus L.....	+	—	—	—	—	—	—	7 IV. 1907.	5—6.
119.	" accipitrinus Pall.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
120.	Syrnium aluco L.....	+	—	—	—	—	—	—	29 III. 1904.	2—5.
121.	Nyctea scandiaca L.....	—	—	—	—	+	—	—	—	—
122.	Bubo bubo L. ¹¹⁾	+	—	—	—	—	—	—	29 III. 1907.	2—3.
123.	Pernis apivorus L.....	—	+	—	—	—	—	—	18 V. 1903.	2—4.
124.	Buteo buteo L.....	—	+	—	—	+	—	—	26 IV. 1909.	2—3.
125.	Archibuteo lagopus Gmel...	—	—	—	+	—	—	—	—	—
126.	" pallidus Menzb...	—	—	—	—	+	—	—	—	—
127.	Vultur monachus L. ¹²⁾	—	—	—	—	—	+	—	—	—
128.	Haliaetus albicillus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
129.	Aquila chrysaëtus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
130.	" maculata Gmel.....	—	+	—	—	—	—	—	30 IV. 1909.	1—2.
131.	Circaëtus gallicus Gmel.	—	—	+	—	—	—	—	16 V. 1902.	1.
132.	Pandion haliaëtus L.....	—	—	+	—	—	—	—	25 IV. 1903.	3.
133.	Milvus ater Gmel.....	—	—	+	—	—	—	—	30 IV. 1909.	2—3.
134.	" ictinus Savi.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
135.	Astur palumbarius L.....	+	—	—	—	—	—	—	28 III. 1905.	4—5.
136.	Accipiter nisus L.....	±	—	—	—	—	—	—	30 IV. 1905.	5—6.
137.	Circus aeruginosus L.....	—	+	—	—	—	—	—	14 V. 1907.	4—5.
138.	" pygargus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
139.	" cyaneus L.....	—	—	—	—	+	+	—	—	—
140.	Falco peregrinus L.....	+p.	—	—	—	—	—	—	15 IV. 1908.	3—4.
141.	" subbuteo L.....	—	+	—	—	—	—	—	1 VI. 1906.	3—4.
142.	" aesalon Gmel.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
143.	Cerchneis tinnunculus L.....	—	±	—	—	—	—	—	30 IV. 1908.	5—6.
144.	" vespertinus L.....	—	—	+	—	—	—	—	8 V. 1907.	5.
145.	Columba palumbus L.....	—	±	—	—	—	—	—	2 V. 1904.	2.
146.	" oenas L.....	—	+	—	—	—	—	—	6 IV. 1906.	2.
147.	Turtur turtur L.....	—	+	—	—	—	—	—	30 IV. 1905.	2.
148.	Coturnix coturnix L.....	—	+	—	—	—	—	—	26 V. 1907.	10—14.
149.	Phasianus colchicus L. ¹³⁾ ...	+	—	—	—	—	—	—	28 IV. 1905.	9—14.
150.	Perdix perdix L.....	±	—	—	—	—	—	—	20 V. 1905.	13—22.

НАИМЕНОВАНИЕ.

№№		Общдлы.	Лѣтнюю.		Зимую.		Пролетны.	Залетны.	Самое равнее нахождение полныхъ кла- докъ.	Число яицъ въ кладкѣ.
			Гнѣздятся постоянно.	Гнѣздятся случайно.	Постоянно.	Случайно.				
151.	Lyrurus tetrax L.....	+	—	—	—	—	—	—	18. IV. 1908.	9—12.
152.	Bonasa bonasia L.....	+	—	—	—	—	—	—	17. IV. 1906.	8—13.
153.	Crex crex L.....	—	+	—	—	—	—	—	5. VI. 1906.	7—10.
154.	Rallus aquaticus L.....	—	+	—	—	+	—	—	28. V. 1905.	6—9.
155.	Fulica atra L.....	—	+	—	—	—	—	—	4. V. 1906.	8—12.
156.	Gallinula chloropus L.....	—	+	—	—	—	—	—	10. V. 1907.	6—10.
157.	Porzana porzana L.....	—	+	—	—	—	—	—	20. V. 1905.	8—12.
158.	„ parva Scop.....	—	+	—	—	—	—	—	18. V. 1909.	8—10.
159.	Otis tetrax L. ¹⁴⁾	—	—	—	—	—	+	—	—	—
160.	Oedienemus crepitans Temm.	—	+	—	—	—	—	—	29. IV. 1909.	2.
161.	Grus grus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
162.	Ardea cinerea L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
163.	„ purpurea L.....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
164.	„ alba L.....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
165.	Nycticorax nycticorax L. ¹⁵⁾ .	—	—	—	—	—	—	+	—	—
166.	Ardetta minuta L.....	—	+	—	—	—	—	—	1. IV. 1907.	5—6.
167.	Botaurus stellaris L.....	—	+	—	—	—	—	—	28. IV. 1906.	—
168.	Ciconia alba Bechst.....	—	+	—	—	—	—	—	19. IV. 1908.	4—5.
169.	„ nigra L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
170.	Vanellus vanellus L.....	—	+	—	—	—	—	—	10. IV. 1906.	4.
171.	Charadrius pluvialis L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
172.	Squatarola helvetica L. ¹⁶⁾ ...	—	—	—	—	—	+	—	—	—
173.	Eudromias morinellus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
174.	Aegialitis hiaticula L.....	—	+	—	—	—	—	—	21. V. 1908.	4.
175.	„ dubia Scop.....	—	+	—	—	—	—	—	26. V. 1906.	4.
176.	Numenius arquatus L. ¹⁷⁾ ...	—	—	+	—	—	+	—	2. V. 1908.	4.
177.	„ phaeopus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
178.	Limosa limosa L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
179.	Totanus littoreus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
180.	„ fuscus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
181.	„ calidris L.....	—	+	—	—	—	—	—	27. IV. 1907.	4.
182.	„ glareola L.....	—	+	—	—	—	—	—	24. IV. 1905.	4.
183.	„ ochropus L.....	—	+	—	—	—	—	—	29. IV. 1908.	4.
184.	Actitis hypoleucos L.....	—	+	—	—	—	—	—	4. V. 1908.	4.
185.	Machetes pugnax L.....	—	—	+	—	—	+	—	12. V. 1907.	4.
186.	Tringa subarquata Guld....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
187.	„ alpina Leisl.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
188.	„ minuta Leisl.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
189.	„ temmincki Leisl.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
190.	Scolopax rusticola L.....	—	+	—	—	—	—	—	19. IV. 1905.	4.
191.	„ major L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
192.	„ gallinago L.....	—	+	—	—	—	—	—	27. IV. 1907.	4.
193.	„ gallinula L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
194.	Hydrochelidon nigra L.....	—	+	—	—	—	—	—	10. V. 1908.	2—3.
195.	„ leucoptera Schinz....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
196.	Sterna hirundo L.....	—	+	—	—	—	—	—	16. V. 1908.	2—3.
197.	„ minuta L.....	—	+	—	—	—	—	—	24. V. 1909.	2—3.
198.	Larus argentatus Brünn.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
199.	„ fuscus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
200.	„ caesus L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
201.	Larus ridibundus L.....	—	—	+	—	—	+	—	29. IV. 1908.	2—3.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ.	Облѣны.	Лѣтнюю.		Зимую.		Пролетны.	Залетны.	Самое раннее нахожденіе полныхъ кла- докъ.	Число яицъ въ кладкѣ.
			Гнѣздятся постоянно.	Гнѣздятся случайно.	Постоянно.	Случайно.				
202.	<i>Stereorarius pomatorhinus</i> Temm. 18).....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
203.	„ <i>crepidatus</i> Gmel....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
204.	<i>Colymbus arcticus</i> L.....	—	—	—	—	—	+ p.	—	—	—
205.	<i>Podiceps cristatus</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	23. V. 1907.	—
206.	„ <i>griseigena</i> Bodd....	—	+	—	—	—	—	—	1. VI. 1907.	—
207.	„ <i>nigricollis</i> Brehm....	—	+	—	—	—	—	—	17. V. 1906.	2—4.
208.	„ <i>fluvialis</i> Tunst....	—	+	—	—	—	—	—	5. V. 1908.	4—6.
209.	<i>Cygnus cygnus</i> L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
210.	„ <i>olor</i> Gmel.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
211.	<i>Anser anser</i> L.....	—	—	—	—	—	+ p.	—	—	—
212.	„ <i>albifrons</i> Scop.	—	—	—	—	—	+	—	—	—
213.	„ <i>finmarchicus</i> Gunner..	—	—	—	—	—	+ p.	—	—	—
214.	<i>Melanonyx segetum</i> Gmel....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
215.	„ <i>arvensis</i> Brehm....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
216.	„ <i>carneirostris</i> Buturl.	—	—	—	—	—	+	—	—	—
217.	<i>Branta bernicla</i> L.....	—	—	—	—	—	+ p.	—	—	—
218.	<i>Tadorna tadorna</i> L.....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
219.	<i>Anas boschas</i> L.....	—	+	—	+	—	—	—	2. IV. 1903.	9—13.
220.	<i>Chaulelasmus streperus</i> L..	—	+ p.	—	—	—	—	—	5. V. 1907.	7—9.
221.	<i>Querquedula crecca</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	4. V. 1905.	8—12.
222.	„ <i>circa</i> L.	—	+	—	—	—	—	—	6. V. 1907.	8—12.
223.	<i>Spatula clypeata</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	4. V. 1906.	8—12.
224.	<i>Dafila acuta</i> L.....	—	—	+	—	—	+	—	11. V. 1907.	7—10.
225.	<i>Mareca penelope</i> L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
226.	<i>Fuligula ferina</i> L.....	—	+	—	—	—	—	—	30. IV. 1906.	8—12.
227.	„ <i>nyroca</i> Guld.....	—	+	—	—	—	—	—	20. V. 1908.	9—12.
228.	„ <i>fuligula</i> L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
229.	„ <i>marila</i> L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
230.	<i>Harelda glacialis</i> L.....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
231.	<i>Clangula glaucion</i> L.....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
232.	<i>Oidemia nigra</i> L.....	—	—	—	—	—	—	+	—	—
233.	„ <i>fusca</i> L.....	—	—	—	—	+	+	—	—	—
234.	<i>Mergus albellus</i> L.....	—	—	—	—	—	+	—	—	—
235.	„ <i>serrator</i> L.....	—	—	—	—	+	+	—	—	—
236.	„ <i>merganser</i> L.....	—	—	—	—	+	+	—	—	—

1). *Merula merula* L.—Незначительное количество старых птиц остается на зиму и держится при незамерзающих источниках или въ густыхъ заросляхъ. Мною добытъ самецъ 10. I. 1905.

2). *Merula torquata alpestris* Brehm.—Только случайнымъ залетомъ изъ Карпатъ объясняю добычу здѣсь старой самки 18. III. 1907 въ горныхъ лѣсахъ юго-западной части губерніи (вблизи деревни Ойцово, Олькушскаго уѣзда).

3). *Monticola saxatilis* L.—Встрѣчается только въ скалахъ юго-западной части губерніи. Въ 1909 году я нашелъ гнѣздящуюся пару, а въ 1903 году ихъ было не менѣе шести.

4). *Regulus ignicapillus* Brehm.—Только одинъ разъ, 6. IV. 1903, мною добытъ старый самецъ.

5). *Anthus spinoletta* L.—Добыты 2 самца 18. IX. 1906 и 5. IX. 1908.

6). *Muscicapa parva* Bechst.—2. VI. 1906 нашелъ гнѣздо съ четырьмя едва начинающими оперяться птенцами.

7). *Pyrrhula europaea* Vieill.—Добытъ мною старый самецъ 30. VIII. 1905.

8). *Pica pica* var. *leucoptera* Gould.—Большую частью встрѣчается именно эта сорока, представляющая переходъ то отъ типичной къ бѣлокрылой, то обратно.

9). *Micropus apus* L.—Гнѣздится только въ скалахъ и древесныхъ дуплахъ юго-западной части губерніи.

10). *Glaucidium passerinum* L.—Встрѣчалъ этихъ совокъ лѣтомъ и зимой.

11). *Bubo bubo* L.—Гнѣздящимся сохранился только въ скалахъ юго-западной части губерніи.

12). *Vultur monachus* L.—Въ октябрѣ 1906 года былъ застрѣленъ одинъ экземпляръ близъ казеннаго курорта Бускъ, въ юго-восточной части губерніи.

13). *Phasianus colchicus* L.—Искусственно разведенъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губерніи, обжился и размножается успѣшно.

14). *Otis tetrix* L.—19. X. 1906 былъ застрѣленъ въ юго-восточной части губерніи одинъ стрепетъ.

15). *Nycticorax nycticorax* L.—Изрѣдка бываютъ залеты лѣтомъ. Мною добыта на Вислѣ старая самка 6. VI. 1907.

16). *Squatarola helvetica* L.—На весеннемъ пролетѣ встрѣчается очень рѣдко. На осеннемъ же бываетъ ежегодно и держится стайками въ 3—5 экземпляровъ по спущеннымъ прудамъ.

17). *Numenius arquatus* L.—2. V. 1908 нашелъ гнѣздо съ 4-мя яйцами, а въ концѣ іюня того-же года поймалъ еще не летающаго, но вполне опереннаго молодого.

18). *Stercorarius pomatorhinus* Temm.—3. IX. 1909 добыта молодая самка изъ числа 3-хъ птицъ, летавшихъ надъ прудами, вдали отъ рѣки Вислы.



Новыя данныя къ распространенію птицъ въ русскомъ Алтаѣ и по Абакану.

И. П. Сушкинъ,

проф. сравн. анат. Имп. Харьк. Унив.

Neue Tatsachen der geographischen Verbreitung der Vögel im russischen Altai und am Abakan.

Von Prof. P. P. Suschkin.

Лѣтомъ 1912 года мною была предпринята поѣздка съ цѣлью зоологическаго изслѣдованія русскаго Алтая. Я намѣтилъ изученіе этой области какъ продолженіе моихъ орнитологическихъ изслѣдованій западнаго Саяна, показавшихъ между прочимъ, что многія птицы, считавшіяся забайкальскими, идутъ на западъ по крайней мѣрѣ до Енисея (Описаніе орнитологической фауны западнаго Саяна въ настоящее время находится въ печати). Моими спутниками были: В. В. Переверзевъ, Н. Н. Попова, В. В. Редикорцевъ, занимающіе должности ассистентовъ при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ и Харьковскихъ Медицинскихъ Курсахъ, и студентъ П. В. Серебровскій. Считаю долгомъ выразить здѣсь свою признательность названнымъ лицамъ за ихъ цѣнное содѣйствіе въ производствѣ наблюденій и сборѣ зоологическаго матеріала ¹⁾.

Исходнымъ пунктомъ путешествія было избрано село Таштыбъ, лежащее на границѣ Енисейской и Томской губерній, всего въ 25 верстахъ отъ села Арбаты, посѣщеннаго мною въ саянскую поѣздку. Экспедиція выступила изъ Таштыба—послѣ долгихъ сборовъ—31 мая и направилась вдоль лѣваго берега Абакана; на этомъ пути былъ сдѣланъ свертокъ на правую сторону Абакана, къ горѣ Шаманъ съ ея изолированнымъ альпійскимъ

¹⁾ Путешествіе это было предпринято цѣликомъ на средства участниковъ. Императорское Русское Географическое Общество—при которомъ имѣется специальная біогеографическая коммиссія—не только отказало экспедиціи въ денежной субсидіи, но даже не потрудилося своевременно снабдить ее открытыми листами. А между тѣмъ въ этой—по мнѣнію Географическаго Общества вѣроятно слишкомъ хорошо изученной—мѣстности работала въ этомъ году экспедиція, снаряженная американцами.

поясомъ. Дойдя вдоль Абакана до рѣки Конисукъ и поднявшись по ней на горный узелъ Джёзынъ, вершина котораго также лежитъ въ альпійской зонѣ, экспедиція спустилась въ верхнюю часть бассейна рѣки Лебедь, принадлежащей уже къ системѣ Оби. Отсюда экспедиція повернула на рѣку Байголъ и, слѣдуя притокомъ его, Клыхъ, достигла сѣвернаго берега Телецкаго озера. Обслѣдовавъ сѣверо-восточный и сѣверо-западный углы озера (устья рѣкъ Каммы и Колдоръ), экспедиція направилась тайгой, прилежащей къ лѣвому берегу Телецкаго озера, къ устью Чулышмана. На этомъ пути была сдѣлана боковая экскурсія на гору Алтынъ-ту, у юго-восточнаго угла озера. Послѣ довольно головоломнаго спуска въ долину Чулышмана, стоившаго экспедиціи порчи двухъ лошадей, экспедиція направилась Курайской дорогой—вверхъ по Чулышману, на Улаганъ, перейдя Башкаусъ на рѣчку Куадры, и чрезъ Курайскій проходъ мимо бѣлковъ, лежащихъ въ верховьѣ р. Куадры. Спустившись въ Курайскую степь, экспедиція направилась Чуйскимъ трактомъ къ Кошъ-агачу.

Область, лежащая вдоль пути отъ Таштыба до Телецкаго озера, представляетъ собою гористую страну, гдѣ однако ни одна вершина не достигаетъ снѣговой линіи и лишь немногія выходятъ въ альпійскую зону. Почти вся эта область покрыта тайгой—вѣковымъ лѣсомъ, состоящимъ, главнымъ образомъ, изъ кедра и пихты. Окраекъ этой области у Таштыба и южнаго конца Телецкаго озера характеризуется преобладаніемъ лиственницы. Альпійская зона представлена какъ бы островками, затерянными среди моря тайги, и имѣетъ очень скудную и мало характерную фауну. Начиная отъ Алтынъ-ту, идетъ область высокаго Алтая. Рельефъ рѣзче и горы выше. Лѣсная растительность представлена преимущественно лиственницей. Лѣсной покровъ скуднѣе, болѣе разорванъ, частью приуроченъ къ мѣнѣе нагрѣваемымъ склонамъ. Открытая мѣстность занимаетъ обширную территорію. Это—главнымъ образомъ альпійская зона, представленная здѣсь уже не изолированными островками. Кромѣ того на нижнемъ Чулышманѣ, по Улагану, и въ верхней части бассейна Чуи, развивается степная, даже пустынная формація. Кое-гдѣ она непосредственно переходитъ въ альпійскую область. Очень своеобразна такъ называемая Чуйская степь, на высотѣ 5 слишкомъ тысячъ футъ. Это уже преддверіе высокихъ каменныхъ степей центральной Азіи. Растительность мѣстами носитъ

рѣшительно пустынный характеръ, а бокъ о бокъ растутъ и представители альпійской флоры; снѣгопады среди лѣта не рѣдкость.

Погода, исключительно неблагоприятная въ этомъ году—сильные дожди въ тайгѣ, частые снѣгопады въ альпійской зонѣ—чрезвычайно мѣшала наблюденьямъ и сборамъ. Все же удалось за іюнь и іюль собрать свыше 600 шкурокъ птицъ и, связавъ фауну Саяна и Алтая, установить нѣкоторые, какъ мнѣ кажется, заслуживающіе вниманія факты распространенія. Отмѣчу слѣдующіе.

Hemichelidon sibirica.—Идетъ отъ Минусинскаго края въ тайгу западнаго берега Телецкаго озера. То же распространеніе имѣетъ *Poliomyias mugimaki*, мѣстами довольно обыкновенная.

Siphia albicilla.—Найдена на гнѣздовѣхъ у сѣвернаго конца Телецкаго озера.

Cinclus cinclus bianchii.—Однажды найдена на Ачелманѣ, притокѣ нижняго Чулышмана. Преобладающая форма оляпки—*C. s. baicalensis*.

Accentor himalayanus.—Къ югу отъ Алтынъ-ту обыкновенна въ альпійской зонѣ. Найдена также на Джёзынѣ, сѣвернѣе Абакана.

Monticola saxatilis.—Всюду въ подходящихъ мѣстностяхъ, начиная отъ Алтынъ-ту.

Saxicola deserti.—Наиболѣе пустынные участки Чуйской степи.

Saxicola isabellina.—Обыкновенна на степныхъ пятнахъ по Улагану и верхнему теченію Чуи.

Ianthia cyanura.—Гнѣздится почти повсюду въ таежной области; еще обыкновенна у сѣверо-восточнаго угла Телецкаго озера, и найдена на гнѣздовѣхъ въ лиственничникахъ по р. Куадру, бѣгущей съ Курайскаго хребта.

Larvivora cyane.—Распространена нѣсколько спорадично, но прослѣжена и до сѣверо-западнаго угла Телецкаго озера; здѣсь эта птичка даже довольно обыкновенна. Это—типичный обитатель непролазныхъ участковъ тайги, низинъ и сырыхъ склоновъ.

Luscinia sibilans.—То же распространеніе, что и предыдущей, но встрѣчается чаще и равномернѣе; мѣстами даже многочисленна, но добыть ее очень трудно. 5 іюля В. В. Переверзевъ нашелъ гнѣздо съ 5 сильно насиженными яйцами. Оно помѣщалось въ древесномъ стволѣ высотой около 2 аршинъ, глубоко

выгнившемъ сверху. Яйца очень своеобразны: свѣтлаго, зелено-сѣвроватаго цвѣта съ блѣдными бурыми пятнами, иногда скрывающими основной цвѣтъ на тупомъ концѣ яйца.

Phoenicurus erythrogastra grandis.—Только къ югу отъ Телецкого озера.

Phoenicurus rufiventris.—Распространена приблизительно такимъ же образомъ. *Phoenicurus phoenicurus* еще обыкновенна у сѣвернаго берега Телецкого озера.

Turdus obscurus.—Гнѣздится по верхнему Абакану, преимущественно у верхней границы лѣса.

Turdus ruficollis.—Область гнѣздовья идетъ на западъ по крайней мѣрѣ до Алтынъ-ту и Курайскаго прохода, минуя посѣщенные мѣстности по Абакану. Всюду лишь въ верхней лѣсной зонѣ.

Turdus atrogularis.—Повсюду въ хвойныхъ лѣсахъ.

Reguloides proregulus.—Рѣдка и распространена спорадично вдоль Абакана; самый западный пунктъ—верстахъ въ 150 отъ границы Томской и Енисейской губерній.

Reguloides humii.—Обыкновененъ повсемѣстно по верхней границѣ лѣсной растительности, откуда спускается внизъ, далеко еще не окончивъ линьки. *Reguloides superciliosus* совершенно не гнѣздится здѣсь.

Herbivocula schwarzi.—Обыкновенна на всемъ пути до половины теченія р. Клыхъ. Не идетъ на Телецкое озеро, несмотря на наличность подходящихъ станцій.

Herbivocula fuscata.—Обыкновенна до южнаго конца Телецкого озера.

Herbivocula indica.—Гнѣздится, начиная отъ устья Башкауса.

Dumeticola thoracica.—Рѣдка, но встрѣчается правильно на первыхъ двухъ третяхъ пути отъ Таштыба до Телецкого озера.

Lanius isabellinus.—Найденъ въ Чуйской степи.

Montifringilla arctoa.—Гнѣздящаяся птица альпійской зоны юго-восточнаго Алтая, начиная отъ Алтынъ-ту. Мѣстами очень обыкновененъ.

Carpodacus sewertzowi.—Найденъ на Алтынъ-ту и въ Курайскомъ хребтѣ.

Emberiza godlewskii.—Обыкновенная гнѣздящаяся птица по нижнему теченію Чулышмана.

Emberiza spodocephala.—Гнѣздится въ таежной области до сѣвернаго конца Телецкого озера.

Trypanocorax pastinator.—На Чуйской степи. На всемъ остальномъ пути никакихъ грачей не встрѣчается.

Lagopus lagopus и **Lagopus rupestris.**—Обѣ найдены въ альпійской зонѣ описываемой области. На Алтынъ-ту и ближайшихъ хребтахъ найдены обѣ одновременно, но въ разныхъ станціяхъ.

Falco altaicus.—Наблюдалъ пару на спускѣ съ Курайскаго перевала у верхней границы лѣсной зоны. Сильная буря помѣшала выслѣдить этихъ цѣнныхъ птицъ.

Eutolmaëtus pennatus.—Гнѣздится на нижнемъ теченіи Улагана.

Oedemia stejnegeri.—Встрѣчается правильно по мелкимъ озерамъ, какъ въ таежной, такъ и въ альпійской зонѣ.

Eulabeia indica.—Обыкновенная гнѣздящаяся птица на Чуйской степи.

По общему характеру фауны—какъ отчасти видно изъ сказаннаго—сѣверо-восточный Алтай во многомъ отличается отъ юго-восточнаго. Такимъ образомъ въ русскомъ Алтаѣ слѣдуетъ отличать по крайней мѣрѣ эти два участка (остальныхъ частей Алтая я пока не касаюсь), и мѣстонахождение „Алтай“ представляется совершенно неопредѣленнымъ. Въ фаунѣ сѣверо-восточнаго Алтая выдаются элементы, которые до послѣдняго времени считались восточно-сибирскими, какъ *Polioptila mugimaki*, *Luscinia sibilans* и др. Фауна юго-восточнаго Алтая носитъ рѣшительный южный, отчасти даже монгольскій отпечатокъ; *Saxicola deserti*, *Lanius isabellinus*, *Eulabeia indica*, *Eutolmaëtus pennatus* чрезвычайно характерны. Считаю необходимымъ подчеркнуть, что я нигдѣ не нашелъ совпаденія фаунистическихъ границъ съ границами рѣчныхъ бассейновъ.

1-го августа 1912 г., Кошъ-агачъ, Чуйская степь, русскій Алтай.



Туркестанская рыжепоясничная ласточка.

С. А. Бутурлинъ.

Cecropis rufula ferghanensis subsp. nov.

By S. A. Buturlin.

Въ сборахъ изъ юго - восточной Ферганы—окрестностей укрѣпленія Гульчи, сѣверный склонъ Алая, около 5000 ф. н. у. м.—оказался добытый 25. IV. 1912 (ст. ст.) взрослый самецъ ласточки съ рыжимъ поясомъ черезъ затылокъ и поясницу (т.-е. родъ *Cecropis* Boie, 1826), съ блѣдно-рыжей, тонко исчерченной нижней стороной тѣла и неисчерченной *сильно* блѣднѣющей къ хвосту поясницей (т.-е. видъ *rufula* Temm., 1835). Размѣры птицы: въ тушкѣ длина 180, размахъ 315 м.м.; сложенное крыло 113 м.м.; вырѣзъ хвоста 50 м.м. Типичная средиземноморская (Темминкъ описалъ ее по египетскимъ и сицилійскимъ экземплярамъ, но она распространена и въ Марокко, Алжирѣ, южной Франціи, Италіи, Греціи и западной части Балканскаго полу-ова, Малой Азіи, Палестинѣ, южной Персіи) *Cecropis rufula* (Temm.) значительно крупнѣе, имѣя длину тѣла около 210 м.м., а длину сложенного крыла 120—125, даже болѣе, м.м., и рѣже—у самокъ и молодыхъ—до 118 м.м.

Малый ростъ ферганскаго экземпляра не случаенъ, такъ какъ и ранѣе уже отмѣчалось, что западно-гималайскіе и афганскіе экземпляры этого вида мелки, имѣя крыло около 112—118 м.м. (Э. Хартертъ: „Vog. Pal.“, 1910, р. 805; Dubois: „Synops.“, 1902, р. 254). Слѣдовательно это—расовая особенность. Обычно эту мелкую западно-гималайскую расу надѣляютъ даннымъ Зибомъ именемъ „*scullii*“. Дѣйствительно Зибомъ въ 1883 году

(„Ибисъ“, стр. 167,-- а не 168, какъ цитируетъ Хартертъ) подъ именемъ „*Higundo rufula* β *scullii*“ говоритъ о мелкой восточной расѣ, не указывая типа и не перечисляя экземпляровъ, а о мѣстонахожденіяхъ указывая коротко: „Джилъджитъ и Непалъ“. Однако Отсъ („Faun. Br. Ind“, II, 1890, p. 284) удостовѣряетъ, что онъ имѣлъ типъ описанія отъ самого Зибомы, и что этотъ экземпляръ изъ Непала. И такъ какъ съ одной стороны мы теперь знаемъ, что *C. rufula* или какая-либо ея раса вовсе не водится въ Непалѣ и вообще восточныхъ и центральныхъ Гималаяхъ, а съ другой стороны такой знатокъ индійскихъ птицъ, какъ Oates, склоненъ типъ зибомовской „*scullii*“ относить просто къ *C. nipalensis* (Hodgs.), которая распространена не только въ Непалѣ, но и повсюду въ Гималаяхъ, такъ какъ этотъ типъ *грубо* исчерченъ снизу и имѣетъ лишь *легкое* поблѣднѣніе поясницы кзади, что нерѣдко бываетъ у *nipalensis*,— то очевидный выводъ изъ этихъ фактовъ: „*Higundo rufula scullii*“ Зибомы есть чистый синонимъ для *Cesropis nipalensis* (Hodgs.) и не можетъ относиться къ описываемой птицѣ, населяющей самый западный конецъ Гималаевъ (Джилъджитъ), части Афганистана, и, какъ теперь оказывается, по меньшей мѣрѣ южную часть Ферганы, почему я ее и называю „*ferghanensis*“.

C. rufula приводится для Закаспійскаго края Радде и Вальтеромъ, для Семирѣчья—Н. А. Заруднымъ и Б. П. Корѣвымъ, для горной Бухары—В. Л. Біанки, но, къ сожалѣнію, все безъ упоминанія размѣровъ. Только Г. Э. Юганзенъ даетъ размѣръ крыла для самца изъ устьевъ Каспека въ 124 m.m.—размѣръ типичной западной формы. Поэтому вѣроятно, что *C. rufula ferghanensis* есть мелкая горная форма сравнительно узкаго распространения.



Замѣтка о персидской горихвосткѣ (*Phoenicurus semenowi* Zar.).

П. А. Зарудный.

Mitteilung über *Phoenicurus semenowi* Zar.

Von N. A. Sarudny.

Ruticilla semenowi spec. nov.—N. Sarudny: «Über neue Arten und Formen» („Orn. Jahrb.“, 1904, p. 213).

Е. Hartert („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, p. 723) редуцируетъ (правда, отчасти и съ сомнѣніемъ) эту горихвостку, названную мною въ честь П. П. Семенова-Тянь-Шанскаго, съ обыкновенной прано-туркестанской (*Phoenicurus ochrogros phoenicuroides* Moore). Эту неправильную редукцію я объясняю частью недостаточно полнымъ описаніемъ, даннымъ мною для нашей птички, частью тѣмъ, что dr. Hartert очевидно не видѣлъ ни одного представителя этой послѣдней.

Такъ какъ персидская горихвостка на гнѣздовья проникаетъ въ Закавказье, гдѣ, судя по имѣвшемуся у меня экземпляру, бываетъ въ лѣсахъ Талышскихъ горъ (около Лирикъ), то считаю небезполезнымъ дать о ней нѣкоторыя свѣдѣнія и для изслѣдователей Россійской орнитофауны. Замѣчу предварительно, что почти во всѣхъ отношеніяхъ она стоитъ гораздо ближе къ *P. mesoleuca* (Hempr. & Ehr.), именно къ той ея формѣ, которую я недавно предложилъ обозначить названіемъ *P. mesoleuca incognita* („Orn. Monats“, 1910, XII) ¹⁾, а

¹⁾ Судя по описаніямъ, отличается отъ типичной *P. mesoleuca* (H. & Ehr.) сильнымъ развитіемъ чернаго цвѣта на сѣромъ фонѣ верхней стороны и болѣе тупымъ крыломъ (изъ 12 моихъ экземпляровъ въ 8 случаяхъ: 4 едва $3 > 5 > 6 > 2 > 7 > \dots$ и въ 4: 3 чуть $4 > 5 > 6 > 2 > 7 > \dots$; по Е. Hartert'у, у типичной *P. mesoleuca* $2 = 6$ или $2 > 6$). Авт.

не къ обыкновенной европейской горихвосткѣ—*P. phoenicurus phoenicurus* L., съ которою я сравнивалъ ее въ первоначальномъ описаніи.

Самцы.

Очень близки къ *P. p. phoenicurus* и *P. m. incognita*, но легко отличаются отъ первой сильнымъ развитіемъ черноватаго цвѣта на верхней сторонѣ головы, шеи и на спинѣ, а также болѣе тупымъ крыломъ; отъ второй—полнымъ отсутствіемъ бѣлаго зеркала на крылѣ. По отсутствію этого зеркала легко можетъ быть издали принята за обыкновенную европейскую *P. p. phoenicurus*.

Въ весеннемъ, уже нѣсколько изношенномъ, нарядѣ наблюдается слѣдующее. Лобъ бѣлый, при чемъ ширина полосы, образуемой этимъ цвѣтомъ, значительно уже, чѣмъ у *P. phoenicurus* и *P. mesoleuca incognita*, а черная полоса, идущая впереди бѣлаго лба отъ внутреннихъ угловъ глазъ черезъ уздечки и надъ клювомъ, замѣтно шире. Нижняя сторона головы вмѣстѣ съ ея боками, а также шея снизу и съ боковъ черныя, при чемъ этотъ цвѣтъ, какъ и у упоминаемыхъ горихвостокъ, лишь слегка переходитъ на грудь. Темя и затылокъ черновато-сѣрые, болѣе темные, чѣмъ у *P. m. incognita* (у *P. phoenicurus*—темно-пепельно-сѣрые). Верхняя сторона шеи или черная, или черно-сѣроватая, а спинная партія черносѣрая, часто почти черная, въ общемъ такая же, какъ у *P. m. incognita* (у *P. phoenicurus* цвѣта верха головы). Крестецъ, какъ у *P. m. incognita*, темно-сѣрый, болѣе темный, чѣмъ у *P. phoenicurus*. Плечевая партія черновато-сѣрая; нѣкоторыя изъ перьевъ внѣшнихъ ихъ частей на внѣшнихъ опахалахъ почти черныя (сходство съ *P. m. incognita* и контрастъ съ *P. phoenicurus*, у которой эти части темно-пепельно-сѣрыя). Мелкія верхнія кроющія крыла черновато-сѣрыя, а нѣкоторыя изъ нихъ почти черныя (опять-таки сходство съ *P. m. incognita* и контрастъ съ *P. phoenicurus*). Нижнія кроющія крыла ровнаго ржавчатаго цвѣта, болѣе насыщеннаго, чѣмъ у обыкновенной горихвостки. Остальное опереніе, какъ у этой послѣдней, но ржавые цвѣта груди и брюха болѣе интенсивны (какъ и у *P. m. incognita*), вслѣдствіе чего бѣлый цвѣтъ вдоль середины брюха кажется болѣе чистымъ.

Самки.

Отличаются от *P. phoenicurus* очень ясно болѣе темнымъ бурымъ цвѣтомъ верхней стороны головы и на спинѣ; эти цвѣта еще болѣе темны, чѣмъ у *P. m. incognita*.

Вотъ размѣры моихъ экземпляровъ.

	Клювъ отъ угла рта.	Крыло.	Хвостъ отъ осно- ванія кобчиковой железы.	Плюсна спереди.
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
1). ♂; 25. XII. 1903; с. Дехъ-и-Дизъ....	16,4	78	61,5	23
2). ♂; 30. XII. 1903; с. Альхорширъ. ...	17	78	61,7	22,6
3). ♂; 28. I. 1904; Макамъ-Мумунадъ. ...	17	78,8	61,9	23
4). ♂; 7. IV. 1904; р. Шалиль.....	16,2	77,3	59	23
5). ♂; 10. IV. 1904; м. Гамдалкаль.....	17,2	75	57	22
6). ♀; ib.....	17,3	72	54	23,5
7). ♂; 17. V. 1904; с. Манджилъ.....	17	75,7	56,5	22
8). ♂; 19. V. 1904; с. Рустемъ-абадъ...	17	73,3	54,5	21,6
9). ♂; 6. I. 1904; с. Кутъ-и-Вейсъ...	18,1	78,6	61	22,5
10). ♀; 14. I. 1904; с. Насріэ.....	16,5	77,1	60,3	23,7

Отношеніе маховыхъ у всѣхъ 10 экземпляровъ: 3 чуть > 4 > 5 > 6 > 2 > 7 >.....

Персидская горихвостка гнѣздится въ горныхъ лѣсахъ провинціи Гилянъ ¹⁾, откуда, какъ упомянуто выше, проникаетъ въ лѣса Талышскихъ горъ въ Закавказьѣ. Кромѣ того

¹⁾ На южномъ берегу Каспійскаго моря. *Лет.*

гнѣздится въ зонѣ дубоваго лѣса Загросскихъ горъ. Зимуетъ какъ въ этихъ послѣднихъ, такъ и въ Месопотаміи, именно въ кустарныхъ заросляхъ нижняго теченія рѣки Карунъ (около вершины Персидскаго залива). На гнѣздовѣ, сравнительно съ *P. mesoleuca incognita*, придерживается болѣе сырыхъ и мрачныхъ участковъ лѣса.

Ташкентъ.
8 февраля 1910 г.



Новая для Россіи птица: кашмирская чечетка.

С. А. Бутурлинъ.

Acanthis flavirostris stoliczkae Hart., new for Russia.

By S. A. Buturlin.

Коротконосая чечетка, *Acanthis brevirostris* (Moore), широко распространена въ Россіи, именно на Кавказѣ и въ Туркестанскомъ краѣ. Полученные мною зимніе (12—25. II. 1912) экземпляры изъ долины Куршаба—въ сѣверныхъ склонахъ Алайскаго хребта (5000—5500 ф. н. у. м.), юго-восточная часть Ферганской области,—сразу отличаются отъ тьянь-шаньскихъ экземпляровъ значительно болѣе блѣднымъ окрасомъ. Это особенно замѣтно въ мантии: темные центры перьевъ свѣтлѣе и менѣе развиты, края перьевъ блѣднаго песочнаго, а не болѣе яркаго рыжеватаго оттѣнка. Крыло 74—74.5, хвостъ отъ корня перьевъ 59—60, клювъ отъ ноздрей 7.3—7.5 м.м.

Это очевидно форма, описанная въ 1903 году др. Э. Хартертомъ по экземплярамъ изъ Джильджита и Ладака подъ именемъ *Acanthis flavirostris stoliczkae* („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, p. 77).



Къ налету бѣлокрылаго клеста (*Loxia bifasciata*) осенью 1911 года.

Д-ръ медицины *В. Р. Отто*.

Zum Herbstzuge des Weissbinden-Kreuzschnabels (*Loxia bifasciata*) im Jahre 1911.

Von D-r. med. *B. Ottow*.

Въ центральныхъ и восточныхъ губерніяхъ Европейской Россіи ежегодно на пролетѣ осенью и зимою—хотя и не часто—встрѣчаются бѣлокрылые клесты (*Loxia bifasciata*). Въ западныхъ губерніяхъ ихъ, однако, слѣдуетъ считать за рѣдкость. Такъ, въ Прибалтійскомъ краѣ они до сихъ поръ наблюдались лишь нѣсколько разъ.

Осенью прошлаго (1911) года бѣлокрылый клестъ появился въ сѣверныхъ частяхъ Лифляндской губерніи многочисленными стаями, по 20—30 особей. Птичка эта, иногда вмѣстѣ съ *Loxia curvirostra*, повсюду встрѣчалась на хвойныхъ деревьяхъ въ теченіе октября и ноября. Въ это время я ихъ почти каждый день наблюдалъ въ садахъ города Юрьева-Дерпта (Лифляндская губернія) и въ его окрестностяхъ¹⁾. Въ то же самое время, по словамъ Г. И. Полякова²⁾, наблюдалось массовое появленіе бѣлокрылаго клеста въ Московской губерніи, а Tischler³⁾ добылъ впервые экземпляръ этого вида въ Восточной Пруссіи.

Такимъ образомъ къ клесту-еловику, уже не разъ появлявшемуся въ послѣднее время массами далеко отъ границъ своего

1) «Ornith. Monatsberichte», 1912, p. 11. *Асм.*

2) «Орнит. Вѣстникъ», 1912 г., кн. I, стр. 47. *Асм.*

3) «Ornith. Monatsberichte», 1912, p. 27. *Асм.*

распространенія, съ прошлаго (1911) года присоединился въ стремленіи на юго-западъ бѣлокрылый клестъ, который обыкновенно не покидаетъ зимою свою хотя и суровую, но богатую хвойнымъ лѣсомъ родину¹⁾. Съ цѣлью выясненія этого явленія было бы очень желательно пополнить приведенныя мною выше скудныя данныя опубликованіемъ на страницахъ „Орнитологическаго Вѣстника“ результатовъ наблюденій надъ появленіемъ бѣлокрылаго клеста въ другихъ частяхъ Россіи.



¹⁾ По поводу наблюденія *Loxia bifasciata* въ стаяхъ *L. curvirostra* въ прошлыхъ годахъ см. замѣтку Э. В. Шарлемана въ «Орнитологическомъ Вѣстникѣ» за 1911 г. (кн. 3—4, стр. 329—330). *Авт.*

Къ вопросу о летѣ птицъ противъ вѣтра.

С. А. Бутурлинъ.

On the flight of birds against the wind.

By S. A. Buturlin.

Еще въ недавнее время большинство натуралистовъ полагало, что попутный вѣтеръ затрудняетъ полетъ птицъ, и до настоящаго времени нѣкоторые держатся убѣжденія, будто сезонный перелетъ птицъ *всегда и всюду* происходитъ со *встрѣчнымъ* вѣтромъ, безъ помощи котораго онъ *не могъ бы* даже совершаться. За послѣднія лѣтъ 15 мнѣ много разъ приходилось довольно подробно оспаривать это мнѣніе, приводить фактическія доказательства его невѣрности и показывать несостоятельность доводовъ его защитниковъ. Въ одной изъ своихъ статей я указывалъ на основаніи данныхъ, опубликованныхъ въ метеорологическихъ изданіяхъ Академіи Наукъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и въ нѣкоторые сезоны обстоятельства такъ невыгодно складываются для перелетныхъ птицъ, что онѣ вынуждены перелетать противъ вѣтра, но что это узко мѣстные явленія, которыя ошибочно обобщать. Къ такимъ мѣстностямъ, судя по метеорологическимъ даннымъ, относятся низовья Дона. Мои оппоненты ссылались, между прочимъ, и на то, что въ Южно-Уссурійскомъ краѣ перелеты тоже совершаются съ противнымъ вѣтромъ.

Поэтому съ большимъ интересомъ прочелъ я въ журналѣ „Семья Охотниковъ“ (№ 9 за 1911 г., стр. 213) корреспонденцію изъ Никольска-Уссурійскаго. Вниманіе автора корреспонденціи, подписавшагося литерами „Н. К.“, было спеціально обращено на этотъ вопросъ. И мнѣніе его, какъ и многихъ другихъ мѣстныхъ охотниковъ-старожиловъ, таково: „главный пролетъ гусей и утокъ

происходитъ въ безвѣтріе или съ попутнымъ вѣтромъ“; „вслучаѣ встрѣчнаго вѣтра птица останавливается даже въ малоудобныхъ для нея мѣстахъ и пережидаетъ вѣтра“; „Всѣмъ мѣстнымъ охотникамъ извѣстно, что когда гусь летитъ кормиться на пашни противъ вѣтра, то летитъ съ трудомъ, неохотно и низко, и всегда старается воспользоваться горой, какъ прикрытіемъ отъ вѣтра, и, долетая до горы, летитъ вдоль нея, ища низкое мѣсто, чтобы перевалить гору, или огибаетъ ее, чѣмъ охотники успѣшно и пользуются“; „26-го марта. Утромъ пасмурно. Южный вѣтеръ приблизительно 5 балловъ. *Летитъ очень много гуся и утки.* Время 8 часовъ утра. Клонитъ къ снѣгу. Съ часу дня *сѣверный вѣтеръ* 3—4 балла вплоть до ночи. *Летъ птицы остановился*“ (это наблюдение на р. Лифу); „27-го апрѣля. Утромъ *сѣверный вѣтеръ* приблизительно 4 балла. Холодно. *Лету* птицы нѣтъ *совершенно.* Послѣ двухъ часовъ, при томъ же вѣтрѣ, вѣрнѣе сѣверо-западномъ, утки и гуся летѣло порядочно, *но высоко.* При тщательномъ наблюдении оказалось, что облака двигались въ направленіи съ *юга на сѣверъ*, т. е. въ верхнихъ слояхъ вѣтеръ былъ южный, попутный птицѣ“ (всѣ курсивы автора корреспонденціи).

И такъ, вотъ факты. Каждое слово этихъ наблюденій буквально подтверждаетъ все, что я уже 15 лѣтъ утверждаю по этому вопросу на основаніи наблюденій, производимыхъ во многихъ пунктахъ, весьма далекихъ отъ Уссурійскаго края. Очевидно, склонность къ лету съ попутнымъ вѣтромъ—есть общее правило, перелеты же съ противнымъ вѣтромъ являются вынужденными исключеніями подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ узко мѣстныхъ условій.



Хроника.—Chronik.

Въ засѣданіи Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній 19-го апрѣля 1912 года состоялись выборы должностныхъ лицъ, при чемъ были избраны единогласно: предсѣдателемъ—*Д. М. Россинскій*, товарищемъ предсѣдателя—*А. С. Хомяковъ*, членами Бюро—*В. Г. Дуровъ*, *В. В. Карповъ*, *В. А. Погорельскій* и *Г. И. Поляковъ*. За отказомъ *В. В. Карпова* выбранъ *А. А. Паиковъ*.

Д. М. Россинскій доложилъ о результатѣ отмѣтки птицъ кольцами *В. Г. барономъ Лоудонъ* въ Лифляндской губерніи (было отмѣчено 1266 птицъ) и познакомилъ собраніе съ результатами окольцовыванія птицъ въ Венгріи за 1908—1911 г. г., показавъ на экранѣ нанесенные на карты пути пролета нѣкоторыхъ видовъ.

Повѣзда въ пустыню Кызыль-кумъ.—Въ началѣ мая сего года *Н. А. Зарудный* сообщилъ намъ, что онъ собирается въ путешествіе по пустынь Кызыль-кумъ, предполагая дважды пересѣчь ее между Сыромъ и Аму.

* * *

Харьковское Общество Испытателей Природы субсидировало *Б. С. Вальха* 150 рублями для изслѣдованія орнитофауны Екатеринославской губерніи.

Къ изученію путей перелета птицъ.—*Г. В. баронъ Лоудонъ* въ письмѣ отъ 8. VII. 1912 сообщаетъ намъ, что предстоящей осенью онъ предполагаетъ въ Отдѣленіи Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній прочесть докладъ по вопросамъ объ окольцовываніи птицъ.

* * *

Отдѣленіемъ Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній предполагено созвать въ Москвѣ 26-го ноября сего 1912 года совѣщаніе заинтересованныхъ учреждений и лицъ по вопросамъ организаціи въ Россіи постоянной наблюдательной орнитологической сѣти. На совѣщаніи этомъ предполагено обсудить: 1) опытное изученіе перелетовъ птицъ окольцовываніемъ, 2) орнитологическую наблюдательную организацію и 3) вопросъ охраны и защиты птицъ.

Охрана природы.—При Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ учреждена особая постоянная Природоохранительная Комиссія, которая имѣетъ цѣлью—возбуждать интересъ въ широкихъ слояхъ населенія и у правительства къ вопросамъ объ охраненіи памятниковъ природы въ Россіи и осуществлять на дѣлѣ сохраненіе въ неприкосновенности отдѣльныхъ участковъ или цѣлыхъ мѣстностей, важныхъ въ ботанико- и зоо-географическомъ, геологическомъ и вообще въ физико-географическомъ отношеніяхъ, а также охрану отдѣльныхъ видовъ растений, животныхъ и проч.

Комиссія состоитъ изъ Предсѣдательствующаго въ Отдѣленіи Физической Географіи, его Помощника, секретаря Географическаго Общества и девяти представителей Общества по избранію Совѣта на 4 года, а также изъ представителей разныхъ ученыхъ обществъ и правительственныхъ учреждений. Кромѣ того Комиссія имѣетъ право увеличивать число своихъ членовъ по собственному избранію, а также приглашать къ участию въ своихъ работахъ свѣдущихъ лицъ и притомъ не только изъ числа членовъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, но и постороннихъ (съ совѣщательнымъ голосомъ).

Выборными членами Комиссіи на первое четырехлѣтіе являются: *К. П. Богдановичъ, Н. А. Бушъ, А. И. Воейковъ, В. А. Дубянский, А. С. Ермоловъ, Н. И. Кузнецовъ, Г. А. Кожевниковъ, кн. В. И. Масальскій и А. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій.*

Нельзя не привѣтствовать учрежденія новой Комиссіи столь симпатичными цѣлями и надо надѣяться, что подъ авторитетнымъ флагомъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества она сумѣетъ достигнуть практическихъ результатовъ.

Нашъ журналъ охотно открываетъ свои страницы для разработки всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ охраною птицъ.

Въ Тифлисъ, при Кавказскомъ отдѣлѣ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества образована Комиссія по охранѣ памятниковъ природы на Кавказѣ, въ обязанности которой входятъ: выясненіе, какіе изъ памятниковъ мѣстной кавказской природы заслуживаютъ охраненія; выработываніе проектовъ мѣръ къ охраненію; наблюденіе за выполненіемъ таковыхъ и пропагандированіе идеи охраненія въ обществѣ.

* * *

Лѣтомъ текущаго года, съ 31. V по 3. VI ст. стиля, долженъ былъ состояться въ Штуттгартѣ второй международный конгрессъ охраны природы—*Le second congrès international de Heimatschutz* (protection des paysages).—Всѣ желающіе могли принять въ немъ участіе (спеціального приглашенія не требовалось), если вносили 6 франковъ 25 сантимовъ, съ правомъ на полученіе журнала „*Heimatschutz*“ въ теченіе настоящаго года.

Частная біологическая станція. — Александромъ Дмитріевичемъ Воейковымъ устроена біологическая станція на хуторѣ Холмы, Сызранскаго уѣзда, Симбирской губерніи (въ 17 верстахъ отъ станціи Балаклейки, Московско-Казанской желѣзной дороги, и въ 7 верстахъ отъ полустанка Коптевки, Сызранско-Вяземской желѣзной дороги, гдѣ всегда есть лошади). Желающимъ заняться изученіемъ природы данной части Поволжья устроитель станціи представляетъ рядъ пособій и содѣйствіе. Стоимость жизни (столъ и квартира) около 15 рублей въ мѣсяцъ. Адресъ для письменныхъ запросовъ: станція Новоспасское, Сызранско-Вяземской желѣзной дороги, А. Д. Воейкову.

Новыя изданія Департамента Земледѣлія. — Департаментомъ Земледѣлія выпущены въ свѣтъ новыми изданіями брошюры: старшаго спеціалиста по борьбѣ съ вредителями сельскаго хозяйства г. Шрейнера—1) „Яблонная моль и мѣры борьбы съ ней“ (цѣна 5 коп.)—и 2) „Мохнатая бронзовка или аленка въ южной Россіи, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ“ (цѣна 10 коп.); завѣдывающаго Бюро по Энтомологіи г. Порчинскаго—3) „Простѣйшій способъ борьбы съ яблоннымъ долгоносикомъ при содѣйствіи его паразитовъ“ (цѣна 5 коп.) и—4) „Рябина и яблоня въ садахъ средней и сѣверной Россіи въ связи съ живущими на нихъ вредными насѣкомыми“ (цѣна 10 коп.); г. Демокидова—5)

„Гессенская муха или хлѣбный комарникъ. Образъ жизни и способы борьбы“ (цѣна 15 коп.).

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества, при коихъ имѣются сельскохозяйственныя библіотеки, могутъ получить по 1 экз. этихъ брошюръ бесплатно, при чемъ съ просьбами о снабженіи этими изданіями имъ надлежитъ обращаться непосредственно къ мѣстному инспектору сельскаго хозяйства (уполномоченному по сельскохозяйственной части) или правительственному агроному, коими эти изданія будутъ предоставляться также и мѣстнымъ казеннымъ учебнымъ заведеніямъ и опытнымъ учрежденіямъ. Прочимъ учрежденіямъ, могущимъ содѣйствовать ознакомленію населенія съ названными насѣкомыми и мѣрами борьбы съ ними, съ просьбами о бесплатной высылкѣ этихъ изданій надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія, коимъ такого рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по мѣрѣ возможности.



Издакія, присланныя въ редакцію.

Éditions parvenus à la rédaction.

Труды Имп. Вольнаго Экономическаго Общества, №№ 5—6 (Сентябрь-Декабрь), 1911 г.

Варшавскія Университетскія Извѣстія, IV и V кн., 1912 г.

Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей, т. XXII, выпускъ 1-ый, 1912 г.

Работы Волжской Біологической Станціи, т. III, № 5; Труды Саратовскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Естествознанія, т. VI, вып. 1-ый, 1909 г.

Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института, кн. 4-ая за 1911 г. и книга 1-ая за 1912 г.

Труды Владимірскаго Общества Любителей Естествознанія, т. III, вып. 2-ой, 1912 г.

Протоколы Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ Университетѣ; XX; 1,2; 3,4; 1911 г.

Ученныя записки Императорскаго Казанскаго Университета, кн. 4-ая, апрѣль; 5-ая, май; 6-ая и 7-ая, іюнь-іюль; 8-ая, августъ; 1912 г.

К. М. Дерюгинъ: „Къ фаунѣ Кольскаго залива“. (Оттискъ изъ „Трудовъ Имп. С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспытателей“, т. XLI, вып. 1, №№ 2—3, 1910 г.). *Отъ автора.*

К. М. Дерюгинъ: „Къ фаунѣ Кольскаго залива“ и „Списокъ станцій и работъ въ Кольскомъ заливѣ въ 1908 и 1909 г.г. (съ 1 картой)“. (Оттискъ изъ „Трудовъ Имп. С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспытателей“, т. XLII, вып. I, №№ 1—2, 1911 г.). *Отъ автора.*

Э. В. Шарлеманъ: „Новая форма кулика-сороки (*Haemathopus ostralegus borysthenticus* subsp. nov.) и „Массовое появленіе въ Европейской Россіи сибирскихъ орѣховокъ (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchus* Brhm.) осенью 1911 г.“ Оттискъ изъ 1-го тома

«Трудовъ» Кіевскаго Орнитологическаго Общества имени К. О. Кесслера. Кіевъ, 1912 г. *Отъ В. М. Артоболевскаго.*

Л. А. Молчановъ: „Матеріалы по фаунѣ безпозвоночныхъ оз. Селигера“. Отд. оттискъ изъ III тома „Трудовъ Прѣсноводной Біологической Станціи Имп. С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей“. Юрьевъ, 1911 г. *Отъ автора.*

Г. Э. Иоганзенъ: „Томская природа въ 1911 году“. Оттискъ изъ Календаря-Справочника „Утро Сибири“ за 1912 г. *Отъ автора.*

Труды Имп. С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, т. XLIII, вып. 1-ый, Протоколы засѣданій, № 1, январь 1912 г.

Извѣстія Кіевскаго студенческаго кружка изслѣдователей природы, вып. 1, 2 и 3; 1911 г.

Краткій путеводитель по выставкѣ весенней природы Харьковскаго Общества Любителей Природы, 1912 г.

Бюллетени Харьковскаго Общества Любителей Природы, 1912 г., № 2.

Записки Императорскаго Харьковскаго Университета, книга 2-ая, 1912 г.

Вопросы колонизаціи. Періодическій сборникъ подъ редакціей Г. Ф. Чиркина и Н. А. Гаврилова. № 11, 1912 г.

Извѣстія Калужскаго Общества Изученія Природы мѣстнаго края, книга 1-ая, 1912 г. (Орнитологическая работа: П. П. Саницкий—«Орнитологическія наблюденія въ Калужской губерніи»).

К. А. Сатунинъ: „О зоогеографическихъ округахъ Кавказскаго края“. Оттискъ изъ «Извѣстій Кавказскаго Музея», т. VII, 1912 г. *Отъ автора.*

Ежегодникъ Русскаго Горнаго Общества, т. VIII, 1908 г.

Труды Бессарабскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Естествознанія, т. II, вып. 2, 1909—10 и 1910—11 годы. Кишиневъ (Орнитологическая работа: А. Остерманъ—«Замѣтки о птицахъ Бессарабинъ» *Отъ Общества.*

Записки Крымскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Природы, т. 1-й, 1911 г. Симферополь. *Отъ Общества.*

Robert Ridgway: „The birds of North and Middle America“, part V. Bulletin of the United States National Museum, № 50. S. I., 1911.

A. C. Bent: „A new subspecies of Ptarmigan from the Aleutian Islands“. Smith. Miscel. Coll., vol. 56, num. 30, 1912.

A. C. Bent: „Notes On Birds Observed During A Brief Visit to the Aleutian Islands and Bering Sea in 1911“. Smith. Miscel. Coll., vol. 56, num. 32, 1912.

E. W. Nelson: „Descriptions of two new species of nun birds from Panama“. Smith. Miscel. Coll., vol. 56, num. 37, 1912.

I. Thienemann: „X Jahresbericht (1910) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft“. II Tiel. (Sonderabdruck aus: Journal für Ornithologie. Aprilheft 1912). *Отъ автора.*

I. Thienemann: „Untersuchungen über den Zug der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) im Herbst 1909 und 1910 in den Provinzen Ostpreussen, Westpreussen und Posen“ (Hierzu Tafel 6). (Sonderabdruck aus: Journal für Ornithologie. Aprilheft 1912). *Отъ автора.*

I. Thienemann: „Von der Vogelwarte Rossitten (Markieren von Waldschnepfen)“. (Sonderdruck aus Nr. 10 Band 59 der «Deutschen Jäger-Zeitung», 1912). *Отъ автора.*

„Ornithologisches Jahrbuch“, Heft 1—2 und 3—4, 1912. *Отъ редактора-издателя.*

„Zeitschrift für Oologie und Ornithologie“, №№ 3, 5—6, und 7, 1912. *Отъ редактора-издателя.*

„Der Ornithologische Beobachter“, №№ 1—12, 1910—1911; №№ 1—12, 1911—1912.

I. Thienemann: „Vogelwarte Rossitten“ (Sonderabdruck aus: Reichenow's Ornithol. Monatsberichte. Juli—Augustheft 1912). *Отъ автора.*

Harry C. Oberholser: „A revision of the subspecies of the green heron [*Butorides virescens* (Linnaeus)].



Вышелъ изъ печати 10 октября (ст. ст.) 1912 г.—Ausgegeben am 10 October (a. St.) 1912.

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляковъ.

Le rédacteur: G. I. Poliakow.

Der Ornithologische Beobachter.

Monatsberichte für Vogelkunde und Vogelschutz.

Offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft
für Vogelkunde und Vogelschutz.

Einzige rein ornithologische Fachschrift in der Schweiz. Enthält einen deutschen und einen französischen Teil.

———— Preis Frs. 5,—jährlich. ————

Probehefte kostenfrei.—Bestellungen an die Expedition:

Buchdruckerei R. G. Zbinden, Rheinsprung 5, Basel, (Schweiz).

Ornithologisches Jahrbuch.

ORGAN

für das

palaearktische Faunengebiet.

————
Herausgegeben

von

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.

————
XXIII Jahrgang.
————

Das „Ornithologische Jahrbuch“ bezweckt ausschliesslich die Pflege der palaearktischen Ornithologie und erscheint in 6 bez. 3 Doppelheften Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von Tafeln erfolgt nach Bedarf.—Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt bei direktem Bezuge für das Inland 10 Kronen, für das Ausland 10 Mk. (= 11.75 K) = 12.50 Frks. = 10 sh. = 4.50 Rbl. pränumerando, im Buchhandel 12 Kronen = 12 Mark. Volks- u. Mittelschulen erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von 6 Kronen bez. 6 Mk. (nur direkt). Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Raume auf dem Umschlage Aufnahme. Beilagen- und Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung. Probehefte nur gegen Rücksendung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften zur Besprechung Abonnements, Annonzen und Beilagen bitten wir an den Herausgeber, Villa Tännenhof bei Hallein, Salzburg, zu adressieren.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, einziges seit 21 Jahren erscheinendes Fachorgan, herausgegeben von Wilhelm Rüdiger, Hochzeit i. d. Neumark. Der Abonnementspreis beträgt für das Jahr bei direkter Zusendung 5 Mk., nach den Ländern des Weltpostvereines 7 Frs. pränumerando. Die Zeitschrift bringt aus Fachkreisen belehrende und einschlägige Artikel, Brut- und Sammelnotizen, Merkmale schwer zu unterscheidender Eier, Literatur, sowie eine grosse Anzahl Kauf-, Verkaufs- und Tausch-Anzeigen.—Probenummern werden auf Wunsch frei zugesendet.



Открыта подписка на 1913 г.

НА

„ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ“

„Messager Ornithologique“. — „Ornithologische Mitteilungen“

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Выходить въ годъ четыре книжки, объемомъ каждая не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ, двѣ до и двѣ послѣ лѣтняго сезона.

Журналъ имѣетъ цѣлью объединять орнитологическія работы русскихъ ученыхъ и способствовать ознакомленію любителей съ нашей орнитофауной, съ литературой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изученіемъ. Въ журналѣ имѣются слѣдующіе отдѣлы: 1) Статьи и замѣтки по систематикѣ и биологій птицъ; 2) Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и библиографія; 4) Корреспонденція; 5) Хроники; 6) Заявленія Гг. подписчиковъ о взаимномъ обменѣ шкурками, гнѣздами и яйцами птицъ; 7) Вопросы и отвѣты.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: В. Г. Аверинъ, С. Н. Алфвиги, В. М. Артеболовскій (предс. Киевск. Орнит. Общ. им. К. В. Кесслера), В. Б. Баньковскій, В. Л. Бланин, С. І. Бильничъ, Е. А. Бихнеръ, В. Н. Бестанжогло, А. А. Браунеръ, С. А. Бутурлинъ, А. М. Быковъ, Б. С. Вальхъ, М. М. Гермъ, Г. Л. Граве, А. Г. Гризобаскій, К. М. Дарюгинъ (прив.-доц. Имп. С.-Пет. Унив.), Б. А. Домбровский, В. С. Елпатьевскій (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Б. М. Житновъ (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. Зврудный, Г. Э. Јоганзенъ, Е. И. Исполотовъ, Д. Н. Кайгородовъ (профес. Лѣн. Инст.), А. Н. Карамзинъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожевниковъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. Ф. Котъ, Г. В. баронъ Лоудонъ, Р. С. Магницкій, Л. А. Молчановъ, П. В. Нестеровъ, С. И. Огневъ, Бенно Отто, І. К. Паческій, Ѳ. Д. Плеска, Г. И. Поляковъ, Д. М. Россинскій, К. А. Сатуинъ, А. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій, П. Ф. Соловьевъ, В. В. Станчинскій, П. П. Сушинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. И. Стяжкій, И. Н. Таргани (проф. Н. Алекс. Инст. С.-Х. и Лѣс.), А. Я. Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ, В. А. Хахловъ, Э. В. Шарлеманъ и др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

съ пересылкой въ Россіи и за границу: на 1 годъ—4 руб., на 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб.

Полные годовые комплекты журнала за 1910 и 1911 г. г., имѣющіяся въ настоящее время въ небольшомъ числѣ, высылаются за 8 руб. (по 4 руб. за годъ).

Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка“, Московск. губ., имѣніе „Саввино“. Телефонъ № 7—51.

Кромѣ конторы редакціи, подписка принимается въ Москвѣ и С.-Петербургѣ въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, Карбасянова и „Новаго Времени“.

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляковъ.

Herausgeber: G. I. Poljakow.

Тип. Импер. Моск. Унив.



О РНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ


MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN

№ 4

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

Troisième ANNÉE



1912 г.



Отъ Редакціи.

1. Редакція не принимаетъ на себя отвѣтственности за своевременную доставку журнала, если подписка не была адресована непосредственно на ея имя.

2. При сообщеніи адреса подписчиковъ просятъ разборчиво обозначать имя, отчество, фамилію, а также губернію, уѣздъ и ближайшее почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяются Редакціей только въ тѣхъ случаяхъ, если таковыя поступаютъ отъ подписчиковъ не позже полученія ими слѣдующаго номера и съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы.

3. При заявленіи о неполученіи журнала и о переимѣнѣ адреса просятъ прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №. При заявленіи о переимѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4. Лицъ, обращающихся письменно въ Редакцію съ запросами, для полученія отвѣта просятъ прилагать почтовую марку. На вопросы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5. Наложеннымъ платежомъ выпуски журнала не высылаются.

6. Рукописи, присылаемыя въ Редакцію, должны быть четко написаны, обязательно за полной подписью автора и съ указаніемъ его точнаго адреса. При этомъ авторовъ просятъ писать на одной сторонѣ листа и оставлять поля. Желательно, чтобы статьи снабжались авторами кромѣ русскихъ названій названіями на какомъ-либо западно-европейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя наименованія птицъ въ работахъ были подчеркнуты авторами одинъ разъ. За номенклатуру въ научныхъ статьяхъ отвѣтственность лежитъ на авторахъ.

7. Непринятые рукописи возвращаются за счетъ авторовъ въ видѣ посылки или подъ заказной бандеролью.

8. Для библиографическихъ отзывовъ просятъ присылать по два экземпляра работъ ¹⁾.



MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Орнитологическій Вѣстникъ.

→ ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Выходитъ четыре раза въ годъ: два №№ до и два — послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна за 1 г.— 4 руб., за 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу— 8 р., за 1/2 страницы—4 р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половинною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просятъ адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle) l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakov, Russie, Chemin de fer Moscou — Nijni-Novgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein) jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poliakov, Russland, Postabteilung «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
1. Лѣтняя орнитофауна дельты Аму-Дарьи. Л. А. Молчановъ..	261
2. Замѣтки по орнитологіи Томской губерніи. Г. Э. Иоганзенъ.	287
3. О нѣкоторыхъ птицахъ Минской губерніи. А. В. Федюшинъ.	297
4. <i>Cygnus bewicki</i> Yarr. и <i>Grus leucogeranus</i> Pall. на зимовьѣ въ восточномъ Закавказьѣ. А. Н. Карамзинъ....	304
5. Къ вопросу о распространеніи степного жаворонка въ Киевской губерніи. Э. В. Шарлеманъ.....	306
6. Предварительная замѣтка о варакушкахъ (<i>Cyanocitta</i>) Туркестана. Н. А. Зарудный.....	308
7. По поводу „Замѣтокъ о Закавказскихъ птицахъ“. С. А. Бутурлинъ.....	317

8. Краткія сообщенія:—

—Сообщеніе о птицахъ, отмѣченныхъ кольцами.—Къ послѣднему на-
лету копытки (*Syrrhaptes paradoxus* Pall.).—Орнитологическія
экскурсіи, организованныя при содѣйствіи Императорскаго Московскаго
Общества Испытателей Природы въ 1912 году.—Къ орнитофаунѣ Чер-
номорскаго побережья Кавказа.—Къ орнитофаунѣ Айиовскихъ остро-
вовъ.—Исслѣдованія въ Оренбургскомъ краѣ и Люблинской губерніи.—
Экспедиція В. А. Русанова на Шпицбергенъ.—Исслѣдованіе орнито-
фауны Кольскаго полуострова.—Къ орнитофаунѣ Закавказья.—Премія
имени профессора А. П. Богданова.—Засѣданія Императорскаго Русскаго
Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній.—Соединенное засѣданіе
Отдѣленія Орнитологіи и Коммисіи для изслѣдованія фауны Московской
губерніи..... 322

9. **Хроника** 327
В. Б. Баньковский. Некрологъ. *Г. И. Поляковъ* 328
Изданія, присланныя въ редакцію..... 329
Объявленія.

10. Поѣздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году.
(Продолженіе). *Г. И. Поляковъ*..... 33—92



SUJET.—INHALT.

- | | P. |
|--|-----|
| 1. Die Sommerornithofauna des Deltas von Amudarja. Von <i>L. A. Moltschanow</i> | 261 |
| 2 Mitteilungen über die Ornithologie des Gouvernements Tomsk. Von <i>Herm. Iohansen</i> | 287 |
| 3. Über einige Vögel des Gouvernements Minsk. Von <i>A. W. Feduschin</i> | 297 |
| 4. <i>Cygnus bewicki</i> Yarr. und <i>Grus leucogeranus</i> Pall. im Winterquartier am östlichen Transkaukasus. Von <i>A. N. Karamsin</i> | 304 |
| 5. Zur Frage über die Verbreitung der Kalanderlerche (<i>Melanocorypha calandra</i> L.) im Gouvernement Kiew. Von <i>E. W. Scharleman</i> | 306 |
| 6. Vorläufige Notiez über die Blaukehlchen (<i>Cyanecyia</i>) des Turkestan. Von <i>N. A. Sarudny</i> | 308 |
| 7. Some notes on Transcaucasian Birds. By <i>S. A. Buturlin</i> | 317 |
| 8. Kurze Mitteilungen Von <i>G. P.</i> | 322 |
| 9. Chronik | 327 |
| W. Banikowski. Nachruf, von <i>G. I. Poljakow</i> | 328 |
| Éditions parvenus à la rédaction..... | 329 |
| Inserate. | |

10. Ein ornithologischer Ausflug nach den Seen Saissan-nor und Marka-kul (in West-Sibirien) im Jahre 1909. (Fortsetzung). Von *G. I. Poljakow*..... 33 92



Лѣтняя орнитофауна дельты Аму-Дарьи.

Л. А. Молчановъ.

Die Sommerornithofauna des Deltas von Amudarja.

Von L. A. Mollchanow.

Во время моей поѣздки въ дельту Аму-Дарьи лѣтомъ 1911 года мнѣ удалось собрать небольшую коллекцію птицъ и про-извести кое-какія наблюденія надъ характеромъ птичьяго насе-ленія въ различныхъ участкахъ дельты. Распредѣленіе протоковъ дельты сильно измѣнилось послѣ послѣдней съемки 1890 года (карта дельты издана въ Ташкентѣ въ 1905 году). Поэтому предварительно мнѣ придется дать общее описаніе дельты, что-бы выяснить мѣстонахожденіе различныхъ пунктовъ, которые будутъ упоминаться при дальнѣйшемъ изложеніи. Замѣчу кстатц, что планъ дельты, составленный въ 1907 году приложенъ къ моей статьѣ, напечатанной въ „Извѣстіяхъ Императорскаго Рус-скаго Географическаго Общества“ за 1912 годъ (томъ XLVIII).

Въ настоящее время дельта Аму-Дарьи начинается близъ укрѣпленія Нукусъ, съ отхожденіемъ направо двухъ протоковъ, которые скоро соединяются и образуютъ протокъ Куваншъ-Джарму. Главная масса воды идетъ по прежнему направленію, т.-е. на сѣверо-западъ, но носитъ названіе уже не Аму, а Ишанъ-Джакенъ. Впрочемъ, часто главный протокъ на разстояніе около 50 верстъ ниже Нукуса называютъ еще Аму-Дарьей. Отъ этого протока начинаютъ отходить отвѣтвленія налѣво: Кунградская Дарья, Телебай и нѣкоторые другіе; большинство изъ этихъ

протоковъ впадаютъ въ разливы, продолжающіеся на много десятковъ верстъ до моря. Въ этомъ участкѣ дельты находятся возвышенности: Крантаули, по правому берегу; Бурлытау, между протоками Ишанъ-Джакеномъ и отходящимъ отъ него влѣво Телебаемъ. Эти возвышенности, какъ и другія, находящіяся въ дельтѣ, представляютъ собою остатки прежняго материка, размытаго здѣсь рѣчными водами. Плоскія вершины этихъ возвышенностей представляютъ сухія вывѣтренныя, часто покрытыя песками, площади, со скудной степной растительностью. Несмотря на окружающія ихъ болота и разливы, здѣсь иногда встрѣчаются чисто степныя и пустынные птицы, какъ, напримѣръ, рябки. Верстъ на 50 ниже Бурлытау находится возвышенность Кубетау; неподалеку лежитъ и туземный городъ Кунградъ. Теперь Кубетау съ юга, востока и сѣвера окружена разливами. Ниже Кубетау въ старое русло протока Талдыкъ вливается справа большое количество воды; правые берега Талдыка имѣютъ видъ узкой полосы, часто прерываемой потоками текущей изъ разливовъ воды. Лѣвый берегъ сухой, густо населенъ, покрытъ полями и кое-гдѣ даже небольшими садами. Здѣсь я встрѣтилъ между прочимъ и перепелокъ. Нижнее теченіе Талдыка не имѣетъ сухихъ береговъ, сплошные разливы по обѣимъ сторонамъ заросли густыми тростниками. Эти заросли продолжаются вплоть до острова Такмакатау, который по своему характеру и по фаунѣ совершенно сходенъ съ возвышенностями внутри дельты.

Все взморье западной части дельты лишено сухихъ береговъ благодаря разливамъ и затопленію моремъ. Заливъ Талдыкъ, въ сѣверо-западную часть котораго впадалъ раньше протокъ Талдыкъ (теперь этотъ протокъ впадаетъ западнѣе), лежитъ верстахъ въ 25—30 восточнѣе острова Такмакатау. Въ этотъ заливъ впадаетъ протокъ Кандъ-узякъ, выносящій воду изъ центральной части дельты.

Средняя часть морского побережья дельты представляетъ сухое пространство; здѣсь нѣсколько лѣтъ назадъ текла Улькунъ-Дарья, теперь пересохшая. Эта мѣстность богата участками степей, гдѣ, какъ мнѣ передавали, встрѣчаются, очевидно на пролетѣ, даже стрепета.

Морское побережье восточной части дельты, восточнѣе разливовъ, доходящихъ приблизительно до горы Терменбесъ, очень богато островами, иногда возвышенными, сухими и песчаными.

Въ настоящее время вообще восточная часть дельты сильно обѣднѣла водой. Протокъ Яны-су, представляющій восточный рукавъ дельты, перегороженъ верстахъ въ 40 отъ устья плотиной, и эта часть его наполнена морской водой. Между устьемъ Яны-су и Улькунъ-Дарьи въ прѣсный заливъ Ирджанъ впадаетъ большой протокъ Казакъ-Дарья, берущій начало въ разливахъ средней части дельты.

Приблизительно въ центрѣ дельты находится возвышенность Кушканатау, достигающая довольно значительныхъ размѣровъ (верстъ 15 въ длину). Протокъ Куваншъ-Джарма, о которомъ я уже упоминалъ, течетъ отъ Нукуса на сѣверо-востокъ, по направленію къ озеру Каратерень. Это озеро съ сѣвера ограждено обрывистыми горами Бельтау (около 50 сажень высоты). Изъ него вытекаетъ протокъ Яны-су (см. выше), почти пересохшій за послѣдніе года.

Берега Аму-Дарьи близъ Нукуса во многихъ мѣстахъ покрыты тугаями, т.-е. естественными лѣсами и зарослями. Изъ крупныхъ деревьевъ здѣсь встрѣчаются тополя (туранга), ивы; многочисленные кустарники, часто снабженные острыми колючками, образуютъ иногда сплошныя заросли, почти непроходимыя. На болѣе сухихъ мѣстахъ заросли состоятъ преимущественно изъ кустарника гребенщика (Tamarix), поражающаго иногда своимъ роскошнымъ ростомъ и яркими цвѣтами. Таковы, напримѣръ, берега истоковъ Кунградской Дарьи. Такія заросли и туган заняли почти всѣ берега главнаго протока верстъ на 50 ниже Нукуса. У холмовъ Бурлытау берега уже низки болотисты и затопляются при половодѣ. Здѣсь начинается царство тростника, камыша, куги и другихъ водяныхъ и болотныхъ растеній. Характеръ разливовъ и протоковъ текучей воды среди зарослей тростника очень однообразенъ во всѣхъ частяхъ дельты, т.-е. въ средней и западной ея части и на взморѣ; даже тамъ, гдѣ вода полу-соленая, тростники растутъ такъ же хорошо, и по внѣшнему виду разливы прѣсные и соленые не отличаются одинъ отъ другого.

Между протокомъ Куваншъ-Джармою на востокъ, холмами Кушканатау и протокомъ Ишанъ-Джакенъ на западъ, находится низменность Чимбайская, густо населенная, но страдающая за послѣднее время недостаткомъ воды для поливки посѣвовъ. Она составляетъ какъ бы переходъ между разливами западной части дельты и полупустыней восточной части, съ ея

пересыхающими протоками. Въ Чимбайскомъ участкѣ дельты я не былъ, но, судя по разспросамъ, здѣсь попадаютъ быть можетъ нѣкоторыя птицы, которыхъ я не встрѣчалъ въ другихъ мѣстахъ дельты: мнѣ называли коноплянокъ, щегловъ. По верхнему теченію Куваншъ-Джармы туган тоже очень многочисленны, высоки и густы; но здѣсь они начинаютъ страдать отъ недостатка воды.

Общій характеръ орнитологической фауны дельты уже отмѣченъ М. Н. Богдановымъ въ его „Очеркахъ природы Хивинскаго оазиса и пустыни Кизилъ-Кумовъ“ (Ташкентъ, 1882 г.). М. Н. Богдановъ спустился вдоль лѣваго протока дельты до Кунграда и оттуда пересѣкъ дельту на востокъ. Такимъ образомъ онъ побывалъ на главныхъ возвышенностяхъ дельты, Кубетау и Кушканатау, также былъ въ Чимбаѣ и Нукусѣ. Въ томъ же 1874 году М. Бутлеровъ производилъ въ августѣ орнитологическія наблюденія около Нукуса¹⁾. А. М. Никольскій изслѣдовалъ западную часть дельты, спустившись отъ Нукуса по протоку Ишанъ къ рыбацкому поселку Кукъ; оттуда черезъ Кунградъ и Усть-Уртъ вернулся въ Европу²⁾. Въ 1874 году посѣтилъ Кушканатау и восточную часть дельты Н. А. Сѣверцовъ; орнитологическія наблюденія его, касающіяся данной мѣстности, приведены въ нѣкоторыхъ его статьяхъ³⁾. Прекрасную сводку всѣхъ имѣющихся матеріаловъ далъ Н. А. Зарудный въ своей работѣ:—„Орнитологическая фауна Закаспійскаго края“ („Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи“, 1896 г.).

Туган по Куваншъ-Джармѣ и по Аму-Дарьѣ ниже Нукуса, несмотря на свой видъ настоящихъ лѣсовъ, собственно лѣсныхъ птицъ лишены, вѣроятно, благодаря изолированности среди пустыни. Я ни разу не встрѣчалъ здѣсь поползня, пищухи, синицъ—кромѣ довольно обычной *Parus bocharensis*,—

¹⁾ «Орнитологическая фауна мѣстности Нукусъ, лежащей между Аму-Дарьей и Куваншъ-Джармой» (Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, т. X, 1879 г.). *Авт.*

²⁾ «Къ фаунѣ млекопитающихъ и птицъ приаральскихъ степей» (Bull. de la Société des Naturalistes de Moscou, 1893, N. S, t. VI, № 4). *Авт.*

³⁾ «Études sur le passage des oiseaux dans l'Asie Central» (Bull. de la Société des Naturalistes de Moscou, 1880, № 2 t. LV). «Вертикальное и горизонтальное распределение Туркестанскихъ животныхъ» («Извѣстія Императорскаго Московскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи», т. VIII, в. 2-ой, 1873 г.) *Авт.*

дятловъ—кромѣ *Dendrocopus albipennis*, который, впрочемъ, предпочитаетъ рѣдкія рощицы и отдѣльныя деревья, даже кустарники, на границѣ песчаныхъ пустынь, и легко добирается до обособленныхъ участковъ тугаа. Впрочемъ, по рассказамъ мѣстныхъ охотниковъ, можно предполагать рѣдкіе залеты сюда какого-то поползня. Въ общемъ тугаи бѣдны жизнью, напоминая этимъ сибирскую тайгу. Часто попадаются здѣсь на глаза лишь обыкновенныя горлицы, немногія мелкія птички (*Iduna*—преимущественно *I. gamsa*, соловьи—*Luscinia golzii*, нѣкоторыя славки—*Sylvia cinerea fuscipilea*, *S. curruca*, *S. minuscule*) да сороки. По опушкамъ обычны шурки, кое-гдѣ удода; изрѣдка покажется какой-нибудь хищникъ—чаще всего черныи коршунъ, иногда ястребъ (*Astur cenchroides*) или пустельга; близъ воды иногда пролетитъ стайка черноголовыхъ ремезовъ и съ нѣжнымъ пискомъ разсядется по вершинамъ прибрежныхъ деревьевъ; по вечерамъ кричатъ фазаны и козодои (*Caprimulgus unwinii*). Крики иволги слышалъ я рѣдко, лишь въ тугаяхъ близъ Нукуса. Въ этомъ укрѣпленіи есть довольно большой садъ, гдѣ можно наблюдать (а также и стрѣлять) сравнительно большое количество птицъ. Не рѣдки здѣсь иволги, пустельги (оба вида), синицы (какъ и всюду—здѣсь *Parus bocharensis*), дятлы.

Заросли гребенщика еще бѣднѣе жизнью, чѣмъ тугаи; иногда можно бродить по нимъ нѣсколько часовъ, почти не замѣтивъ ни одной птицы.—Замѣчу здѣсь, что въ густыхъ заросляхъ на Куваншъ-Джармѣ я встрѣтилъ въ срединѣ іюля стайку птицъ, очень напоминающихъ какихъ-то чечетокъ; дѣло было вечеромъ, стайка быстро улетѣла и ни одной птицы добыть не удалось.

Лишь тамъ, гдѣ почва болѣе влажна и растительность разнообразнѣе, птичье населеніе болѣе богато. Таковы берега по среднему теченію протоковъ выше, т.е. южнѣе, разливовъ и ниже тугаевъ; иногда такія мѣста расположены между тугаемъ и водой. Здѣсь очень обычны черноголовыя трясогузки, овсянки (*Emberiza luteola*), кое-гдѣ воробьи (преимущественно *Passer montanus* и *P. indicus*), шурки (главнымъ образомъ *Merops persicus*), *Aedon familiaris* (который, впрочемъ, встрѣчается не рѣдко и на совершенно сухихъ мѣстахъ), попадаютъ варакушки (*Cyanocitta suecica pallidogularis*), камышевыя овсянки (*Cynchramus pygmaeoides*). Въ тростниковыхъ заросляхъ орнитофауна очень

однообразна. Кромѣ камышевокъ (см. въ списокѣ), оглушительные крики которыхъ слышны еще задолго до того, какъ лодка въѣдетъ въ заросли, здѣсь обычны лишь цапли (выше въ дельтѣ—сѣрая, на взморѣ—рыжая, другіе виды рѣдки), камышевые луни, да крачки и рѣже чайки, пролетающія надъ тростниками въ поискахъ открытаго пространства воды. Очень обычны здѣсь усатые синицы, которыя часто перелетаютъ стаіками по тростникамъ, сопровождая лодку и подпуская ее иногда на разстояніе нѣсколькихъ аршинъ, совершенно не боясь людей. Кое-гдѣ на вершинахъ высокихъ тростинкохъ сидятъ овсянки (*Synchramus pyrrhuloides*). Сѣрый гусь сталъ часто попадаться на глаза съ послѣднихъ чиселъ іюля. Утокъ приходится видѣть мало, такъ какъ онѣ легко скрываются въ густыхъ заросляхъ отъ взоровъ человѣка. На озеровидныхъ открытых пространствахъ разливовъ, особенно на отмеляхъ, часто удается встрѣтить очень оживленныя картины. Издали бросается въ глаза рядъ крупныхъ бѣлыхъ птицъ—это расположились на отдыхъ пеликаны; ритмически нагибаясь и проводя по илу своимъ широкимъ клювомъ, быстро ходятъ по мелкой водѣ колпицы. Крачки тучами носятся по воздуху, поминутно бросаясь въ воду; на мокрыхъ глинистыхъ берегахъ бѣгаютъ многочисленные кулички (*Tringa* sp., *Totanus* sp.), чибисы, кое-гдѣ — каравайки; иногда можно увидѣть и лебедя (*Cygnus olor*), бѣлую цаплю, шилоклювку, большого кроншнепа. Однако на этихъ птицъ (кромѣ куликовъ и крачекъ) приходится лишь любоваться издали, такъ какъ на открытой мѣстности почти невозможно подѣхать къ нимъ на выстрѣлъ. Въ густыхъ заросляхъ тростника, гдѣ вода обмелѣла и обнажилась болотистая почва, скрываются камышевые курочки, которыхъ почти не приходится видѣть и лишь изрѣдка удается слышать ихъ крики. Поганокъ, которыхъ наблюдалъ М. Н. Богдановъ, я вовсе не встрѣчалъ въ дельтѣ и лишь разъ видѣлъ на взморѣ.

Побережья восточной части дельты, песчаные острова, отчасти сухіе песчаные берега нижняго теченія Яны-су богаты зуйками, разнообразными куликами (попался разъ и турухтанъ), бакланами и пеликанами (на морѣ), чайками и крачками, нѣкоторыми видами утокъ—преимущественно бѣлоглазымъ ныркомъ (*Fuligula pugnosa*), иногда попадаетъ узконосый чирокъ (*Anas angustirostris*); не рѣдки здѣсь береговья ласточки (*Riparia riparia*). По протокамъ, въ заросляхъ по высыхающимъ

разливамъ, очень обычны ходулочникъ, нѣкоторые кулики (особенно *Totanus stagnatilis*), пугалицы (особенно *Vanellus leucurus*, иногда *V. cristatus*), кое-гдѣ зуйки, попадаетъ куликъ-перевозчикъ (*Totanus hypoleucos*); очень обычны здѣсь крачки (*Sterna anglica*, *fluviatilis*, *minuta*), пониже въ дельтѣ—также *Hydrochelidon nigra* и *hybrida*. Кое-гдѣ на отмеляхъ многочисленны каравайки (на озерѣ Каратерень). Рябки-бульдюрюки (*Pterocles arenarius*) встрѣчаются въ дельтѣ на возвышенностяхъ (Кубетай, Кушканатау) и въ восточной части ея (Яны-су, Куваншъ-Джарма, горы Бельтай); бѣлобрюхій рябокъ (*Pterocles alchata severzowi*) очень многочисленъ на берегахъ озера Каратерень, куда прилетаютъ цѣлыя тысячи этихъ птицъ на водопой; въ другихъ мѣстахъ я его почти не встрѣчалъ.

Сухія степныя пространства въ дельтѣ, помимо жаворонковъ (*Calandrella minor leucophaea*, *Galerida magna*), каменокъ (*Saxicola deserti*, *S. isabellina*), шурокъ (*Merops persicus*), авдотокъ (*Oedicnemus crepitans*), пустынного козодоя (*Caprimulgus aegyptianus*),—характеризуются большимъ количествомъ обыкновенной кукушки; эта птица, впрочемъ, не рѣдка и по тростниковымъ зарослямъ, гдѣ есть поблизости хоть небольшой участокъ сухой земли.

Пустыня кое-гдѣ подходитъ почти къ самой водѣ; это наблюдается въ восточной части дельты, у границы Кызылъ-Кумовъ. Здѣсь попадаютъ нѣсколько видовъ сорокопутовъ, каменки (3 вида, см. въ списокѣ), *Sylvia nana*, авдотки и рябки, вѣроятно кое-гдѣ и саксаульная сойка (я ее видѣлъ лишь разъ). Фауну такихъ мѣстностей я имѣлъ возможность наблюдать лишь урывками, и не могу на ней останавливаться.

Повсюду въ верхней части дельты, приблизительно до начала разливовъ, очень обычными птицами являются орланы—*Haliaeetus leucogyrus*, отчасти *H. albicilla*. Очень многочисленны повсюду въ дельтѣ, гдѣ есть хоть небольшіе участки сухой земли, луговые тиркушки (*Glareola pratincola*); не рѣдки онѣ и по Аму-Дарьѣ.

Большіе протоки, какъ и сама Аму-Дарья, бѣдны плавающими и голенастыми птицами. Причины этого были указаны А. М. Никольскимъ и Н. А. Заруднымъ: это—быстрота течения, мутность воды и половодье во время гнѣздованія. Совершенно нѣтъ на Аму-Дарьѣ (я говорю здѣсь лишь о нижнемъ и большей

части средняго теченія) зимородковъ, вѣроятно, также вслѣдствіе быстроты и мутности воды, а также и отсутствія удобныхъ мѣстъ для гнѣздованія, такъ какъ почти всѣ обрывистые берега все время размываются и обрушиваются.

Привезенныя мною шкурки были опредѣлены Н. А. Заруднымъ. Пользуюсь случаемъ высказать здѣсь ему искреннюю благодарность, какъ за опредѣленіе коллекцій, такъ и за многія полезныя указанія практическаго характера.

Saxicola isabellina Rüpp..

Этотъ чеканъ встрѣчается въ подходящихъ мѣстахъ дельты довольно часто.

Saxicola morio Ehrb..

♂, 5. VII, Яны-су.

Этотъ видъ встрѣчается кое-гдѣ въ дельтѣ по берегамъ протока Яны-су; видѣлъ я его и на прибрежныхъ горахъ на Аму-Дарьѣ—Шейхъ-Джейли.

Saxicola deserti atrogularis Blyth..

♂, 30. VI, гора Терменбесъ; 9. VII, озеро Каратерень.

Встрѣчается въ различныхъ мѣстахъ восточной, болѣе сухой, части дельты.

Примѣчаніе. По словамъ М. Бутлерова, съ середины августа около Нукуса появляются *Pratincola rubetra* L. и *Pratincola mauro* Pall., гнѣздящійся, по словамъ М. Н. Богданова, въ Хивинскомъ оазисѣ, и замѣченный въ серединѣ августа около Нукуса М. Бутлеровымъ; мнѣ не попадался вовсе. Тоже могу сказать о *P. rubicola* L. и *P. caprata* L. (по М. Н. Богданову, гнѣздятся въ Хивинскомъ оазисѣ).

Cyanecula suecica pallidogularis Zar..

Лич., 22. VI, протокъ Кандъ-узякъ; 15. VII, Куваншъ-Джарма.

Гнѣздится кое-гдѣ на сравнительно сухихъ участкахъ дельты въ заросляхъ кустарника.

Luscinia golzii Cab. (hafizi Sev.).

♂, 8. VI, окрестности Петро-Александровска на Аму-Дарьѣ.

Собственно въ дельтѣ соловей этотъ гнѣздится по тугаямъ на берегахъ Куваншъ-Джармы и по Аму-Дарьѣ приблизительно до холмовъ Крантаули; ниже если и встрѣчается, то очень рѣдко.

Примѣчаніе. М. Н. Богдановъ упоминаетъ о нахожденіи *Sylvia hortensis* Gml. на низовьяхъ Аму-Дарьи въ августѣ.

Sylvia cinerea fuscipilea Sev..

Эта славка довольно обычна въ тугаяхъ и заросляхъ по берегамъ Аму-Дарьи, Куваншъ-Джармы и отчасти Ишанъ-Джакена.

Примѣчаніе. М. Бутлеровъ нашелъ въ Нукусѣ *Sylvia mystacea* Ménétr.

Sylvia curruca affinis Blyth..

Мнѣ не удалось привести шкурку этой славки, хотя я встрѣчалъ ее по берегамъ Куваншъ-Джармы. По мнѣнію Н. А. Заруднаго, часть наблюдавшихся М. Бутлеровымъ и М. Н. Богдановымъ птицъ этого вида должна относиться къ *S. minuscula* Hume.

Sylvia nana Hempr. & Ehrb..

♂, 8. VII, гора Бельтау.

Я часто встрѣчалъ эту славку на берегу озера Каратерень.

Примѣчаніе. Въ августѣ М. Н. Богдановъ наблюдалъ въ низовьяхъ Аму-Дарьи *Phylloscopus tristis* Blyth., *P. rufus* Bechst. и *P. trochilus* L..

Acrocephalus stentoreus brunnescens Jerd..

♂, 20. VI, протокъ Талдыкъ.

Н. А. Зарудный, повидимому, правъ, предполагая, что указанія М. Н. Богданова и А. М. Никольскаго на гнѣздованія въ дельтѣ Аму-Дарьи *A. turdoides* Meyer. относятся не къ послѣднему виду, а къ *A. stentoreus* Hempr. & Ehr. Эта камышевка очень обычна въ тростниковыхъ заросляхъ разливовъ нижней части дельты.

Примѣчаніе. М. Н. Богдановъ указываетъ на гнѣздованіе въ низовьяхъ Аму-Дарьи *Acrocephalus agricola* Jerd, *Calamodrus phragmitis* Bechst.,

Cettia cetti Marm; вѣроятно здѣсь же будетъ найдена и *Acrocephalus streperus* Vieill.

***Acrocephalus dumetorum* Blyth..**

19. VI, протокъ Талдыкъ.

Гнѣздится въ тростниковыхъ заросляхъ дельты.

***Luscinola melanopogon mimica* Mad..**

19. VI, протокъ Талдыкъ; ♂, 29. VI, устье Яны-су.

Гнѣздится въ заросляхъ разливовъ дельты.

***Iduna rama* Sykes.**

♂, 9. VI, горы Шейхъ-Джейли; 10. VI, Нукусъ (съ гнѣздомъ); ♂, 20. VII, Куваншъ-Джарма; ♂, 21. VII, тамъ-же; ♀, 14. VI, протокъ Ишанъ-Джакенъ.

Обычна около Нукуса, по сухимъ берегамъ верхней и восточной части дельты.

***Iduna pallida* Hempr. & Ehrb..**

♂, 8. VI, Аму-Дарья, 80 верстъ ниже Петро-Александровска.

Эта птичка встрѣчается здѣсь значительно рѣже предыдущаго вида.

***Aëdon familiaris* Ménétr..**

♀, 14. VI, протокъ Ишанъ-Джакенъ; ♂, 4. VII, Яны-су.

Довольно часто встрѣчается по сухимъ зарослямъ дельты.

***Panurus biarmicus russicus* Brehm.**

29. VI, Яны-су; ♂, 19. VI, Талдыкъ.

Очень обычна въ тростниковыхъ заросляхъ дельты.

***Remiza macronyx* Sev. ¹⁾.**

Я видѣлъ одинъ экземпляръ, повидимому, этого вида въ тростниковыхъ заросляхъ устья Куваншъ-Джармы.

¹⁾ О ремезахъ см. статью профессора М. А. Мензбира: «Обзоръ ремезовъ Туркестанско-Сибирской фауны». («Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи», 1910 г.). *Авт.*

Remiza coronata Sev..

♂, 20. VII, Куваншъ-Джарма.

Этого ремеза я часто встрѣчалъ по протоку Куваншъ-Джарма.

Parus bokharensis Licht..

2♂ и 1♀, 20. VII, Куваншъ-Джарма.

Синица эта обычна въ Нукусѣ и въ тугаяхъ нижней Аму-Дарьи. Однако въ камышевыхъ и тростниковыхъ заросляхъ я ее не встрѣчалъ вовсе.

Budytes melanocephalus melanogriseus Hom..

♂, 22. VI, протокъ Кандъ-узакъ; ♂, 15. VI, гора Бурлытау.

Очень обычна въ дельтѣ Аму-Дарьи.

Calobates melanope Pall..

♂, 3. VIII, заливъ Талдыкъ.

Эту трясогузку я встрѣтилъ въ первый разъ въ началѣ августа на баржѣ, которая служитъ параконной пристанью въ заливѣ Талдыкъ. Трясогузки держались здѣсь иногда парами, часто по 3—4 особи до середины августа. По всей вѣроятности это были пролетные экземпляры.

Motacilla personata Gould..

Одинъ экземпляръ бѣлой трясогузки я замѣтилъ около селенія Саманкулъ (возвышенность Кушканатау) 1. VIII, но была ли это *M. alba dukhunensis* Gould, которая, по М. Н. Богданову, гнѣздится на нижнемъ теченіи Аму-Дарьи, или упоминаемый мною видъ, навѣрно не могу сказать, такъ какъ добыть птицы не удалось. Во время моего перваго посѣщенія этой возвышенности (въ іюнѣ) я не видалъ бѣлой трясогузки.

Anthus campestris L..

Я видѣлъ этого конька разъ близъ устья протока Кандъ-узакъ 2. VIII.

Oriolus kundoo Sykes.

Иволгу эту нашли въ Нукусѣ М. Н. Богдановъ, М. Бутле-

ровъ и А. М. Никольскій; кромѣ Нукуса, я встрѣтилъ ее и въ тугаяхъ по протоку Куваншъ-Джарма.

Otomela phoenicuroides karelini Bogd., переходный къ
O. p. romanovi Bogd..

♂, 7. VII, озеро Каратерень.

Встрѣченъ одинъ разъ близъ озера Каратерень.

Lanius pallidirostris Cass..

♂, 7. VII, и ♀, 9. VII, Бельтау.

Нѣсколько разъ встрѣчался въ песчаныхъ пространствахъ, кое-гдѣ заросшихъ рѣдкими кустами саксаула, къ сѣверу отъ холмовъ Бельтау.

Примѣчаніе 1-е. Изъ гнѣздящихся въ низовьяхъ Аму-Дарьи сорокопутовъ М. Н. Богдановъ приводитъ еще *Otomela isabellina* Hempr. & Ehr., *Lanius assimilis* L. et. A. Br., *L. grimmi* Bogd.

Примѣчаніе 2-е. М. Н. Богдановъ и М. Бутлеровъ напали въ Хивинскомъ оазисѣ и Нукусѣ *Muscicapa grisola* L.

Hirundo rustica L.

Очень обычна близъ селеній.

Cotyle riparia diluta Sharpe & Wyatt.

♀, 2. VII, Яны-су.

Встрѣчается въ дельтѣ Аму-Дарьи; болѣе обычна на взморьѣ.

Cynchramus pyrrhuloides Pall..

Объ этой овсянкѣ упоминаетъ М. Н. Богдановъ, какъ о гнѣздящейся въ заросляхъ дельты; я нѣсколько разъ издали видѣлъ эту птицу, однако добыть ее не удалось.

Emberiza luteola Sparrm.

♂, 4. VII, Яны-су.

Въ дельтѣ Аму-Дарьи овсянка эта очень обычна.

Loxia curvirostra L..

♀, 24. VI, Кушканатау.

Одну самку клеста съ сильно атрофированнымъ яичникомъ

я встрѣтилъ въ средней части дельты 24.VI; птица перелетала по кустикамъ низкаго *Peganum harmala* L. и другимъ степнымъ растеніямъ, повидимому собирая сѣмена. Мѣстность, гдѣ я встрѣтилъ клеста, представляла холмистую степь, деревьевъ здѣсь нѣтъ вовсе. Очевидно, это былъ отбившійся экземпляръ налета 1909 года („Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1911 годъ: замѣтка Э. В. Шарлемана, стр. 328, и статья Н. А. Заруднаго, стр. 3).

***Passer indicus* Jard. & Selby.**

♂, 4.VII, Яны-су.

Очень обычная птица въ дельтѣ.

***Salicipasser montanus dilutus* Richm..**

♂, 22 VI, протокъ Кандъ-узякъ.

Обыкновененъ, хотя рѣже предыдущаго.

***Passer hispaniolensis* Temm..**

Рѣже предыдущихъ.

***Galerida magna* Hume.**

♂, 15.V, гсра Бурлытау.

Хохлатый жаворонокъ не рѣдокъ въ подходящихъ мѣстахъ дельты, т.-е. на возвышенностяхъ внутри дельты и по берегамъ протока восточной и южной части ея.

***Calandrella minor leucophaea* Sev., переходный къ
C. m. heinei Hom.**

♀, 26.VI, гора Кушканатау; 15.VI, гора Бурлытау.

Жаворонокъ этотъ очень обыченъ въ дельтѣ, особенно въ восточной ея части, гдѣ близъ озера Каратерень попадаетъ большими стаями.

***Pastor roseus* L.**

Розовый скворецъ найденъ въ низовьяхъ Аму-Дарьи М. Булеровымъ и М. Н. Богдановымъ. Я встрѣтилъ птицу эту въ незначительномъ количествѣ лишь разъ близъ озера Каратерень 8.VII. Быть можетъ рѣдкость здѣсь розоваго скворца лѣтомъ

1911 года была слѣдствіемъ почти полного отсутствія саранчи, многочисленной въ другіе года.

***Sturnus dresseri* Buturl.**

♀, 27.VI, протокъ Джүзъ-Дарья.

Черные скворцы встрѣчаются кое-гдѣ въ дельтѣ, но сравнительно рѣдко; о нихъ упоминаетъ А. М. Никольскій, предполагая, что это *S. rigirugascens* Gould. Нѣсколько стаякъ скворцовъ я видѣлъ 27.VI на холмахъ Кушканатау; птицы летѣли на юго-западъ.

Примѣчаніе. М. Н. Богдановъ упоминаетъ о гнѣздованіи галки (*Corvus monedula* L.) близъ Кунграда; я этой птицы не видѣлъ въ дельтѣ, но замѣчалъ неоднократно съ парохода на прибрежныхъ скалахъ между Чарджуемъ и Петро-Александровскомъ.

***Corvus cornix* L.**

Сѣрую ворону, которая кажется не рѣдка въ дельтѣ зимой, я встрѣтилъ два раза: на плотинѣ, отдѣляющей морскую воду отъ прѣсной верстахъ въ 40 отъ моря, на протокъ Яны-су (въ первыхъ числахъ іюля), и на берегу Куваншъ-Джармы двумя недѣлями позже; послѣдняя птица повидимому не летала, такъ какъ одно крыло ея было сильно попорчено.

***Corvus corone* L.**

Обычна въ дельтѣ; встрѣчалъ я ее даже на взморьѣ среди сплошныхъ тростниковыхъ зарослей.

Примѣчаніе. М. Н. Богдановъ считаетъ грача (*Corvus frugilegus* L.) гнѣздящейся птицей дельты; никто изъ другихъ изслѣдователей дельты о немъ не упоминаетъ; вѣроятно грачъ здѣсь лишь зимуетъ и встрѣчается на пролетахъ.

***Podoces panderi* Fisch.**

Птица эта встрѣчается лишь на окраинахъ дельты; А. М. Никольскій встрѣтилъ ее близъ Кунграда; я видѣлъ ее разъ на берегу Куваншъ-Джармы.

***Pica pica bactriana* Bonap.**

Juv., 21.VII, Куваншъ-Джарма.

Сорока довольно часто встрѣчается въ тугаяхъ и заросляхъ по берегамъ Аму-Дары и ея протоковъ въ дельтѣ. Птица въ

общемъ осторожная и добыть ее не всегда легко. Подъ различными названіями упоминается всѣми прежними изслѣдователями дельты.

***Dendrocopus albipennis* Buturl.**

б. VII, Яны-су.

Вѣроятно къ этому виду относятся указанія М. Бутлерова и М. Н. Богданова, нашедшихъ *Picus chan Fil.* и *P. leucorterus Salv.* около Нукуса. Кромѣ окрестностей Нукуса, я встрѣчалъ дятловъ преимущественно по Куваншъ-Джармѣ и Яны-су, притомъ довольно близко отъ моря, гдѣ уже нѣтъ настоящихъ тугаевъ, да и кустарниковая растительность довольно рѣдка.

Примѣчаніе. М. Н. Богдановъ предполагаетъ, что вертишейка (*Jynx torquilla L.*) гнѣздится въ Хивинскомъ оазисѣ; М. Бутлеровъ видѣлъ эту птицу около Нукуса въ августѣ.

***Cuculus canorus* L.**

Обыкновенная кукушка мѣстами въ дельтѣ очень обычна; попадаетъ даже въ тростниковыхъ заросляхъ, гдѣ совершенно нѣтъ сухой земли.

***Coracias garrula semenovi* Loud. & Tschusi.**

Сизоворонка водится здѣсь сравнительно въ незначительномъ количествѣ. Часто встрѣчалъ я ее лишь на возвышенности Кубетау.

***Merops apiaster* L.**

Этотъ видъ шурки гнѣздится въ дельтѣ, но значительно рѣже слѣдующаго; я встрѣчалъ его по берегамъ Ишанъ-Джакена, Куваншъ-Джармы и на озерѣ Каратерень.

***Merops persicus* Pall.**

Очень обычна всюду въ дельтѣ.

***Upupa epops* L.**

Удодъ замѣченъ въ дельтѣ всѣми прежними изслѣдователями; я, впрочемъ, не могу сказать, чтобы гнѣздилися онъ здѣсь въ большомъ числѣ.

Caprimulgus unwini Hume.

♂, 8. VII, гора Бельтау.

Этотъ козодой встрѣчается въ тугаяхъ и кое-гдѣ на возвышенностяхъ, напримѣръ на Бельтау, въ общемъ рѣже слѣдующаго вида.

Caprimulgus aegyptianus Licht..

♀, 9. VII, гора Бельтау.

Довольно обычная птица на сухихъ площадяхъ съ рѣдкой растительностью. Въ первыхъ числахъ августа я встрѣтилъ нѣсколько экземпляровъ близъ устья протока Кандъ-узякъ, на небольшомъ участкѣ земли среди сплошныхъ разливовъ.

Scops brucei Hume.

♀, 9. VII, гора Бельтау; ♂ juv., 4. VII, Яны-су.

Совка эта не рѣдка въ дельтѣ, особенно въ ея восточной части, на открытыхъ глинистыхъ или песчаныхъ пространствахъ, среди рѣдкой кустарниковой растительности.

Athene bactriana Blyth..

♀, 5. VII, Яны-су.

Я встрѣчалъ сычей около Нукуса (по сухому руслу бывшаго протока изъ рѣки въ озеро Ащиккуль) и кое-гдѣ на возвышенностяхъ дельты. Видѣлъ его также и на горахъ Шенхъ—Джейли.

Примѣчаніе. Раза два я видѣлъ издали крупную сову, спугнутую нашими выстрѣлами и высоко кружившуюся надъ тугаемъ по Ишанъ-Джакену. Повидимому это былъ какой-то филинъ.

Circus rufus Gm..

♀, 19. VI, Талдыкъ.

Камышевый лунь очень обыченъ въ тростниковыхъ заросляхъ дельты.

Примѣчаніе. Я нѣсколько разъ видѣлъ по Талдыку, Куваншъ-Джармъ и близъ озера Каратерень свѣтлаго луня, но очень далеко, такъ что не удавалось ни добыть птицу, ни опредѣлить ее хотя бы приблизительно. Всего вѣроятнѣе, что это былъ *C. macrurus* Gmel..

Astur cenchroides Sev..

На нижней Аму-Дарьѣ видѣ этотъ я наблюдалъ нѣсколько разъ въ Петро-Александровскѣ (въ городскомъ саду) въ началѣ іюня и разъ въ серединѣ іюля въ тугаѣ по Куваншъ-Джармѣ.

Cenchrus cenchris Naum..

Пустельгу я видѣлъ близъ Нукуса.

Cenchrus alaudarius Briss..

Я не разъ встрѣчалъ эту птицу на развалинахъ и обрывахъ между Петро-Александровскомъ и Нукусомъ.

Примѣчаніе 1-ое. М. Н. Богдановъ и М. Бутлеровъ считаютъ чеглока (*Falco subbuteo* L.) гнѣздящейся птицей низовьевъ Аму-Дарьи, что подтверждаютъ М. А. Мензбиръ и Н. А. Сѣверцовъ.

Примѣчаніе 2-ое. М. Н. Богдановъ нашелъ въ низовьяхъ Аму-Дарьи скопу (*Pandion haliaëtus* L.) и *Buteo ferox* Gmel..

Circaëtos gallicus hypoleuca Pall..

♂, 20. VII, Куваншъ-Джарма.

Я разъ только встрѣтилъ орла-змѣеяда; судя по поведенію птицы, поблизости въ тугаѣ было гдѣ-нибудь ея гнѣздо.

Milvus ater Gmel..

♂, 13. VI, Ишанъ—Джакенъ.

Этотъ коршунъ очень обыченъ въ тугаяхъ по берегамъ южной части протоковъ дельты, но не заходитъ однако за границу древесной растительности. По Куваншъ-Джармѣ въ серединѣ іюля я его видѣлъ очень рѣдко.

Haliaëtus leucoryphus Pall..

Очень обычная птица въ низовьяхъ Аму-Дарьи въ ея дельтѣ до начала сплошныхъ разливовъ.

Haliaëtus albicilla Briss..

Орланъ-бѣлохвость гнѣздится въ дельтѣ Аму - Дарьи,

но рѣже предыдущаго вида. Вообще орланъ весьма обыкновенная птица низовьевъ Аму-Дарьи.

Примѣчаніе. М. Н. Богдановымъ найденъ на гнѣздовѣхъ въ низовьяхъ Аму-Дарьи стервятникъ (*Neophron percnopterus* L.).

***Pelecanus crispus* Bruch. и *P. onocrotalus* L..**

Пеликаны встрѣчаются на озерахъ дельты и на взморьѣ, гдѣ ихъ наблюдали и прежніе изслѣдователи. На самой Аму-Дарьѣ если и попадаются, то случайно. Большая часть встрѣченныхъ мною птицъ были розовые пеликаны.

***Phalacrocorax carbo* L..**

Лично я видѣлъ баклана лишь на взморьѣ въ очень значительномъ количествѣ и раза 2—3 на Яны-су.

***Fuligula nyroca* Gûld..**

Этотъ нырокъ здѣсь очень обыченъ.

***Anas querquedula* L..**

Три экземпляра этого чирка я встрѣтилъ въ концѣ іюля (22-го) на озерѣ Ащикулъ, близъ Нукуса, и двухъ застрѣлилъ.

***Anas boschas* L..**

Кряква встрѣчается здѣсь въ незначительномъ количествѣ. Я видѣлъ ее раза 2—3.

***Anas strepera* L..**

Сѣрая утка гнѣздится въ значительномъ количествѣ въ дельтѣ.

***Anas angustirostris* Ménêtr..**

Эта утка очень часто встрѣчается въ дельтѣ.

Примѣчаніе. М. Н. Богдановъ приводитъ, какъ гнѣздящихся въ дельтѣ утокъ, еще *Anas crecca* L., *Fuligula rufina* Pall. и *F. ferina* L..

***Tadorna cornuta* Gm..**

Мнѣ пришлось наблюдать этотъ видъ лишь разъ, именно 30. VI на горѣ Терменбесъ (взморье близъ устья Яны-су).

Tadorna rutila Pall..

Красная утка встрѣчается въ дельтѣ сравнительно часто. Нѣсколько экземпляровъ я видѣлъ на возвышенностяхъ внутри дельты (Кушканатау, Бурлытау); два большихъ выводка нашелъ на соленыхъ озерахъ близъ озера Каратерень; не разъ видѣлъ ихъ по Куваншъ-Джармъ. 15. VII нѣкоторые птенцы были еще въ пуху; многіе достигли уже $\frac{2}{3}$ величины взрослыхъ, но еще не летали.

Anser cinereus Meyer..

Сѣрый гусь не представляетъ здѣсь рѣдкости. Въ первой половинѣ лѣта его трудно увидѣть, такъ какъ гуси прячутся по зарослямъ, но въ концѣ іюля и началѣ августа они постоянно попадаются на глаза.

Cygnus olor Gm..

Я встрѣтилъ лебедя-шипуну лишь разъ—3 экземпляра на озерѣ Каратерень 13. VII.

Примѣчаніе. Мнѣ передавали старожилы, что изрѣдка залетаетъ на Аральское море фламинго (*Phoenicopterus roseus* Pall.).

Platalea leucorodia L..

Колпица не рѣдка въ дельтѣ Аму-Дарьи, особенно по высыхающимъ разливамъ средней ея части.

Ibis falcinellus L..

Каравайка очень обычна въ восточной части дельты на озерѣ Каратерень и на нижней Куваншъ-Джармъ. Въ другихъ мѣстахъ я встрѣчалъ ее очень рѣдко. 12. VII вечеромъ я наблюдалъ многочисленныя стайки караваекъ, летящихъ на югъ на сравнительно незначительной высотѣ (50—70 сажень).

Ardea cinerea L..

Сѣрая цапля очень обычна въ южной половинѣ дельты. Ближе къ морю она становится рѣже и на взморьѣ почти вовсе не попадаетъ; здѣсь ее замѣняетъ слѣдующій видъ.

Ardea purpurea L..

Очень многочисленна по протокамъ и разливамъ дельты близъ моря и кое-гдѣ по морскимъ островамъ.

Ardea alba L..

Бѣлая цапля не каждый годъ встрѣчается въ одинаковомъ количествѣ; въ 1911 году бѣлыхъ цапель въ дельтѣ было очень мало: я видѣлъ ее лишь разъ—16—VI на протокѣ Телебай.

Garzetta garzetta L..

Малая бѣлая цапля гнѣздится кое-гдѣ въ дельтѣ, именно близъ озера Каратерень.

Ardetta minuta L..

Эта цапля встрѣтилась мнѣ нѣсколько разъ въ заросляхъ тростниковъ въ средней части дельты.

Nycticorax griseus Briss..

Ночная цапля встрѣтилась мнѣ лишь разъ—18. VI на Куваншъ-Джармѣ, въ довольно густомъ и высокомъ тугаѣ.

Botaurus stellaris L..

Выпь гнѣздится въ дельтѣ, хотя, повидимому, въ незначительномъ количествѣ. Я слышалъ ее нѣсколько разъ близъ озера Каратерень.

Прилѣчаніе. По М. Н. Богданову въ дельтѣ Аму-Дарьи гнѣздится *Ardea somata* Pall.

Turtur auritus L..

Горлица обычна въ дельтѣ всюду, гдѣ есть участки сухой земли.

Columba livia fera Bogd..

Этотъ голубь обыченъ на обрывахъ возвышенностей восточной части дельты; встрѣчается кое-гдѣ на развалинахъ прежнихъ селеній.

Прилѣчаніе 1-е. Кромѣ этого голубя я замѣтилъ въ дельтѣ (по Яны-су) другой видъ, къ сожалѣнію, не добытый. Вѣроятно, это окажется *Columba fusca* Pall..

Прилѣчаніе 2-е. *Syrnoides paradoxus* Pall., которая гнѣздится, по М. Н. Богданову, въ пустыняхъ близъ низовьевъ Аму-Дарьи, мнѣ ни разу не попалась.

Pterocles alchata severzovi Bogd..

Этотъ рябокъ гнѣздится въ огромномъ количествѣ близъ озера Каратерень, куда слетается на водопой по утрамъ, часовъ до 10—11, и вечеромъ, начиная съ 3—4 часовъ. Кое-гдѣ я встрѣчалъ его и по Куваншъ-Джармъ и Яны-су, но въ очень незначительномъ количествѣ.

Pterocles arenarius Pall..

Чернобрюхій рябокъ встрѣчается здѣсь рѣже предыдущаго вида, но зато въ различныхъ пунктахъ дельты, гдѣ есть подходящія мѣста для гнѣздованія. Попадаетъ и около Нукуса.

Примѣчаніе. На холмѣ Кубетау близъ прѣснаго озера я видѣлъ издали пару рябковъ, которые, повидимому, не относятся къ двумъ предыдущимъ видамъ. Этотъ рябокъ былъ величиной немного больше *P. arenarius* Pall., издали казался весь сѣраго цвѣта и улетѣлъ молча, не издавая столь характерныхъ для извѣстныхъ мнѣ рябковъ криковъ.

Coturnix communis orientalis Bogd. (?).

Перепелка встрѣчена мною въ срединѣ іюня на хлѣбныхъ поляхъ южнѣе холма Кубетау, къ западу отъ протока Талдыкъ. Въ это время крикъ этой птицы былъ слышенъ все утро часовъ до 9—10. Безъ сомнѣнія, перепела здѣсь гнѣздятся, хотя и въ незначительномъ количествѣ. Вѣроятно, они относятся къ восточной разновидности.

Phasianus chrysomelas Sev..

Этотъ фазанъ, описанный Н. А. Сѣверцовымъ, встрѣчается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дельты въ значительномъ количествѣ. Крики пѣтуховъ постоянно приходится слышать, проѣзжая по протокамъ мимо тугаевъ, но найти здѣсь птицу почти невозможно. Лишь на мѣстахъ съ низкой растительностью удается заставить фазана взлетѣть на воздухъ, да и то послѣ долгихъ усилій. За все лѣто я добылъ нѣсколько фазановъ, преимущественно молодыхъ. Первыхъ летающихъ молодыхъ встрѣтилъ въ срединѣ іюля (на Куваншъ-Джармъ). Опредѣленіе добытаго мною самца было провѣрено профессоромъ М. А. Мензбиромъ.

Glareola pratincola L..

Эта тиркушка водится въ дельтѣ въ огромномъ количествѣ.

Chettusia leucura Licht..

Гнѣздится въ значительномъ количествѣ повсюду въ дельтѣ.

Vanellus cristatus Meyer..

Чибисъ, вѣроятно, гнѣздится въ дельтѣ, такъ какъ попадался мнѣ все лѣто парами и небольшими стайками.

Aegialitis cantiana Lath. (=alexandrina L.).

♂, 24. VI, холмы Кушканатау.

Мнѣ этотъ звукъ попадался кое-гдѣ въ дельтѣ, преимущественно въ ея центральной и восточной части.

Aegialitis dubia Scop..

♂, 5. VII, Яны-су; ♀, 15. VI, Бурлытау.

Довольно обычная птица въ дельтѣ. Я часто встрѣчалъ этого зуйка по берегамъ протоковъ, особенно въ восточной и южной части дельты, и около воды на возвышенностяхъ.

Oedienemus crepitans Темм..

♀, 15. VII, Куваншъ-Джарма.

Авдотки встрѣчаются нерѣдко въ восточной части дельты и гораздо рѣже—въ западной, гдѣ менѣе подходящихъ мѣстъ. Добытый мною экземпляръ относится къ типичной формѣ.

Примѣчаніе. М. Н. Богдановъ упоминаетъ о гнѣздованіи на взморьѣ камнешарки (*Strepsilas interpres* L.).

Haematopus ostralegus longipes Buturl..

♂, 3. VII, взморье близъ устья Яны-су.

Куликъ-сорока на взморьѣ водится кое-гдѣ въ значительномъ количествѣ. Показанія предыдущихъ изслѣдователей дельты относятся къ этой формѣ.

Himantopus himantopus L..

Ходулочникъ очень обыченъ всюду въ дельтѣ. Въ серединѣ іюля я встрѣчалъ близъ озера Каратерень значительныя стаи этой птицы.

Recurvirostra avocetta L..

Шилоклювку встрѣтилъ я въ іюнѣ на отмели средней части дельты. Попадаетъ и около Нукуса.

Numenius arquatus L..

Большой кроншнепъ встрѣчался мнѣ нѣсколько разъ по-одиночкѣ, парами и небольшими стаями, преимущественно во вторую половину лѣта.

Numenius tenuirostris Vieill..

Малый кроншнепъ попался мнѣ разъ на протокѣ Ишанъ-Джакенъ 30. VII; затѣмъ часто я видѣлъ его небольшими стаями (5—10 экземпляровъ) въ началѣ августа при устьѣ Кандъ-узяка.

Limosa aegocephala L..

♀, 12. VII, озеро Каратерень.

Этотъ веретенникъ былъ замѣченъ мною въ большомъ количествѣ на озерѣ Каратерень въ серединѣ іюля. Птицы держались иногда по-одиночкѣ, но чаще стаями, иногда очень значительными.

Terekia cinerea Güld..

♂, 30. VI, гора Терменбесъ.

Мородунка попалась мнѣ лишь разъ. Изъ стайки въ 10—15 особей, летѣвшей вечеромъ на значительной высотѣ, удалось выбить одинъ экземпляръ.

Tringa temmincki Leisl..

♂, 8. VII, озеро Каратерень; ♀, 2. VIII, Кушканатау.

Этотъ куличекъ попадался мнѣ все лѣто отдѣльными экземплярами.

Tringa minuta Leisl..

♂, 19. VI, протокъ Куваншъ-Джарма.

Про этого кулика можно сказать то же, что и про предыдущаго. На Куваншъ-Джармѣ въ іюлѣ онъ встрѣчается огромными стаями.

***Tringa subarquata* Güld..**

♀, 12. VII, озеро Каратерень.

Этотъ куликъ часто встрѣчался мнѣ въ восточной части дельты въ іюлѣ. Помимо пролетныхъ, здѣсь были, вѣроятно, и бродячіе экземпляры.

***Tringa arenaria* L..**

Песчанка встрѣтилась мнѣ одинъ разъ—8. VII на озерѣ Каратерень въ количествѣ 3-хъ экземпляровъ.

***Totanus hypoleucos* L..**

♀, 6. VII, Яны-су.

Перевозчикъ встрѣчался мнѣ въ разныхъ мѣстахъ дельты, но въ незначительномъ количествѣ.

***Totanus glottis* L..**

Этотъ куликъ попался мнѣ лишь 3. VII на Яны-су близъ пароходной пристани (верстѣ 40 отъ моря), на небольшомъ озеркѣ; изъ двухъ замѣченныхъ экземпляровъ одинъ былъ застрѣленъ.

***Totanus stagnatilis* Bechst..**

♀, 22. VI, Кандъ-узякъ; ♀, 24. VI, холмъ-Иткыръ.

Улитъ не представляетъ рѣдкости въ дельтѣ; кое-гдѣ, какъ, напримѣръ, на разливахъ къ югу отъ озера Каратерень, онъ очень обыкновененъ.

***Totanus ochropus* L..**

Чернышъ не рѣдокъ въ дельтѣ, особенно въ восточной ея части.

***Machetes pugnax* L..**

♂, 3. VII, взморье.

Турухтанъ встрѣтился мнѣ на взморьѣ около устья Яны-су въ началѣ іюля. Здѣсь я видѣлъ нѣсколько экземпляровъ на песчаныхъ островахъ, очень многочисленныхъ по этому берегу.

Scolopax gallinago L..

Бекасъ встрѣчается въ дельтѣ лѣтомъ, но сравнительно рѣдко. Я видѣлъ его раза 2—3 въ западной части дельты.

Примѣчаніе 1-е. Въ пустыняхъ близъ береговъ нижняго теченія Аму-Дарьи гнѣздится дрофа-джекъ (*Otis macqueni* J. Gr.), замѣченная здѣсь А. М. Никольскимъ и М. Н. Богдановымъ.

Примѣчаніе 2-е. По М. Н. Богданову, въ дельтѣ Аму-Дарьи гнѣздятся *Gallinula chloropus* L., *Fulica atra* L., *Porzana parva* Scop. и *Rallus aquaticus* L. Изъ этихъ птицъ я ни одной не видѣлъ, но слышалъ въ камышахъ крикъ лысухи и камышевой курочки (*G. chloropus* L.).

Larus cachinnans Pall..

Эта чайка очень обычна по морскому побережью; внутри дельты по протокамъ встрѣчается рѣже.

Larus ridibundus L..

Эта чайка встрѣчается гораздо рѣже предыдущей.

Larus ichthyætos Pall..

Черноголовый хохотунъ попался мнѣ лишь разъ—на островѣ Такмакатау въ концѣ іюня въ количествѣ 3—4 экземпляровъ.

Hydrochelidon hybrida Pall..

♀, 18. VI, Талдыкъ.

Эта крачка очень многочисленна въ дельтѣ, особенно въ западной и центральной части, а также на взморьѣ.

Hydrochelidon leucoptera L..

Этотъ видъ крачки встрѣчается, сравнительно съ другими крачками, рѣдко.

Hydrochelidon nigra L..

♂, 24. VI, Кушканатау.

Эта крачка довольно обычна въ дельтѣ, особенно близъ моря.

Sterna anglica Mont..

Очень обычна на Аму-Дарьѣ и въ ея дельтѣ.

Sterna fluviatilis Naum..

Эта крачка встрѣчается въ дельтѣ Аму-Дарьи въ значительномъ количествѣ, какъ по протокамъ и озерамъ, такъ и кое-гдѣ близъ моря.

Sterna caspia Pall..

Чеграва встрѣчается здѣсь въ незначительномъ количествѣ. Чаше наблюдалъ я ее на морѣ, въ дельтѣ—рѣке и раза два видѣлъ на Аму-Дарьѣ между Петро-Александровскомъ и Нукусомъ.

Sterna minuta L..

Эта крачка очень обычна въ дельтѣ по протокамъ, озерамъ и на взморьѣ. Вѣроятно, среди птицъ этого вида попадаютъ экземпляры и *Sterna saundersi* Hume, которая найдена въ 1898 году П. П. Сушкинымъ въ Киркизскихъ степяхъ, а мною въ 1901 году въ Крыму и въ послѣднее время Н. А. Заруднымъ въ Туркестанѣ на Сыръ-Дарьѣ („Орнитологическiй Вѣстникъ“ за 1910 г., № 2).

Podiceps cristatus L..

Большая поганка встрѣтилась мнѣ лишь разъ—30. VI на взморьѣ между островами близъ устья Яны-су. Птицы — ихъ было 2 — были очень осторожны и далеко не подпускали лодку, такъ что пришлось ограничиться наблюденiемъ въ бинокль.



Замѣтки по орнитологіи Томской губерніи.

Г. Э. Іоанзенъ.

Mitteilungen über die Ornithologie des Gouvernements Tomsk.

Von Herm. Johansen.

1. *Calliope calliope* (Pall.).

Въ окрестностяхъ Томска, по рѣчкѣ Ушайкѣ, между деревнями Корниловой и Родіоновой, 25. V. 1909 было найдено гнѣздо краснозобаго соловья, помѣщавшееся на землѣ въ заросли малины, двудомной крапивы и тальника. Гнѣздо чрезвычайно рыхлое, сооруженное изъ нѣжныхъ стебельковъ и растительныхъ волоконъ, съ незначительной примѣсью волосъ и ничтожнымъ количествомъ растительнаго пуха въ качествѣ, можетъ быть, случайной примѣси, занесенной вѣтромъ. Наружный діаметръ его около 9 см., внутренній около 6,5 см. Въ гнѣздѣ оказалось 4 яйца зеленовато-голубого цвѣта, съ едва замѣтными блѣдноржавыми, крайне мелкими пятнышками, иногда—и черточками, которыя въ большемъ числѣ группируются на тупой половинѣ яйца. Размѣры (въ миллиметрахъ) и вѣсъ (въ гр.) этихъ яицъ:

$$1) \frac{20,0 \times 14,7}{0,14}, \quad 2) \frac{19,0 \times 14,6}{0,13}, \quad 3) \frac{19,2 \times 15,0}{0,12} \quad \text{и} \quad 4) \frac{19,2 \times 15,0}{0,12}.$$

2. *Phylloscopus viridanus* Blyth.

Въ 1909 году удалось получить несомнѣнные доказательства гнѣздованія въ окрестностяхъ Томска зеленой пѣночки, пойманной Г. Е. Сольскимъ въ гнѣздѣ 26. V близъ деревни Кисло-

вой. Измѣренія самки: длина клюва—*rostrum* 9,—*culmen* 11,5 м.м.; крыло 58,5 м.м.; длина выдающейся части 1-го махового 15 м.м.; хвостъ (отъ кобчиковой железы) 48 м.м.; плюсна 18 м.м. Второе маховое <7-го, но>8-го.—Гнѣздо, помѣщавшееся на землѣ, состояло изъ зеленого мха. Наибольшая длина нижней его стороны 105 м.м.; длина крыши 65 м.м.; наибольшая ширина всей постройки впереди у входа и равна 75 м.м.; наибольшая высота (надъ входомъ) равна 74 м.м.—Въ гнѣздѣ найдено 6 малоблестящихъ яицъ чисто-бѣлаго цвѣта, довольно сильно насиженныхъ. Размѣры ихъ (въ миллиметрахъ): $15,0 \times 11,2$; $15,5 \times 11,2$; $15,0 \times 11,5$; $15,5 \times 11,5$; $15,0 \times 11,3$; $15,0 \times 11,2$. Всѣ скорлупы (отверстія большія) не менѣе 0,05 гр.

3. *Bombycilla garrulus* (Linn.).

Въ прежніе годы взрослые экземпляры свиристелей наблюдались иногда подъ Томскомъ въ августѣ. Появленіе этихъ птицъ здѣсь можно было объяснить кочевками, такъ какъ о гнѣздованіи ихъ недалеко отъ названнаго города до настоящаго времени ничего не было извѣстно.—Въ 1910 году П. А. Шастовскимъ 28. VII наблюдалось 6 птицъ этого вида: 2 взрослыхъ и 4 молодыхъ; изъ нихъ добытъ взрослый самецъ (длина крыла 114 м.м.). Черезъ день этимъ же наблюдателемъ въ „горяихъ“ Пѣтуховской тайги замѣчены выводки свиристелей, состоявшіе изъ 6 и 9 индивидовъ, изъ которыхъ одинъ былъ убитъ. Длина его крыла 111 м.м. Хохолокъ у него совершенно отсутствуетъ; темя, затылокъ и спина сѣровато-бураго цвѣта.

4. *Acanthis hornemannii exilipes* (Coues).

Эта чечетка найдена въ 1906 году гнѣздящаяся въ окрестностяхъ Томска. Гнѣздо ея помѣщалось на тонкомъ сухомъ суку ели на высотѣ около $1\frac{1}{2}$ метровъ отъ земли и на разстояніи одного метра отъ ствола, толщина котораго была около 12 см. Оно было подвѣшено къ сучку и едва подпиралось снизу нѣсколькими тоненькими вѣточками. Гнѣздо представляло собою красивую, плотную постройку, внутри выстланную перышками, пухомъ и шерстью. Эти непроводники тепла вплетены и въ наружные, главнымъ образомъ низшіе слои гнѣзда. Высота его почти 5 см., наружный діаметръ—8, а внутренній около 5 см. 13. IV гнѣздо это было еще пусто, а 21. IV въ немъ замѣчено

5 еще ненаспиченныхъ яичекъ. Всѣхъ неперепарированныхъ яичекъ: 146, 139, 127, 124 и 117 гр. Размѣры (въ миллиметрахъ) и всѣхъ (въ гр.) ихъ скорлупы:

$$\frac{17,0 \times 12,0}{0,07}, \frac{17,0 \times 12,2}{0,07}, \frac{17,3 \times 12,0}{0,08}, \frac{16,5 \times 11,3}{0,07} \text{ и } \frac{16,8 \times 11,4}{0,07}.$$

Въ это время обильно выпадалъ снѣгъ, и самочку почти постоянно заставляли сидѣть въ гнѣздѣ.

5. *Gyps fulvus* Gmel..

О нахожденіи въ Алтаѣ какого-то бѣлоголоваго грифа, котораго я привожу здѣсь подъ названіемъ *fulvus* (Gmelin, 1788)—хотя возможно, что это былъ и *himalayensis* (Hume, 1869) или *cinclomachus* (Reichenow, 1907)—К. М. Сухаревымъ сообщены мнѣ слѣдующія выписки изъ его записной книжки:

„Черный Ануй, 7 іюня 1905 года. Сипъ бѣлоголовый. Длина 120 сант., крыло 75, хвостъ 45, плюсна 12, восковица 2, клювъ 9. Самецъ убитъ 4 іюня въ Туратѣ“. „Турата—стойбище калмыцкихъ юртъ на рѣчкѣ Туратѣ, среди лѣсистыхъ горъ, въ 8 в. отъ Чернаго Ануя и въ 40 в. къ сѣверу отъ с. Усть-Канъ“... Къ сообщенію К. М. Сухаревымъ былъ приложенъ фотографическій снимокъ съ убитой имъ птицы.

6. *Glaucidium passerinum* (Linn.).

Въ зоологическій музей Томскаго университета поступилъ экземпляръ самки воробыиной совки, добытый 15. VII. 1908 П. А. Шастовскимъ на 29-ой верстѣ отъ станціи „Тайга“ (железнодорожная вѣтка „Томскъ - Тайга“), въ тотъ моментъ, когда эта совка задушила хомяка (*Cricetus cricetus*, ¹⁾). Кромѣ этого, мнѣ пришлось приобрести и временно пользоваться слѣдующими экземплярами: ♀, Томскъ, 27. II. 1910; ♂, окрестности Томска, 28. XII. 1910; ♀, дачная мѣстность „Городокъ“ близъ Томска, 17. X. 1911 (моя коллекція); ♀, верховья рѣки Джилинды, Забайкальская область, 29. IX. 1909 (коллекція А. Я. Тугаринова), и ♀, окрестности Томска, 1. XII. 1911 ²⁾.

¹⁾ Хомякъ въ качествѣ объекта охоты этой маленькой совы не упоминается въ новомъ изданіи Наумана. *Авт.*

²⁾ П. А. Шастовскаго и А. Я. Тугаринова прошу принять благодарность за предоставленные мнѣ на время экземпляры ихъ коллекцій. *Авт.*

Пересмотрѣвъ эти экземпляры, я пришелъ къ выводу, нѣсколько отличному отъ сдѣланнаго С. А. Бутурлинымъ ¹⁾, согласно которому западная форма воробьиного сыча „распространена по всей Западной Сибири“, между тѣмъ какъ „въ Иркутской губ. и далѣе на востокъ до побережій Татарскаго пролива его замѣняетъ близкая форма *Gl. pass. orientale* Tacz“. Изъ сравненія поступившихъ экземпляровъ я убѣдился въ томъ, что зимою оба подвида встрѣчаются въ Томской губерніи, что они связаны особыми переходнаго характера и что эти формы такъ мало отличаются другъ отъ друга, что врядъ ли возможно ихъ точно опредѣлить, не зная мѣста, гдѣ добыты птицы.

Наиболѣе типичнымъ *orientale* — по болѣе сѣрому цвѣту спины, по большей испещренности всего верха головы до затылка бѣлыми пятнышками и по рѣзкости рисунка вообще — оказался экземпляръ, добытый въ Томскѣ. Ему почти не уступаетъ экземпляръ изъ окрестностей Томска, который также считаю за представителя восточной расы. Добытый же въ „Городкѣ“ заслуживаетъ быть отнесеннымъ къ западной формѣ: окрасъ верхней его стороны болѣе коричневатый; испещренность верхней стороны и затылочной области у него значительно рѣже и слабѣе выражена, чѣмъ у перваго; хвостовыя поперечныя полосы менѣе чисто-бѣлаго цвѣта, чѣмъ у предшествующаго. Экземпляръ изъ Забайкальской области при сравненіи съ томскими оказывается менѣе типичнымъ, чѣмъ добытый въ Томскѣ: цвѣтъ верха у него съ большей примѣсью коричневаго; пятнистость не такъ развита и отличается меньшей яркостью бѣлаго цвѣта; поперечныя полосы на хвостѣ я не назвалъ бы чисто бѣлыми, какъ это дѣлаютъ авторы „Матеріаловъ по птицамъ Енисейской губерніи“; „границы рисунка“ менѣе рѣзки, чѣмъ у томскаго экземпляра. Густота темныхъ пятенъ низа зависитъ, по-моему, отъ препаровки этого экземпляра. — Экземпляры отъ 15. VIII. 1908 и 28. XII. 1910 — особи переходнаго характера. Изъ нихъ первый (линяющая птица) стоитъ ближе къ западной формѣ, а второй — къ восточной. Первый, судя по размѣрамъ — ♂, хотя полъ этой птицы былъ и опредѣленъ иначе. Подошвы свѣжедоставленнаго экземпляра были желтыя, когти черныя. Значительно варьируютъ у воробьиныхъ совокъ вели-

¹⁾ А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: «Матеріалы по птицамъ Енисейской губерніи» (Красноярскъ, 1911 г.). Авт.

чина, яркость и расположение бѣлыхъ пятенъ на наружныхъ опахалахъ первыхъ маховыхъ.

	Крыло.	Клювъ.	Хвостъ.	Формула крыла.
	м.м.	м.м.	м.м.	
♂(♀?); 15. VIII. 1908; Том- скій уѣздъ	95	11	58,5	4>3>5>2>1
♀; 27. II. 1910; г. Томскъ .	106	14	66,5	4>3>5>2>1
♂; 28. XII. 1910; окрестно- сти Томска, деревня Коломнина	96	12	63,0	4>3>5>2>1
♀; 17. X. 1911; „Городокъ“, близъ Томска	105	14	66,0	3>4>5>2>1
♀; 29. IX. 1909; Забайкаль- ская область, вер- ховья рѣки Жи- линды	107	14	66,0	4>3>5>2>1
♀; 1. XII. 1911; окрестно- сти Томска	105	13	70,0	4>3>5>2>1

Воробыиная совка въ послѣднее время найдена и въ Барабинской степи: П. А. Шастовскій видѣлъ на станціи Каинскъ и на разъѣздѣ 1073 версты двухъ совокъ этого вида, убитыхъ 1. II. 1912.

7. *Gallinula chloropus* (Linn.).

П. А. Шастовскій доставилъ мнѣ двухъ камышницъ, изъ которыхъ одна была добыта въ Барабинской степи 28. IX. 1908 близъ станціи Каинскъ изъ числа трехъ птицъ, замѣченныхъ на берегу Шубинскаго озера, а другая—взрослый самецъ—въ окрестностяхъ Томска (деревня Еушта) 25. VII. 1910.—27. VIII. 1911 П. А. Шастовскій добылъ самца въ Барабинской степи близъ деревни Поповой (1073 верста желѣзной дороги) и „видѣлъ, какъ самка увела птенцовъ въ камыши“.

Измѣренія 1-го экземпляра (♂): клювъ со включеніемъ длины лобнаго щитка—31,5, крыло—166, хвостъ—71, плюсна—45,5, средній палецъ безъ когтя—58, его коготь (по прямой линіи)—13 м.м.; первое маховое на 19 м.м. короче второго, которое на 1 м.м. длиннѣе третьяго и является самымъ длиннымъ въ крылѣ.

Ноги свѣже убитой птицы были темно-зеленаго цвѣта, не-

покрытыя перьями части голени—морковно - красного. Клювъ желтовато-зеленый, близъ лобнаго оперенія красноватый.

Судя по весьма незначительному по величинѣ лобному щитку, по бѣлому цвѣту горла и нѣкоторымъ другимъ особенностямъ окраски (бѣлыя, окаймленныя ржаво-желтымъ цвѣтомъ полосы по бокамъ тѣла), это—птица въ первомъ осеннемъ опереніи.

Измѣренія 2-го экземпляра (взрослый ♂): клювъ со включеніемъ длины лобнаго щитка—37,5, крыло—170, хвостъ—74, плюсна—47, средній палецъ безъ когтя—59, его коготь (по хордѣ) почти 16 м.м.; первое маховое на 15 м.м. короче второго, которое чуть длиннѣе третьяго; эти два маха образуютъ вершину крыла.

Окраска голыхъ частей 2-го экземпляра не была записана. На шкуркѣ она такова: клювъ въ основной части и бляха оранжево-кирпично-краснаго цвѣта; плюсна оливко-зеленая, а непокрытыя части голени выше сочлененія такой же почти окраски, какъ и основная часть клюва.

Такимъ образомъ, камышницу приходится причислить къ гнѣздящимся у насъ птицамъ. Нахожденіе ея въ Барабинской степи тѣмъ болѣе интересно, что по М. А. Мензбину ¹⁾ она „въ Западной Сибири вѣроятно водится только въ самыхъ южныхъ частяхъ“, а по С. А. Бутурлину ²⁾ „въ Западной Сибири не доходитъ до Тобольской губ.“.

8. *Platalea leucorodia* Linn..

Въ концѣ октября 1909 года на берегу рѣки Томи, противъ селенія Нагорный Иштанъ, была убита колпица. По окраскѣ клюва, стволовъ всѣхъ маховыхъ, въ особенности же первыхъ четырехъ изъ нихъ, это—молодая птица въ первомъ осеннемъ перѣ. Полъ ея остался неопредѣленнымъ. Такъ какъ западная и восточная (*Pl. l. major* Temm. & Schl.) формы колпицы въ молодомъ возрастѣ не различимы, то невозможно высказать даже предположительно, изъ какой мѣстности могъ совершиться залетъ этой птицы подъ Томскъ.

Размѣры ея таковы: клювъ—174, крыло—377, хвостъ—143, плюсна—142 м.м.. Формула крыла: $2 > 3 > 4 > 1 > 5$; пятое маховое на 34 м.м. короче перваго.

¹⁾ «Птицы Россіи», стр. 454 *Авт.*

²⁾ «Синоптическія таблицы охотничьихъ птицъ Россійской Имперіи», стр. 75. *Авт.*

9. *Scolopax stenura* Bonaparte.

Въ зоологическомъ музеѣ Томскаго университета имѣются взрослая самка и ея птенецъ, добытые П. А. Шастовскимъ 30. VI. 1908 въ окрестностяхъ Томска, около деревни Черныя Юрты. У ♀ всѣхъ рулевыхъ 24; изъ нихъ крайнія 7 съ каждой стороны очень узки. Длина крыла въ указанныхъ С. А. Бутурлинымъ въ „Синоптическихъ таблицахъ“ предѣлахъ.

Такъ какъ находка эта указываетъ на гнѣздованіе азіатскаго бекаса близъ Томска, то я позволю себѣ привести здѣсь всѣ случаи нахожденія этого вида въ предѣлахъ Западной Сибири. Экспедиціею профессора Н. О. Кащенко добытъ на Алтаѣ ♂ этого вида 21. VII. 1898. Въ 1898 году я получилъ хвостъ птицы этого бекаса, добытаго 23. VIII близъ селенія Тисуль въ Маринскомъ уѣздѣ, Томской губерніи ¹⁾. Въ окрестностяхъ Барнаула этотъ видъ былъ добытъ А. П. Велижанинымъ 10. VIII. 1899 ²⁾.

10. *Eudromias morinellus* (Linn.).

Въ видѣ дополненія къ сказанному профессоромъ Н. О. Кащенко ³⁾ о нахожденіи этого кулика на гнѣздовѣ въ русскомъ Алтаѣ, могу сообщить, что В. В. Хворовымъ доставлены въ музей Томскаго университета сивки, добытыя около 20. VII. 1909 на бѣлкахъ въ системѣ рѣчки Абакана.

11. *Numenius phaeopus* (Linn.).

Г. Е. Сольскимъ куплены на рынкѣ въ Томскѣ два самца средняго кроншнепа, убитые 21. V. 1909 въ 12 верстахъ отъ города. Обѣ птицы съ сильно развитыми тестикулами.

Размѣры ихъ таковы:

клювъ (по хордѣ)....	88	и	75	м.м.
крыло.....	240	„	239	„
хвостъ, отъ кобчи- кой железы.....	110	„	108	„
плюсна.....	59	„	58	„

Второй экземпляръ отличается отъ перваго болѣе свѣтлою окраскою нижней стороны. Пестрины на груди и шеѣ у него

¹⁾ и ²⁾ «Ornithologisches Jahrbuch»: 1899, p. 135, и 1902, p. 188. *Авт.*

³⁾ «Результаты Алтайской Зоологической Экспедиции 1898 г.», стр. 96. *Авт.*

свѣтлѣе, а брюхо даже почти сплошь бѣлое, между тѣмъ какъ у перваго экземпляра оно въ значительной степени испещрено пятнами и лишь въ области анальнаго отверстія оно чисто бѣлое. На надхвостьѣ у перваго экземпляра замѣтны рѣдкія, темныя крапины, тогда какъ у втораго ихъ почти нѣтъ. На нижнихъ кроющихъ крыла бѣлый цвѣтъ сильно преобладаетъ надъ темнымъ.

Птицы эти были сравнены съ экземпляромъ *N. p. h. variegatus* изъ селенія Витима, Иркутской губерніи.

12. *Rufibrenta ruficollis* (Pall.).

Самецъ краснозобой казарки добытъ М. М. Елесиннымъ 7. IX. 1909 въ 6 часовъ утра на рѣкѣ Таганъ, между деревнями Таганъ и Молчановой на Оби, въ 60 верстахъ отъ Томска. Птица эта находилась на берегу и подпустила къ себѣ лодку съ охотникомъ шаговъ на 35.

Размѣры ея слѣдующіе: клювъ отъ лобнаго оперенія — 22, коготокъ верхней челюсти — 10, ширина его — 11, наибольшая высота верхней челюсти — 10, крыло — 330, хвостъ (отъ кобчиковой железы) — 115, плюсна около — 53, средній палецъ съ когтемъ — 53, его коготь — 7.5 м.м.

По окраскѣ экземпляръ этотъ, судя по описанію нарядовъ въ „Птицахъ Россіи“ профессора М. А. Мензбира, представляетъ собою „молодую птицу на первомъ году, т.-е. послѣ первой осенней линьки“.

13. *Anser finmarchicus* Gunner.

Пискулька изъ окрестностей Томска мнѣ пока не была известна. Первый экземпляръ этого гуся былъ доставленъ въ зоологическій музей Томскаго университета В. С. Пучковымъ въ видѣ свѣже снятой шкурки, при чемъ полъ птицы не былъ опредѣленъ. Убита она была въ окрестностяхъ Томска, на лугу близъ деревни Петровой, около 16. IX. 1909.

Размѣры ея слѣдующіе: клювъ: culmen—38, отъ вершины до бѣлаго лобнаго оперенія—30, длина коготка верхней челюсти — 10.5, ширина его—10 м.м.; крыло — 355, плюсна около—52, средній палецъ безъ когтя—49, коготь этого пальца—7.5 м.м.. Ширина бѣлаго пятна на лбу (отъ клюва къ теменію) — 27 м.м..

Бѣлый цвѣтъ заходитъ за линію, соединяющую глаза. Подбородокъ лишь въ переднемъ углу помѣченъ бѣлымъ. На нижней сторонѣ тѣла рѣзко выступаютъ черныя пятна неправильной формы. На правой сторонѣ брюха ихъ гораздо больше, чѣмъ на лѣвой.

14. *Nettion formosum* (Georgi).

Мнѣ только недавно пришлось имѣть дѣло съ западно-сибирскими экземплярами клокуна, добытыми близъ Томска въ 1910 и 1911 годахъ. Въ первый разъ всего было добыто 6 экземпляровъ въ первыхъ числахъ мая 1910 года въ одной и той же мѣстности, именно: въ долину рѣки Томи отъ рѣчки Кисловки, протекающей частью этой долиной, до Еуштинской протоки. Поэтому позволительно думать, что это была одна стая, разбѣянная выстрѣлами. Для провѣрки опредѣленія мнѣ были доставлены два экземпляра взрослыхъ самцовъ С. Федоровымъ и А. М. Жуковскимъ, за что обоимъ лицамъ приношу благодарность.

Размѣры этихъ экземпляровъ (по чучеламъ): длина клюва отъ начала лобнаго оперенія—37 и 39; ширина клюва у основанія—13 и 13.5, у коготка—13.8 и 14 м.м.; длина коготка въ обоихъ случаяхъ — 8.5, ширина—его 5.5 и 6 м.м.; крыло — 220 и 225 м.м.. Рулевыхъ — 14.

Впослѣдствіи оказалось, что клокутъ и осенью посѣщаетъ долину рѣки Томи: студентъ Томскаго университета Ю. В. Молчановъ убилъ 14. IX. 1911 на Сѣнной Курьѣ, близъ Томска, ночью самца этого вида.

Размѣры его (на свѣжемъ экземпляръ): крыло — 215, хвостъ отъ железы — 76, плюсна — 37 м.м.; клювъ отъ угла рта — 45, отъ начала лобнаго оперенія — 36 м.м.; ширина клюва у основанія — 14, у коготка — 14 м.м.; длина коготка 8, ширина 5 м.м.. Рулевыхъ—14.

П. А. Шастовскій сообщилъ мнѣ, что онъ встрѣтилъ около 15-го—20 сентября нѣсколько экземпляровъ (3—4) клокуна у торговцевъ дичью на томскомъ рынкѣ. Кромѣ того, онъ предоставилъ въ мое распоряженіе рукопись, изъ которой я считаю нелишнимъ привести слѣдующія данныя, свидѣтельствующія и о лѣтнемъ пребываніи у насъ этой птицы въ 1911 году: 14. V на городскомъ лугу (гдѣ есть озерки), по правому берегу рѣки Томи, видѣлъ двухъ селезней, чрезвычайно смирныхъ и

подпустившихъ къ себѣ очень близко; 17. V въ той же приблизительно мѣстности замѣтилъ самку въ обществѣ трехъ селезней; 28. V тамъ же видѣлъ двухъ самцовъ и самку; 3. VI тамъ же видѣлъ самца и вспугнулъ въ кустахъ недалеко отъ этого озера съ сухого мѣста самку, къ которой, когда она опустилась на воду, тотчасъ же подлетѣлъ самецъ; 29. VI, а также въ половинѣ юля, на томъ же озеркѣ и на другомъ берегу рѣки Томи были убиты три самца.

15. *Oidemia fusca stejnegeri* Ridgw..

Такъ какъ западная граница распространенія восточно-сибирскаго турпана до сихъ поръ не вполне выяснена, я привожу слѣдующіе извѣстные мнѣ факты нахожденія этой формы въ предѣлахъ Томской губерніи.

1) Во время поѣздки по Алтаю въ 1895 году я видѣлъ 30. VI на Каракоджурскихъ озерахъ (на высотѣ около 1670 м.) турпановъ, которыхъ не пришлось убить, почему и подвидъ не былъ точно установленъ („Ornithologisches Jahrbuch“, VIII, 1897, S. 131). Что это была восточно-сибирская разновидность, меня убѣждаетъ то, что

2) экземпляръ, застрѣленный С. В. Хомичемъ въ юнѣ 1896 года въ Чуѣйской степи близъ Кошъ-Агача, есть типичный старый ♂ восточно-сибирской разновидности. (Приводится профессоромъ Н. Ѳ. Кашенко въ „Результатахъ Алтайской Зоологической Экспедиціи 1898 г.“—на страницѣ 99-й подъ названіемъ „*Fuligula fusca* L.“). Длина его клюва отъ лобнаго оперенія—46, крыло—275 м.м..

3) На Алтаѣ же былъ найденъ въ 1901 году П. Г. Игнатовымъ восточно-сибирскій турпанъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы (любезно сообщено мнѣ С. А. Бутурлинымъ).

4) Въ 1901 году около 10. IV старый самецъ былъ добытъ въ окрестностяхъ Томска г-номъ Зефиринымъ. Съ опредѣленіемъ моимъ согласился С. А. Бутурлинъ, которому я прислалъ набросокъ съ характерными очертаніями головы („Ornithologisches Jahrbuch“, XV, 1904, S. 93).

5) 17. IX. 1909 подъ Томскомъ, на рѣкѣ Курьѣ, Г. И. Рычковымъ былъ убитъ турпанъ. По окраскѣ и формѣ клюва это—самка. Ея клювъ отъ лобнаго оперенія—42, крыло—250 м.м..

О нѣкоторыхъ птицахъ Минской губерніи.

А. В. Федюшинъ.

Über einige Vögel des Gouvernements Minsk.

Von A. W. Fedüschin.

(Изъ лабораторіи Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго Университета).

Въ настоящемъ описаніи я сообщаю фактическія свѣдѣнія, касаясь времени гнѣздованія, прилета и отлета птицъ, и ихъ распространенности.

Долженъ оговорить, что всѣ сообщаемыя мною ниже свѣдѣнія касаются главнымъ образомъ Слуцкаго уѣзда, занимающаго болѣе или менѣе центральное мѣсто губерніи, и границъ Слуцкаго и Бобруйскаго уѣздовъ.

Всѣ даты въ статьѣ приведены по старому стилю, а номенклатура дана по книгѣ профессора М. А. Мензбира „Птицы Россіи“.

Vanellus cristatus Meyer. — Чибисъ прилетаетъ сюда очень рано, обычно въ концѣ февраля, такъ, напримѣръ, въ 1907 году я видѣлъ этихъ птицъ 24. II, когда кругомъ лежалъ снѣгъ, и рѣка еще не думала трогаться. Въ концѣ іюня держатся семействами, а иногда и стайками особей въ 30 и болѣе; къ срединѣ іюля собираются въ большія стаи и постепенно съ этого времени начинаютъ исчезать, такъ что къ концу мѣсяца попадаются очень рѣдко.

Scolopax major Gm. — Дупеля больше всего бываетъ у насъ во время его осенняго пролета, т.-е. числа отъ 20 іюля и до первыхъ чиселъ августа; въ концѣ этого мѣсяца становится весьма рѣдокъ.

Scolopax gallinago Briss.—Бекасъ у насъ болѣе распространенъ и многочисленъ, чѣмъ дупель. Прилетаетъ онъ къ намъ около половины марта. Въ 1911 году, напримѣръ, я видѣлъ бекаса 13. III. Токъ продолжается очень долго, и мнѣ удалось застрѣлить токующаго самца 2. VI, когда уже встрѣчалъ молодыхъ птенцовъ. Держатся бекасы здѣсь очень долго, до самыхъ заморозковъ.

Scolopax rusticola L.—Вальдшнепъ прилетаетъ довольно рано: въ случаѣ теплой весны попадаетъ въ первой половинѣ марта, но обыкновенно пролетъ вальдшнепа въ нашей мѣстности начинается съ конца марта. Тяга продолжается до конца мая. Осенній пролетъ начинается съ первой половины сентября и длится очень долго; мнѣ приходилось видѣть вальдшнеповъ по порошѣ, въ началѣ октября.

Scolopax gallinula L.—Единственный случай, когда мнѣ лѣтомъ удалось здѣсь встрѣтить эту птичку, былъ въ 1910 году 29. VI близъ города Слуцка, на довольно большомъ топкомъ, травянистомъ болотѣ. Осенью бываетъ у насъ въ гораздо большемъ количествѣ, нежели весной. Весной я встрѣчалъ гаршнеповъ въ концѣ марта. Осенью они появляются не ранѣе второй половины сентября и держатся до заморозковъ, т.-е. до половины октября.

Totanus totanus L.—Этотъ видъ кулика найденъ мною въ качествѣ гнѣздящейся птицы въ Слуцкомъ уѣздѣ, близъ деревни Поповцы. Здѣсь 2. VI. 1911 на обширномъ травянистомъ болотѣ былъ добытъ одинъ экземпляръ старой птицы изъ числа другихъ особей того же вида, носившихся съ тревожными криками вокругъ меня,—и найдены молодые съ не вполне еще развитыми маховыми перьями. Приходилось убивать куликовъ этого вида и весной, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, возлѣ самого города Слуцка.

Totanus pugnax Briss.—Въ наибольшемъ количествѣ *Totanus pugnax* Briss. встрѣчается въ Минской губерніи весной. Въ 1911 году мнѣ удалось наблюдать тока турухтана только въ 3 мѣстахъ Слуцкаго уѣзда. Лѣтомъ удалось добыть лишь одинъ экземпляръ (♀) 2. VI близъ деревни Борки (Слуцкій уѣздъ), на большомъ, травянистомъ болотѣ.

Totanus glareola L.—Фи-фи въ Слуцкомъ уѣздѣ приходилось встрѣчать лѣтомъ и весной довольно часто. Лѣтомъ любитъ держаться возлѣ затянутыхъ грязью ручейковъ, канавъ, на грязныхъ берегахъ рѣкъ, даже на дорогахъ возлѣ лужъ. Въ моей

коллекціи находятся три экземпляра *Totanus glareola* L.: два ♂♂, добытые 1. VI около деревни Поповцы (одинъ сидящимъ на верхушкѣ молодой березки), и одинъ ♂, убитый 21. VI въ Бобруйскомъ уѣздѣ, близъ деревни Залужье.

Totanus ochropus L.—Вездѣ, гдѣ только есть лѣсныя болота, рѣчки съ лѣсными берегами, канавы, поросшія молодымъ или старымъ лѣсомъ, можно встрѣтить здѣсь черныша, особенно въ періодъ гнѣздованія. Я былъ не мало удивленъ, когда, экскурсируя около деревни Поповцы (Слуцкій уѣздъ), замѣтилъ черныша въ совершенно сухомъ еловомъ лѣсу, въ числѣ многихъ другихъ мелкихъ птичекъ: дроздовъ, иволгъ, дятловъ и т. п., настойчиво преслѣдующихъ лѣсную сову (*Syrnium aluco* L.). Добыть его мнѣ здѣсь не пришлось, но зато невдалекѣ отъ этого мѣста, на маленькомъ болотцѣ, поросшемъ березнякомъ и ивнякомъ съ выдающимися грязными кочками, удалось найти его гнѣздо. При моемъ приближеніи самецъ съ безпокойнымъ крикомъ сталъ носиться вокругъ меня. На молодой елочкѣ, аршинахъ въ 2-хъ отъ земли, помѣщалось гнѣздо черныша, въ которомъ находились два птенца еще въ пуху. При ближайшемъ разсмотрѣніи оказалось, что чернышъ воспользовался на этотъ разъ гнѣздомъ пѣвчаго дрозда. Лѣсники и мѣстные крестьяне-охотники утверждали, что этотъ куликъ никогда не устраиваетъ собственнаго гнѣзда, а всегда пользуется чужими гнѣздами, преимущественно же—пѣвчаго дрозда. На другой день я застрѣлилъ въ лѣсу еще одинъ экземпляръ самца черныша.

Botaurus stellaris L.—Въ южной части Слуцкаго уѣзда выпь весьма нерѣдкая птица. Съ конца іюня эту птицу легко можно встрѣтить отдѣльными особями на болѣе открытыхъ мѣстахъ. Въ это время попадаютъ большей частью уже летающія молодья.

Botaurus minutus L.—Выпь малая встрѣчается рѣже, нежели предыдущій видъ. Въ прошломъ году добыто мною за лѣто два экземпляра. Встрѣчалъ я эту птицу здѣсь въ августѣ. Держится обыкновенно по берегамъ рѣкъ съ густыми тростниками и зарослями кустарника, встрѣчаясь всегда отдѣльными особями.

Ciconia alba Briss.—Для Слуцкаго уѣзда, да и для всей Минской губерніи, бѣлый аистъ весьма обыкновенная птица. Трудно найти деревню, въ которой не было бы 2-хъ, 3-хъ гнѣздъ аистовъ. Прилетаютъ всегда во второй половинѣ марта, а отлетаютъ въ концѣ августа.

Ciconia nigra L.—Этотъ видъ встрѣчается гораздо рѣже предыдущаго. Въ южной части Слуцкаго уѣзда (въ Полѣсьѣ) онъ гнѣздится, а въ сѣверной бываетъ только на пролетахъ. Въ это время любитъ подсаживаться къ бѣлымъ аистамъ, но держится всегда нѣсколько въ сторонѣ.

Gallinula chloropus L.—Камышницу встрѣчать и убивать здѣсь приходилось довольно часто.

Ballus aquaticus Briss.—Пастушки попадаютъ у насъ сравнительно рѣдко, хотя добывать ихъ приходилось ежегодно. Держатся всегда возлѣ затоновъ рѣкъ или озеръ съ густо поросшими берегами.

Hydrochelidon nigra L.—Черная крачка въ Слуцкомъ уѣздѣ гнѣздится только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. 5. VI. 1911 года мною были замѣчены и застрѣлены два самца и самка этого вида недалеко отъ города Слуцка, на рѣкѣ Случь, на обширномъ плесѣ, съ зарослями камыша по берегамъ.

Larus ridibundus L.—Экземпляръ чайки обыкновенной, добытый 29. VIII. 1911 на рѣкѣ Случь, близъ города Слуцка, является единственнымъ въ моей коллекціи.

Anas boschas L.—Кряква является у насъ однимъ изъ самыхъ многочисленныхъ и обыкновенныхъ видовъ изъ рода *Anas*. Прилетаютъ кряквы сюда въ первой половинѣ марта и держатся до начала октября, а иногда и позже.

Изъ другихъ видовъ утокъ въ Минской губерніи встрѣчаются: чирокъ-трескунокъ (*Anas circia* L.), затѣмъ чирокъ-свиутунокъ (*Anas crecca* L.), широконоска (*Anas platyrhynchos* L.) и шилохвость (*Anas acuta* L.); послѣдняя попадаетъ здѣсь весьма рѣдко.

Syrnium aluco L.—Лѣсная сова у насъ очень обыкновенна. Встрѣчается не только въ лѣсахъ, но и въ садахъ со старыми деревьями.

Кромѣ этой совы у насъ встрѣчается часто болотная (*Asio accipitrinus* Pall.) и рѣже ушастая (*Asio otus* L.).

Circus aeruginosus L.—Болотный лунь въ Слуцкомъ уѣздѣ встрѣчается вездѣ, гдѣ только есть болота съ камышами или рѣки съ плесами, заросшими камышомъ.

Circus cyaneus L.—Въ моей коллекціи имѣется одинъ экземпляръ самки полевого луны, убитый въ самомъ городѣ Слуцкѣ, надъ рѣкою Случью, 5. VIII. Больше всего полевыхъ луней бываетъ у насъ во второй половинѣ августа, во время ихъ осенняго пролета.

Picus major L.—Изъ всѣхъ видовъ дятловъ, встрѣчающихся въ Минской губерніи, это безусловно самый многочисленный. Во второй половинѣ іюня попадаютъ уже летающіе молодые.

Picus martius L.—Желна гнѣздится у насъ въ большихъ лѣсахъ и почти никогда не залетаетъ къ селеніямъ.

Picus leuconotus Bechst.—Бѣлоспинный дятель встрѣчается у насъ рѣже, чѣмъ два предыдущихъ вида. Гнѣзда ихъ я находилъ въ Слуцкомъ и Бобруйскомъ уѣздахъ. Молодые вылетаютъ изъ гнѣзда около середины іюня.

Picus tridactylus L.—За все время я единственный разъ добылъ здѣсь трехпалаго дятла, именно: 25. VII. 1912 въ южной части Слуцкого уѣзда, близъ деревни Гаврильчицы. Птица эта (♀ juv.) держалась въ высокой грядѣ бора среди обширныхъ моховыхъ болотъ.

Gecinus canus Gm.—Сѣдоголовый дятель является здѣсь однимъ изъ наиболѣе рѣдкихъ видовъ. Находящійся у меня экземпляръ (♀) былъ добытъ мною 21. VI. 1911 изъ пары у гнѣзда, которое помѣщалось въ полузасохшемъ старомъ дубѣ, въ казенномъ лѣсу, близъ деревни Залужье (Бобруйскій уѣздъ).

Изъ другихъ видовъ дятловъ у насъ встрѣчаются: *Gecinus viridis* L. и *Picus minor* L..

Cuculus canorus L.—Кукушка здѣсь обыкновенная птица. Прилетаетъ около половины апрѣля. Спариваніе начинается вскорѣ послѣ прилета, т.-е. во второй половинѣ апрѣля. Тогда же слышно и кукованіе. Особенно любитъ придерживаться мѣстъ, поросшихъ вербой и молодымъ ольховымъ лѣсомъ.

Coracias garrula L.—Сизоворонка у насъ тоже обыкновенна.

Upupa epops L.—Въ Слуцкомъ уѣздѣ удоѣ обыкновенная гнѣздящаяся птица.

Alauda arborea L.—Мнѣ удалось всего одинъ разъ, 23. VI. 1911, встрѣтить небольшую (особей въ 6—8) стайку лѣсныхъ жаворонковъ въ сосновомъ лѣсу, на вырубленной полянѣ, заваленной ломомъ, близъ станціи Горки, въ Бобруйскомъ уѣздѣ.

Garrulus glandarius L.—Сойка у насъ одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ. Осенью собирается въ довольно большія стаи.

Sturnus vulgaris L.—Скворцы здѣсь очень обыкновенны. Прилетаютъ во второй трети марта. Со второй половины лѣта собираются въ многочисленные стаи; держатся до конца августа.

Emberiza citrinella L.—Эта овсянка у насъ очень многочисленная гнѣздящаяся птица.

Loxia curvirostra L. — Клеста лѣтомъ замѣтитъ здѣсь удалось лишь два раза, именно: 21 и 23. VI 1911 года въ Бобруйскомъ уѣздѣ. Осенью, но не ежегодно, появляются небольшими стайками.

Fringilla coelebs L. — Зябликъ одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птичекъ нашихъ садовъ и лѣсовъ. Прилетаетъ иногда въ концѣ февраля и въ началѣ марта, но обыкновеннымъ временемъ прилета зяблика для нашей мѣстности надо считать середину марта.

Certhia familiaris L. — Зимую шишку здѣсь часто можно видѣть въ садахъ по заборамъ и т. п. Лѣтомъ встрѣчается въ лѣсахъ.

Lanius collurio L. Сорокопута—жулана у насъ можно встрѣтить почти вездѣ, гдѣ есть заросли кустарниковъ.

Lanius minor Gm. — Чернолобый сорокопутъ встрѣчается у насъ въ Слуцкомъ уѣздѣ гораздо рѣже, чѣмъ *Lanius collurio* L..

Пзрѣдка лѣтомъ и чаще зимою здѣсь попадаетъ *Lanius excubitor* L..

Oriolus galbula L. — Пволга у насъ обыкновенна. Гнѣздится въ лѣсахъ и въ большихъ садахъ.

Anthus arboreus Briss. — Лѣсной конекъ очень обыкновенъ въ нашихъ лѣсахъ.

Troglodytes parvulus L. — Крапивникъ въ изучаемой мною мѣстности обыкновенная осѣдлая птица. Летающихъ птенцовъ я нашелъ уже 22. V, при чемъ мною было замѣчено, что старыя птицы носили матеріалъ для постройки новаго гнѣзда, такъ что есть основаніе думать, что крапивникъ у насъ гнѣздится въ лѣто два раза.

Sitta europaea homeyeri Hart. — Поползень — обыкновенная осѣдлая птица нашихъ лѣсовъ.

Lophophanes cristatus Briss. — Хохлатая синица встрѣчается у насъ въ качествѣ осѣдлой птицы.

Acredula caudata L. — Этотъ видъ въ сообществѣ другихъ синицъ зимою нерѣдко посѣщаетъ у насъ усадьбы съ садами. Имѣющійся въ моей коллекціи экземпляръ былъ застрѣленъ 21. VI. 1911 на большомъ сѣнокосѣ, поросшемъ грядами ивъ и березняка, въ Бобруйскомъ уѣздѣ.

Phylloscopus sibilatrix Bechst. — Трудно найти у насъ такой лѣсъ или рощу, чтобы сразу не услышать характернаго пѣнія этой пѣночки.

Merula merula L. — Черный дроздъ для Слуцкаго уѣзда является довольно рѣдкимъ видомъ. На зиму не остается. Прилетаетъ эта птица около половины марта.

Turdus viscivorus L. — Деряба часто встрѣчается въ нашей мѣстности. Въ теплыя зимы отдѣльные особи этого вида остаются у насъ зимовать.

Turdus musicus L. — Пѣвчій дроздъ изрѣдка гнѣздится здѣсь. На пролетѣ же обыкновененъ. Прилетаетъ въ срединѣ марта.

Turdus pilaris L. — Этотъ видъ дрозда у насъ самый многочисленный. Остается на зиму, но не каждый годъ.

Bonasa canescens Sparrm. — Рябчикъ гнѣздится здѣсь въ довольно большомъ числѣ.

Coturnix communis Bonn. — Перепелъ является обыкновенной птицей нашихъ полей и сухихъ сѣнокосовъ. Больше всего этихъ птицъ бываетъ у насъ въ концѣ августа и въ началѣ сентября.

Turtur auritus Gray. — Горлица здѣсь обыкновенная гнѣздящаяся птица. Въ 1911 году, въ концѣ мая, мнѣ пришлось наблюдать близъ деревни Поповцы, Слуцкаго уѣзда, въ казенной лѣсной дачѣ, на сравнительно небольшомъ участкѣ густыхъ зарослей осины, березы и ели нѣсколько десятковъ гнѣздящихся паръ этого вида.

Columba palumbus L. — Вяхирь встрѣчается у насъ въ качествѣ обыкновенной гнѣздящейся птицы. Въ концѣ мая и въ началѣ юня я находилъ уже хорошо летающихъ молодыхъ, но еще съ остатками пуха на головѣ и шеѣ.

Кромѣ этого голубя здѣсь часто наблюдается клинтухъ (*Columba oenas* Briss.).



Cygnus bewicki Yarr. и Grus leucogeranus Pallas на зимовьѣ въ восточномъ Закавказьѣ.

А. Н. Карамзинъ.

Cygnus bewicki Yarr. und Grus leucogeranus Pall. im Winterquar- tier am östlichen Transkaukasus.

Von A. N. Karamsin.

Въ южной части Бакинскоѣ губерніи, по низовью рѣки Куры, Каспійскому побережью и въ прилегающихъ степяхъ Джеватскаго и Ленкоранскаго уѣздовъ, находится самое богатое по числу зимующихъ птицъ мѣсто въ предѣлахъ Европейской Россіи и Кавказа. Этому способствуетъ теплая зима, отсутствіе снѣжнаго покрова, незамерзающія воды и малая населенность описываемой мѣстности.

Здѣсь я приведу нѣсколько данныхъ о зимовьѣ малаго лебедя и бѣлаго журавля. У М. А. Мензбира ¹⁾ есть указаніе, что *Grus leucogeranus* Pall. въ небольшомъ числѣ зимуетъ въ Закавказьѣ. По моимъ наблюденіямъ, стерхъ зимуетъ здѣсь въ значительномъ количествѣ: я наблюдалъ большія стаи (особей въ 100—200 и болѣе) этихъ великолѣпныхъ птицъ. Самыхъ раннихъ бѣлыхъ журавлей я замѣтилъ 4. X. 1904, сразу стаями. Въ 1907 году 25—28. II и 2. III я видѣлъ отлетающія большія стаи стерховъ; путь они держали на сѣверъ и летѣли такимъ же строемъ, какъ и сѣрые журавли. Эти осторожныя птицы держатся зимой стаями по мелководнымъ разливамъ Куры и Аракса; особенно часто попадались онѣ мнѣ на озерахъ: Казенномъ Амбарѣ и Ахъ-Чалѣ въ Джеватскомъ уѣздѣ. 15. XII. 1911 на послѣднемъ озерѣ добытъ старый самецъ этого вида.

¹⁾ «Птицы Россіи», т. I, стр. 425. *Авт.*

На зимованіе *Cygnus bewicki* Yagg. въ Закавказьѣ указываетъ М. А. Мензбиръ ¹⁾. Мною малый лебедь впервые замѣченъ зимой 1910—1911 года. Зима этого года отличалась чрезвычайной суровостью: температура въ Карачалахъ (мое имѣніе на Курѣ) спускалась до -16°C. ; выпало много снѣга, и не только стоячіе водоемы, но и Кура покрылась льдомъ; остались лишь небольшія полыньи, гдѣ скоплялась масса водяной птицы. На одномъ изъ такихъ незамерзающихъ участковъ озера Ахъ-Чалы, близъ Сальянъ, 20. XII. 1910 было добыто охотникомъ два малыхъ лебедя. Одинъ старый экземпляръ (крыло 427 м.м.), а другой молодой (крыло 421 м.м.), съ остатками сѣраго оперенія на шеѣ, спинѣ и крыльяхъ; у обѣихъ птицъ желтый и грязно-мясной цвѣтъ на клювахъ доходилъ лишь до ноздрей. По всѣмъ признакамъ это были типичные *Cygnus bewicki* Yagg..

¹⁾ «Птицы Россіи», т. I, стр. 715. *Авт.*

Къ вопросу о распространении степного жаворонка въ Кіевской губерніи.

Э. В. Шарлемань.

Zur Frage über die Verbreitung der Kalandlerlerche (*Melanocorypha calandra* L.) im Gouvernement Kiew.

Von E. W. Scharleman.

Для Уманскаго уѣзда, Кіевской губерніи, степной жаворонкъ приводится Goebel'емъ въ качествѣ очень рѣдкой птицы. Названный орнитологъ встрѣтилъ его здѣсь всего два раза стаями въ сентябрѣ, а 22. VI. 1874 нашелъ гнѣздо съ четырьмя птенцами ¹⁾. Т. К. Вржещъ любезно сообщилъ мнѣ, что нѣсколько степныхъ жаворонковъ наблюдались имъ лѣтомъ 1910 года въ Звенигородскомъ уѣздѣ. Въ коллекціи Кіевскаго Орнитологическаго Общества имени профессора К. Θ. Кесслера до весны 1912 года имѣлся лишь одинъ экземпляръ взрослой самки *Melanocorypha calandra* L., добытый 21. V. 1910 близъ деревни Даниловки въ Кіевскомъ уѣздѣ.

14. III. 1912 (ст. ст.) степные жаворонки появились въ окрестностяхъ деревни Даниловки въ огромномъ количествѣ; держались они здѣсь парами и небольшими стайками, спаривались и пѣли; 16. III птицъ стало меньше, но все же онѣ встрѣчались еще очень часто; 18. III степные жаворонки исчезли, но одинъ экземпляръ наблюдался здѣсь еще 10. IV.—Одинъ птицеловъ сообщилъ мнѣ, что нѣсколько паръ степныхъ жаворонковъ лѣгомъ этого года осталось для гнѣздованія въ окрестностяхъ Кіева. 29.

¹⁾ Н. Goebel: «Die Vögel des Kreises Uman», S. 91. 1879. *Asm.*

V, провѣряя это сообщеніе, я нашелъ двѣ пары интересующей насъ птицы: одну близъ дачнаго поселка „Сырца“ въ урочищѣ „Берковецъ“ (въ 3 верстахъ отъ Кіева), другую—близъ дачнаго поселка „Святошино“ (въ 7 верстахъ отъ Кіева). I. VI препараторъ П. Верещакъ замѣтилъ шесть паръ *Melanocorypha calandra* L. на поляхъ близъ деревни Даниловки, а З. VI мною наблюдалось здѣсь еще большее количество названныхъ птицъ, и одна парочка (♂ и ♀) была добыта. На пространствѣ 10—15 десятинъ въ воздухѣ съ пѣснями кружились 6—8 самцовъ. Въ ихъ пѣннѣ я различалъ отрывки пѣсни жулана (*Enneostonus collurio*), касатки (*Hirundo rustica*), садовой овсянки (*Emberiza hortulana*), крикъ травника (*Totanus totanus*), звонкую трель фифишки (*Totanus glaucolus*), предостерегающій крикъ жулана и нѣкоторыхъ другихъ. Отдѣльныя строфы пѣсни были перевиты своеобразнымъ дребезжающимъ крикомъ. Птицы оставались въ воздухѣ не менѣе получаса, затѣмъ пѣсня затихала и птица камнемъ падала на землю. Отправляясь на то мѣсто, гдѣ спускались самцы, я, обыкновенно, вблизи вспугивалъ и самокъ, которыя, отлетѣвъ въ сторону, крикомъ и тѣлодвиженіями выражали душевное волненіе. Одна самочка даже прикинулась раненой. Но ни въ одной изъ упомянутыхъ выше мѣстностей гнѣздъ степныхъ жаворонковъ найти мнѣ не удалось, такъ какъ для гнѣздованія птички избрали поля, засѣянные овсомъ, всходы котораго въ то время достигли высоты 3—4¹/₂ вершковъ, и ходить по нимъ не представлялось удобнымъ.



Предварительная замѣтка о варакушкахъ (*Cyanecula*) Туркестана.

Н. А. Зарудный.

Vorläufige Notiez über die Blaukehlchen (*Cyanecula*) des Turkestan.

Von N. A. Sarudny.

Въ русскомъ Туркестанѣ, считая въ его предѣлахъ Бухарское ханство и Закаспійскую область, встрѣчается цѣлый рядъ варакушекъ.

1. *Cyanecula svetica svetica* L..

Встрѣчается только на пролетахъ. Обнаружена въ долинѣ Сыръ-Дарьи (ниже Ходжента и до устья), по Чирчику, по Аму-Дарьѣ (внизъ включительно отъ Чарджуя до устья), по восточному берегу Арала и Каспія, а также на южномъ берегу этого послѣдняго; найдена подъ Репетекомъ, въ Мервѣ, подъ Асхабадомъ, Кызылъ-арвадомъ и Казанджикомъ. Въ восточной половинѣ края встрѣчается рѣже, чѣмъ въ западной. Зимой найдена мною въ персидской Месопотаміи.

Всего въ коллекціи имѣется 22 экземпляра. Размѣры ихъ слѣдующіе:

	Клювъ (отъ передняго края ноздри).	Крыло.	Хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы).	Плюсна (сзади).
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♂ ♂	9,2—8,2	76 —71,2	59,6—54,5	27,1—25,3
♀ ♀	9,1—8,3	74,2—69,6	58 —52,7	26,3—24,3

Крыловая формула: $6 > 2 > 7$ въ 20 случаяхъ,
 $2 = 6$ въ одномъ,
 $5 > 2 > 6$ въ одномъ.

Вершина крыла (промежутокъ между средними малыми махами и вершиною самага длиннаго изъ большихъ маховъ) равняется 15—17 м.м. въ 16 случаяхъ; меньше 15, но не меньше 14 м.м. въ 3 случаяхъ, и меньше 14, но не меньше 13,3 м.м. въ остальныхъ.

Нѣкоторые экземпляры по интенсивности окраски, но не по величинѣ, приближаются къ *C. s. robusta*; нѣкоторые же, приближаясь къ этой послѣдней по размѣрамъ, рѣзко отличаются большею блѣдностью окраски. Имѣются экземпляры переходные къ *C. s. pallidogularis*.

2. *Cyanecula svetica robusta* Buturl.

Встрѣчается только на пролетахъ и притомъ рѣдко. Для Туркестана, именно для Семирѣчья, указана впервые С. А. Бутурлинымъ („Орнитологическій Вѣстникъ“, 1911 г., вып. I), который получилъ ее въ одномъ экземплярѣ (♂, 28. IV. 1909, Нарынъ) среди значительнаго количества „типичныхъ *C. suetica*“ (странно, что не *C. pallidogularis* и *C. discessa*, которыя въ Семирѣчьи рѣшительно преобладаютъ). Мною добыто четыре экземпляра. Ихъ размѣры таковы.

	Клювъ.	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.	Отношеніе маховыхъ.
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.	
♂; 14. IX. 1907; Кокъ-булакъ ¹⁾ .	9	77	60	26,8	3 чуть>4 чуть>5>6>2>7.
♂; 14. IX. 1906; Ташкентъ	8,8	76,5	58	26,6	Такое же.
♂; 2 X. 1909; ib.....	9	76,8	59,2	27	3 чуть>4=5>6>2>7>.....
♂; ib	8,7	77,2	59	27,8	3 чуть>4 чуть>5>6>2>7>.
Вершина крыла составляетъ 18,4—18 м.м..					

3. *Cyanecula svetica pallidogularis* Zar.

По Н. А. Сѣверцову („Вертикальное и горизонтальное распределение Туркестанскихъ животныхъ“), „*Lusciola sue-*

¹⁾ При впадении рѣки Келесъ въ Сыръ-Дарью. *Авт.*

сиса" является гнѣздящеюся птицею въ трехъ первыхъ зоологическихъ участкахъ Туркестана, именно въ 3-мъ поясѣ вертикальнаго распространенія. Иначе говоря, по Н. А. Сѣверцову, въ областяхъ Семирѣченской и Сыръ-Дарынской на высотѣ отъ 4000' „до 4500 и мѣстами даже 7—8000', а вообще до 6 тыс.“ Мнѣ кажется очевиднымъ, что эти данныя относительно гнѣздованія относятся не къ *C. svetica* (L.), а къ *C. pallidogularis* и въ меньшей степени къ *C. discessa*. Сомнительной мнѣ кажется „*Cyanescula suecica* Linn“. Н. А. Сѣверцова („Замѣтки о фаунѣ Памира“) ¹⁾, который говоритъ про нее: „на Алаѣ и въ верховьяхъ Кашгаръ-дарыи не рѣдка въ юлѣ, по всему Памиру—въ августѣ; приемы не пролетной птицы, и, вѣроятно, на этихъ высотахъ гнѣздится“. Возможно, что въ дѣйствительности здѣсь рѣчь идетъ о гнѣздованіи *C. pallidogularis*, или *C. discessa*, или даже *C. c. abbotti*...

Несомнѣнные мѣста гнѣздованія *C. s. pallidogularis* находятся въ Семирѣчѣ, гдѣ, по наблюденіямъ покойнаго Б. П. Карѣева (Н. А. Зарудный и Б. П. Карѣевъ: „Орнитологическая фауна Семирѣченскаго края" ²⁾), они располагаются въ трехъ первыхъ поясахъ высоты (см. Н. А. Сѣверцова, 1. с.). Во всякомъ случаѣ она здѣсь довольно обыкновенна на гнѣздовѣ въ Тышканѣ (на высотѣ около 4000') и по садамъ близъ Джаркента. Лично для меня ея гнѣздованіе ускользнуло изъ вниманія въ областяхъ Ферганской и Самаркандской, а также въ Бухарскомъ ханствѣ. Въ предѣлахъ Сыръ-Дарынской области я нашелъ ея гнѣздовье только подъ Перовскомъ, при чемъ считаю его не совсѣмъ нормальнымъ. Въ Закаспійской области принадлежитъ къ рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ въ Мервскомъ оазисѣ и въ садахъ селенія Фирюзе (Копетъ-дагъ). Для Аму-Дарынскаго отдѣла несомнѣнна на гнѣздовѣ (здѣсь А. М. Никольскій нашелъ ее въ юлѣ, а Л. А. Молчановъ добылъ молодую въ первомъ перѣ и взрослыхъ) ³⁾. Весьма обыкновенна на пролетахъ по большей части Туркестана и Персіи. Случайно зимуетъ въ

¹⁾ «Записки Туркестанскаго Отдѣла Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографии», т. I, вып. 1-й, стр. 76. *Авт.*

²⁾ Въ спискѣ экземпляровъ *C. svetica* и *C. s. pallidogularis*, приводимыхъ въ этой статьѣ, птицы изъ Тышкана отъ 4—8. V и 6. VI и обозначенныя за *C. svetica*, въ дѣйствительности принадлежатъ къ *C. s. pallidogularis*, а двѣ изъ нихъ ни къ какой другой формѣ, какъ только къ *C. s. discessa*. *Авт.*

³⁾ Въ книгѣ моей «Орнитологическая фауна Закаспійскаго края» подъ названіемъ «*Cyanescula coerulescula* Pall.» скрываются пролетныя *C. svetica pallidogularis* и *discessa*, а также мѣстовыя *C. pallidogularis*. *Авт.*

Закаспійской области. На зимовѣ найдена мною въ Сеистанѣ, Белючистанѣ и персидской Месопотаміи.

Въ коллекціи имѣется 70 экземпляровъ. Размѣры ихъ таковы.

	Клювъ.	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♂♂... 9,6—8		74,5—68	62 —53,6	27 —27
♀♀... 8,6—7,5		71,7—66,5	57,3—53	25,3—23

Крыловая формула: $7 > 2 > 8$ въ 45 случаяхъ.

$6 > 2 > 7$	”	20	”
$8 > 2 > 9$	”	3	”
$7 > 2 = 8 > 9$	”	1	”
$7 > 8 = 2 > 9$	”	1	”

Вершина крыла равняется (во вниманіе приняты экземпляры, у которыхъ она могла быть измѣрена болѣе или менѣе точно):

10 — 11 m.m.	въ 2 случаяхъ,
11,1—12	” ” 12 ”
12,1—13	” ” 26 ”
13,1—14	” ” 18 ”
14,1—15	” ” 6 ”
15,1—16	” ” 4 ”

Многіе экземпляры въ разныхъ отношеніяхъ составляютъ весьма явственные переходы къ *C. svetica* и, въ особенности, къ *C. discessa*. Отнесены къ *C. pallidogularis* по совокупности большинства признаковъ.

4. *Cyanecula svetica discessa* Mad..

По Э. Хартерту („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, p. 747), гнѣздится въ Алтаѣ и Тарбагатаѣ, уступая для *C. s. pallidogularis* гнѣздовья въ Туркестанѣ (Семирѣчье, Иссыкъ-куль, Тянь-Шань, Сыръ-Дарья). Однако, судя по сборамъ Б. П. Карѣева, почти навѣрное гнѣздится и въ Семирѣчьи, именно подъ Тышканомъ. Очень обыкновенна на пролетѣ въ Семирѣченской, Самаркандской и Ферганской областяхъ, въ Бухарскомъ ханствѣ, въ восточныхъ частяхъ областей Сыръ-Дарьинской и Закаспійской (на нижнемъ теченіи Сыръ-Дарьи и въ западной

части Закаспія встрѣчается рѣшительно рѣже, чѣмъ *C. pallidogularis*). Обыкновенна пролетомъ въ восточной Персіи и найдена нами на зимовѣ въ Сеистанѣ и Белючистанѣ.

Всего въ коллекціи имѣется 65 экземпляровъ. Размѣры ихъ слѣдующіе.

	Клювъ.	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
♂♂...	9,3—7,5	71,5—65,6	61 —51,4	27,4—22
♀♀...	9 —7	69 —64,3	55,7—51,4	25,6—23

Крыловая формула: 7>2>8 въ 30 случаяхъ,

6>2>7 " 7 "

6>2=7>8 " 12 "

7>2=8>9 " 8 "

8>2>9 " 5 "

9>2>10 " 3 "

Вершина крыла равняется: 9,1—10 м.м. въ 3 случаяхъ,

8 — 9 " " 5 "

10,1—11 " " 10 "

11,1—12 " " 11 "

12,1—13 " " 14 "

13,1—14 " " 13 "

14,1—15 " " 7 "

15,1—16 " " 1 "

16,1—17 " " 1 "

Если брать размѣры, означающіе не максимальныя величины, а вообще господствующія, и если принять во вниманіе преобладающую пластику крыльевъ и наичаще повторяющійся оттѣнокъ окраски оперенія, то, по справедливому замѣчанію Э. Хартерта (I. c), *C. discessa* является изъ всѣхъ варакушекъ самой блѣдной, тупокрылой и маленькой.—Эта форма даетъ въ сторону *C. pallidogularis*, какъ и эта послѣдняя къ ней, многочисленные переходы, напримѣръ, сочетаніе характерной для самыхъ типичныхъ *C. discessa* тупокрылости съ болѣе крупнымъ ростомъ и болѣе темнымъ оттѣнкомъ оперенія, или удивительно малый ростъ съ меньшею тупокрылою и т. д. Отнесены мною эти переходы къ *C. discessa* по совокупности большинства признаковъ, ей свойственныхъ.—Во всякомъ случаѣ нигдѣ въ крайнихъ западныхъ частяхъ Туркестана и Персіи нигдѣ

никогда среди какихъ бы то ни было варакушекъ до сихъ поръ не попадались такія мелкія, какъ на востокѣ, напримѣръ, подѣ Ташкентомъ, въ Ферганѣ, Бухарѣ, восточной части Закаспійской области, въ Сепстанѣ и Белючистанѣ. За всѣмъ тѣмъ надо сознаться, что опредѣленіе пролетныхъ варакушекъ формъ *discessa* и *pallidogularis* въ очень многихъ случаяхъ будетъ до тѣхъ поръ не надежно, пока путемъ детальнаго изслѣдованія длинныхъ серій гнѣздящихся птицъ не выяснятся съ большею подробностью ихъ отличительные признаки.

5. *Cyanecula cyanecula occidentalis* Zar..

Cyanecula suecica var. *occidentalis* (Н. А. Зарудный: «Птицы долины Орчика» ¹⁾ въ «Матеріалахъ къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи», ч. зоол., т. I, стр. 146, 1892 г.).

Erithacus volgae Kleinschmidt (Falco III, 2, p. 47, 1907).

Встрѣчается у насъ только на пролетѣ и лишь въ ничтожномъ числѣ. Мнѣ извѣстны экземпляры съ восточнаго берега Каспійскаго моря (Красноводскъ, Узунъ-ада и Чикишляръ). За предѣлами края мнѣ извѣстны образчики этой формы отъ поздней осени изъ Талыша. Въ довольно большомъ числѣ я нашелъ ее на зимовкѣ въ персидской Месопотаміи (долина рѣки Карунъ). Пролетъ вдоль восточнаго берега Каспійскаго моря заставляетъ подозрѣвать гнѣздованіе ея гдѣ-нибудь и на низовьяхъ рѣки Урала, къ тому же въ своемъ спискѣ птицъ „урало-казачьихъ владѣній“ Г. С. Карелинъ („Разборъ статьи г. А. Рябинина“ въ «Трудахъ С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей», т. VI, 1875 г., стр. 287) говоритъ о варакушкѣ—*Lusciola suecica*—съ ея разновидностью. По Э. Хартерту (l. c.), ея гнѣздовая область, повидимому, лежитъ въ южной Россіи (Полтава, Харьковъ, нижняя Волга) и въ западной части Закаспія, а зимовье—въ Египтѣ. Гнѣздованіе въ Закаспійской области мнѣ кажется сомнительнымъ, но оно возможно на южномъ побережѣ Каспійскаго моря.

6. *Cyanecula cyanecula turkestanica* Zar..

Cyanecula leucocyana turkestanica subsp. nov. (N. Sarudny—„Ornithologische Monatsberichte“, 1911, II. VII—VIII).

Это еще не выясненная форма, которую я не могу отождествить ни съ *C. s. abbotti*, ни съ *C. s. cyanecula*, ни съ

¹⁾ Въ Константиноградскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи, и въ Валковскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи. Авт.

C. c. occidentalis. Отъ этихъ формъ отличается болѣе блѣднымъ оттѣнкомъ буроватыхъ цвѣтовъ верхней стороны и гораздо болѣе блѣднымъ голубымъ цвѣтомъ горла. Отъ *C. c. abbotti* разнится кромѣ того хорошо развитою свѣтлою надглазною полоскою, идущею отъ основанія надклювья назадъ почти до задняго края ушной партіи. Пятно на голубомъ горловомъ полѣ бѣлое ¹⁾, такой же величины, какъ у *C. c. suanacula* и *C. c. occidentalis*, слѣдовательно болѣе крупное, чѣмъ у *C. c. abbotti*. — Публикуя первоначальное описаніе, я сравнивалъ размѣры своихъ птицъ съ экземплярами *C. c. suanacula* (Wolf) мѣстовыми изъ С.-Петербургской и Псковской и съ однимъ пролетнымъ изъ Полтавской губерній, при чемъ крыло туркестанскихъ оказалось болѣе длиннымъ на величину 2—3 м.м. [по E Hartert'у (l. c.), у самцовъ *C. c. suanacula* длина крыла всего чаще колеблется между 74 и 77 м.м.]. Вотъ размѣры моихъ птицъ.

	Клювъ.	Крыло.	Хвостъ.	Цвѣсла.	Отношеніе маховыхъ.
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.	
♂♂.					
1). 7. V. 1907; Ташкентъ...	9	76,2	61	27,8	4 чуть> 3 чуть>5>6>2=7>8>.
2). 4. V. 1909; ib.	9,2	80	61,7	27,6	4 чуть> 3 чуть>5>6>2>7>....
3). 7. V. 1910; Карлыкъ (въ Бухарѣ).....	9	74,8	57	26	lb.
4). 1. V. 1908; Чиміонъ (Фергана).....	8,8	78	56,9	27	lb.
5). 26. IV. 1908; г. Ошъ	8,8	75,5	57	26,3	4 чуть> 3 чуть>5>6>7>2>8>.
♀.					
1). 7. V. 1910; Карлыкъ (въ Бухарѣ)	8,7	72,2	56,2	25,4	4 чуть> 3 чуть>5>6>2>7>....
Размѣрами превосходитъ и <i>C. c. occidentalis</i> , длина крыла ♂♂ которой колеблется между 69 и 74 м.м. (рѣдко					

¹⁾ Или бѣлое съ ржавою примѣсью. Авт.

до 75).—Условія пребыванія этой формы въ Туркестанѣ мнѣ не извѣстны. Вѣроятно она гнѣздится въ нашихъ горахъ къ югу отъ Ферганской долины и лишь залетаетъ на сѣверъ отъ этой послѣдней.—Къ ней я отношу экземпляръ, добытый 18. VI. 1892 на пролетѣ подъ Репетекомъ въ пустынѣ между Мервомъ и Чарджуемъ (Н. А. Зарудный: „Орнитологическая фауна Закаспійскаго края“, стр. 77). Вѣроятно сюда же слѣдуетъ относить варакушку, добытую барономъ Лоудономъ 4. III. 1903 на Кушкѣ [Н. Baron Loudon: „Meine dritte Reise nach Zentral-Asien“ ¹⁾] и обозначенную имъ какъ *C. suecica leucoscyanea* (*C. L. Brehm*)].—В. Л. Бианки (*V. Bianchi*: „Zur Ornithologie der westlichen Ausläufer des Pamir und des Alai“ ²⁾), упоминаетъ о двухъ экземплярахъ *C. leucoscyana* (*Brehm*), добытыхъ г.г. Грумъ-Гржимайло въ 1885 году въ восточной Бухарѣ, именно о ♂ отъ 14. VI съ перевала Сагри-даштъ (10000') и о ♂ (♀) отъ 27. VI изъ Тупчека. Эти птицы очевидно должны относиться либо къ описываемой формѣ, либо къ нижеслѣдующей.

7. *Cyanecula cyanecula abbotti* Rishm..

Е. Hartert (l. c.) говоритъ, что эта форма гнѣздится на большихъ высотахъ (6000—11000 и даже до 16000') въ Ладакѣ (Кашмирѣ), на Каракорумѣ, въ Восточномъ Туркестанѣ (Яркентѣ), на Памирахъ и на Алаѣ, слѣдовательно (между прочимъ и у насъ въ русскомъ Туркестанѣ).—Мнѣ она извѣстна лишь по двумъ старымъ ♂♂, добытымъ полковникомъ П. Н. Жаба-лѣ-томъ гдѣ-то въ Дарвазѣ (Восточная Бухара). Ихъ размѣры таковы.

Клювъ.	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.	Отношеніе маховъ.
м.м.	м.м.	м.м.	м.м.	
9	77	61,2	26,5	6>2>7
8,8	75,5	56,8	26	6>2>7

Размѣрами, повидимому, не отличается отъ предыдущей. Вообще говоря, *C. c. abbotti* и *C. c. turkestanica* представляютъ весьма близкія формы, изъ которыхъ первая распространена болѣе къ востоку, а вторая—къ западу.

¹⁾ „Journal für Ornithologie“, 1909—1910. *Асм.*

²⁾ «Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie Impériale Sciences de St.-Petersbourg», т. XII. *Асм.*

Варакушка, гнѣздящаяся въ прикаспійскихъ провинціяхъ Персіи и обозначенная мною (N. Sarudny: „Verzeichnis der Vögel Persiens“ ¹⁾ за *C. leucosyana* Brehm., еще не выяснена какъ слѣдуетъ, и я обозначилъ ее этимъ наименованіемъ лишь временно и условно. Къ крупной *C. s. magna* Zag & Loud. ²⁾ я отнести ее не могу.

Ташкентъ.

21 января 1912 г.



¹⁾ «Journal für Ornithologie», IV, 1911. *Авт.*

²⁾ Гнѣздятся въ Загросскомъ участкѣ Персіи. *Авт.*

По поводу „Замѣтокъ о Закавказскихъ птицахъ“.

С. А. Бутурлинъ.

Some notes on Transcaucasian Birds.

By S. A. Buturlin.

Давно интересуясь авифауной Кавказскаго края, я намѣревался высказаться по поводу „Замѣтокъ“ П. В. Нестерова, когда его серія статей будетъ закончена. Но такъ какъ въ № 2 журнала почтенный изслѣдователь специально занимается критикою нѣкоторыхъ описанныхъ мною формъ, то я считаю себя обязаннымъ безотлагательно разъяснить тѣ недоразумѣнія, въ которыя онъ при томъ впадаетъ.

Оговариваюсь: съ основной мыслью глубокоуважаемаго зоолога я вполне согласенъ. Мысль эта если и не особенно глубока, то во всякомъ случаѣ неоспорима, и заключается въ томъ, что я не со дня своего рожденія различалъ описанныя мною формы кавказскихъ видовъ, а научился ихъ различать съ теченіемъ времени и накопленіемъ матеріала. Не удивляюсь, что это обстоятельство кажется П. В. Нестерову страннымъ: вѣдь есть разные методы и разное отношеніе къ научной работѣ. Напримѣръ, можно вычитать въ какой-нибудь старой статьѣ замѣчаніе, что нѣкоторые виды склонны въ морскомъ климатѣ развивать темную окраску, и составить одинъ списокъ „темныхъ“ птицъ для Батума, другой—„свѣтлый“—для Минусинска, и, не имѣя понятія о видахъ и расахъ палеарктическихъ птицъ, и о деталяхъ ихъ географическаго распространенія, зачислить тетерева-косача въ свѣтлыя, лазоревку или сойку въ темныя птицы, а то и просто одну и ту же птицу въ оба списка подъ разными именами (сорока).

Можно при этомъ зачислить лебедей въ континентальную, а черного и синяго дроздовъ, черного чекана и т. п.—въ береговую группу, и вообще, птицъ распространенныхъ широко въ обоихъ климатахъ (лебедь, шилоклювка, колпикъ, галка и т. д.), зачислять, смотря по цвѣту, то туда, то сюда. Къ сожалѣнію, не всѣ способны работать такимъ методомъ, какъ написано „Вліяніе климата на окраску у птицъ“ П. В. Нестерова.

Высказывая ту истину, что я прежде, чѣмъ научился отличать нѣкоторыя кавказскія расы—не отличалъ ихъ, многоуважаемый П. В. Нестеровъ, къ сожалѣнію—человѣкъ рабъ привычекъ—приводитъ невѣрную справку, будто я „нѣсколькими мѣсяцами ранѣе“ описанія кавказскихъ лазоревокъ называлъ ихъ неотличимыми отъ типичныхъ. На самомъ дѣлѣ *Cyanistes colchicus* описана мною въ октябрѣ 1908 года, а А. М. Кобылинъ, приводящій мои слова о неотличимости кутаисскихъ и типичныхъ лазоревокъ, умеръ въ августѣ 1907 года, какъ говорится въ началѣ цитируемой П. В. Нестеровымъ статьи. Конечно, П. В. Нестеровъ не будетъ спорить, что Кобылинъ писалъ свою статью ранѣе своей смерти, а опредѣлялъ и посылалъ мнѣ свои матеріалы раньше, чѣмъ писалъ статью. Поэтому точнѣе было бы говорить о нѣсколькихъ годахъ, чѣмъ о нѣсколькихъ мѣсяцахъ. Впрочемъ, П. В. Нестеровъ—прѣсныя выбитыя скотомъ лужицы въ 7-ми верстахъ отъ Красноярска называющій солеными озерами Минусинскаго края и зачисляющій въ Минусинскую фауну сокола, убитаго подъ Ленкоранью и купленного въ Москвѣ у Ф. К. Лоренца,—можетъ считать такую точность излишней.

Къ сожалѣнію, переходя къ болѣе детальной критикѣ лазоревокъ, глубокоуважаемый авторъ становится для меня еще загадочнѣе. Объ окраскѣ птицъ П. В. Нестеровъ буквально говоритъ: „Такія же отличія, какъ «чуть-чуть сѣроватѣе» или «поблѣднѣе», совершенно не могутъ считаться обоснованными“. Однако почему бы это и въ какомъ смыслѣ надо понимать столь загадочную фразу? Значитъ ли это, что вообще одна раса птицъ не можетъ отличаться отъ сосѣдней сѣроватостью или блѣдностью оттѣнка? Или П. В. Нестеровъ предписываетъ такую невозможность для однихъ только лазоревокъ? Или уважаемый авторъ хочетъ сказать, что онъ убѣдился, что кавказскія лазоревки фактически нисколько не блѣднѣе и не сѣрѣе типичныхъ? — Но почему бы тогда такъ и не сказать прямо? Не потому ли, что

въ послѣднемъ случаѣ я имѣлъ бы право возразить, что, разумѣется, разница въ окраскѣ сосѣднихъ расъ лазоревокъ можетъ показаться несуществующей изслѣдователю, смѣшивающему въ окончательной обработкѣ (не предварительномъ сообщеніи) черноспиннаго *Saxicola picata* съ бѣлоспиннымъ *S. melano-leuca* (т.-е. птицъ, изображенныхъ въ популярной сводкѣ М. А. Мензбира!). А вѣдь П. В. Нестеровъ „открылъ впервые“ въ Закавказьѣ *S. picata* именно по экземплярамъ давно отсюда извѣстной *S. melano-leuca*! Гдѣ же тутъ разбираться съ дѣйствительно близкими расами лазоревокъ.

Почтенный изслѣдователь орнитофауны Закавказья приводитъ мои указанія на размѣры клювовъ разныхъ расъ лазоревокъ, но пренебрежительно замѣчаетъ, что въ лучшемъ случаѣ разница въ высотѣ клювовъ „всего“ 0,3 м.м., а въ нѣкоторыхъ случаяхъ она можетъ уменьшаться до 0,1 м.м.. Такую разницу П. В. Нестеровъ считаетъ „не реальной“. Конечно, что реально и что не реально—дѣло взгляда: мой высокопочитаемый оппонентъ сдѣлалъ въ Саянахъ замѣчательное открытіе гнѣздованія *Tringa minuta* только потому (и это не въ предварительной, а въ окончательной обработкѣ), что у добытаго имъ 21 іюня пуховичка счелъ „не реальной“ (или, можетъ быть, „совершенно необоснованной“) изрядную перепонку между среднимъ и внѣшнимъ пальцами (конечно, все же не такую, какъ, напримѣръ, у лебедя) и потому широко распространеннаго и извѣстнаго почти всякому деревенскому мальчику *Actitis hypoleucis* произвелъ въ *Tringa minuta*. Конечно, и въ обращеніяхъ съ цифрами уважаемый П. В. Нестеровъ столь же точенъ, какъ и во всемъ прочемъ¹⁾: если я даю для *Cyanistes georgicus* высоту клюва 3,9—4,2, а для *C. colchicus* 4,3—4,5 м.м., т.-е. въ среднемъ для первой формы 4,05 и для второй 4,4 м.м., то разница въ среднемъ будетъ не 0,3, но 0,35 м.м..

Какъ бы то ни было, о „реальности“ такой разницы замѣчу слѣдующее. Всякій, что нибудь понимающій въ систематикѣ птицъ, знаетъ, что у близкихъ формъ мелкихъ птицъ могутъ быть совершенно ясныя для глаза различія въ формѣ клюва, слишкомъ однако же тонкія для того, чтобы быть выраженными въ цифрахъ даже при помощи штангенциркуля. И если при та-

1) Даже редакція «Орнитологическаго Вѣстника» должна была оговорить въ примѣчаніи на страницѣ 154 его статьи непомѣрную «приблизительность» нѣкоторыхъ заявленій П. В. Нестерова. *Авт.*

кихъ крошечныхъ величинахъ, какъ клювы лазаревовъ, разница высоты достигаетъ въ среднемъ третіи миллиметра, то такую разницу ни одинъ понимающій человѣкъ не назоветъ незначительной. Я сказалъ бы даже, что она слишкомъ велика и при измѣреніи большихъ серій можетъ уменьшиться, не подрывая тѣмъ различія расъ.

Что же касается замѣчанія о минимальной границѣ разницы 0,1 м.м., то оно ясно доказываетъ непониманіе самой сущности понятія „подвидъ“. Подвиды суть не вполне раздѣлившіеся, только намѣченные, молодые виды. Значитъ и признаки ихъ нерѣзки, могутъ сливаться, давая промежуточные экземпляры. А слѣдовательно и у упомянутыхъ двухъ сосѣднихъ расъ лазаревовъ наименьшая разность въ высотѣ клювовъ при достаточномъ количествѣ измѣреній, конечно, должна свестись къ нулю. Но изъ того, что предѣльные размѣры двухъ расъ сходятся или даже слегка покрываются въ извѣстномъ процентѣ экземпляровъ,—наивно заключать, что явное различіе въ величинѣ главныхъ массъ особей не имѣетъ значенія.

Жалѣя и свое время, и мѣсто въ журналѣ, я не могу съ такой же полнотой разобрать то, что говоритъ П. В. Нестеровъ о сизоворонкахъ. Да и врядъ ли это нужно. Достаточно отмѣтить такой характерный пунктъ. Пытаясь выставить „противорѣчія“ въ моихъ описаніяхъ кавказскихъ сизоворонокъ, авторъ съ одной стороны выписываетъ то, что мной говорено о кутаисскихъ экземплярахъ, т.-е. крайняго запада страны,—съ другой стороны то, что я говорю о птицахъ изъ Геокъ-Тапа, т.-е. изъ восточной части Закавказья.

Что же касается вывода П. В. Нестерова, будто кавказскія сизоворонки тождественны съ типичными (конечно—гнѣздящіяся въ Кавказскомъ краѣ, такъ какъ тамъ должны встрѣчаться на пролетѣ и типичныя), то я опять вынужденъ повторить: какого до вѣрія заслуживаетъ изслѣдователь, который нѣсколько лѣтъ подъярды работаетъ по орнитофаунѣ, имѣетъ подъ рукою коллекціи и библіотеки Академіи Наукъ и Университета и въ окончательной обработкѣ дѣлаетъ и *подчеркиваетъ свои зоогеографическія открытія* на основаніи смѣшенія не только бѣлоспиннаго съ черноспиннымъ чеканомъ или куличка воробья съ перевозчикомъ, но даже дербника съ пустельгой („Извѣстія Кавказскаго Музея“, т. V, в. 2—3, стр. 104 и 105: „Aesalon aesalon“, открытый впервые г. Нестеровымъ на гнѣздовѣ, на стр. 160 обращается

уже въ „*Tinnunculus cenchris*“¹⁾),—и даже коршуновъ съ орлами! На страницѣ 102 только что указаннаго тома П. В. Нестеровъ горько порицаетъ Вильконскаго за то, что послѣдній отрицаетъ гнѣздованіе чернаго коршуна въ районѣ его изслѣдованій, тогда какъ онъ, П. В. Нестеровъ, ихъ нашелъ тамъ. На страницахъ 105 и 106 эти находки *Milvus ater* опять подчеркиваются и служатъ основаніемъ для выводовъ. Но изъ систематической части эти находки исчезаютъ безслѣдно, такъ что въ сущности невозможно и догадаться, что было принято за коршуна. Коршунъ не только въ коллекціи, но и далеко на лету такъ не похожъ на другихъ хищниковъ, что съ орломъ или ястребомъ его смѣшать въ сущности не легче, чѣмъ съ тетеревомъ или уткой. И только изъ любезнаго разъясненія самаго автора (in litt.) я узнаю, что гнѣздящіеся коршуны общаго обзора—не коршуны, а фактически подорлики (*Aquila paevia*) систематической части (стр. 159), но зато нѣкоторые подорлики систематической части (тѣ же *A. paevia* пролетные) должны испытать вторичное обратное превращеніе и снова считаться коршунами!! И это въ окончательной обработкѣ экземпляровъ, на коихъ основываютъ открытія и выводы! Такой изслѣдователь, мнѣ думается, врядъ ли можетъ надѣяться, чтобы его изрѣченія о близкихъ и дѣйствительно очень сходныхъ расахъ трудныхъ группъ принимались кѣмъ-либо серьезно? ²⁾).



¹⁾ А частью и еще во что-то другое, такъ какъ мнимыхъ дербниковъ авторъ «наблюдалъ 26—31. VII у поста Арсіянскаго» (стр. 105), но пустельги тамъ въ эти числа не наблюдалъ (стр. 160)—дербника же въ систематической части вовсе нѣтъ! Авт.

²⁾ Редакція, принципиально соглашаясь съ уважаемымъ авторомъ, считаетъ вопросъ о кавказскихъ лазаревкахъ исчерпаннымъ и потому не находитъ возможнымъ въ дальнѣйшемъ предоставлять мѣсто въ журналѣ для полемики на эту тему.

Кстати редакція проситъ автора въ подобныхъ статьяхъ высказываться лишь по существу затронутаго вопроса, не перечисляя и не ставя на видъ прежнихъ ошибокъ оппонента. Ред.

Краткія сообщенія.—Kurze Mittheilungen.

Сообщеніе о птицахъ, отмѣченныхъ кольцами.—Mittheilung über die mittelst Ring gemerkten Vögel.—Владиміръ Алексѣевичъ Меландеръ сообщаетъ, что имъ въ текущемъ (1912) году въ имѣніи „Миломъ“ (въ 45—50 верстахъ къ S.O.O. отъ г. Смоленска) были окольцованы:

<i>Birds.—Species.</i>	<i>Dates.—Datum.</i>	<i>NºNº колецъ.— NºNº der Ringe.</i>
<i>Jynx torquilla</i> , ♀ ad.	29.V	4198
<i>Numenius arquatus</i> , juv.	12.VI	4160
<i>Anthus arboreus</i> , juv.	14.VI	4194
„ „ „	„	4195
„ „ „	„	4197
<i>Chloris chloris</i> , juv.	23.VI	4196
<i>Hirundo rustica</i> , juv.	2.VII	5534
„ „ „	„	5537
<i>Ciconia alba</i> , juv.	29.VI	7140
„ „ „	„	7141
„ „ „	„	7142
<i>Corvus monedula collaris</i> , juv.	„	7325
<i>Cotile riparia</i> , juv.	7.VII	5519
„ „ „	„	5523
„ „ „	„	5530
„ „ „	„	5531
„ „ „	„	5532
„ „ „	„	5542
„ „ „	„	5543
„ „ „	„	5544
<i>Scolopax gallinago</i> , juv.	27.VII	8378
<i>Corvus cornix</i> , juv.	30.VIII	7196.

Адресъ В. А. Меландеръ—станція „Добромино“ Рязанско-Уральской желѣзной дороги, имѣніе „Милое“.

Г. Ш.

Къ послѣднему налету копытки (*Syrghartes pagodochus* Pall.).—Въ 1908 году мнѣ пришлось наблюдать подъ Саратовымъ пролетъ копытки. Начался онъ 7-го апрѣля и кончился 15-го числа этого же мѣсяца. Тянули съ востока на западъ небольшія стайки изъ 4—10 птицъ. Въ 12-ти верстахъ отъ города въ продолженіе одного дня было замѣчено до 10 такихъ стаякъ. Черезъ 7—8 дней снова наблюдались здѣсь копытки, но уже летѣвшія въ обратномъ направленіи и не болѣе, какъ въ половинномъ количествѣ протянувши хъ на западъ. — Пролетавшія копытки были вообще не пугливы: замѣченная въ полѣ стайка изъ 6 птицъ подпустила меня къ себѣ на 10—12 шаговъ, продолжая собирать сѣмена въ старой травѣ. Въ неволѣ эта птица скоро ручиѣетъ. Приобрѣтенный мною въ предшествующій налетъ (въ 1888 году) легко раненый самецъ довольно долго жилъ у меня, питаясь просомъ и муравьиными яйцами; онъ часто, подобно курамъ, купался въ пескѣ и ухаживалъ за впущенной къ нему самкой—снизкомъ, принимая позы, свойственныя ухаживающему голубю-самцу.

В. Ф. Комаръ.

Орнитологическія экскурсіи, организованныя при содѣйствіи Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы въ 1912 году.

В. А. Филатовъ коллектировалъ въ теченіе лѣта и осени на верхнемъ теченіи Печоры, въ сопредѣльныхъ частяхъ Пермской и Вологодской губерній.

Графъ **Н. А. Бобринскій** экскурсировалъ въ маѣ въ западномъ углу Сурмалинскаго уѣзда, Эриванской губерніи. Наиболѣе интересными находками его сборовъ въ зоогеографическомъ смыслѣ являются: *Irania gutturalis* (добыто 9 экземпляровъ)¹⁾, *Saxicola finschii*, *Rhodoprechis sanguinea* (оказалась здѣсь многочисленной на гнѣздовы), *Bucanetes mongolicus* и *Chagadrius geoffroi* (найденный здѣсь, повидимому, въ качествѣ гнѣздящейся птицы).

В. Ч. Дорожастайскій и **К. Н. Мейеръ** ѣздили въ Сѣверо-Западную Монголію и южную часть Иркутской губерніи, при чемъ у озера Шеранура были добыты: *Leucosticte arctoa*,

¹⁾ Впервые былъ найденъ въ 1911 году К. А. Сатунинымъ («Эккурсія въ южное Закавказье», «Орнитологическій Вѣстникъ», кн. 1. и 2 за 1912 г.).

Monticola saxatilis, *Ruticilla severtzovi*, *Ruticilla erythronota*, *Anthus blakistoni* и *Turdus ruficollis*; здѣсь экскурсантамъ удалось собрать гнѣзда: *Scolopax solitaria*, *Carpodacus roseus*, *Ruticilla aurea*, *Lanius phoenicurus*, *Phylloscopus proregulus*, а на границѣ и рѣкѣ Цагонъ-Сайръ—*Tetrao urogalloides* (съ 8-ью яйцами) и *Turdus ruficollis*; на рѣкѣ Джарѣ наблюдался токъ *Scolopax stenura* и была записана любовная пѣсня этого бекаса; въ Дархатской степи найдено гнѣздо *Otocoris brandtii*; на берегахъ озера Косогола были добыты: *Totanus brevipes*, *Lagopus mutus*, *Bonasa canescens*, *Muscicapa sibirica*, *Muscicapa latirostris* и *Acanthis brevirostris*, а на Мунку-Сардыкѣ — *Leucosticte arctoa* (много самцовъ и самокъ), *Accentor fulvescens* и *Ruticilla severtzovi* (взрослыя и молодыя птицы); наконецъ, въ Тункинскихъ горахъ и въ долинѣ рѣки Иркутъ удалось собрать *Erythrosterna mugimaki*, *Falco peregrinus* (subsp.?) *Falco subbuteo*, *Anas falcata* и *Porzana bailoni*. Всего было собрано 300 шкурокъ, 25 гнѣздъ и болѣе 100 яицъ.

*
* * *

Къ орнитофаунѣ черноморскаго побережья Кавказа.—Въ за-сѣданіи Отдѣленія Орнитологій Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній 12-го октября текущаго года Д. М. Россинскимъ былъ прочтенъ докладъ *К. В. Лауницъ*—„О птицахъ черноморскаго побережья Кавказа“. Въ этомъ докладѣ авторъ излагаетъ свои наблюденія надъ 101 вид. и подвид., при чемъ упоминаетъ о добытой на гнѣздовьи камнешаркѣ (*Arenaria interpres* Linn.) въ окрестностяхъ города Дзашра и о впервые найденной въ Западномъ Закавказьѣ пѣночкѣ-бормотушкѣ (*Hypolaïs caligata* Licht.).

*
* * *

Къ орнитофаунѣ Айновскихъ острововъ.—Въ очередномъ за-сѣданіи отдѣленія біологій Общества Естествениспытателей при Императорскомъ Варшавскомъ Университетѣ (въ 1911 — 1912 акад. году) *П. А. Мавродіади* прочелъ докладъ „Орнитологическія наблюденія на Айновскихъ островахъ лѣтомъ 1911 года“.

*
* * *

Исслѣдованія въ Оренбургскомъ краѣ и Люблинской губерніи.— Въ отчетѣ о состояніи и дѣятельности Императорскаго Варшавскаго Университета за 1911—1912 акад. годъ („Варш. Унив. Извѣстія“, 1912—VI) помѣщены отзывы профессора П. Я. Щелкановцева о медальныхъ сочиненіяхъ: *А. Райскаго* — „Къ Орнитологической фаунѣ Оренбургскаго края“ и *Н. Футаевича* — „Матеріалы по фаунѣ позвоночныхъ Люблинской губерніи“.

*
* *

Экспедиція В. А. Русанова на Шпицбергенъ.—Петербургское Телеграфное Агентство сообщаетъ, что въ Александровскъ на Мурманѣ прибылъ зоологъ экспедиціи Русанова—*Святошъ*, собравшій на Шпицбергенѣ значительный матеріалъ по морской фаунѣ и орнитологін.

*
* *

Исслѣдованіе орнитофауны Кольскаго полуострова.—Въ текущемъ году экспедиціей Шведскаго Географическаго Общества производились исслѣдованія орнитофауны Кольскаго полуострова и Кемскаго уѣзда. По сообщенію „Извѣстій Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера“, экспедиція эта собрала здѣсь богатую орнитологическую коллекцію.

Г. П.

Къ орнитофаунѣ Закавказья.—Лѣтомъ нынѣшняго (1912) года, экскурсируя на западномъ побережьи Каспійскаго моря, между Аншеронскимъ полуостровомъ и мысомъ Бяндованъ, я нашелъ выводки *Ochodromus Geoffroyi* Wagl. и большую (въ нѣсколько тысячъ особей) гнѣздовую колонію *Larus argentatus* Gmel.—Этимъ же лѣтомъ, во время поѣздки на озеро Кели, въ Главномъ Кавказскомъ хребтѣ мнѣ удалось найти на гнѣздовьи *Ruticilla erythrogastra* Güld..

В. Б. Баньковский.

Премія имени профессора А. П. Богданова.—Въ засѣданіи Зоологическаго Отдѣленія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи 20-го октября 1912 года въ члены комиссіи по присужденію премии имени профессора А. П. Богданова (за работы зоологическаго содержанія)

были избраны Б. М. Житковъ, В. С. Елпатьевскій и Г. П. Поляковъ.

* * *

Въ засѣданіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній 20-го ноября С. П. Огневымъ въ докладѣ о результатахъ поѣздки въ дельту Волги весною текущего года было упомянуто о добытыхъ между прочимъ четырехъ экземплярахъ полевого воробья еще не описанной формы, легко отличимой отъ *Passer montanus montanus* (Linn.) и *Passer montanus transcaucasicus* Buturl.

Въ этомъ же засѣданіи были избраны въ комиссію по присужденію преміи имени Августѣйшаго Покровителя Общества Великаго Князя Сергѣя Александровича за орнитологическія работы слѣдующія лица: профессоръ Г. А. Кожевниковъ, Д. М. Россинскій, Б. М. Житковъ, профессоръ Н. Ю. Зографъ и профессоръ Н. М. Кулагинъ.

Кстати упомяну здѣсь о курьезномъ сообщеніи о докладѣ С. П. Огнева, появившемся на слѣдующій день въ газетѣ „Раннее Утро“, въ которомъ между прочимъ говорится: „Добыто около 200 экземпляровъ уже вымирающихъ породъ птицъ, какъ-то: гагары, бѣлые лебеди, бѣлая цапля и друг.“.

* * *

Въ соединенномъ засѣданіи Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній и Комиссіи для изслѣдованія фауны Московской губерніи, состоящей при Зоологическомъ Отдѣленіи Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, 26-го ноября с/г. въ Зоологическомъ Музеѣ Императорскаго Московскаго Университета были заслушаны доклады: профессора Г. А. Кожевникова: — „Нѣкоторые очередные вопросы охраны животныхъ отъ истребленія“, Д. М. Россинскаго — „Опытныя орнитологическія учрежденія въ западной Европѣ“ и Г. В. барона Лоудона — „О кольцеваніи птицъ“.

Въ засѣданіи этомъ было постановлено: 1) ходатайствовать передъ Департаментомъ Земледѣлія объ организаціи ряда заповѣдныхъ участковъ съ запрещеніемъ охоты, а также научнаго коллектированія птицъ; 2) организовать въ Москвѣ комитетъ по охранѣ птицъ и устроить орнитологическую наблюдательную станцію; 3) созвать въ Москвѣ въ 1914 году всероссійскій съѣздъ орнитологовъ, приурочивъ его къ исполняющемуся въ этомъ году пятидесятилѣтнему юбилею Московскаго Зоологическаго Сада.

Г. П.

Хроника.—Chronik.

Новое изданіе Департамента Земледѣлія.—Въ цѣляхъ ознакомленія населенія съ пріемами борьбы съ сусликами Департаментъ Земледѣлія выпущенъ въ свѣтъ отчетъ инструктора Департамента по борьбѣ съ вредителями сельскаго хозяйства г. Лебедева—„О борьбѣ съ сусликами при помощи сѣрнистаго углерода въ Самарской, Ставропольской, Астраханской и Саратовской губ. въ 1909—1911 годахъ“ (цѣна 10 коп.).

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества, при коихъ имѣются сельскохозяйственныя библіотеки, могутъ получить по 1 экземпляру этого отчета бесплатно, при чемъ съ просьбами о снабженіи этимъ изданіемъ имъ надлежитъ обращаться непосредственно къ мѣстному инспектору сельскаго хозяйства или правительственному агроному, коимъ это изданіе будетъ предоставляться также и мѣстнымъ казеннымъ учебнымъ заведеніямъ и опытнымъ учрежденіямъ. Прочимъ учрежденіямъ, могущимъ содѣйствовать ознакомленію населенія съ пріемами борьбы съ сусликами, съ просьбами о безплатной высылкѣ этого изданія надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія, коимъ такого рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по мѣрѣ возможности.

Распорядительный Комитетъ XIII Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей, имѣющаго состояться съ 16 по 24 іюня 1913 года въ г. Тифлисѣ, доводитъ до свѣдѣнія всѣхъ желающихъ принять участіе въ работахъ Съѣзда въ качествѣ членовъ его, что всѣ необходимыя справки о предстоящемъ Съѣздѣ, равно какъ „Правила“ Съѣзда, бланки подписныхъ листовъ и свѣдѣнія объ экскурсіяхъ, предположенныхъ во время Съѣзда, можно получить въ Распорядительномъ Комитетѣ Съѣзда (Тифлисѣ, канцелярія Попечителя Кавказскаго Учебнаго Округа), для чего на имя Распорядительнаго Комитета слѣдуетъ сообщить свой адресъ.

Работа „Птицы Минусинскаго края, западнаго Саяна и Урянханской земли“ профессоромъ П. П. Сушкинымъ сдана въ печать.



В. Б. Баньковскій.

W. B. Banikowski. Nachruf, von G. J. Poljakow.

Въ ночь на 25-ое ноября текущаго (1912) года покончилъ съ жизнью Вячеславъ Брониславовичъ Баньковскій, студентъ физико-математическаго факультета Императорскаго Московскаго Университета.

Покойный готовился быть географомъ, но немало удѣлялъ времени и орнитологич., и, несмотря на свою молодость—ему было лишь 23 года—уже успѣлъ зарекомендовать себя опытнымъ работникомъ въ этой области знанія.

В. Б. Баньковскій главнымъ образомъ изучалъ птицъ Кавказа, собравъ въ окрестностяхъ Тифлиса и на берегу Каспійскаго моря большую—около 1500 экземпляровъ—коллекцію. Весною настоящаго года онъ очень талантливо разобрался въ запутанномъ вопросѣ о представителяхъ рода *Scops*. Статья по этому поводу, а также его наиболѣе значительная и интересная работа о кавказскихъ птицахъ печатается въ настоящее время въ „Извѣстіяхъ Кавказскаго Музея“.

Въ день смерти В. Б. Баньковскій былъ занятъ разработкой группы чекановъ (*Saxicola*) и написалъ для „Орнитологическаго Вѣстника“ свою послѣднюю замѣтку, помѣщенную мною въ отдѣлѣ „Краткія сообщенія“ настоящаго номера.

Г. И. Поляковъ.

Издакія, присланныя въ редакцію.

Éditions parvenus à la rédaction.

Записки Уральского Общества Любителей Естествознанія, т. XXXI, вып. 2. Екатеринбургъ, 1912 г.

Журналь „Птицевѣдѣніе и Птицеводство“, годъ III, вып. 1 и 2. Москва, 1912 г.

Д. М. Россинскій: „Соображенія по поводу организаціи орнитологическаго отдѣла Московской Областной Опытной Станціи“. Изд. Отд. Орнит. Имп. Рус. Об. Ак. Жив. и Раст.; Москва, 1912 г.

Д. М. Россинскій: „Кольцеваніе птицъ въ Венгріи (1908—1911)“. Изд. Отд. Орнит. Имп. Рус. Общ. Ак. Жив. и Раст.; Москва, 1912 г.

В. Ч. Дорогостайскій: „Къ біологіи горнаго дупеля (*Scolopax solitaria* Midd.)“. Изд. Отд. Орнит. Имп. Рус. Об. Ак. Жив. и Раст.; Москва, 1912 г.

К. В. Анфиловъ: „Оклеветанная птица“. Изд. Отд. Орнит. Имп. Рус. Общ. Ак. Жив. и Раст.; Москва, 1912 г.

Г. В. баронъ Лоудонъ: „Кольцеваніе птицъ“. Изд. Отд. Орнит. Имп. Рус. Об. Ак. Жив. и Раст.; Москва, 1912 г.

Ученыя записки Императорскаго Казанскаго Университета, годъ LXXIX, кн. 9-ая, сентябрь 1912 г.

Записки Общества Подольскихъ Естествоиспытателей и Любителей Природы, т. I, 1912 г.

Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института, кн. 2-ая за 1912 г.

Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, т. XLIII, вып. 1-ый, № 2-3, 1912 г.

П. Ө. Соловьевъ: „Паразитическіе черви птицъ Туркестана“. Оттискъ изъ „Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ“, т. XVII, 1912 г.

Бюллетени Харьковского Общества Любителей Природы, № 3, 1912 г. [Орнитологическія замѣтки: *И. Гавриленко*—«Замѣтки о нѣкоторыхъ птицахъ Полтавской губерніи». *В. Г. Аверинъ*—«Бѣлая мухоловка» (альбиносъ *Muscisara grisola* Linn.), «Малая чайка (*Larus minutus* Pall.)», «Пѣтухоперая самка варакушки (*Suarescula suecica suecica* L.)» и «Авдотка (*Oedicnemus crepitans* L.) въ Полтавской губ.».].

Журналы Общихъ собраній и Совѣта Вятскаго Кружка Любителей Естествознанія, съ 15. IX. 1902 по 1. 1903 (*В. Бѣловъ*: «Бѣлая замѣтка о птицахъ Вятскаго края») и съ 1. I. 1904 по 1. I. 1911 г.

Извѣстія Оренбургскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, вып. XXIII, 1912 г.

Извѣстія Тульского Общества Любителей Естествознанія, вып. I, 1912 г.

Варшавскія Университетскія Извѣстія, 1912, VI и VII.

Ученыя записки Императорскаго Казанскаго Университета, книга X, 1912 г.

Записки Императорскаго Харьковского Университета, книга 3-ья 1912 г.

Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, книжка XXXVI, вып. I, 1912 г.

Годичный отчетъ Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы за 1911—1912 г.

Протоколы засѣданій Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы, годъ 1911.

А. А. Браунеръ: „О вредныхъ и полезныхъ птицахъ Херсонской, Таврической и Бессарабской губерній“.

„Der Ornithologische Beobachter“, Heft. 1 und 2, 1912—1913.

N. Sarudny und M. Härms: „Bemerkungen über einige Vögel Persiens“, Sonderabdruck aus: Journal für Ornithologie, Oktoberheft 1912.



Въшелъ изъ печати 20 декабря (ст. ст.) 1912 г.—Ausgegeben am 20 December (a. St.) 1912.

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляковъ.

Herausgeber: G. I. Poliakow.

Der Ornithologische Beobachter.

Monatsberichte für Vogelkunde und Vogelschutz.

Offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft
für Vogelkunde und Vogelschutz.

Einzigste rein ornithologische Fachschrift in der Schweiz. Enthält einen deutschen und
einen französischen Teil.

———— Preis Frs. 5,—jährlich. ————

Probehefte kostenfrei.—Bestellungen an die Expedition:

Buchdruckerei R. G. Zbinden, Rheinsprung 5, Basel, (Schweiz).

Ornithologisches Jahrbuch.

—
O R G A N

für das

palaearktische Faunengebiet.

—
Herausgegeben

von

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.


—
XXIII Jahrgang.
—

Das „Ornithologische Jahrbuch“ bezweckt ausschliesslich die Pflege der palaearktischen Ornithologie und erscheint in 6 bez. 3 Doppelheften Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von Tafeln erfolgt nach Bedarf.—Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt bei direktem Bezuge für das Inland **10 Kronen**, für das Ausland **10 Mk.** (= 11.75 K) = **12.50 Frks.** = **10 sh.** = **4.50 Rbl. pränumerando**, im Buchhandel **12 Kronen** = **12 Mark.** Volks- u. Mittelschulen erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von **6 Kronen** bez. **6 Mk.** (nur direkt). Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Raume auf dem Umschlage Aufnahme. Beilagen- und Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung. Probehefte nur gegen Rücksendung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften zur Besprechung Abonnements, Annonzen und Beilagen bitten wir an den Herausgeber, Villa Tännenhof bei Hallein, Salzburg, zu adressieren.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, einziges seit 21 Jahren erscheinendes Fachorgan, herausgegeben von **Wilhelm Rüdiger, Hochzeit i. d. Neumark.** Der Abonnementspreis beträgt für das Jahr bei direkter Zusendung 5 Mk., nach den Ländern des Welpostvereines 7 Frs. pränumerando. Die Zeitschrift bringt aus Fachkreisen belehrende und einschlägige Artikel, Brut- und Sammelnotizen, Merkmale schwer zu unterscheidender Eier, Literatur, sowie eine grosse Anzahl Kauf-, Verkaufs- und Tausch-Anzeigen.—Probenummern werden auf Wunsch frei zugesendet.





Открыта подписка на 1913 г.

— НА —

„ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ“.

„Messager Ornithologique“ — „Ornithologische Mitteilungen“.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Выходитъ въ годъ четыре книжки, объемомъ каждая не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ, двѣ до и двѣ послѣ лѣтняго сезона.

Журналъ имѣетъ цѣлью объединять орнитологическія работы русскихъ ученыхъ и способствовать ознакомленію любителей съ нашей орнитофауной, съ литературой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изученіемъ. Въ журналъ имѣются слѣдующіе отдѣлы: 1) Статьи и замѣтки по систематикѣ и біологій птицъ; 2) Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и библиографія; 4) Корреспонденція; 5) Хроника; 6) Заявленія гг. подписчиковъ о взаимномъ обменѣ шкурками, гнѣздами и яйцами птицъ; 7) Вопросы и отвѣты.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: В. Г. Аверинъ, С. Н. Алфераки, В. М. Артоболевскій (предс. Кіевск. Орнит. Общ. им. К. Э. Кесслера), В. Л. Бланки, С. І. Билькевичъ, Е. А. Бихнеръ, В. Н. Бостанжогло, А. А. Браунеръ, С. А. Бутурлинь, А. М. Быковъ, Б. С. Вальхъ, М. М. Гернсъ, Г. Л. Граве, А. Г. Гринбоускій, К. М. Дерюгинъ (прив.-доц. Имп. С.-Пет. Унив.), Б. А. Домбровский, В. С. Елпатовскій (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Б. М. Житковъ (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. Зарудный, Г. Э. Јоганзенъ, Е. И. Исполотовъ, Д. Н. Кайгородовъ (профес. Лѣн. Инст.), А. Н. Карамзинъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожениковъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. Ф. Котсь, Г. В. баронъ Лоудонъ, Р. С. Магницкій, Л. А. Молчановъ, П. В. Нестеровъ, С. И. Огневъ, Бенно Отто, І. К. Пачоскій, Ө. Д. Плесие, Г. И. Поляковъ, Д. М. Россинскій, С. А. Рѣзцовъ, Н. А. Сатунинъ, А. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій, П. Ф. Соловьевъ, В. В. Станчинскій, П. П. Сушкинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. И. Стеникій, И. Н. Тарнани (проф. Н. Алленс. Инст. С.-Х. и Лѣс.), А. Я. Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ, В. А. Хахловъ, Э. В. Шарлеманъ и др.

— ПОДПИСНАЯ ЦѢНА —

съ пересылкой въ Россіи и за границу: на 1 годъ—4 руб., на $\frac{1}{2}$ года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб.

Полные годовые комплекты журнала за 1910 и 1911 г.г., имѣющіеся въ настоящее время въ небольшомъ числѣ, высылаются за 8 руб. (по 4 руб. за годъ).

Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка“, Московск. губ., имѣніе „Саввино“. Телефонъ № 7—51.

Кромѣ конторы редакціи, подписка принимается въ Москвѣ и С.-Петербургѣ въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, Карбасникова и „Новаго Времени“.

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляковъ.


Herausgeber: G. I. Poljakow.

Тип. Импер. Моск. Унив.

Содержаніе «Орнитологическаго Вѣстника» за 1913 годъ.

(АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.)

	Стр.
Библиографія:	
— П. П. баронъ фонъ-Винклеръ: „Враги птицеводства“. О. С. Шербаковъ	226—228
— Vogelschutzkalender 1914. Г. А. Кожесвииковъ	371—373
Бѣлый турпанъ [<i>Oidemia fusca</i> (Linn.)]. В. Е. Ушаковъ	161—162
Доклады и сообщенія	381
Е. А. Бихнеръ. Некрологъ. Г. И. Поляковъ	374
Замѣтка о новой пѣночкѣ изъ Туркестана (<i>Phylloscopus collybita subsindianus subsp. nov.</i>). Н. А. Зарудный	269—271
Замѣтки о нѣкоторыхъ кавказскихъ птицахъ. Э. В. Шарлеманъ	262—265
Замѣтки по орнитологii Туркестана. (Продолженіе). Н. А. Зарудный	137—150, 245—256
Изданія, присланныя въ редакцію. 78—80, 133—134, 233—242, 386—389	
Имена сѣрыхъ синицъ. С. А. Бутурлинъ	51—53
Кедровки въ Кіевской и Черниговской губерніяхъ въ 1913 году. Э. В. Шарлеманъ	272—273
Китайскій лебедь (<i>Cygnus davidi</i> Swinh.) въ Сибири. В. Ч. Дорогостайскій	110—112
Кое-что о бѣлолобой казаркѣ (<i>Anser albifrons</i> Scop.). Н. А. Смирновъ	158—160
Краткая замѣтка о новой формѣ розоваго снѣгирия (<i>Carpodacus rhodochlamys kotschubeii subsp. nov.</i>) Н. А. Зарудный	165—166



Краткія сообщенія:

- Къ авифаунѣ Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи. *Н. А. Карамзинъ*.—Къ налету орѣховокъ. *Э. В. Шарлеманъ*.—Къ орнитофаунѣ Смоленской губерніи.—Экскурсіи Кругжа Любителей Естествознанія при Московскомъ Сельскохозяи-
ственномъ Институтѣ въ 1911 году.—Къ изученію птицъ Царства Польскаго.—Къ изслѣдованію орнитофауны Херсон-
ской губерніи.—Интересныя находки въ С.-Петербургской губерніи.—Къ орнитофаунѣ Московской губерніи.—Интерес-
ныя находки въ Ярославской губерніи.—Къ орнитофаунѣ Уфимской губерніи.—О птенцахъ *Oceanodroma leucorhoa*.—
Новыя (напечатанныя) работы ученаго персонала Зоологиче-
скаго Музея Императорской Академіи Наукъ.—О новѣйшихъ работахъ профессора П. П. Сушкина.—Засѣданіе Импера-
торскаго Московскаго Общества Испытателей Природы.—Къ отмѣткѣ птицъ кольцами.—Засѣданіе Отдѣленія Орнитоло-
гіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Жи-
вотныхъ и Растеній. *Г. П.* 54—58
- Зимовка малиновки (*Erithacus rubecula* Linn.) подъ Петер-
бургомъ. *В. Бялоусовъ*.—Къ орнитофаунѣ Московской губер-
ніи. *Г. Н. Поляковъ*.—Замѣтка къ *Cornix cornix* Linn. var.
christophi Alph. nova. *Н. А. Зарудный*.—Къ орнитофаунѣ
Сувадкской губерніи. *Г. Н. Поляковъ*.—Кое-что о пролетѣ
чернаго аиста. *Е. Я. Катинъ* 121—123
- Къ распространенію дубровника (*Emberiza aureola* Pall.) въ
Московской губерніи. *В. А. Линдгольмъ*.—Къ орнитофаунѣ
Уссурийскаго края. *Г. Н. Поляковъ*.—Къ вопросу о миграціяхъ
саджи [*Syrrhaptes paradoxus* (Pall.)]. *Г. Н. Поляковъ* 180—181
- Къ орнитофаунѣ Минской губерніи. *Янушъ Доманевскій*.—Къ
орнитофаунѣ Московской губерніи. *Г. Н. Поляковъ*.—Еще
объ *Emberiza jakowskii* Tacz. *Ред.*—Красная утка въ
С.-Петербургской губерніи. *Ред.*—Къ окольцовыванію птицъ.
Ред. 287—289
- Къ біологіи оляпки (*Cinclus melanogaster* Brehm).
С. Г. Штеверъ 257—261
- Къ вопросу о систематическомъ положеніи бѣлокрылой
сороки (*Pica leucoptera* Gould.). *С. П. Онеговъ* 113—115
- Къ орнитофаунѣ Закавказья *П. В. Нестеровъ*. 175—179
- Къ орнитофаунѣ Закаспійской области и сосѣднихъ съ
нею частей Персіи. *Н. А. Зарудный* и *С. І. Биль-
кевичъ* 20—33
- Къ орнитофаунѣ сѣверо-восточныхъ Саянъ. *А. Я. Ту-
гариновъ* 83—90
- Къ распространенію гаичекъ. *С. А. Бутурлинъ* 116—117

Къ распространенію ганчекъ въ Европейской Россіи.	
Проф. П. П. Сушкинъ	266—268
Лазоревка бѣлая, сибирская (<i>Cyanistes cyanus yenisseeensis</i> But. et Tugar.) въ Кіевѣ. С. А. Бутурлинъ .	118—119
Линька пустельги. В. А. Хазловъ	163—164
Мои ошибки въ вопросѣ о формахъ черноголового щегла (<i>Carduelis carduelis</i>) и ихъ исправленіе. Н. А. Зарудный	274—286
Новая форма клинтуха (<i>Columba oenas hurgana subsp. nov.</i>). Н. А. Зарудный и С. И. Билъкевичъ . . .	120
Новая форма тростниковой камышевки. В. В. Станчинскій	34—39
Новый подвидъ полевого воробья. С. П. Ошевъ . . .	41—45
Новыя формы ремезовъ (<i>Remiza</i>). Н. А. Зарудный . .	46—50
О нѣкоторыхъ птицахъ Кѣлецкой губерніи. (Продолженіе). Е. Я. Катинъ	17—19
О птицахъ Айбугира. Л. А. Молчановъ	151—157
Обзоръ иностранной литературы по орнитологіи. (Продолженіе). С. А. Бутурлинъ	367—370
Обзоръ русской орнитологической литературы. (Продолженіе). С. А. Бутурлинъ	59—69, 124—131
Обмѣнъ орнитологическимъ матеріаломъ	77
Овсянки въ различной степени переходныя между <i>Emberiza leucocerphalos</i> S. G. Gm. и <i>Emberiza citrinella erythrogastrus</i> Brehm. Н. А. Зарудный . . .	91—109

Орнитофенологическія наблюденія:

- 1) Урочище Славянка, Приморской области. А. Медвѣдевъ.—
- 2) Окрестности города Смоленска. А. Г. Гржибовскій.—
- 3) Имѣніе „Милое“, Смоленской губерніи. В. А. Меландеръ.—
- 4) Николаевъ, Херсонской губерніи. Б. Л. Токаръ и Г. П. Ивановъ.—
- 5) Славка Ачикулакъ, Ставропольской губерніи. А. С. Рудневъ.—
- 6) Днѣпровская біологическая станція въ Черниговской губерніи. П. Г. Емельяненко 182—213
- 4) Имѣніе „Адрианово“, Херсонской губерніи. Е. А. Куликовскій.—
- 5) Окрестности г. Кіева. Э. В. Шарлеманъ.—
- 6) Окрестности города Владиславова, Сувалкской губерніи. Е. Я. Катинъ.—
- 7) Имѣніе „Зыпле“, Сувалкской губерніи. Ю. Ф. Воеводскій.—
- 8) Имѣніе „Зыковичи“, Виленской губерніи. Ю. О. М.—
- 9) Мѣстечко „Ушачь“, Витебской губерніи. В. П. Жадановскій.—
- 10) Имѣніе „Милое“, Смоленской губерніи. В. А. Меландеръ.—
- 11) Имѣніе „Лиздень“, Лифляндской губерніи. Г. В. баронъ Лоудонъ.—
- 12) Имѣніе „Замгофъ“, Лиф-

ляндской губерніи. *М. М. Гермс.*—13) Городъ Опочка и его окрестности, Псковской губерніи. *Е. П. Исполотовъ.*—14) Погость Корлы, Псковской губерніи. *Я. Н. Никандровъ.*—15) Гатчино, С.-Петербургской губерніи. *В. Р. Дичъ.*—16) Окрестности села „Лахта“, С.-Петербургской губерніи. *К. В. Лауницъ.*—17) Царское Село, С.-Петербургской губерніи. *Н. А. Тихомировъ.*—18) Село „Полибино“, Самарской губерніи. *А. Н. Карамзинъ.*—19) Бугурусланскій уѣздъ, Самарской губерніи. *В. Д. Пополутовъ.*—20) Село „Атмисъ“, Пензенской губерніи. *Г. Д. Смагинъ.*—21) Окрестности г. Нижняго-Новгорода и сель „Городецъ“ и „Бриляково“, Нижегородской губерніи. *Н. А. Покровский.*—22) Село „Сормово“, Нижегородской губерніи. *В. И. Малиновскій.*—23) Имѣніе „Саввино“, Московской губерніи. *П. С. Колановъ.*—24) Москва, Сокольники. *Н. Д. Митрофановъ.*—25) Можайскій уѣздъ, Московской губерніи. *С. П. Отсвъ.*—26) Дмитровскій уѣздъ, Московской губерніи. *Н. В. Шевалдышевъ.*—27) Вышній Волочокъ, Тверской губерніи. *А. М. Капусткинъ.* 290—366

Отъ редакціи	214
Поправки	243
Поѣздка на озеро Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году. (Продолженіе). <i>Г. И. Поляковъ.</i> (Приложеніе къ №№ 1, 2 и 3) . . . 93—140, 141—188,	189—252
Предварительный перечень птицъ Тарскаго уѣзда, Тобольской губерніи. <i>В. Е. Ушаковъ</i>	3—16
Сыръ-дарыинскій чернохвостый сорокопутъ (<i>Caudalanus erythronotus jahartensis Buturl.</i>). <i>Н. А. Зарудный.</i>	167—174
Уссурійская большеклювая ворона. <i>С. А. Бутурлинъ.</i>	40

Хроника:

- Къ XIII съѣзду Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей . . . 70—73
- 4-ое общее собраніе Международнаго Сельскохозяйственнаго Института.—Первое засѣданіе „Русскаго Орнитологическаго Комитета“.—Награды, присужденныя нашимъ сотрудникамъ.—Засѣданіе Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній 132
- Къ изслѣдованію озера Марка-куль.—Къ изслѣдованію низовьевъ Оби и Обской губы.—Къ изслѣдованію Печеры.—Къ охранѣ природы.—Отъ постоянной Природоохранительной Комиссіи при Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ.—Засѣданіе Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографии.—Вопросъ объ охранѣ птицъ на Общемъ Собраніи Международнаго Сельскохозяйственнаго Института въ Римѣ въ 1913 году.—Выставка

	Стр.
охраны природы.—Къ свѣдѣнію собирающихъ Зоологическія коллекціи.—Новыя изданія Департамента Земледѣлія	215—225
— Международное совѣщаніе о всемірной охранѣ природы. Г. А. Кожевниковъ.—Третья Международная выставка птицъ всѣхъ видовъ въ Льежѣ. Новыя изданія Департамента Земледѣлія	375—380
Циркуляръ Департамента Земледѣлія въ губернскія и уѣздныя земскія управы	74—76
Циркуляръ Комиссіи по организациі Инструкторскихъ курсовъ птицеводства Департамента Земледѣлія	229—232
Экспедиціи, путешествія, экскурсіи, командировки и пр.	382—385

Inhalt der «Ornithologische Mitteilungen» des Jahres 1913.

(ALPHABETISCHES REGISTER.)

	P.
Acrocephalus streperus intermedius subsp. nov. Von W. W. Stantschinski	34—39
Austausch ornithologischen Materials	77
Bemerkung über einen neuen Laubsänger von Turkestan (Phylloscopus collybita subsindianus subsp. nov.). Von N. A. Sarudny	269—271
Berichtigung	243
Bibliographie	226—232, 371—373
Caudalanus erythronotus jaxartensis Buturl. Von N. A. Sarudny	167—174
Chinesischer Schwan (Cygnus davidi Swinh.) in Sibirien. Von W. Dorogostaisky	110—112
Chronik	70—73, 132, 215—225, 375—380
Corvus macrorhynchus mandshuricus subsp. nov. By S. A. Buturlin	40
Cyanistes cyanus yenisseeensis But. et Tugar. in Kiev. By S. A. Buturlin	118—119
Éditions parvenues à la rédaction. 78—80, 133—134, 233—242, 386—389	
Einiges über die Blässengans (Anser albifrons Scop.). Von N. A. Smirnow	158—160
Eugène Büchner. Nachruf. Von G. I. Poljakow	374

Expéditions, voyages, excursions, etc.	382—385
Kurze Bemerkung über eine neue Form des Rosengimpels (<i>Carpodacus rhodochlamys kotschubeii</i> sub sp. nov.). Von <i>N. A. Sarudny</i>	165—166
Kurze Mitteilungen	54—58, 121—123, 180—181, 287—289
Meine Irrtümer betreffs der Frage von den Formen des schwarzköpfigen Stieglitzes (<i>Carduelis carduelis</i>) und die Verbesserung derselben. Von <i>N. A. Sarudny</i> .	274—286
Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan. (Fort- setzung). Von <i>N. A. Sarudny</i>	137—150, 245—256
Names of the <i>Parus cinereus</i> Group. By <i>S. A. Buturlin</i> .	51—53
Neue Form der Hohltaube (<i>Columba oenas hyrcana</i> sub sp. nov.). Von <i>N. A. Sarudny</i> und <i>S. I. Bilkewitsch</i> .	120
Neue Formen der Beutelmeise (<i>Remiza</i>). Von <i>N. A. Sarudny</i>	46—50
Neue geographische Form des Feldsperlings: <i>Passer mon- tanus volgensis</i> sub sp. nov. Von <i>S. I. Ognew</i> . .	41—45
Notes on Distribution of <i>Penthestes</i> (= <i>Poecile</i>). By <i>S. A. Buturlin</i>	116—117
Notizen über einige kaukasische Vögel. Von <i>E. W. Schar- leman</i>	262—265
Ornithologischer Ausflug nach den Seen Saissan-nor und Marka-kul (in West-Sibirien) im Jahre 1909. (Fort- setzung). Von <i>G. I. Poljakow</i> . №№ 1, 2 und 3 . .	93—140 141—188, 189—252
Ornithophenologische Beobachtungen	182—213, 290—366
Rapports et communications	381
Review of the foreign ornithological Literature. (Conti- nued). By <i>S. A. Buturlin</i>	367—370
Review of the Russian ornithological Literature. (Conti- nued). By <i>S. A. Buturlin</i>	59—69, 124—131
Tannenhäher in dem Kiew'schen und Tschernigow'schen Gouvernement im Jahre 1913. Von <i>E. W. Scharleman</i> .	272—273
Über die „Mause“ des <i>Tinnunculus tinnunculus</i> (Linn.). Von <i>W. A. Hachlow</i>	163—164
Über die Vögel von Ajbugir. Von <i>L. A. Moltschanow</i> .	151—157
Über diverse Uebergangsformen zwischen Gold- und Weiss-Kopf-Ammern (<i>Emberiza citrinella erythroge- nys</i> Brehm & <i>Emberiza leucocephalos</i> S. G. Gm.). Von <i>N. A. Sarudny</i>	91—109

Über einige Vögel des Kjelzer Gouvernements. (Fortsetzung). Von <i>E. I. Katin</i>	17—19
Von der Redaktion	214
Vorläufige Liste der Vögel des Kreises Tarsk aus dem Gouvernement Tobolsk. Von <i>W. E. Uschakow</i> . . .	3—16
Weisse Trauer-Ente [<i>Oidemia fusca</i> (Linn.)]. Von <i>W. E. Uschakow</i>	161—162
Zur Biologie der Wasserramsel (<i>Cinclus melanogaster</i> <i>Brehm</i>). Von <i>S. G. Stecher</i>	257—261
Zur Frage über die sistematische Stellung der weissflü- geligen Elster (<i>Pica leucoptera</i> Gould.). Von <i>S. I. Ognew</i>	113—115
Zur Ornithologie des Nord-östlichen Sayan-Gebirges. Von <i>A. I. Tugarinow</i>	83—90
Zur ornithologischen Fauna des Transkaspischen Gebietes und der benachbarten Teile Persiens. Von <i>N. A. Sarudny</i> und <i>S. I. Bilkewitsch</i>	20—33
Zur ornithologischen Fauna Transkaukasiens. Von <i>P. W. Nesterow</i>	175—179
Zur Verbreitung der Sumpfschnecken im Europäischen Rus- sland. Von Prof. <i>P. P. Suschkin</i>	266—268