

№ 1

ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

QUATRIEME ANNEE

Apr 5 1913

1913 г.

Отъ Редакціи.

1. Редакція не принимаетъ на себя отвѣтственности за своевременную доставку журнала, если подписка не была адресована непосредственно на ея имя.

2. При сообщеніи адреса подписчиковъ просятъ разборчиво обозначать имя, отчество, фамилію, а также губернію, уѣздъ и ближайшее почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяются Редакціей только въ тѣхъ случаяхъ, если таковыя поступаютъ отъ подписчиковъ не позже полученія ими слѣдующаго номера и съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы.

3. При заявленіи о неполученіи журнала и о перемѣнѣ адреса просятъ прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №. При заявленіи о перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4. Лицъ, обращающихся письменно въ Редакцію съ запросами, для полученія отвѣта просятъ прилагать почтовую марку. На вопросы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5. Наложеннымъ платежомъ выпуски журнала не высылаются.

6. Рукописи, посылаемыя въ Редакцію, должны быть четко написаны, обязательно за полной подписью автора и съ указаніемъ его точнаго адреса. При этомъ авторовъ просятъ писать на одной сторонѣ листа и оставлять поля. Желательно, чтобы статьи снабжались авторами, кромѣ русскихъ названій, названіями на какомъ-либо западноевропейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя наименованія птицъ въ работахъ были подчеркнуты авторами одинъ разъ. За номенклатуру въ научныхъ статьяхъ отвѣтственность лежитъ на авторахъ.

7. Непринятыя рукописи возвращаются за счетъ авторовъ въ видѣ посылки или подъ заказной бандеролью.

8. Для библіографическихъ отзывовъ просятъ присылать по два экземпляра работъ.

1913 г. Четвертый годъ изданія.—Quatrième année. № 1.

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Орнитологическій Вѣстникъ.

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN.

Выходитъ четыре раза въ годъ: два №№ до и два—послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна за 1 г.—4 руб., за 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу—8 р., за 1/2 страницы—4 р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половинною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просять адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Саввино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle) l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakow, Russie, Chemin de fer Moscou — Nijninovgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savvino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein) jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2 Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poljakow, Russland, Postabteilung. «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut. «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

1. Предварительный перечень птицъ Тарскаго уѣзда, Тобольской губерніи. *В. Е. Ушаковъ* 3
2. О нѣкоторыхъ птицахъ Кѣлецкой губерніи. (Продолженіе). *Е. Я. Катинъ* 17
3. Къ орнитофаунѣ Закаспійской области и сосѣднихъ съ нею частей Персіи. *Н. А. Зарудный* и *С. І. Билькевичъ* 20
4. Новая форма тростниковой камышевки. *В. В. Станчинскій.* 34
5. Уссурійская большеклювая ворона *С. А. Бутурлинъ* . . 40
6. Новый подвидъ полевого воробья. *С. И. Огневъ* 41
7. Новыя формы ремезовъ (Remiza). *Н. А. Зарудный* . . 46
8. Имена сѣрыхъ синицъ. *С. А. Бутурлинъ* 51
9. **Краткія сообщенія:**

— Къ авифаунѣ Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи. *Н. А. Карамзинъ*.—Къ налету орѣховокъ.—*Э. В. Шарлеманъ*.—Къ орнитофаунѣ Смоленской губерніи.—Экскурсіи Кружка Любителей Естествознанія при Московскомъ Сельско-хозяйственномъ Институтѣ въ 1911 году.—Къ изученію птицъ Царства Польскаго. — Къ изслѣдованію орнито-

Стр.

фауны Херсонской губерніи.—Интересныя находки въ С.-Петербургской губерніи.—Къ орнитофаунѣ Московской губерніи.—Интересная находка въ Ярославской губерніи.—Къ орнитофаунѣ Уфимской губерніи.—О птенцахъ Oceanodroma leucorhoa.—Новыя (напечатанныя) работы ученаго персонала Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ.—О новѣйшихъ работахъ профессора П. П. Сушкина.— Засѣданіе Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы.—Къ отмѣткѣ птицъ кольцами.—Засѣданіе Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній. *Г. П.* 54

10. **Обзоръ русской орнитологической литературы.** (Продолженіе). *С. А. Бутурлинъ* 59

11. **Хроника:**

— Къ XIII съѣзду Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей . . . 70

Циркуляръ Департамента Земледѣлія въ губернскія и уѣздныя земскія управы 74

Обмѣнъ орнитологическимъ матеріаломъ 77

Изданія, присланныя въ редакцію 78

Объявленія.

12. Поѣздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году. (Продолженіе). *Г. П. Поляковъ* . . . . . 93—140

SUJET. — INHALT.

P.

1. Vorläufige Liste der Vögel des Kreises Tarsk aus dem Gouvernement Tobolsk. Von *W. E. Uschakow* 3

2. Uber einige Vögel des Kjelzer Gouvernements. (Fortsetzung). Von *E. I. Katin* 17

3. Zur ornithologischen Fauna des Transkaspischen Gebietes und der benachbarten Teile Persiens. Von *N. A. Sarudny* und *S. I. Bilkewitsch* 20

4. Acrocephalus streperus intermedius subsp. nov. Von *W. W. Stantschinski* 34

5. Corvus macrorhynchus mandshuricus subsp. nov.. Bu *S. A. Buturlin* 40

6. Eine neue geographische Form des Feldsperlings: Passer montanus volgensis subsp. nov. Von *S. I. Ognew* . . . 41

7. Neue Formen der Beutelmeise (Remiza). Von. *N. A. Sarudny.* 46

8. Names of the Parus cinereus Group. By *S. A. Buturlin.* 51

9. **Kurze Mitteilungen** 54

10. **Rewiew of the Russian ornithological Literature.** (Continued). By *S. A. Buturlin* 59

11. **Chronik** 70

Austausch ornithologischen Materials 77

Éditions parvenus à la rédaction 78

Inserate.

12. Ein ornithologischer Ausflug nach den Seen Saissan-nor und Marka-kul (in West-Sibirein) im Jahre 1909. (Fortsetzung). Von *G. I. Poljakow* . . . . . 93 - 140

Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб. д.
МОСКВА—1913.

Предварительный перечень птицъ Тарскаго уѣзда, Тобольской губерніи.

В. Е. Ушаковъ.

Vorläufige Liste der Vögel des Kreises Tarsk aus dem Gouvernement Tobolsk.

W. E. Uschakow.

Полное отсутствіе въ спеціальной литературѣ свѣдѣній о пернатомъ мірѣ Тарскаго уѣзда побудило меня выпустить настоящій краткій перечень птицъ [1]).

Мои двадцатилѣтнія наблюденія даютъ мнѣ смѣлость надѣяться, что списокъ этотъ будетъ болѣе или менѣе точенъ. Претендовать на исчерпывающую полноту его, разумѣется, нельзя. Я увѣренъ, что многіе виды птицъ вовсе не попали въ него, особенно изъ числа пролетныхъ, но почти можно ручаться за то, что всѣ обыкновенные виды въ списокъ вошли, а также—за то, что ни одного сомнительнаго вида не внесено въ него за №. Тѣ виды птицъ, экземпляровъ которыхъ я не имѣлъ въ рукахъ, приводятся въ спискѣ безъ №№. Гнѣзда или яйца птицъ, указанныхъ мною для Тарскаго уѣзда въ качествѣ гнѣздующихъ, имѣются въ моей коллекціи.

---

[1]) О птицахъ Тобольской губерніи извѣстно только три работы: *И. Я. Словцова*—«Позвоночныя Тюменскаго округа и ихъ распространеніе въ Тобольской губерніи» («Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи», 1892 г.), *М. Рузскаго* — «Краткій фаунистическій очеркъ южной полосы Тобольской губерніи» (1897 г.) и *К. М. Дерюгина*—«Путешествіе въ долину средняго и нижняго теченія рѣки Оби и фауна этой области» («Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей», т. XXIX, 1898 г.).

Птицы, опредѣленіе которыхъ казалось затруднительнымъ для меня, въ большинствѣ опредѣлены профессоромъ М. А. Мензбиромъ и С. А. Бутурлинымъ; эти птицы отмѣчены въ спискѣ звѣздочкой (*).

Районом̀ моихъ наблюденій послужили окрестности города Тары, радіусомъ верстъ на 50, но иногда приходилось получать экземпляры птицъ и изъ болѣе отдаленныхъ пунктовъ уѣзда.

1.* **Turdus viscivorus** Linn..—Дроздъ-деряба встрѣчается въ березовыхъ лѣсахъ праваго берега Иртыша. Гнѣздится.

2.* **Turdus philomelus** Brhm.—Дроздъ пѣвчій до 1909 года здѣсь мною не замѣчался. Въ 1909 же году добыто нѣсколько экземпляровъ весной. Позднѣе найденъ на гнѣздовьи.

3.* **Turdus iliacus** Linn..—Дроздъ-бѣлобровикъ встрѣчается на гнѣздовьи въ хвойныхъ лѣсахъ праваго берега Иртыша, а также найденъ гнѣздящимся въ кладбищенской рощѣ г. Тары.

4.* **Turdus pilaris** Linn..—Дроздъ-рябинникъ—самый обыкновенный и многочисленный изъ дроздовъ. Гнѣздится повсемѣстно. Изрѣдка зимуетъ.

5. **Turdus atrogularis** Temm..—Одинъ экземпляръ чернозобаго дрозда былъ добытъ въ сентябрѣ изъ пролетной стаи.

6.* **Saxicola oenanthe** (Linn.).—Каменка—обыкновенная, повсемѣстно гнѣздующая здѣсь птица.

7.* **Pratincola rubetra** Linn..—Самецъ этого вида былъ добытъ въ іюнѣ, повидимому, отъ гнѣзда.

8.* **Pratincola maura** (Pall.).—Азіатскій черноголовый чеканъ—обыкновенная гнѣздящаяся птица полей и луговъ.

9.* **Ruticilla phoenicurus** (Linn.).—Горихвостка встрѣчается повсемѣстно. Часто гнѣздуетъ среди города—въ садахъ и огородахъ.

10.* **Cyanecula suecica** (Linn.).—Варакушка гнѣздится здѣсь въ ограниченномъ количествѣ.

11.* **Calliope calliope** (Pall.).—Самецъ соловья-красношейки былъ добытъ въ маѣ въ Ашировской рощѣ.

12.* **Daulias philomela** Bechst..—Соловей здѣсь очень рѣдокъ. Найденъ на гнѣздовьи въ городской кладбищенской рощѣ.

13.* **Sylvia communis icterops** Ménétr..—Славка сѣрая въ значительномъ количествѣ гнѣздится въ кладбищенской рощѣ. Обыкновенна.

14.* **Sylvia curruca affinis** Blyth..—Славка-завирушка встрѣчается довольно часто. Гнѣздуетъ.

15.* **Sylvia borin** Bodd..—Славка садовая найдена въ большомъ количествѣ на гнѣздовьи въ городской кладбищенской рощѣ. Рѣже встрѣчается повсемѣстно въ березовыхъ рощицахъ.

16. **Regulus regulus coatsi** Suschkin.—Королекъ изрѣдка наблюдался осенью. Въ сентябрѣ 1911 года добыто 2 экземпляра въ Ашировской рощѣ.

17.* **Phylloscopus trochilus eversmanni** (Bp.).—Пѣночка-весничка повсемѣстно встрѣчается на гнѣздовьи.

18.* **Phylloscopus tristis** Blyth..—Сибирская пѣночка встрѣчается рѣже предыдущей, однако жъ довольно обыкновенна на гнѣздовьи.

19.* **Phylloscopus viridanus** Blyth..—Зеленая пѣночка на гнѣздовьи не рѣдка.

20.* **Hypolais icterina** Vieill..—Малиновка встрѣчается на гнѣздовьи въ березовыхъ рощахъ въ окрестностяхъ города.

21.* **Hypolais caligata** (Licht.).—Бормотушка въ большомъ количествѣ встрѣчается на гнѣздовьи въ мѣстностяхъ, поросшихъ мелкимъ кустарникомъ.

22.* **Acrocephalus dumetorum** Blyth..—Камышевка садовая довольно обыкновенна на гнѣздовьи въ городской кладбищенской рощѣ. Рѣже встрѣчается повсемѣстно, не исключая и луговъ.

23.* **Acrocephalus schoenobaenus** Linn..—Камышевка-барсучекъ встрѣчается здѣсь въ каждой зарослн камыша.

24.* **Acredula caudata** (Linn.).—Стайки длиннохвостой синицы осенью наблюдаются по лугамъ и рощамъ. Въ 1907 году найдена здѣсь на гнѣздовьи.

25.* **Parus major** Linn..—Большая синица—одна изъ самыхъ обыкновенныхъ осѣдлыхъ птицъ; гнѣздится повсемѣстно. Осенью приближается къ жилищамъ.

26.* **Periparus ater** (Linn.).—Синица-московка—обитательница хвойныхъ лѣсовъ праваго берега Иртыша. Гнѣздится. Въ незначительномъ количествѣ встрѣчается осенью.

27.* **Poecile borealis** De Selys.—Гаичка гнѣздится, большей частью, въ хвойныхъ лѣсахъ, гдѣ многочисленна.

28.* **Cyanistes cyanus** Pall..—Бѣлая лазоревка—обыкновенная гнѣздящаяся птица луговъ и чернолѣсья. Часто встрѣчается и зимой.

29. **Aegithalus** sp.?—Ремеза не встрѣчалъ, но имѣю гнѣзда этой птички, найденныя въ Тарскомъ уѣздѣ, въ долинѣ рѣки Тары.

30.* **Sitta europaeus sibirica** Pall..—Поползень—довольно обыкновенная осѣдлая птичка, гнѣздующая, большей частью, въ урманахъ праваго берега Иртыша.

31.* **Certhia familiaris** Linn..—За все время добыто два экземпляра пищухи, въ Ашировской рощѣ.

32.* **Motacilla alba** Linn..— Трясогузка — обыкновенная, часто встрѣчающаяся птица. Гнѣздится.

33.* **Budytes citreola** (Pall.).—Желтоголовая трясогузка встрѣчается здѣсь довольно рѣдко въ качествѣ гнѣздящейся птицы.

34.* **Budytes citreola werae** Buturl.. — Одинъ экземпляръ этой трясогузки былъ добытъ въ маѣ. Опредѣленіе провѣрено С. А. Бутурлинымъ.

35 и 36.* **Budytes flava** Linn. и* **Budytes f. beema** Sykes. — Обѣ разновидности желтой трясогузки здѣсь очень обыкновенны. Въ качествѣ гнѣздящихся птицъ иногда встрѣчаются въ лугахъ въ большомъ количествѣ.

37.* **Anthus pratensis** Linn..—Луговой конекъ—рѣдко встрѣчающійся видъ; всего добыто 3 экземпляра весной и осенью.

38.* **Anthus trivialis** Linn..—Лѣсной конекъ— одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и многочисленныхъ птицъ, встрѣчающаяся и гнѣздующая повсемѣстно.

39.* **Anthus cervinus** Pall.. — Одинъ экземпляръ краснозобаго конька (juv.) добытъ здѣсь въ сентябрѣ.

40.* **Anthus richardi** Vieill.. — Степной конекъ встрѣчается у насъ довольно рѣдко. Въ коллекціи имѣется нѣсколько экземпляровъ этого вида, добытые мной въ окрестностяхъ города Тары.

41.* **Oriolus oriolus** (Linn.). — Иволга—постоянно гнѣздящаяся птица березовыхъ рощицъ. Встрѣчается на гнѣздовьи и въ зарослях высокаго тальника по берегу Иртыша.

42.* **Lanius collurio** Linn..—Сорокопутъ-жуланъ—обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица.

43.* **Lanius excubitor homeyeri** Cab..—Восточный сорокопутъ — нерѣдкая гнѣздящаяся птица; изрѣдка наблюдается и зимой.

44.* **Lanius major** Pall..—Одинъ экземпляръ этого сорокопута былъ добытъ въ ноябрѣ.

45. **Bombicilla garrulus** (Linn.). — Свиристели наблюдаются осенью, зимой и въ началѣ весны, но не каждый годъ.

46.* **Muscicapa ficedula** (Linn.).— Сѣрая мухоловка очень часто попадается здѣсь на гнѣздовьи.

47.* **Muscicapa atricapilla** Linn..—Мухоловка пеструшка встрѣ-

чается рѣже предыдущей. Найдена здѣсь на гнѣздовьи въ березовыхъ рощахъ.

48.* **Hirundo rustica** Linn.. — Ласточка повсемѣстно многочисленна на гнѣздовьи. Одинъ экземпляръ опредѣленъ С. А. Бутурлинымъ, какъ H. gutturalis.

49.* **Chelidon urbica** (Linn.).—Городская ласточка во множествѣ гнѣздится среди города.

50.* **Riparia riparia** (Linn.).—Береговая ласточка громадными колоніями гнѣздится по обрывистымъ берегамъ рѣкъ и овраговъ. Особенно многочисленна по берегамъ Иртыша.

51.* **Carduelis carduelis volgensis** Buturl.. — Щеголъ, появляясь громадными стаями осенью, къ веснѣ значительно уменьшается въ численности. Въ березовыхъ рощахъ найденъ на гнѣздовьи.

52. **Coccothraustes vulgaris** Pall.. — Осенью 1911 года одинъ экземпляръ ♂ дубоноса былъ добытъ въ Ашировской рощѣ.

53.* **Passer domesticus** (Linn.).—Воробей — осѣдлая птица, во множествѣ ютящаяся около жилищъ.

54.* **Passer montanus** (Linn.). — Полевой воробей обыкновененъ здѣсь въ качествѣ осѣдлой птицы. Гнѣздится, по большей части, въ дуплахъ деревьевъ.

55.* **Fringilla coelebs** Linn..—Зябликъ — обыкновенная, гнѣздящаяся здѣсь птица.

56.* **Fringilla montifringilla** Linn.. — Юрокъ встрѣчается рѣже зяблика, хотя тоже обыкновененъ. Гнѣздуетъ.

57.* **Acanthis linaria exilipes** (Coues.). — Чечетка въ большомъ числѣ наблюдается осенью на пролетѣ. Часто встрѣчается и зимой. Въ окрестностяхъ города лѣтомъ не найдена.

58.* **Carpodacus erythrinus** (Pall.).—Чечевица повсемѣстно встрѣчается на гнѣздовьи. Избѣгаетъ большихъ хвойныхъ лѣсовъ.

59.* **Pyrrhula pyrrhula** (Linn.).— Снѣгирь, появляясь осенью въ большомъ количествѣ, держится всю зиму. Весной отлетаетъ. Самые поздніе экземпляры наблюдались 10—23. IV.

60.* **Loxia curvirostra** Linn..— Клестъ-еловикъ въ большомъ количествѣ держится въ урманѣ. Въ нѣкоторые годы осенью появляется громадными стаями въ окрестностяхъ города на огородахъ, въ садахъ и т. п. Зимой наблюдается рѣдко.

61. **Loxia bifasciata** (Brehm). — Этотъ видъ клеста попадается гораздо рѣже предыдущаго. Осенью, во время кочевокъ еловика, встрѣчается изрѣдка въ стаяхъ послѣдняго.

62.* **Emberiza aureola** Pall..—Дубровникъ — весьма обыкновен-

ная птица, встрѣчающаяся, главнымъ образомъ, въ лугахъ. Гнѣздится.

63.* **Emberiza citrinella erythrogenis** Brehm. — Желтая овсянка весной появляется ранѣе другихъ птицъ. Возможно, что одиночные экземпляры зимуютъ. Гнѣздится. По численности далеко уступаетъ слѣдующему виду.

64.* **Emberiza leucocephala** Gm.. — Овсянка бѣлошапочная въ большомъ количествѣ гнѣздится повсемѣстно.

65.* **Emberiza rustica** Pall..—Овсянка-ремезъ встрѣчается, главнымъ образомъ, на пролетахъ. Отдѣльныя особи этого вида изрѣдка здѣсь гнѣздятся.

66.* **Emberiza schoeniclus** Linn.. — Болотная овсянка гнѣздится здѣсь въ ограниченномъ количествѣ на лугахъ.

67.* **Emberiza pallasi** (Cab.).—Экземпляръ полярной овсянки добытъ лѣтомъ въ камышевыхъ зарослях вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ.

68.* **Plectrophenax nivalis** (Linn.).—Стайки подорожника появляются здѣсь съ половины сентября и держатся всю зиму; къ концу апрѣля отлетаютъ.

69.* **Otocorys alpestris flava** Gm.. — Полярный жаворонокъ встрѣчается на пролетахъ. Иногда задерживается до половины ноября.

70 и 71.* **Sturnus poltaratzkii menzbieri** Sharpe и * **Sturnus intermedius** Praz..—Обѣ формы скворца встрѣчаются здѣсь во множествѣ на гнѣздовьи.

72.* **Pastor roseus** Linn..—Самка розоваго скворца добыта здѣсь въ маѣ. Держалась она вмѣстѣ съ обыкновенными скворцами (Sturnus intermedius Praz.).

73.* **Nucifraga caryocatactes** Linn.. — Осенью добытъ 1 экземпляръ орѣховки, по опредѣленію С. А. Бутурлина, оказавшійся принадлежащимъ этой формѣ.

74.* **Nucifraga caryocatactes macrorhynchus** Brehm. — Орѣховка сибирская во множествѣ гнѣздится въ хвойныхъ лѣсахъ, гдѣ живетъ осѣдло. Осенью часто появляется въ окрестностяхъ города.

75.* **Perisoreus infaustus** (Linn.).—Кукша, подобно предыдущему виду,—обитательница хвойныхъ урмановъ праваго берега Иртыша, въ которыхъ и гнѣздится

76.* **Garrulus brandti** Eversm..—Сойка водится, по большей части, въ хвойныхъ лѣсахъ, но нерѣдка и въ березовыхъ рощахъ лѣваго берега Иртыша. Гнѣздится. Встрѣчается и зимой.

77.* **Pica pica** Linn. и **P. p. leucoptera** Gould..—Обѣ формы сороки встрѣчаются какъ осѣдлыя, при чемъ количественно преобладаетъ типичная. Молодые экземпляры P. leucoptera не отличимы отъ таковыхъ же P. pica.

78.* **Coloeus monedula collaris** (Drumm.).—Галка—многочисленная осѣдлая птица, гнѣздящаяся какъ въ самомъ городѣ, такъ и въ окрестностяхъ.

79.* **Corvus cornix charpei** Oates.—Сѣрая ворона — обыкновенный, во множествѣ гнѣздящійся видъ. На зиму отлетаетъ, хотя отдѣльныя особи изрѣдка зимуютъ.

80*. **Corvus corax** Linn..—Воронъ гнѣздится въ хвойныхъ лѣсахъ. Осенью и зимой держится въ окрестностяхъ города. Немногочисленъ.

81.* **Trypanocorax frugilegus** (Linn.).—Въ окрестностяхъ города грачъ встрѣчается лѣтомъ и осенью во множествѣ. Гнѣздуетъ верстахъ въ 40—50 къ югу отъ Тары.

82.* **Apus apus** (Linn.).—Стрижъ весной встрѣчается на пролетѣ. Гнѣздится въ хвойныхъ лѣсахъ. Въ городѣ не водится.

83.* **Caprimulgus europaeus** Linn..—Козодой на гнѣздовьи многочисленъ въ хвойныхъ урманахъ. Рѣже встрѣчается и въ лѣсостепныхъ мѣстностяхъ.

84. **Picus martius** Linn..—Желна—обыкновенная гнѣздящаяся птица хвойныхъ лѣсовъ. Иногда встрѣчается и въ березовыхъ рощицахъ, на лѣвомъ берегу Иртыша.

85.* **Dendrocopus major** Linn..—Большой пестрый дятелъ — многочисленная осѣдлая птица, гнѣздящаяся повсюду.

86.* **Dendrodromas leuconotus uralensis** (Bp.).—Дятелъ бѣлоспинный встрѣчается гораздо рѣже предыдущаго вида; для гнѣздовья предпочитаетъ березовыя рощи. Осѣдлый.

87.* **Xylocopus minor kamtschatkensis** (Malh.).—Малый пестрый дятелъ встрѣчается здѣсь довольно часто. Гнѣздится.

88.* **Picoides tridactylus uralensis** Buturl.. — Дятелъ трехпалый на гнѣздовьи встрѣчается въ хвойныхъ лѣсахъ, преимущественно въ ельникахъ. Зимой попадается вездѣ; иногда отдѣльныя особи залетаютъ даже въ городскіе сады.

89.* **Gecinus canus** Gm..—Сѣдоголовый дятелъ— довольно рѣдкая гнѣздящаяся птица. Мѣстомъ своихъ гнѣздовій, преимущественно, выбираетъ березовые лѣса.

90.* **Jynx torquilla** Linn..—Вертиголовка довольно часто попадается на гнѣздовьи въ березовыхъ рощахъ окрестностей города Тары.

91.* **Cuculus canorus** Linn..— Кукушка водится въ Тарскомъ уѣздѣ повсемѣстно.

Cuculus intermedius Vahl..—Одинъ испорченный экземпляръ ♀ малой кукушки съ готовымъ къ сносу яйцомъ въ яйцеводѣ принесли мнѣ для препаровки. Всѣ признаки птицы, какъ будто, подходили къ этому виду, но не будучи увѣренъ въ правильности опредѣленія я не рѣшаюсь помѣстить эту птицу подъ №.

92.* **Strix uralensis** Pall..—Неясыть длиннохвостая—обыкновенный осѣдлый видъ, гнѣздящійся въ урманахъ.

93.* **Strix lapponica** Retz..—Въ своемъ распространеніи на мѣстахъ гнѣздовья каменная неясыть сходится съ предыдущимъ видомъ. Зимой кочуетъ, встрѣчаясь иногда даже въ степной части уѣзда.

94.* **Nyctea nyctea** (Linn.).—Бѣлая сова появляется здѣсь осенью и держится всю зиму; исчезаетъ въ апрѣлѣ.

95.* **Surnia ulula** (Linn.).—Ястребиная сова—характерная птица для гарей урмана, гдѣ въ большомъ количествѣ гнѣздится; изрѣдка попадается и въ березовыхъ рощахъ. Осенью кочуетъ.

96.* **Cryptoglaux tengmalmi transvolgensis** Buturl..—Мохноногій сычъ встрѣчается здѣсь въ небольшомъ количествѣ въ качествѣ гнѣздящейся птицы. Гнѣздится въ хвойныхъ лѣсахъ, мелкихъ березовыхъ рощахъ, а также и въ деревенскихъ гумнахъ. Осѣдлый видъ.

97.* **Asio otus** (Linn.).—Сова ушастая—обыкновенный гнѣздящійся видъ.

98. и 99. ***Asio flammeus** Pantopp. и* **Asio f. aegolius** (Pall.).—Обѣ формы болотной совы довольно многочисленны здѣсь на гнѣздовьи.

100.* **Scops giu** Scop..—Совка найдена на гнѣздовьи въ Ашировской рощѣ.

101.* **Bubo scandiacus** Linn.. — Сибирскій филинъ — довольно обыкновенный осѣдлый видъ Тарскаго уѣзда.

102.* **Glaucidium passerinum** (Linn.).—Одинъ экземпляръ сычика былъ добытъ въ сентябрѣ въ хвойномъ лѣсу праваго берега Иртыша. Гнѣздится.

103.* **Circus aeruginosus** Linn..—Болотный лунь—одинъ изъ самыхъ многочисленныхъ видовъ гнѣздящихся здѣсь хищныхъ птицъ.

104.* **Circus cyaneus** (Linn.). — Лунь полевой — обыкновенный гнѣздящійся видъ. Одинъ экземпляръ (♂ ad.) признанъ С. А. Бутурлинымъ за переходный къ восточной расѣ C. c. taissiae But..

105.* **Circus macrurus** Gm..—Степной лунь встрѣчается здѣсь въ качествѣ гнѣздящейся птицы значительно рѣже.

106.* **Buteo desertorum vulpinus** Licht..—Канюкъ—довольно обыкновенная гнѣздящаяся птица хвойныхъ лѣсовъ праваго берега Иртыша. Осенью наблюдается въ большомъ количествѣ.

107.* **Archibuteo pallidus** Menzb..—Зимнякъ встрѣчается здѣсь въ большомъ количествѣ на пролетахъ; изрѣдка гнѣздится.

108. **Aquila chrisaëtos** (Linn.).—Орелъ-халзанъ, по разсказамъ жителей деревень, расположенныхъ среди хвойныхъ лѣсовъ на правомъ берегу Иртыша, изрѣдка встрѣчается на гнѣздовьи. Я самъ видѣлъ однажды орла, который, по моему мнѣнію, могъ принадлежать только этому виду (наблюдалъ я его съ помощью Цейссовскаго бинокля).

109.* **Aquila maculata** Gm..—Подорликъ здѣсь самый распространенный изъ орловъ; гнѣздится въ Тарскомъ уѣздѣ.

110.* **Haliaëtos albicilla** (Linn.).— Бѣлохвостъ — обыкновенная гнѣздящаяся птица долины Иртыша.

111.* **Astur palumbarius** (Linn.).—Ястребъ-тетеревятникъ встрѣчается у насъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы.

112.* **Astur candidissimus** Dyb.. — Одинъ экземпляръ бѣлаго ястреба былъ убитъ осенью 1910 года.

113. **Accipiter nisus** (Linn.).—Ястребъ-перепелятникъ въ небольшомъ количествѣ найденъ здѣсь на гнѣздовьи.

114.* **Milvus melanotis** Temm. et Schl.. — Черноухій коршунъ встрѣчается на весеннемъ пролетѣ иногда въ большомъ количествѣ. Ежегодно въ окрестностяхъ города можно найти нѣсколько гнѣздящихся паръ.

115.* **Falco peregrinus leucogenys** Brehm.. — Сапсанъ — рѣдкая гнѣздящаяся здѣсь птица. Былъ замѣченъ и зимой.

116.* **Hypotriorchis subbuteo** (Linn.).—Чеглокъ встрѣчается здѣсь въ качествѣ гнѣздящейся птицы.

117.* **Cerchneis vespertinus obscurus** Tschusi. — Кобчикъ—довольно обыкновенная гнѣздящаяся колоніями птица.

118.* **Tinnunculus tinnunculus** (Linn.). — Пустельга гнѣздится здѣсь въ большомъ количествѣ.

119. **Pandion haliaëtos** Linn..—Скопа — немногочисленная гнѣздящаяся птица долины Иртыша.

120. **Ardea cinerea** Linn..—Сѣрая цапля встрѣчается на гнѣздовьи на югъ и юго-востокъ отъ города Тары. У меня имѣются яйца этой птицы, найденныя въ 60 верстахъ отъ города.

121.* **Botaurus stellaris** (Linn.). — Выпь — рѣдкая гнѣздящаяся птица; въ нѣкоторые же годы встрѣчается у насъ въ большомъ количествѣ.

122.* **Ciconia nigra** (Linn.).—Черный аистъ спорадически гнѣздится здѣсь въ хвойныхъ лѣсахъ. На пролетахъ попадается чаще по берегамъ обширныхъ рѣкъ, озеръ и разливовъ.

123. **Melanonyx segetum** (Gm.). — Гусь-гуменникъ обиленъ на пролетѣ. Часть остается на гнѣздовье.

124. **Anser anser** Linn..—Сѣрый гусь весной наблюдается здѣсь на пролетѣ въ большомъ количествѣ. Гнѣздится.

125. **Anser albifrons** (Scop.).—Бѣлолобая казарка попадается, преимущественно, на весеннемъ пролетѣ.

126. **Branta ruficollis** (Pall.).—Краснозобая казарка встрѣчается на пролетѣ.

127. **Cygnus cygnus** (Linn.).—Лебедь-кликунъ — обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица. На пролетахъ встрѣчается большими стаями.

128.* **Cygnus bewicki** Yarr..—Малый лебедь найденъ здѣсь на весеннемъ пролетѣ.

129. **Anas boschas** Linn..—Кряква здѣсь одинъ изъ самыхъ многочисленныхъ и обыкновенныхъ видовъ утокъ; гнѣздится повсемѣстно въ Тарскомъ уѣздѣ.

130. **Chaulelasmus streperus** (Linn.).—Сѣрая утка обыкновенна здѣсь на гнѣздовьи.

131. **Spatula clypeata** (Linn.).—Соксонъ—повсюду обыкновенная гнѣздящаяся утка.

132. **Nettion crecca** (Linn.).—Чирокъ-свистунокъ своимъ повсемѣстнымъ распространеніемъ на гнѣздовьи и многочисленностью, если не превосходитъ крякву, то и не уступаетъ ей.

133. **Querquedula circia** (Linn.).—Чирокъ-трескунокъ встрѣчается рѣже предыдущаго вида. Гнѣздится.

134. **Dafila acuta** (Linn.).—Шилохвость на гнѣздовьи встрѣчается рѣже другихъ утокъ, но на пролетѣ, особенно весеннемъ, попадается во множествѣ.

135. **Mareca penelope** (Linn.).—Свіязь—обыкновенна и на пролетѣ, и на гнѣздовьи.

136. **Fuligula rufina** (Pall.).—Самецъ красноносаго нырка добытъ въ концѣ апрѣля въ 40 верстахъ отъ города Тары.

137. **Marila ferina** (Linn.).—Красноголовый нырокъ въ незначительномъ количествѣ встрѣчается повсемѣстно на гнѣздовьи.

138. **Marila fuligula** (Linn.). — Чернеть — очень обыкновенная гнѣздящаяся здѣсь птица.

139. **Clangula clangula** (Linn.).—Гоголь иногда появляется здѣсь весной большими стаями. Гнѣздится.

140.* **Harelda hyemalis** (Linn.).—Два экземпляра морянки добыто здѣсь на осеннемъ пролетѣ въ сентябрѣ и октябрѣ.

141.* **Oidemia fusca** (Linn.).—Турпанъ въ большомъ количествѣ гнѣздится на нѣкоторыхъ озерахъ Тарскаго уѣзда.

142. **Mergus merganser** Linn..—Большой крохаль обыкновененъ здѣсь на пролетахъ.

143.* **Mergus serrator** Linn..—Этотъ видъ крохаля встрѣчается на пролетѣ рѣже предыдущаго.

144. **Mergus albellus** Linn..—Лутокъ часто встрѣчается въ качествѣ обыкновенной гнѣздящейся птицы въ Тарскомъ уѣздѣ.

145.* **Columba livia** Gm..—Сизый голубь — обыкновенная осѣдлая птица; гнѣздится въ городѣ. По опредѣленію С. А. Бутурлина, ближе всего подходитъ къ расѣ C. l. neglecta Hume.

146.* **Turtur ferrago** Eversm..—Горлица не рѣдка, но распространена спорадично. Гнѣздится.

147. **Coturnix coturnix orientalis** Bogd..—Перепелка—довольно обыкновенная гнѣздящаяся птица.

148.* **Perdix cinerea robusta** Hume.—Сѣрая куропатка въ южной части уѣзда, имѣющей степной характеръ, довольно обыкновенна. Въ окрестностяхъ Тары рѣдка. Гнѣздится.

149.* **Lagopus lagopus** (Linn.).—Бѣлая куропатка—многочисленная осѣдлая птица, гнѣздящаяся по всему уѣзду. Изрѣдка попадаются экземпляры, которые принадлежатъ къ подвиду L. l. major Lorenz.

150.* **Tetrao urogallus taczanovskii** (Stejn.).—Глухарь—осѣдлый обитатель урмановъ, гдѣ гнѣздится во множествѣ. Нашъ глухарь—промежуточная форма между T. u. volgensis Buturl. и T. u. taczanovskii, но ближе подходитъ къ послѣдней.

151.* **Lyrurus tetrix viridanus** Lorenz.—Тетеревъ во множествѣ населяетъ Тарскій уѣздъ. Кромѣ осѣдлыхъ, мѣстныхъ особей, въ нѣкоторые годы появляются большими стаями залетные экземпляры.

152. **Tetrastes bonasia** (Linn.).—Рябчикъ — коренной обитатель хвойныхъ урмановъ. Водится въ громадномъ количествѣ. Какъ рѣдкость встрѣчаются выродки, описанные профессоромъ М. А. Мензбиромъ подъ именемъ T. griseiventris.

153.* **Porzana porzana** (Linn.).—Погонышъ у насъ обыкновенная гнѣздящаяся птица.

154. **Crex crex** (Linn.).—Каждый лугъ, каждая низинка, имѣющая характеръ болотца, служатъ у насъ мѣстомъ для гнѣздованія коростеля.

155.* **Fulica atra** Linn..—Лысуха гнѣздится у насъ по болѣе или менѣе обширнымъ озерамъ.

156. **Grus grus lilfordi** Sharpe. — Журавль гнѣздится по всему уѣзду, иногда въ большомъ количествѣ.

Grus leucogeranus Pall.. — Стерхъ, по словамъ крестьянъ-старожиловъ, изрѣдка встрѣчается въ западной части уѣзда.

157. **Tetrax campestris** Leach..—Стрепетъ гнѣздится въ южныхъ частяхъ Тарскаго уѣзда. Рѣдокъ.

158.* **Charadrius apricarius** Linn..—Сивка встрѣчается у насъ на пролетахъ. Немногочисленна.

159 и 160.* **Aegialitis hiaticula** (Linn.) и ***Aegialitis dubia** Scop..— Оба вида чаще встрѣчаются весной; на гнѣздовьи не найдены.

161.* **Eudromias morinellus** (Linn.). — Сивка глупая найдена на пролетѣ осенью, въ августѣ.

162. **Vanellus vanellus** (Linn.). — Чибисъ — довольно обыкновенная, повсемѣстно гнѣздящаяся птица.

163. **Haematopus ostralegus longipes** Buturl.. — Куликъ-сорока встрѣчается здѣсь иногда въ качествѣ гнѣздящейся птицы.

164.* **Phalaropus lobatus** (Linn.). — Поплавокъ чаще попадается у насъ на осеннемъ пролетѣ.

165. **Scolopax rusticola** Linn..—Вальдшнепъ въ небольшомъ количествѣ гнѣздится въ Тарскомъ уѣздѣ.

166.* **Gallinago media** (Lath.).—Дупель въ значительномъ числѣ гнѣздится по всему уѣзду.

167.* **Gallinago gallinago** (Linn.).—Бекасъ въ большомъ количествѣ повсемѣстно распространенъ на гнѣздовьи.

168. **Gallinago gallinula** (Linn.). — Гаршнепъ — рѣдкая гнѣздящаяся птица окрестностей Тары. Осенью появляется въ большомъ количествѣ.

169.* **Tringa alpina** Linn.. — Чернозобикъ найденъ нѣсколько разъ на осеннемъ пролетѣ въ стаяхъ другихъ T r i n g a.

170.* **Tringa minuta** Leisl..—Куликъ-воробей на весеннемъ пролетѣ попадается нерѣдко. Съ начала іюля появляется стайками, число которыхъ все возрастаетъ до августа.

171.* **Tringa subminuta** Midd.. — Мною добыто два іюльскихъ экземпляра длиннопалаго песочника. Судя по повадкамъ одного изъ убитыхъ экземпляровъ, можно предположить, что эти кулички гнѣздятся въ Тарскомъ уѣздѣ.

172.* **Tringa temmincki** Leisl.. — Песочникъ попадается здѣсь громадными стаями большею частью на осеннемъ пролетѣ.

173.* **Machetes pugnax** (Linn.).—На юго-западъ отъ Тары турухтанъ является многочисленнымъ, гнѣздящимся на обширныхъ рямовыхъ болотахъ, видомъ.

174.* **Totanus erythropus** (Pall.). — Щеголь рѣдко встрѣчается здѣсь на весеннемъ пролетѣ, но на осеннемъ—это многочисленная птица.

175.* **Totanus nebularius** (Gunn.). — Большой улитъ — довольно обыкновенный гнѣздящійся видъ Тарскаго уѣзда.

176. **Totanus stagnatilis** Bechst..—Поручейникъ до весны 1911 года не былъ замѣченъ. Этой же весной появился въ значительномъ количествѣ. Осенью не найденъ.

177.* **Totanus ochropus** (Linn.).—Куликъ-чернышъ—повсемѣстно распространенный, но немногочисленный гнѣздующій видъ.

178.* **Totanus glareola** (Linn.).—Этотъ куличекъ довольно многочисленъ въ Тарскомъ уѣздѣ; мной на гнѣздовьи не найденъ.

179.* **Actitis hypoleucus** (Linn.).—Перевозчикъ часто встрѣчается здѣсь въ небольшомъ количествѣ. Гнѣздится.

180. **Terekia cinerea** (Güld.). — Мородунка обыкновенно появляется у насъ въ іюлѣ и августѣ.

181.* **Pseudoscolopax taczanovskii** Verr.—Самецъ и самка бекасовиднаго веретенника были добыты въ маѣ въ окрестностяхъ Тары; у самки въ яйцеводѣ было готовое къ сносу яйцо.

182. **Limosa limosa** Linn..—Веретенникъ спорадически распространенъ на гнѣздовьи по всему уѣзду, особенно въ западной его части.

183. **Numenius phaeopus** (Linn.).—Кроншнепъ средній очень рѣдокъ. Попадается на гнѣздовьи на юго-западъ отъ Тары.

184.* **Numenius tenuirostis** Vieill..—Малый кроншнепъ раньше встрѣчался довольно часто на гнѣздовьи; въ настоящее время въ окрестностяхъ города Тары рѣдокъ.

185.* **Numenius arquatus lineatus** Cuv..—Этотъ видъ кроншнепа во множествѣ гнѣздится въ разныхъ частяхъ уѣзда.

186.* **Hydrochelidon nigra** (Linn.).—Черная крачка гнѣздится здѣсь колоніями, совмѣстно съ другими видами.

187.* **Hydrochelidon leucoptera** Schinz..—Бѣлокрылая крачка въ небольшомъ количествѣ гнѣздится вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ.

188.* **Sterna hirundo** Linn..— Крачка — многочисленная, гнѣздящаяся колоніями, птица.

189.* **Larus ridibundus** Linn..—Чайка — довольно обыкновенный гнѣздящійся видъ, распространенный повсемѣстно.

190.* **Larus minutus** Pall..—Малая чайка спорадически распространена на гнѣздовьи. Осенью залетаетъ въ ближайшія окрестности города Тары.

191.* **Larus canus niveus** Pall..—Сизая чайка—самый многочисленный видъ изъ гнѣздящихся у насъ чаекъ.

192. **Larus glaucus** Brünn..—Одинъ экземпляръ молодой (juv.) полярной чайки добытъ здѣсь въ октябрѣ 1911 года.

193.* **Urinator stellatus** Pont..—Добыты два самца краснозобой гагары на весеннемъ пролетѣ.

194.* **Urinator arcticus** (Linn.).—Чернозобая гагара здѣсь—обыкновенный гнѣздящійся видъ.

195. **Colymbus cristatus** Linn..—Большая поганка встрѣчается въ Тарскомъ уѣздѣ въ качествѣ рѣдкой гнѣздящейся птицы.

196.* **Colymbus auritus** Linn.. — Рогатая поганка обыкновенна здѣсь на гнѣздовьи; встрѣчается повсемѣстно.

О нѣкоторыхъ птицахъ Кѣлецкой губерніи.

Е. Я. Катинъ.

Uber einige Vögel des Kjelzer Gouvernements.

Von *E. I. Katin.*

(Продолженіе.—Fortsetzung.) [1]).

Камышевка рѣчная (Locustella fluviatilis Wolf).

Эта камышевка встрѣчается очень рѣдко не только на гнѣздовьи, но и на пролетахъ. За многолѣтніе поиски я нашелъ ее гнѣздящеюся только 6 разъ. Столь малое число находокъ въ теченіе 20 лѣтъ объясняется не только малочисленностью этой птички, но и очень скрытнымъ образомъ ея жизни.

Прилетаетъ рѣчная камышевка въ концѣ апрѣля и окончательно улетаетъ къ концу августа. Во время перелетовъ попадается въ паркахъ и большихъ садахъ, въ гнѣздовую же пору держится въ сырыхъ нестарыхъ лѣсахъ и по болотамъ, поросшимъ кустами и высокой густой травой; не избѣгаетъ такихъ болотъ и въ глубинѣ лѣса.

Одно изъ найденныхъ мною гнѣздъ находилось при опушкѣ молодого смѣшаннаго лѣса среди сухихъ кочекъ, на разстояніи 300 шаговъ отъ воды. Гнѣздо устраивается обыкновенно на ровномъ мѣстѣ и помѣщается въ углубленіи почвы, среди болѣе

---

[1]) См. „Орнитологическій Вѣстникъ“, 1911 г., книга III—IV, стр. 224—226. S. „Ornithologische Mitteilungen“, 1911, B. III—IV, S. 224—226.

грубой травы; края его очень немного возвышаются надъ землею. Основаніе гнѣзда имѣетъ форму чашки; выдѣлывается оно изъ сухихъ древесныхъ листьевъ, затѣмъ идутъ упругіе травяные стебли, которые не переплетаются между собою, а только укладываются и приминаются. Лотокъ выстилается мягкими травинками, а изрѣдка и конскими волосами. Гнѣздо очень похоже на соловьиное, но не такъ высоко и имѣетъ въ ширину приблизительно $3^3/_4$, а въ вышину $2^1/_2$ дюйма. Ширина лоточка $2^3/_4$, а глубина $1^1/_2$ дюйма.

Во второй половинѣ мая, когда трава достаточно поднимется, рѣчная камышевка кладетъ 4—5 яицъ. Насиживаніе, при небольшой помощи самца, продолжается около 14 дней. Самка очень привязана къ яйцамъ, но остается очень осторожною, и при приближеніи человѣка къ гнѣзду, незамѣтно сходитъ съ него и всегда отбѣгаетъ пѣшкомъ. Найдя въ первый разъ гнѣздо и желая добыть птицу, я примялъ кругомъ траву и помѣстился въ 4 шагахъ отъ него. Черезъ 15—20 минутъ напраснаго ожиданія я подошелъ къ гнѣзду и увидалъ птичку, скользнувшую по землѣ, подобно мыши. Спустя нѣсколько минутъ птичка снова была на гнѣздѣ, и снова я не могъ въ нее выстрѣлить. Подобный маневръ повторился 5 разъ. Тогда я взялъ яйца у гнѣздившейся поблизости Sylvia curruca Linn. и, замѣнивъ ими находившіяся въ гнѣздѣ, отошелъ на нѣсколько шаговъ. Минутъ черезъ десять я выстрѣлилъ въ гнѣздо и убилъ самку Locustella fluviatilis Wolf. Во время описаннаго наблюденія нѣсколько разъ прилеталъ самецъ, присаживался на 2—3 секунды на дерево и улеталъ обратно.

Дѣти въ гнѣздѣ остаются долго, почти до подъема на крылья. Наблюдая кормленіе почти оперившихся птенцовъ, я слышалъ родъ какого-то шипѣнія, издаваемаго молодыми, но голоса стариковъ не слыхалъ.

Яйца этой камышевки, большею частью, овальной формы и имѣютъ очень небольшую разницу въ концахъ. Скорлупа ихъ нѣжная, съ умѣреннымъ блескомъ и сильно просвѣчивающая. Фонъ чисто-бѣлый; у невыпущенныхъ яицъ выглядитъ розоватымъ. Накрапъ двойной, очень густъ и обыкновенно равномѣрно распредѣленъ по всей поверхности; изрѣдка онъ немного сгущается въ нижней половинѣ яйца. Слагается накрапъ изъ немногихъ мелкихъ пятнышекъ и массы крапинокъ и точекъ, изъ нихъ нижнія, не многочисленныя и слабо видимыя невооруженнымъ гла

зомъ, сѣровато-пепельнаго цвѣта,—верхній же накрапъ коричневато-краснаго или коричневато-оливковаго цвѣта. Яйца одной кладки одинаковы.

Размѣры и вѣсъ яицъ кладками.

	Длина. m.m.	*Ширина.* m.m.	*Вѣсъ.* gr.
№ 1. 16. V. 1906; Стопницкій уѣздъ.	19,4	13,9	0,12
	19,4	13,8	0,12
	19,3	14	0,115
	19,3	14	0,115
	19,2	14,1	0,115
№ 2. 23. V. 1909; здѣсь же.	20	15,1	0,14
	19,5	15	0,132
	19,3	15,1	0,132
	19,2	15	0,13
	19,1	14,2	0,11

(Продолженіе слѣдуетъ.—Fortsetzung folgt.)

Къ орнитофаунѣ Закаспійской области и сосѣднихъ съ нею частей Персіи.

Н. А. Зарудный и *С. І. Билькевичъ.*

Zur ornithologischen Fauna des Transkaspischen Gebietes und der benachbarten Teile Persiens.

N. A. Sarudny und *S. I. Bilkewitsch.*

Данныя, сообщаемыя нами въ этой статьѣ, основаны, главнымъ образомъ, на сборахъ С. І. Билькевича. Они входятъ въ составъ подготовительнаго матеріала для предпринятой нами работы „Ревизія птицъ Закаспійскаго края".

---

1. **Grus leucogeranus** Pall..

Поздно вечеромъ 9. X. 1912, карауля утокъ на маленькомъ озерѣ около Душака, С. І. Билькевичъ выбилъ бѣлаго журавля изъ прилетѣвшей пары.

2. **Caprimulgus europaeus meridionalis** Hart..

Имѣемъ мѣстовые экземпляры этого козодоя изъ Астрабада, Бендеръ-и-Гязи и Ахъ-Имама.

3. **Caprimulgus europaeus anhgeri** Zar..

E. Hartert („Die Vögel der paläarktischen Fauna") редуцируетъ этого козодоя съ C. europaeus plumipes Przew.. Пока мы

не можемъ согласиться съ этой редукціей, такъ какъ опереніе ногъ ангеровскаго козодоя одинаково съ C. e. unwini Hume. С. І. Билькевичемъ добытъ одинъ экземпляръ 5. X. 1910 около Асхабада.

4. **Dryobates major poelzami** Bogd..

Имѣемъ многочисленные экземпляры изъ Терсакана и Ахъ-Имама (лѣто 1912 года).

5. **Picus viridis karelini** Brandt.

Хорошая серія карелинскаго зеленаго дятла добыта лѣтомъ 1912 года около Гумбетъ-хоуза, Ахъ-Имама и Терсакана. Описаніе этого матеріала составляетъ предметъ отдѣльной статьи нашей.

6. **Xylocopus minor hyrcanus** subsp. nov..

Малый дятелъ Астрабадской провинціи Персіи былъ принятъ Н. А. Заруднымъ за X. m. quadrifasciatus Radde (N. Sarudny: „Verzeichnis der Vögel Persiens“) [1] безъ сравненія съ типичною птицею изъ Талыша и на основаніи трехъ экземпляровъ (2 ♂ и 1 ♀), добытыхъ въ зиму съ 1891 г. на 1892 г., въ окрестностяхъ г. Астрабадъ.

Въ настоящее время въ нашемъ распоряженіи имѣется еще два экземпляра (♂, 27. VII. 1912, Терсаканъ, и ♀, 10. V. 1912, Бендеръ-и-Гязь) изъ Астрабадской провинціи, при чемъ мы имѣемъ возможность сравнивать всѣхъ этихъ персидскихъ птицъ съ парою настоящаго X. m. quadrifasciatus, добытою зимою около Ленкорана (♂ и ♀). Какъ доказываетъ тщательное сравненіе, астрабадскіе экземпляры не могутъ быть признаны за X. m. quadrifasciatus и вотъ почему:

1. Окраска нижней стороны головы и шеи, а также всей груди, брюха и подхвостья еще болѣе темнаго и густого буроватаго цвѣта. По своему напряженію эта окраска представляется рѣзко двухтонною: гораздо болѣе темною снизу головы и на зобѣ [2] до основанія того раіона, въ которомъ начинается опятненіе,—и гораздо болѣе свѣтлою какъ въ этомъ районѣ, такъ и на остальномъ пространствѣ нижней стороны.

---

[1] „Journal für Ornithologie“, IV, 1911. *Авт.*

[2] Здѣсь одноцвѣтна съ ушными партіями. *Авт.*

2. Пестрины груди и брюха развиты сильнѣе, какъ по величинѣ, такъ и по своей напряженности. Подхвостье съ рѣзкими черными поперечными полосами. Отмѣтины боковъ задней части брюха въ гораздо болѣе сильной степени, чѣмъ у X. m. quadrifasciatus, имѣютъ наклонность становиться поперечными.

3. Черныя поперечныя полосы спины и рулевыхъ шире и болѣе рѣзки.

4. Задній край ушныхъ партій отороченъ черною полоскою, лишь у одной самки (изъ Бендеръ-и-Гязи) не доходящею до затылка (у X. m. quadrifasciatus она отсутствуетъ).

По окраскѣ крыльевъ обѣ формы сходятся: бѣлыя отмѣтины на среднихъ верхнихъ кроющихъ крыла отсутствуютъ, и только у одной самки (Бендеръ-и-Гязь)—лишь намѣчены; благодаря этой особенности, у обѣихъ формъ на сложенномъ крылѣ имѣется только четыре бѣлыхъ поперечныхъ полосы, считая отъ вершины малыхъ маховыхъ.

X. minor danfordi Harg. и X. m. colchicus But. въ нашей коллекціи отсутствуютъ. Отъ перваго нашъ X. m. hyrcanus отличается отсутствіемъ бѣлыхъ отмѣтинъ на среднихъ верхнихъ кроющихъ крыла и, судя по Э. Хартерту („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, p. 922), болѣе темнымъ оттѣнкомъ буроватаго цвѣта на нижней сторонѣ тѣла; а отъ второго, судя по Э. Хартерту (l. c.) и С. А. Бутурлину („Notes on Woodpeckers“ въ «Ежегодникѣ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ», т. XII, p. 249, 1908 г.),—главнымъ образомъ сильнымъ развитіемъ черной полоски, оторачивающей сзади ушную партію, темною окраскою нижней стороны тѣла и большею шириною черныхъ поперечныхъ полосъ на спинѣ и на рулевыхъ. По величинѣ нашъ X. m. hyrcanus совпадаетъ съ X. m. quadrifasciatus.

Вотъ размѣры нашихъ экземпляровъ.

♂	*Клювъ* (отъ угла рта). m.m.	*Клювъ* (отъ черепа). m.m.	*Крыло.* m.m.	*Хвостъ.* m.m.
1. Астрабадъ . . .	19,4	18,2	82	57
2. Ibidem.	18,9	17,6	83,8	58,2
3. Терсаканъ . . .	19,5	18,2	82	57

♀♀				
4. Астрабадъ . . .	18,4	16,7	84	58,3
5. Бендеръ-и-Гязь .	18,2	16,4	83	def.

По Э. Хартерту (l. c.), длина крыла у X. m. danfordi равняется 84,5—88 m.m., у X. m. colchicus—88—91 m.m. (по С.А. Бутурлину—84—90), у X.m. quadrifasciatus—82—89 m.m.. Загросскій X. m. morgani Zar. & Loud. имѣетъ болѣе крупные размѣры и болѣе свѣтлую окраску нижней стороны тѣла при такомъ же, какъ у X. m. quadrifasciatus, сильномъ развитіи черныхъ на ней отмѣтинъ и при ясной черной полоскѣ, оторачивающей сзади ушную партію, но до затылка, однако, не доходящей.

7. **Parus major karelini** Zar..

Parus major Linn..—Blanford: «Eastern Persia», v. II, p. 227—228, 1876 (part.).

Parus major Linn..—А. Никольскій: «Матеріалы къ познанію фауны позвоночныхъ сѣверо-восточной Персіи и Закаспійской области» («Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей», 1886 г.).

Parus major Linn..—Н. А. Зарудный: «Матеріалы для орнитологической фауны сѣверной Персіи» (Изданіе Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы, 1891 г.).

Parus major Linn..—Н. А. Зарудный: «Орнитологическая фауна Закаспійскаго края», 1896.

Parus major caspius subsp. nov..—Sarudny & Loudon: «Ornithologische Monatsberichte», 1905, p. 108—109.

Parus major aphrodite Madar.. — С. А. Бутурлинъ: «Наша охота», 1908 г., кн. X.

Parus major karelini (n. em.). — Н. А. Зарудный: «Наша охота», 1910 г., стр. 138—139.

Приводя размѣры нашихъ экземпляровъ, должны сказать, что въ списокъ помѣстили и таковые, которые, будучи своевременно записаны, принадлежатъ птицамъ, выбывшимъ изъ коллекціи. Въ размѣрахъ этихъ послѣднихъ часто пропущена длина клюва отъ ноздри и gonys, а также и ступни, такъ какъ эти части измѣрялись не между тѣми точками, какъ у громаднаго большинства. Такіе случаи обозначены знакомъ вопроса. Рядомъ съ P. major karelini приводимъ размѣры P. m. major изъ Европейской Россіи. Экземпляры располагаются по степени убыванія длины крыла. Размѣры въ миллиметрахъ.

Parus major karelini.

	Клювъ (отъ переднаго края ноздри).	Gonys.	Крыло.	Хвостъ (отъ основанія копчиковой железы).	Плюсна (сзади).
♂♂					
1) 24. IX. 1903; Гязь . .	?	?	76,3	67,6	?
2) Ib.	9	7,1	76	67,5	19,4
3) 27. VI. 1912; Терсакань	9,2	7,5	76	def.	18,4
4) 24. IX. 1904; Гязь . .	9	7,3	76	68,5	19,4
5) 7. V. 1912; Астрабадъ	8,6	def.	75,2	67,3	19
6) Ib.	9,6	8,7	74,8	68,7	18,3
7) 22. V. 1912; Гязь . .	9	7,6	74,6	65,4	18,1
8) 30. VII. 1912; Гумбетъ.	8,4	7	74	67,6	18,2
9) 7. V. 1912; Астрабадъ	9	8	74	66	18
10) 29. V. 1912; Гумбетъ	9	7	74	65,6	18

Parus major major.

	Клювъ (отъ переднаго края ноздри).	Gonys.	Крыло.	Хвостъ (отъ основанія копчиковой железы).	Плюсна (сзади).
♂♂					
1) 4. I. 1903; Псковъ . .	9,3	def.	78,3	69	19,4
2) 21. II. 1903; ib. . . .	9,2	7,3	78	69,2	19
3) 16. IX. 1902; ib. . .	9	7,3	78	69	19
4) 4. I. 1903; ib.	9,2	7,3	78	69	19,1
5) 20. IX. 1887; Оренбургъ	9,3	def.	78	72	18,4
6) 24. X. 1903; Замгофъ.	9,2	7,3	78	72,4	18,3
7) 1. XI. 1887; Оренбургъ.	8,2	6,3	77,5	def.	18,5
8) Ib.	9	7,2	77	69	18,4
9) 15. XII. 1889; ib. . .	9	7,3	76,9	70	18,8
10) 23. VIII. 1903; Замгофъ	9,3	def.	76,8	69	18,2

	Клювъ (отъ переднаго края ноздри).	*Goniys.*	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).	*Плюсна* (сзади).
♂♂					
11) 15. VI. 1912; Терсаканъ	9	7,4	74	65	18
12) 10. V. 1912; Гязь . .	def.	def.	74	def.	def.
13) 7. V. 1912; Астрабадъ	9,3	8,2	73,6	65,5	18,1
14) 11. VI. 1912; Терсаканъ	9,4	8	73,5	65,4	18,3
15) 30. VI. 1912; Ахъ-Имамъ	9,2	7,4	73,4	def.	18,3
16) 11. V. 1912; Терсаканъ	9,5	8,1	73,2	64,2	18,3
17) 24. IX. 1903; Гязь .	8,8	8	72,5	def.	18
18) Ib.	?	?	72,5	?	?
19) 15. VI. 1912; Терсаканъ	9,1	7,6	72,3	65	18
20) 5. V. 1912; Гязь . .	9	7,6	72,3	63,5	18

	Клювъ (отъ переднаго края ноздри).	*Goniys.*	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).	*Плюсна* (сзади).
♂♂					
11) 14. I. 1899; Псковъ .	8,3	6,4	76,2	69,2	19
12) Ib.	8,9	7,4	76,1	69,4	19
13) 3. I. 1886; Оренбургъ	8,2	6,3	76	69,6	18,6
14) 28. VIII. 1903; Замгофъ	9	7,4	76	69,6	19
15) 20. IX. 1887; Оренбургъ	9	7,3	75,5	69,3	18,5
16) 7. II. 1902; Псковъ .	def.	def.	75,3	def.	def.
17) 22. I. 1903; ib. . . .	8,2	6,3	75,2	70,4	19,2
18) 20. XI. 1906; Замгофъ.	8,2	6,3	74,9	70,4	18

	Клювъ (отъ переднаго края ноздри).	*Gonys.*	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія копчиковой железы).	*Плюсна* (сзади).
♂♂					
21) 19. VI. 1912; Терсаканъ	9,2	7,3	def.	def.	19,1
22) 20. V. 1904; Рустемъабадъ	9,8	7,8	72,2	64,5	18
23) 24. V. 1912; Гумбетъ .	9	7,5	72	65,4	18,5
24) 20. V. 1904; Рустемъабадъ	9,6	8	72	63,3	18,6
25) Jb.	?	?	72	62,8	?
26) 24. V. 1912; Гумбетъ .	8,9	7,5	71,5	65,3	19,2
27) 3. X. 1903; Астрабадъ	8,3	7	71,2	63	18
28) 16. V. 1904; Па-Чинаръ	?	?	70,4	61,2	?
29) 17. V. 1904; Манджиль.	?	?	70,4	61,2	?
30) 13. X. 1903; Кулямъ-Хаджи-Али	?	?	70,3	61	?

	Клювъ (отъ переднаго края ноздри).	*Gonys.*	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія копчиковой железы).	*Плюсна* (сзади).

	Клювъ (отъ переднего края ноздри).	Gonys.	Крыло.	Хвостъ (отъ основанія копчиковой железы).	Плюсна (сзади).		Клювъ (отъ переднего края ноздри).	Gonys.	Крыло.	Хвостъ (отъ основанія копчиковой железы).	Плюсна (сзади).
♂♂											
31) 5. VIII. 1912; Ахъ-Имамъ	8,7	7,3	69	61,2	17,9						
32) Ib.	8,6	7,2	68,5	61,2	17,3						
33) 19. VI. 1912; Терсаканъ	9	7,6	68,4	61	def.						
♀♀						♀♀					
1) 3. X. 1903; Астрабадъ	8,3	7	71,4	63	18	1) 12. XII. 1905; Псковъ .	8,6	7	75,4	61,5	19,2
2) Ib.	?	?	71,4	63,3	?	2) 17. XI. 1887; Оренбургъ	8,5	7	75,4	62	19,4
3) 6. V. 1912; Грязь . .	def.	def.	71	64	18	3) 8. X. 1906; Замгофъ .	8,3	7,1	75	63	19
4) Ib.	def.	def.	71	63,3	18,2	4) Ib.	8,6	7	74	64	18,3
5) 3. X. 1903; Астрабадъ	8,3	7	71	63	19	5) 17. XII. 1905; Псковъ .	8,2	6,3	73,8	63,4	18,8
6) 15. VI. 1912; Терсаканъ	9	7,3	69,8	62	18,8	6) Ib.	8,6	7,2	73,2	63	18,9

	Клюзъ (отъ переднаго края ноздри).	*Gonys.*	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).	*Плюсна* (сзади).		*Клюзъ* (отъ переднаго края ноздри).	*Gonys.*	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).	*Плюсна* (сзади).
♀♀						♀♀					
7) Ib.	8,9	7,2	69,7	62	18,7	7) 11. II. 1906; ib. . . .	8,6	7,2	73	62	19
8) 22. IX. 1903; Гязь . .	?	?	69,4	60,5	?	8) 4. I. 1886; Оренбургъ .	8,9	7,4	73	61,8	19
9) 22. IX. 1903; Гязь . .	8,5	7,3	69,8	60,7	18,5	9) 8. X. 1906; Замгофъ .	8,6	7	73	61,4	19
10) Ib.	8,5	7,3	69,2	60,5	18,4	10) 4. II. 1893; Псковъ .	8,8	7,1	72,8	60	18,8
11) 11. V. 1912; ib. . .	9	7,4	def.	def.	def.						
12) 28. VI. 1912; Терсаканъ	9	7,5	def.	def.	19,4						
13) 11. V. 1912; Гязь . .	9	7,4	69,5	def.	18,4						
14) 22. IX. 1903; ib. . .	8,6	7,2	69,5	61	18,3						
15) 11. V. 1912; ib. . . .	9	7,4	68	def.	18,4						
16) 5. VIII. 1912; Ахъ-Имамъ	8,5	7,3	67,3	61,3	17,1						
17) Ib.	8,6	7,3	67,2	61,1	18						

Кромѣ того, у насъ имѣется самка P. m. karelini съ потеряной этикеткой; ея крыло равняется—72,3 m.m..

Всѣ эти экземпляры принадлежатъ частью къ вполнѣ взрослымъ птицамъ, частью—несущимъ нарядъ первой осени, частью—перебирающимся въ этотъ послѣдній.

Считаемъ полезнымъ привести еще таблицу измѣреній молодыхъ P. m. karelini, несущихъ вполнѣ развитой первый нарядъ.

	Клювъ (отъ передняго края ноздри).	*Cauda.*	*Крыло.*	*Хвостъ.*	*Плюсна* (сзади).
♂♂					
1) 7. V. 1912; Гязь	8,3	6,6	73,3	60	19,2
2) 19. VI. 1912; Терсаканъ	8,5	7	73	65,4	18,3
3) 7. V. 1912; Гязь	8,4	6,5	73	63,6	18
4) 10. V. 1912; Астрабадъ	8	6,6	70,5	58	18
5) 14. V. 1912; ib.	8,2	7	70	58,8	def.
6) 7. VIII. 1912; Ахъ-Имамъ	8	6,6	69	58	18,6
♀♀					
1) 10. V. 1912; Астрабадъ	8	6,3	72,3	57	18,5
2) 15. VIII. 1912; Ахъ-Имамъ	8,3	def.	71,3	56,8	17,8
3) 15. VI. 1912; Терсаканъ	8,3	7	71,2	60,6	18,4
4) 14. V. 1912; Гязь	8,4	7	70,7	58,6	18
5) 6. VIII. 1912; Ахъ-Имамъ	8,5	7,2	69,8	60	17,4
6) 21. VI. 1912; Терсаканъ	7,2	5,6	68,4	55,6	17,4
7) 22. VI. 1912; ib.	9,3	7,4	67,7	55,4	17,7

Послѣдняя птичка представляетъ выродокъ: шапочка у ней не черно-сѣрая, какъ полагается у молодыхъ въ вполнѣ развитомъ первомъ нарядѣ, а коричнево-бурая; въ такой же цвѣтъ окрашена полоска, ограничивающая сзади ушныя партіи; обычное черно-сѣрое надхвостье здѣсь коричнево-буроватое; спинная и плечевыя партіи съ коричневатою примѣсью. Убита она препараторомъ С. А. Александровымъ [1]), добывшимъ въ послѣдніе годы очень много любопытнаго по части орнитологіи въ Закаспійскомъ краѣ и сопредѣльныхъ съ нимъ частяхъ Персіи. Н. А. За-

[1]) Съ Н. А. Зарудным участвовалъ въ путешествіяхъ по Персіи въ 1900—1901 и 1903—1904 гг. и служилъ у него препараторомъ въ Туркестанѣ съ 1906 по 1910 г. *Авт.*

рудный хорошо помнитъ, что во время путешествія своего въ 1885 году съ А. М. Никольскимъ добылъ въ той же Астрабадской провинціи такую же птичку.

Сопоставляя полученныя величины, видимъ, что южно-каспійская синица рѣшительно мельче обыкновенной европейской. Что касается до цвѣтовыхъ признаковъ, то въ этомъ отношеніи различій не находимъ, если не считать желтаго цвѣта, который у южно-каспійской формы часто бываетъ болѣе блѣднымъ.

E. Hartert („Die Vögel der paläarktischen Fauna") подъ названіемъ Parus major aphrodite Mad. разумѣетъ какъ Parus aphrodite, описанную Madarász'омъ съ острова Кипра и отличающуюся крайне блѣднымъ желтоватымъ цвѣтомъ (сливочнымъ), такъ и „типичную P. major", по словамъ Madarász'а, обитающую на томъ же островѣ (Term. Füzetek, XXIV, p. 272, 1901). Къ той же формѣ относитъ E. Hartert большихъ синицъ изъ Малой Азіи, принимая блѣдно-окрашенныхъ кипрскихъ за ненормальныхъ и характеризуя эту форму, на ряду съ укороченными размѣрами крыла и плюсны, болѣе насыщеннымъ желтымъ цвѣтомъ. Такъ какъ P. karelini, при меньшихъ размѣрахъ длины крыла и хвоста и развѣ лишь при чуть меньшей величинѣ плюсны, не только не отличается насыщенностью желтаго цвѣта, какъ по крайней мѣрѣ мало-азіатскія птицы, но даже имѣетъ наклонность блѣднѣть въ эту сторону по сравненію съ типичными,— то сливать ее съ P. aphrodite намъ не приходитъ въ голову.

8. **Parus major major** Linn..

7. XI. 1910 подъ Асхабадомъ добытъ самецъ большой синицы, который по своимъ размѣрамъ и по густотѣ желтаго цвѣта долженъ быть признанъ за типичную. Клювъ (отъ угла рта)—14, крыло—76,5, хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы)—72, плюсна (спереди)—20,4 m.m..

Для Закаспійскаго края это очень рѣдкая залетная птица.

9. **Poecile lugubris hyrcanus** Zar. & Loud..

Эта синица, до сихъ поръ крайне рѣдкая въ коллекціяхъ даже самыхъ громадныхъ музеевъ, добыта въ одномъ экземплярѣ 11. VII. 1912, въ окрестностяхъ Ахъ-Имама [1]). Добытая птица

[1]) Часто упоминаемыя въ этой статьѣ мѣста Терсаканъ и Ахъ-Имамъ находятся: первое въ 30 верстахъ къ югу отъ Гумбета и второе въ 120 верстахъ на юго-востокъ отъ того же пункта по рѣчкѣ Гярмъ-рудъ (притокъ Гюргена). *Авт.*

несетъ почти совсѣмъ развитой нарядъ первой осени и имѣетъ такіе размѣры (въ миллиметрахъ):

клювъ: длина отъ угла рта—11,2;
„ „ „ лба —11,4;
„ „ „ передняго края ноздри—7,6;
крыло—66;
хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы)—58;
плюсна (сзади)—15,5.

10. **Periparus ater gaddi** Zar. & Härms.

Весьма многочисленные экземпляры южно-каспійской черной синицы добыты около Ахъ-Имама и Терсакана въ іюнѣ и первой половинѣ іюля. Взрослыя птицы находятся въ линяніи крупнаго и мелкаго оперенія. Изъ молодыхъ—іюньскія несутъ вполнѣ развитой первый нарядъ, а іюльскія перебираются въ нарядъ первой осени. Весь этотъ матеріалъ вполнѣ подтверждаетъ сказанное Н. А. Зарудныхъ и С. І. Билькевичемъ на страницахъ „Орнитологическаго Вѣстника“ относительно различія между этою формою и хорасанскою черною синицею (P. ater chorassanicus Zar. & Bilk.).

11. **Cyanistes coeruleus raddei** Zar. & Loud..

Мѣстовые экземпляры, добытые лѣтомъ 1912 года около Ахъ-Имама, Терсакана, Астрабада и Бендеръ-и-Гязи, относятся именно къ этой формѣ, отличающейся отъ типичной европейской лазоревой синицы болѣе густымъ и тусклымъ желтымъ цвѣтомъ и болѣе темнымъ зеленымъ.

Измѣреній нашихъ многочисленныхъ птицъ еще не сдѣлали.

12. **Aegithalus tephronotus** Günther.

Получены С. І. Билькевичемъ лѣтніе (1912) экземпляры изъ Ахъ-Имама и Терсакана (не считая другихъ изъ давно уже извѣстныхъ мѣстонахожденій).

13. **Sitta europaea rubiginosa** Tschusi & Zar..

Получены С. І. Билькевичемъ лѣтніе экземпляры изъ тѣхъ же мѣстъ (1912).

14. **Certhia familiaris persica** Zar. & Loud..

На несомнѣнномъ гнѣздовьи найдена около Ахъ-Имама (1912).

15. **Troglodytes troglodytes hyrcanus** Zar. & Loud..

Рядъ крапивниковъ этого подвида (линяющихъ взрослыхъ и молодыхъ, носящихъ вполнѣ развитой первый нарядъ) добытъ лѣтомъ 1912 года около Ахъ-Имама и Терсакана.

16. **Butalis striata neumanni** Poche..

et

17. **Erythrosterna parva** Bechst..

Получены лѣтніе экземпляры (1912) изъ Терсакана и Ахъ-Имама.

18. **Phylloscopus collybita abietina** Nilss..

Имѣемъ одинъ экземпляръ изъ Ахъ-Имама отъ 4. VII. 1912. Это молодая птица, начавшая перебираться въ мелкомъ перѣ въ нарядъ первой осени. Здѣсь несомнѣнно гнѣздится. Для Персіи (Южно-Каспійскій участокъ) раньше была извѣстна только, какъ сомнительно гнѣздящаяся птица (N. Sarudny: „Verzeichnis der Vögel Persiens“, «Journal für Ornithologie», IV, 1911).

19. **Acrocephalus arundinaceus zarudnyi** Hart..

Въ окрестностяхъ Чатлы 9. VII. 1912 добытъ экземпляръ этого подвида въ вполнѣ развитомъ нарядѣ первой осени. Условія его пребыванія здѣсь не извѣстны. Обычная мѣстовая большая камышевка Закаспійскаго края принадлежитъ къ A. stentorea brunnescens Jerd. (= A. stentoreus H. & Ehrb. прежнихъ работъ по этой странѣ).

20. **Hipolais icterina** Vieill..

Получены многочисленные экземпляры, добытые въ іюнѣ 1912 въ окрестностяхъ Терсакана. Птица отъ 28. VI несетъ вполнѣ развитой первый нарядъ.

21. **Agrobates familiaris** Ménétr..

Экземпляры, добытые лѣтомъ 1912 года около Чатлы (Атрекскій подъ-участокъ Хорасанскаго участка), ничуть не разнятся по своей окраскѣ и размѣрамъ отъ господствующихъ типовъ другихъ странъ Закаспія и русскаго Туркестана.

22. **Turdus philomelos** Brehm.

Получено нѣсколько экземпляровъ пѣвчаго дрозда, добытыхъ въ маѣ 1912 года около Терсакана. Молодая птица отъ 17. V не-

сетъ вполнѣ развитое первое опереніе. Въ длинной серіи экземпляровъ пѣвчій дроздъ южнаго побережья Каспійскаго моря и юго-западной части Закаспійскаго края окажется несомнѣнно отличнымъ отъ типичнаго, на что однимъ изъ насъ указывалось уже давно.

23. **Merula merula aterrima** Mad..

Эта форма чернаго дрозда, широко распространенная въ Гилянѣ, Мазандеранѣ, Астрабадѣ и въ горахъ Закаспійской области и замѣняющая здѣсь настоящаго Merula merula Linn., добыта 23. V. 1912 въ Чатлы и 15. VII того же года въ Ахъ-Имамѣ.

Молодая птица изъ этого послѣдняго почти уже перебралась въ нарядъ первой осени.

24. **Luscinia megarhynchos africana** Fisch. & Rchw..

Согласно описанію этой формы соловья у E. Hartert'a (l. c.), именно къ ней должны быть отнесены мѣстовые экземпляры изъ Астрабада, Бендеръ-и-Гязь, Чатлы и Казанджика. Что касается другихъ странъ Закаспійскаго края (не считая бассейна Аму-Дарьи, гдѣ повсемѣстно обитаетъ L. megarhynchos golzii Cab.), то соловей, обозначавшійся для нихъ подъ названіемъ Daulias hafizi въ смыслѣ точности опредѣленія подлежитъ большому сомнѣнію.

25. **Luscinia luscinia** Linn..

Экземпляръ, добытый 13. VIII. 1912 около Ахъ-Имама, принадлежитъ взрослой птицѣ въ вполнѣ развитомъ осеннемъ нарядѣ. Конечно, это пролетная птица.

26. **Garrulus hyrcanus** Blanf..

Многочисленные экземпляры, добытые на мѣстахъ гнѣздовья лѣтомъ 1912 года въ окрестностяхъ Гумбетъ-хоузъ и Ахъ-Имама, относятся къ этой формѣ сойки.

27. **Passer hispaniolensis transcaspicus** Tschusi.

Имѣемъ мѣстовые экземпляры изъ Чатлы и Терсакана.

28. **Coccothraustes coccothraustes nigricans** Buturl..

Имѣемъ экземпляры отъ 21. VI. 1912 изъ Терсакана.

Новая форма тростниковой камышевки.

В. В. Станчинскій.

Acrocephalus streperus intermedius subsp. nov..

Von *W. W. Stantschinski.*

Экскурсируя въ серединѣ іюля 1901 года въ Ельнинскомъ уѣздѣ, Смоленской губерніи, я убилъ на озерѣ близъ села Шмакова взрослую ♀ камышевки, которую опредѣлилъ какъ Acrocephalus streperus. Птица сохранена не была, такъ какъ оказалась совершенно разбитой. По повадкамъ и мѣстонахожденію, добытая камышевка рѣзко отличалась отъ многочисленныхъ въ этой мѣстности Acrocephalus palustris. Два экземпляра молодыхъ камышевокъ, добытыхъ мною въ томъ же году въ Рославльскомъ уѣздѣ, были опредѣлены мною тоже какъ Acrocephalus streperus. На основаніи этихъ данныхъ я и писалъ въ 1901 году въ своемъ краткомъ отчетѣ Московскому Обществу Испытателей Природы о распространеніи Acrocephalus streperus въ Смоленской губерніи.

Въ Москвѣ я сравнилъ добытыхъ мною молодыхъ комышевокъ съ молодыми Acrocephalus palustris и Acrocephalus streperus коллекцій профессора М. А. Мензбира и профессора П. П. Сушкина, при чемъ выяснилось, что добытыя мною въ Рославльскомъ уѣздѣ молодыя камышевки ничѣмъ рѣшительно не отличаются отъ молодыхъ Acrocephalus palustris.

Будучи однако увѣренъ, что добытая мною 12.VII.1901 въ Ельнинскомъ уѣздѣ взрослая самка была тростниковой камышевкой, я въ іюнѣ слѣдующаго (1902) года предпринялъ детальное

обслѣдованіе озера Шмаковскаго. Въ верховьяхъ этого озера, при сліяніи двухъ рѣчекъ, въ обширныхъ зарослях тростника (Phragmites) я услышалъ пѣніе камышевокъ, рѣзко отличавшееся отъ пѣнія Acrocephalus palustris быстротой темпа и обиліемъ цикающихъ и тиркающихъ звуковъ. Пространство, занятое тростникомъ, было залито водой и съ одной стороны выходило на озеро, а съ другихъ—было окружено непролазной чащей ольхи и лозы. Въ зарослях тростника я обнаружилъ двѣ пары камышевокъ. Самцы все время пѣли, перелетая съ мѣста на мѣсто, и иногда дрались другъ съ другомъ. Самки появлялись рѣдко и сейчасъ же скрывались. Судя по тому, что самцы, а чаще самки, пробирались тростникомъ съ насѣкомыми въ клювѣ, нужно думать, что у камышевокъ уже вывелись дѣти. Къ сожалѣнію, гнѣздъ мнѣ найти не удалось; вѣроятно, они помѣщались въ той части тростниковыхъ зарослей, гдѣ вода была настолько глубока, что пробраться туда не было никакой возможности. Тщательно изучивъ голосъ и повадки камышевокъ, я добылъ обоихъ самцовъ. Такой же точно экземпляръ добытъ былъ мной въ томъ же году въ Порѣчскомъ уѣздѣ, въ зарослях озера Бахова.

Эти экземпляры я сравнилъ съ камышевками коллекцій профессора М. А. Мензбира и профессора П. П. Сушкина и пришелъ къ заключенію, что мы имѣемъ дѣло съ новой расой Acrocephalus streperus. Необходимо было поближе познакомиться съ біологіей типичной расы этого вида, такъ какъ именно въ этомъ отношеніи мои камышевки рѣзко отличались отъ Acrocephalus palustris. Во время своего пребыванія въ юго-западной Германіи я подробно изучилъ біологію типичныхъ Acrocephalus streperus, при чемъ нашелъ, что и голосъ, и повадки ихъ ничѣмъ рѣшительно не отличаются отъ смоленскихъ камышевокъ.

Чтобы окончательно установить различія моихъ камышевокъ отъ типичныхъ и отъ туркестанскихъ Acrocephalus streperus macronyx (Sev.) мною въ самое послѣднее время были просмотрѣны экземпляры коллекціи Академіи Наукъ.

Такъ какъ по окраскѣ и по пластическимъ признакамъ мои камышевки занимаютъ какъ разъ промежуточное мѣсто между типичными Acrocephalus streperus (Vieill.) и Acrocephalus palustris (Bechst.), то я и назвалъ ихъ Acrocephalus streperus intermedius subsp. nov..

Вотъ описаніе этого подвида.

Вся верхняя сторона бураго цвѣта съ яснымъ рыжеватымъ, а не оливковымъ оттѣнкомъ, какъ то мы наблюдаемъ у Acrocephalus palustris; надхвостье одного цвѣта со спиной, у нѣкоторыхъ особей съ болѣе яснымъ рыжеватымъ оттѣнкомъ, но не рыжее, какъ у типичныхъ Acrocephalus streperus streperus. Рыжеватый оттѣнокъ особенно ясно выступаетъ на сильномъ, напримѣръ, солнечномъ свѣту. Низъ палевый, на бокахъ, груди и подхвостьи съ болѣе или менѣе выраженнымъ охристымъ налетомъ. Бровь неясная, палеваго цвѣта.

Клювъ по формѣ и силѣ близокъ къ таковому типичныхъ, но нѣсколько слабѣе. Щетинки у клюва развиты слабѣе, чѣмъ у Acr. palustris, такъ же какъ и у типичныхъ. Вырѣзка на внутреннемъ опахалѣ второго махового лежитъ между 7-мъ и 9-мъ маховыми, тогда какъ у Acr. palustris она лежитъ между 5-мъ и 8-ымъ маховыми, а у Acr. streperus streperus между 8-мъ и 10-ымъ.

Первое маховое короче или равно большимъ кроющимъ крыла; третье маховое самое длинное; второе маховое длиннѣе четвертаго.

Размѣры моихъ трехъ экземпляровъ изъ Смоленской губерніи слѣдующіе:

	Клювъ: culmen.	*Клювъ:* culmen denudatum.	*Клювъ:* отъ ноздри.	*Плюсна.*	*Крило.*	*Хвостъ.*
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
№ 1. ♂, 22. V. 1902	17,1	11,5	8,4	22,4	65,6	57
№ 2. ♂, 24. VI. 1902	17,5	11.9	8,7	23.5	68.4	57
№ 3. ♂, 24. VI. 1902	17,2	11.8	8,6	22,5	65,4	55,5

Изъ просмотрѣнныхъ мною экземпляровъ коллекціи Музея Академіи Наукъ къ этому подвиду должны быть отнесены тростниковыя камышевки, собранныя Березовскимъ въ Волынской губерніи (Суражъ), часть камышевокъ коллекціи Сомова изъ Харьковской губерніи, въ которой однако преобладаютъ переходныя къ типичной [1]).

[1]) Въ 1902 году къ этому же подвиду я отнесъ тростниковыхъ камышевокъ изъ Тульской губерніи, добытыхъ профессоромъ П. П. Сушкинымъ, и экземпляры изъ Поти и Батума коллекціи профессора М. А. Мензбира. Къ сожалѣнію, я не имѣлъ возможности пересмотрѣть эти экземпляры въ послѣднее время. Тростниковыя камышевки изъ Оренбургскаго края, какъ то можно судить по описанію Н. А. Заруднаго („Дополненія къ орнитологической фаунѣ Оренбургскаго края", стр. 30 и 31), быть можетъ хотя отчасти относятся къ нашему подвиду. *Авт.*

Привожу размѣры промѣренныхъ мною взрослыхъ экземпляровъ изъ Волынской губерніи, Кременчугскаго уѣзда [1]).

	Клювъ: culmen.	*Клювъ:* culmen denudatum.	*Клювъ:* отъ ноздри.	*Плюсна.*	*Крыло.*	*Хвостъ.*
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♂, 3. VI. 1889, Суражъ	17,3	11,4	9,1	22,5	65	54
♀, 25. VI. 1889, Суражъ	17,6	12	9,4	23,6	65	53

E. Hartert въ своей работѣ „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ (S. 561) въ качествѣ самостоятельнаго подвида выдѣляетъ Acrocephalus streperus macronyx (Sev.). Признаки этой расы слѣдующія: „weniger röstliche, etwas mehr ins olivenbräunliche ziehende Oberseite“, чѣмъ она очень похожа на A. palustris, и „blassere Körperseiten und Unterschwanzdecken“. Видѣнные мной въ коллекціяхъ профессора М. А. Мензбира и Музея Академіи Наукъ экземпляры тростниковой камышевки Туркестана дѣйствительно отличаются отъ типичныхъ почти полнымъ отсутствіемъ рыжаго оттѣнка, который замѣненъ у нихъ на спинѣ оливковымъ, и слабо замѣтенъ лишь на надхвостьи. Этимъ онѣ отличаются и отъ моихъ A. streperus intermedius. Гораздо болѣе рѣзкимъ отличительнымъ признакомъ этой восточной расы являются размѣры.

Вотъ промѣры экземпляровъ этой расы изъ Музея Академіи Наукъ [1]).

	Клювъ: culmen.	*Клювъ:* culmen denudatum.	*Клювъ:* отъ ноздри.	*Плюсна.*	*Крыло.*	*Хвостъ.*
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♂, 3. V. 1862, Гурьевъ	18,4	13,8	9,9	24,5	69	59
♂, 11. V. 1878, Чиназъ	17,6	13	9,7	22,5	65	56,5
♂, 8. IX. 1876, Тянь-Шань	18,4	13,6	10	24,3	71	62

Молодыя птицы всѣхъ трехъ подвидовъ не отличимы. Весьма трудно отличить ихъ и отъ молодыхъ Acrocephalus palustris, которыя выдѣляются лишь меньшей интенсивностью и нѣ-

[1]) Размѣры этихъ экземпляровъ уже были приведены Ѳ. Д. Плеске въ его „Ornithographia Rossica“, стр. 530. Однако размѣры птицъ, особенно мелкихъ, всегда бываютъ нѣсколько субъективны, что зависитъ, какъ отъ манеры измѣрять, такъ и отъ отсутствія опредѣленныхъ точекъ для измѣреній; потому я и привожу свои измѣренія, которыя дѣйствительно нѣсколько отличаются отъ таковыхъ Ѳ. Д. Плеске.
Авт.

которой блѣдностью рыжаго тона. Относительно хорошій отличительный признакъ взрослыхъ экземпляровъ обоихъ видовъ—положеніе вырѣзки на внутреннемъ опахалѣ второго махового—у молодыхъ птицъ выраженъ очень слабо, а иногда даже вовсе отсутствуетъ. Замѣчу кстати, что и у взрослыхъ Acrocephalus palustris положеніе вырѣзки подвержено значительнымъ колебаніямъ. Такъ, среди экземпляровъ коллекціи Музея Академіи Наукъ мною было найдено всего 11 взрослыхъ экземпляровъ несомнѣнно этого вида, у которыхъ вырѣзка находилась или на одной высотѣ съ 8-мъ маховымъ, или даже за 8-ымъ и 9-ымъ маховыми. Среди нихъ были и самцы, и самки, добытые изъ разныхъ мѣстъ отъ Австріи до Енисейской губерніи.

Такимъ образомъ видъ Acrocephalus streperus распадается на три подвида, изъ которыхъ типичный—Acrocephalus streperus streperus—распространенъ въ Западной Европѣ, Польшѣ и, быть можетъ, въ остзейскихъ провинціяхъ, а также въ западной части южной Россіи.—Слѣдующая среднерусская форма—Acrocephalus streperus intermedius—распространена далѣе на востокъ отъ Подольской губерніи черезъ Полѣсье, губерніи Смоленскую, Орловскую, Тульскую на востокъ до Волги и, быть можетъ, до Оренбургской губерніи. Впрочемъ, границы этой расы еще не могутъ быть установлены сколько-нибудь точно. Возможно, что именно эта форма тростниковой камышевки распространена и на Кавказѣ. Восточнѣе эта форма замѣнена большеклювой камышевкой—Acrocephalus streperus macronyx,—границы которой на востокѣ, югѣ и сѣверѣ пока еще не могутъ быть опредѣлены. На западъ она идетъ, повидимому, до устья Волги, на что указываетъ E. Hartert; во всякомъ случаѣ именно къ этой формѣ относится экземпляръ тростниковой камышевки изъ-подъ Гурьева въ Музеѣ Академіи Наукъ.

По даннымъ E. Hartert'a, къ этой же формѣ относятся камышевки Персіи и Белуджистана и, вѣроятно, видѣнные мной въ коллекціи профессора М. А. Мензбира экземпляры изъ Батума и Поти.

Во всякомъ случаѣ для опредѣленія точныхъ границъ распространенія всѣхъ трехъ расъ тростниковой камышевки время еще не настало, тѣмъ болѣе, что наиболѣе рѣзкимъ отличительнымъ признакомъ двухъ близкихъ видовъ пока остается біологія, а расовыя различія требуютъ матеріала для сравненія.

A. streperus streperus.	*A. streperus intermedius.*	*A. streperus macronyx.*	*A. palustris.*
Верхъ бурый съ рыжеватымъ оттѣнкомъ; надхвостье рыжее.	Верхъ свѣтлѣе, бурый съ рыжеватымъ оттѣнкомъ; надхвостье одного цвѣта со спиной или едва замѣтно рыжѣе.	Верхъ свѣтло-бурый съ оливковымъ оттѣнкомъ; надхвостье чуть рыжеватое.	Верхъ свѣтло-бурый съ яснымъ оливковымъ оттѣнкомъ. Надхвостье одного цвѣта со спиной, но свѣтлѣе.
Низъ палевый, бока и подхвостье ржаво-охристые.	Низъ палевый, бока, подхвостье и середина груди охристые.	Низъ палевый съ слабымъ охристымъ налетомъ на бокахъ и подхвостьѣ.	Низъ палевый съ охристымъ налетомъ на груди и бокахъ.
Клювъ относительно сильный.		Клювъ сильный.	Клювъ слабѣе.
Culmen 17 — 18 m.m.	Culmen 17—17,5 m.m.	Culmen 17,5—18,5 m.m.	Culmen 16—17,5 m.m.
Длина клюва (отъ ноздри) 8,5 — 9,5 m.m.	Длина клюва (отъ ноздри) 8,4 — 9,5 m.m.	Длина клюва (отъ ноздри) 9,8 — 10 m.m.	Длина клюва (отъ ноздри) 7,8—9 m.m.
Вырѣзка на второмъ маховомъ лежитъ между 8-мъ и 10-мъ маховыми.	Вырѣзка на второмъ маховомъ лежитъ между 7-мъ и 9-мъ маховыми.	Вырѣзка на второмъ маховомъ лежитъ между 7-мъ и 10-мъ маховыми.	Вырѣзка на второмъ маховомъ лежитъ между 5-мъ и 8-мъ маховыми.
Формула маховыхъ: $3>4\geqslant 2$.	Формула маховыхъ: $3>4\geqslant 2$.	Формула маховыхъ: $3>4\geqslant 2$.	Формула маховыхъ: $3>4\geqslant 2$.

Уссурійская большеклювая ворона.

С. А. Бутурлинъ.

Corvus macrorhynchus mandshuricus subsp. nov..

By C. A. Buturlin.

Энергичный изслѣдователь Уссурійскаго края штабсъ-капитанъ В. К. Арсеньевъ добылъ въ долинѣ рѣки Самарги два экземпляра этой птицы: 21 ноября 1908 года самца и 16 ноября (ст. ст.)—безъ опредѣленія пола. По сравненію съ двумя имѣющимися у меня экземплярами японской расы—C. m. japonicus Bp., оказывается, что послѣдняя крупнѣе. Что результатъ этотъ не случайный, вслѣдствіе малочисленности экземпляровъ, доказывается тѣмъ, что размѣры моихъ японскихъ птицъ сходны съ даваемыми Зибомомъ въ его работѣ о птицахъ Японіи, и что и др. Хартертъ отмѣчаетъ сравнительно мелкій ростъ континентальныхъ птицъ. Различать эти двѣ расы проще всего такъ: у японской наибольшая глубина нижней челюсти больше 11 m.m., а наибольшая высота верхней челюсти (отъ средней линіи хребта до рѣжущаго края по прямой) противъ середины ноздрей—болѣе 19-ти m.m., а у C. m. mandshuricus эти измѣренія меньше указанной границы. Южно-азіатская C. m. levaillanti Less. еще гораздо мельче: послѣднее измѣреніе меньше 16 m.m..

Corvus macrorhynchus mandshuricus of Ussuri land has lighter bill, than C. m. japonicus Bp.: maximal depth of mandibula less than 11 millim., and heighth of maxilla opposite nostrils less than 19 millim..

Новый подвидъ полевого воробья.

С. И. Огневъ.

Eine neue geographische Form des Feldsperlings: Passer montanus volgensis subsp. nov..

S. I. Ognew.

Во время непродолжительной весенней поѣздки въ дельту Волги, организованной въ мартѣ 1912 года *Б. М. Житковымъ*, мнѣ удалось добыть небольшую серію полевыхъ воробьевъ, сразу обратившихъ на себя мое вниманіе особенностями окраски. При тщательномъ сличеніи съ большими серіями типичныхъ Passer montanus montanus Linn. быстро выяснился рядъ признаковъ, дифференцирующихъ воробья волжской дельты въ особый подвидъ. Отъ средне-русскаго полевого воробья Passer montanus volgensis subsp. nov. отличается общимъ болѣе сѣрымъ тономъ окраски всей верхней стороны. Этотъ оттѣнокъ особенно замѣтно сказывается на перьяхъ спины. Здѣсь каждое перо характеризуется широкимъ сѣроватымъ краевымъ ободомъ, придающимъ всей спинной области замѣтный сѣроватый оттѣнокъ, рѣзко отличающійся отъ рыжевато-каштановыхъ краевъ спинныхъ перьевъ типичнаго Passer m. montanus Linn.. Далѣе, поясница и рулевыя перья гораздо сѣрѣе, чѣмъ у обычнаго полевого воробья. Наконецъ, характернымъ цвѣтовымъ признакомъ является окраска шапочки. У всѣхъ добытыхъ мною экземпляровъ новаго подвида она удивительно однообразна и отличается темнымъ коричневымъ цвѣтомъ, съ очень рѣзко выраженнымъ сѣро-лиловатымъ оттѣнкомъ. Интересно отмѣтить, что по тону шапочки замѣчается наибольшее сходство съ цвѣтомъ ея у восточно-сибирскаго воробья, таксономическое значеніе котораго еще требуетъ дальнѣйшаго выясненія и котораго большинство

авторовъ считаетъ за Passer montanus saturatus Stejn.. Помимо чисто цвѣтовыхъ признаковъ, воробей волжскихъ низовій легко отличается отъ типичнаго своими меньшими размѣрами. Такъ, клювъ новаго подвида замѣтно короче, чѣмъ у Passer montanus montanus Linn.; то же надо сказать и про длину крыла, хвоста и плюсны.

Остается выяснить взаимоотношенія волжскаго воробья и Passer montanus transcaucasicus Buturl. [1]). По С. А. Бутурлину, послѣдній подвидъ отличается отъ типичныхъ замѣтно болѣе бѣловатымъ брюхомъ, а также нѣсколько болѣе свѣтлымъ оттѣнкомъ верхней стороны. Отъ туркестанскаго Passer montanus dilutus Richm. закавказскія птицы дифференцируются своей сѣроватой, а не желтоватой поясницей и сѣроватымъ, а не охристымъ налетомъ боковъ. Кромѣ того, закавказскій воробей меньше типичнаго.

Благодаря любезности С. А. Бутурлина, приславшаго мнѣ всѣхъ воробьевъ своей коллекціи, среди которыхъ было нѣсколько Passer montanus transcaucasicus But., я могъ сравнить этотъ подвидъ съ вновь найденнымъ мною. Тщательный просмотръ серій показалъ мнѣ, что Passer montanus volgensis subps. nov. по окраскѣ отличается отъ закавказскаго воробья еще болѣе замѣтно, чѣмъ отъ типичнаго. Это сразу отнимаетъ возможность считать новый подвидъ переходной формой.

Итакъ, волжскій воробей отличается отъ P. m. transcaucasicus But. отсутствіемъ желтовато-глинистаго оттѣнка спины, который характеренъ для послѣдняго подвида. Далѣе, основанія перьевъ спины, помимо черной полосы, проходящей по конечной части одного изъ опахалъ каждаго пера, у закавказскаго воробья глинисто-буроватыя съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Совершенно иной видъ имѣютъ они у волжскаго воробья, отличаясь своимъ тусклымъ сѣровато-каштановымъ цвѣтомъ. Поясница Passer montanus volgensis subsp. nov. замѣтно сѣрѣе, чѣмъ у закавказскаго подвида, а шапочка много темнѣе и очень рѣзко отличается своимъ лиловато-сѣрымъ оттѣнкомъ, тогда какъ у послѣдняго она даже свѣтлѣе, чѣмъ у типичнаго. Что касается до болѣе бѣловатаго брюха Passer montanus transcaucasicus But., признака, которому С. А. Бутурлинъ придаетъ особое значеніе, то дѣйствительно это отличіе можетъ быть констатировано на серіи и является общимъ съ моимъ новымъ подвидомъ. Спѣшу отмѣтить

[1]) „The Ibis“, 1906, p. 423.

только, что къ этому признаку надо относиться довольно осторожно. Дѣло въ томъ, что болѣе свѣтлая брюшная сторона птицы легко пачкается и дѣлается поэтому темнѣе своей дѣйствительной окраски. По размѣрамъ волжскій воробей стоитъ ближе къ закавказскому, чѣмъ къ типичному. Въ короткихъ словахъ діагнозъ Passer montanus volgensis subsp. nov. можетъ быть резюмированъ слѣдующимъ образомъ. *Этотъ подвидъ отличается: своимъ тусклымъ сѣрымъ тономъ спины, съ сѣро-каштановыми основаніями перьевъ этой области; сѣрой поясницей и рулевыми перьями; очень темной буро-лиловато-сѣрой шапочкой и мелкими общими размѣрами.* Серія въ пять экземпляровъ этого подвида была добыта мною 21, 22 и 26 марта 1912 года въ порослякъ камышей на островахъ по берегамъ Никиткинаго банка (пролива), въ западной части волжской дельты, въ 7 верстахъ отъ взморья. Въ этотъ періодъ воробьи, вѣроятно, уже гнѣздились въ камышахъ и своими звонкими криками, показавшимися мнѣ болѣе громкими, чѣмъ щебетанье обычнаго Passer montanus Linn., сразу обращали на себя вниманіе.

Изъ литературныхъ свѣдѣній имѣется послѣднее новое указаніе на распространеніе полевого воробья по волжской дельтѣ въ работѣ В. Н. Бостанжогло [1]), который считалъ его обычнымъ Passer montanus Linn.. Эта неожиданная находка новаго подвида въ мѣстности, которая уже видѣла много изслѣдователей, невольно заставила меня обратиться къ просмотру серій воробьевъ, любезно присланныхъ мнѣ С. А. Бутурлинымъ и Г. Э. Іоганзеномъ, а также воробьевъ, имѣющихся въ большомъ количествѣ у Г. И. Полякова. Отъ послѣдняго я получилъ не только любезное разрѣшеніе воспользоваться экземплярами его коллекціи, но и нѣсколько цѣнныхъ указаній относительно описываемаго мною подвида и потому считаю долгомъ выразить ему здѣсь особую благодарность. Это болѣе детальное знакомство съ разными представителями полевыхъ воробьевъ ясно показало наклонность къ большой измѣнчивости этой птицы, яркую дифференцировку ея на хорошо выраженные подвиды, связанные переходными формами. Своимъ результатамъ этого просмотра я думаю посвятить особую статью.

Въ заключеніе привожу измѣренія Passer montanus volgensis subsp. nov. параллельно съ таковыми близкихъ къ нему формъ.

[1]) В. Н. Бостанжогло: „Орнитологическая фауна Арало-Каспійскихъ степей“. („Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской имперіи“, отд. зоолог., вып. XI, 1911.), стр. 236—237.

	Длина крыла.	*Длина хвоста.*	*Длина плюсны.*	*Сидѣт.*	*Длина клюва:* отъ передняго края ноздри до конца верхней челюсти.	*Длина клюва:* отъ разрѣза рта до конца верхней челюсти.
	m.m.	*m.m.*	*m.m.*	*m.m.*	*m.m.*	*m.m.*
Passer montanus volgensis subsp. nov..						
1. ♂; 22. III. 1912; заросли камыша по берегамъ Никиткина банка, западная часть дельты Волги.	70	57	16,1	12,2	8,8	12,1
2. ♀; 22. III. 1912; ibidem	67,4	59,4	17,6	12	8,7	11,4
3. ♀; 26. III. 1912; ibidem	67,3	58,5	16,3	12,2	8,7	12
4. ♂; 21. III. 1912; ibidem	69,3	59	16,6	12,8	9,1	11,7
5. ♂; 26. III. 1912; ibidem	70,9	57,2	16	12,4	8,4	11,6
Passer montanus transcaucasicus But..						
1. ♂; 14. III. 1882; Тифлисъ; г. Г. Радде (коллекція Зоологическаго Музея Московскаго Университета) .	69,4	63,2	16,7	12,3	8,3	11,5
2. ♂; 9. VII. 1904; Тифлисская губернія, Горійскій уѣздъ; А. Кобылинъ (t y p u s, коллекція С. А. Бутурлина)	70,2	57,3	16,9	13,7	9,5	13,6
3. ♀; 18. III. 1905; Ахалцыхскій уѣздъ, окрестности Ахалцыха, Тифлисская губернія; А. Кобылинъ (коллекція С. А. Бутурлина).	66	62,7	15,5	12	9,2	12,3
4. ♀; 18. III. 1905; ibidem	66,5	59	16,3	11,7	8,9	11
5. ♀; 1. XII. 1904; Ахалцыхъ, долина р. Посконъ-Чай; А. Кобылинъ (коллекція С. А. Бутурлина)	68,2	59,2	14,9	11,7	8,4	11,2
6. ♀; 15. V. 1907; Кубанская область (коллекція В. Б. Баньковскаго)	65,3	56	15,6	12,5	9	11,5

	Длина крыла.	*Длина хвоста.*	*Длина плюсны.*	*Culmen.*	*Длина клюва:* отъ переднято края поздри до конца верхней челюсти.	*Длина клюва:* отъ разрѣза рта до конца верхней челюсти.
	m.m.	*m.m.*	*m.m.*	*m.m.*	*m.m.*	*m.m.*
Passer montanus montanus Linn..						
1. ♀; 12 января; Московская губернія; Ѳ. К. Лоренцъ (коллекція Зоологическаго Музея Московскаго Университета)	70	62,4	17,8	13,4	9,7	13,5
2. ♀; январь; Воробьевы горы, близъ Москвы; К. А. Сатунинъ (ibid.) .	70	59,2	16,2	13,5	9,3	12,5
3. ♀; 21 января; Московскій уѣздъ; Ѳ. К. Лоренцъ (ibidem)	71,6	60	18,5	13,8	9,8	12,4
4. ♂; 3. II. 1887; Москва: Ѳ. К. Лоренцъ (ibidem)	73,4	62,5	19,8	13,5	9,6	12,5

Новыя формы ремезовъ (Remiza).

Н. А. Зарудный.

Neue Formen der Beutelmeise (Remiza).

N. A. Sarudny.

В. Н. Бостанжогло во время одного изъ путешествій своихъ по Арало-Каспійскимъ степямъ добылъ въ 1907 году на среднемъ теченіи Урала и въ его устьяхъ рядъ ремезовъ, отнесенныхъ имъ („Орнитологическая фауна Арало-Каспійскихъ степей“ [1])) къ A. pendulinus castaneus Sev., при чемъ замѣчаетъ, что на побережьѣ моря, въ устьяхъ Урала, эти птички, „лишенныя лѣсныхъ богатствъ рѣчной уремы, *обитаютъ камыши и строятъ среди нихъ свои гнѣзда*“ [2]). По мнѣнію В. Н. Бостанжогло, „въ этой приспособляемости къ имѣющимся налицо условіямъ кроется одна изъ біологическихъ особенностей каспійскаго ремеза“. Къ сожалѣнію, уважаемый авторъ ничего не говоритъ о гнѣздахъ этихъ камышевыхъ обитателей. Несомнѣнно, эти гнѣзда, свитыя среди камышей, должны рѣзко отличаться отъ обычныхъ, устроенныхъ на деревьяхъ, и по способу прикрѣпленья и по матеріалу. Дѣлая обзоръ своего матеріала, В. Н. останавливается на двухъ экземплярахъ, настолько отличающихся отъ остальныхъ размѣрами и окраской, что производятъ впечатлѣніе гибридовъ A. castaneus съ A. macronyx. По этому поводу В. Н. замѣчаетъ: „Если мы дѣйствительно имѣемъ здѣсь случай

[1]) „Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи“, отд. зоол., вып. XI, 1911 г. *Авт.*

[2]) Курсивъ мой. *Авт.*

такой гибридизаціи, то отъ Aeg. macronyx оказались бы неунаслѣдованными тупость клюва и увеличенная длина перваго махового, при передачѣ общей длины тѣла и его массивности". *Объ птицы добыты 26 апрѣля въ камышахъ близъ устьевъ Урала и представляютъ брачныхъ самца и самку* [1]).

На этихъ же удивительныхъ экземплярахъ останавливается и профессоръ М. А. Мензбиръ („Обзоръ ремезовъ туркестанско-сибирской фауны" [2])). Относительно самца онъ говоритъ: „Хотя по размѣрамъ и окраскѣ этотъ экземпляръ и напрашивается на сравненіе съ R. macronyx, тѣмъ не менѣе едва ли есть основаніе считать его за что-либо другое, кромѣ крупнаго и нѣсколько темнѣе окрашеннаго R. p. caspia". Про самку же заявляетъ: „Какъ видно, самка также крупна, но клювъ у нея, какъ и у самца, острый. Окраска нормальная для молодой особи" [3]). Благодаря любезности В. Н. Бостанжогло, приславшаго мнѣ свой матеріалъ для осмотра, я могу сказать, что эта „молодая особь" вполнѣ зрѣла и была вполнѣ готова къ размноженію. Тамъ же, близъ устьевъ Урала (Итъ-Балыкъ), былъ добытъ третій экземпляръ, представлявшій типичнаго R. p. caspia ♂ ad., малорослаго, какъ говоритъ профессоръ М. А. Мензбиръ. *Первые два итъ-балыкскихъ экземпляра добыты 26. IV, слѣдовательно болѣе чѣмъ на вѣроятномъ гнѣздовьи* [4]), *тогда какъ третій много раньше, именно 7. IV., т.-е. могъ быть еще на пролетѣ* [5]). Никакихъ другихъ ремезовъ съ устьевъ Урала въ коллекціи В. Н. не оказалось. Сопоставляя вышеприведенныя данныя, надо притти къ тому заключенію, что *въ камышахъ близъ устьевъ Урала обитаетъ и гнѣздится ремезъ, похожій на Remiza pendulina caspia, что до сихъ поръ изъ этой мѣстности извѣстно только два экземпляра (брачные ♂ и ♀), добытые въ одинъ и тотъ же день въ гнѣздовое время, и что оба экземпляра отличаются отъ типичной формы крупнымъ ростомъ и цвѣтовыми признаками, сближаясь въ этомъ отношеніи съ R. macronyx, живущимъ исключительно въ камышахъ*. Мнѣ кажется, что это—либо гибриды между R. p.

---

[1]) Курсивъ мой. *Авт.*

[2]) „Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи", отд. зоол., вып. X, 1910 г. *Авт.*

[3]) Не совсѣмъ такъ. См. ниже. *Авт.*

[4]) Конечно, къ нимъ относится показаніе относительно обитанія ремезовъ въ камышахъ и устройства гнѣздъ среди этихъ послѣднихъ. *Авт.*

[5]) Курсивъ мой. *Авт.*

caspia и R. macronyx (R. macronyx, о которомъ я когда-то писалъ въ своихъ „Дополненіяхъ къ орнитологической фаунѣ Оренбургскаго края", теперь для меня сомнителенъ; гнѣздо его во всѣхъ отношеніяхъ походило на свойственное R. macronyx, но въ опредѣленіи птички возможна ошибка; по сильному развитію чернаго цвѣта она могла быть еще болѣе темною, чѣмъ описанный здѣсь ♂ съ устьевъ Урала, но въ другихъ отношеніяхъ—съ нимъ одинаковой), либо, что вѣрнѣе,—представители особой формы, которой можно дать названіе Remiza pendulina bostanjogli (по имени лица, ее открывшаго).

Самецъ подробно описанъ профессоромъ М. А. Мензбиромъ (l. c.). Привожу это описаніе, сдѣлавъ курсивомъ кое-какія дополненія. Лобъ и бока головы густо-черные, постепенно переходящіе въ каштаново-черную окраску темени и затылка; *перья затылка черные, чѣмъ на темени, почти черныя; сильно черноваты широкіе и длинные надлазные участки (если бы не легкій каштановый оттѣнокъ, они были бы одноцвѣтны съ ушными партіями); въ изношеномъ перѣ голова сверху должна быть черною съ черно-каштановымъ теменемъ;* окраска темени и затылка, становясь болѣе ржавчатой, переходитъ на верхнюю часть спины; затылокъ густо испещренъ бѣловатыми кончиками перьевъ; плечевыя и нижняя часть спины рыжевато-охристыя; верхнія кроющія хвоста охристо-бѣловатыя, съ буроватыми центрами; малыя кроющія крыла ржавчатыя, съ чуть замѣтными болѣе желтоватыми ободками, большія каштаново-охристыя съ охристыми, не очень широкими вершинами; маховыя и рулевыя — черновато-бурыя, съ широкими сливочно-бѣлыми ободками, которые на второстепенныхъ маховыхъ постепенно расширяются по мѣрѣ приближенія къ плечевымъ. *Черное поле занимаетъ всю уздечку, идетъ широко подъ глазомъ къ ушнымъ партіямъ и, постепенно блѣднѣя и растушевываясь, переходитъ на бока горла, а также подъ упомянутыя партіи. Остальная часть горла бѣловатая. На каштановыхъ перьяхъ боковъ шеи (за ушными партіями) ясная черная примѣсь.* Нижняя сторона охристая съ каштаново-ржавчатыми, прикрытыми бѣловатыми краями перьевъ, пестринами на зобѣ, которыя, постепенно свѣтлѣя, распространяются и на бока тѣла; подхвостье бѣловатое; перья голени ржавчатыя. Клювъ темно-роговой съ желтовато-сѣрыми краями челюстей; ноги темно-свинцовыя. По В. Н. Бостанжогло, длина всей птички 122, крыла 58 и клюва $9^1/_2$ m.m..

М. А. Мензбиръ относительно самки говоритъ, что ея окраска нормальная для молодой особи. У В. Н. Бостанжогло читаемъ: „У самки № 9, при еще болѣе длиномъ, но такомъ же остромъ клювѣ, все темя темно-коричневое, затылокъ и шея грязно-бѣлые. Черное пятно на лбу, глазѣ и ухѣ развито сильно (хотя и менѣе, чѣмъ у описаннаго самца) и также упирается въ нижнюю челюсть. Абортивное перо длиннѣе кроющихъ на 1 m.m.[1]). Въ остальномъ похожа на прочихъ самокъ, но вся массивнѣе ихъ. Длина туловища 124 m.m., крыла 56 и клюва 11 m.m.“.

Къ этому описанію добавлю слѣдующее. Надъ глазами тянутся черныя полосы; въ каштановомъ цвѣтѣ темени замѣтна ясная черноватая примѣсь. Отъ черной уздечки тянется подъ глазомъ черная полоса, которая, растушевываясь по своему нижнему краю и блѣднѣя, переходитъ на бока горла и бѣлое (у настоящихъ R. caspia) пространство подъ ушными партіями.

Уже давно я обратилъ вниманіе на малый ростъ ремезовъ, собранныхъ мною въ январѣ и февралѣ 1894 года въ низовой части Персидской Месопотаміи по рѣкѣ Карунъ (Макамъ-небирахуахи, Кутъ-Газауэ, Себа, Харма, Кутъ-Измаини, Макамъ-эминъ-эль-Мумунадъ, Мемляхъ-менсіэ).

Вотъ ихъ размѣры (по степени убыванія длины крыла).

Клювъ (отъ передняго края ноздри).	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія копчиковой железы).	*Плюсна* (сзади).
m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♂♂			
7	53,6	47	12,4
7,3	53,3	46	12,4
7,4	52,4	43	12,6
7,7	52,2	44	12,6
7,5	52,2	45	13,3
7,5	52,2	43,7	13
7,8	51,3	45	12,9
7,4	50,5	44,2	12,3

[1]) У самца на $1^1/_2$ m.m. *Авт.*

Клювъ (отъ передняго края ноздри).	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).	*Плюсна* (сзади).
m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
♀♀			
7,5	52,6	45,7	12,6
7,6	52,6	44	12,4
7,4	52,4	44,5	def.
7,7	52	47,8	12,6
7,4	52	42,6	13
7,4	52	def.	def.
7,3	51,6	43,7	13,3
7,7	51,3	44,3	12,3
7,5	51,3	44	13,6
7,3	51,3	def.	13
7,4	51	def.	12
7,2	50,4	43,4	12,7
7,3	50,3	43	12,8

Эти птицы всего больше походятъ на Remiza pendulina pendulina (Linn.), но отличаются меньшимъ ростомъ отъ малороссійскихъ представителей названной формы и вообще отъ европейскихъ, у которыхъ длина крыла, по E. Hartert'у [1]), колеблется между 55—58 (рѣдко 60) m.m.. Кромѣ того, по сравненію съ малороссійскими,—ржаво-каштановая полоска, сзади оторачивающая черную полосу лба, у старыхъ самцовъ является болѣе широкою и непрерывною. Такъ какъ эта каштановая полоса ограничивается только лбомъ, не распространяясь дальше къ глазамъ, и такъ какъ каштановый цвѣтъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и въ самой ничтожной степени, въ видѣ оттѣнка, объявляется на ушныхъ партіяхъ, то эта форма кажется ясно отличною также отъ R. p. caspia и R. p. jaxartica. Обозначаю эту форму названіемъ Remiza pendulina menzbieri.

[1]) „Die Vögel der paläarktischen Fauna“, p. 389.. *Авт.*

Имена сѣрыхъ синицъ.

С. А. Бутурлинъ.

Names of the Parus cinereus Group.

By *S. A. Buturlin.*

Въ № 2 нашего журнала (стр. 132 и сл.) помѣщена превосходная статья Н. А. Зарудnаго и С. І. Билькевича, разъясняющая вопросъ о средне-азіатскихъ расахъ сѣрыхъ синицъ по великолѣпному матеріалу (239 взрослыхъ экземпляровъ). Къ сожалѣнію, въ научныя названія этихъ расъ вкралась значительная путаница, которую чѣмъ скорѣе привести въ ясность — тѣмъ лучше.

Повторяю, самый вопросъ о расахъ разработанъ превосходно и ясно. Ихъ насчитано четыре: 1) мелкая и блѣдная *закаспійская*, распространенная отъ Каспійскаго и Аральскаго морей по Закаспійской области, Нижней Бухарѣ до Чарджуя и по большей части Сыръ-Дарьинской области къ востоку до устьевъ Чирчика; 2) крупная и блѣдная *семирѣченская*, найденная въ окрестностяхъ Джаркента и ближайшихъ частяхъ долины Или (наши авторы прибавляютъ и хребетъ Алатау, не приводя экземпляровъ оттуда); 3) похожая на предшествующую, но съ болѣе сильнымъ и высокимъ клювомъ *джунгарская*, добытая въ Булунъ-тохой и Орху; 4) крупная, но сравнительно тонкоклювая, темная *ферганская*, распространенная по всей Ферганѣ и горной Бухарѣ, къ сѣверо-западу, включая Чиназъ и Ташкентъ, къ сѣверо-востоку, включая Кунгей-Алатау.

Въ названіяхъ же допущена такая ошибка. Джунгарская и семирѣченская расы описываются въ качествѣ „новыхъ“ подви-

довъ, а къ ферганской пріурочивается названіе „turkestanicus“ съ прямой ссылкой на „Ornithologische Monatsberichte“ за 1905 г., стр. 109. Если однако мы обратимся къ этому послѣднему изданію, то увидимъ нѣчто совершенно иное: въ 1905 году Н. А. Зарудный и баронъ Г. В. Лоудонъ описали подъ именемъ „Parus bokharensis turkestanicus“ синицу, которая, по ихъ словамъ, „отличается отъ бухарскихъ и закаспійскихъ особенно большимъ ростомъ, длиннымъ хвостомъ и въ особенности толстымъ клювомъ“, т.-е. приводятся признаки семирѣченской и джунгарской расъ, но не упоминается темный цвѣтъ—признакъ ферганской расы. О распространеніи говорится въ 1905 году: „обитаетъ Джунгарію, Семирѣченскую и Сыръ-Дарьинскую области“. Если оставимъ въ сторонѣ это послѣднее указаніе, такъ какъ теперь оказывается, что почти всю Сыръ-Дарьинскую область, кромѣ юго-восточнаго угла, населяетъ мелкая P. bokharensis, то опять видимъ указаніе на область обитанія джунгарской и семирѣченской, но не ферганской расъ. Но яснѣе всего рѣшается дѣло тѣмъ, что въ статьѣ 1905 года Н. А. Зарудный и баронъ Г. В. Лоудонъ прямо перечисляютъ тотъ матеріалъ, на которомъ основывали они свой новый подвидъ „turkestanicus“, именно: 1 самку съ рѣки „Оршу“ (правильнѣе Орху) въ Джунгаріи, безъ даты, и 5 самцовъ и 1 самку изъ-подъ Джаркента въ Семирѣченской области. И такъ какъ птица съ Орху принадлежитъ къ джунгарской, а птицы изъ Джаркента къ семирѣченской расамъ, то названіе „turkestanicus“ 1905 года относилось къ этимъ двумъ близкимъ расамъ и только къ нимъ, а потому называть *объ* эти расы теперь „новыми“ подвидами, а данное имъ въ 1905 году названіе переносить на совершенно иную, ферганскую, расу, въ 1905 году вовсе не имѣвшуюся въ виду—со всякой точки зрѣнія и безусловно неправильно. Именно она, эта ферганская раса и оказалась „новой“, ни въ одномъ экземплярѣ не имѣвшейся въ виду при созданіи имени „turkestanicus“.

Это совершенно ясно и неоспоримо, но нѣсколько труднѣе рѣшить — предполагая, что отдѣленіе джунгарской отъ семирѣченской расы, основанное лишь на трехъ джунгарскихъ экземплярахъ, правильно,—за какой изъ двухъ этихъ расъ слѣдуетъ оставить суженное названіе „turkestanicus“, а какую считать „новой“ формой. Трудность въ томъ, что ни типъ описанія, ни типичная мѣстность не были въ 1905 году, къ сожалѣнію, указаны.

Можно руководствоваться тѣмъ, что въ перечнѣ экземпляровъ, какъ и въ перечнѣ распространенія, на первомъ мѣстѣ стоитъ Джунгарія и тѣмъ, что теперь въ качествѣ первой „новой“ расы описывается семирѣченская,—а потому оставить названіе „turkestanicus“ за джунгарской расой, а семирѣченской присвоить даваемое теперь ей имя „iliensis“.

Но правильнѣе, по-моему, руководствоваться другими соображеніями. Во-1-хъ, въ 1905 году матеріаломъ служили джунгарской расы только 1 экземпляръ, притомъ самка и безъ даты (т.-е. безъ указанія ея въ статьѣ 1905 года), а семирѣченской расы — шесть экземпляровъ обоего пола и всѣ датированные. Во-2-хъ, самое названіе „turkestanicus“ указываетъ, что авторы болѣе имѣли въ виду джаркентскіе экземпляры (такъ какъ Семирѣчье составляетъ часть Туркестана), чѣмъ экземпляръ изъ Орху, добытый въ Джунгаріи, а не въ Туркестанѣ. Поэтому за типы слѣдуетъ признать джаркентскіе экземпляры и за семирѣченской расой оставить имя „turkestanicus“, а джунгарскую расу, какъ вновь выдѣленную, называть „dzungaricus“.

Такимъ образомъ краткая синонимика этихъ расъ будетъ такая (за типичную въ номенклатурномъ смыслѣ, дающую видовое названіе всему комплексу, я считаю не bokharensis Лихтенштейна, а cinereus Віельо, какъ на 5 лѣтъ болѣе раннее имя), перечисляя въ хронологическомъ порядкѣ описаній:

1. Parus cinereus bokharensis Licht. 1823.

2. Parus cinereus turcestanicus Zarud. et Loud. 1905 (Parus bokharensis iliensis „subsp. nov.“ Zarud. et Bilkew. 1912, eadem terra typica!).

3. Parus cinereus ferghanensis But. 1912, Apr. 24 nov. st. (Parus bokharensis turkestanicus apud Zarud. et Bilkew. 1912, Mai 4 nov. st., nec P. b. turcestanicus Zarud. et Loud. 1905!).

4. Parus cinereus dzungaricus Zarud. et Bilkew. 1912 (Parus bocharensis turcestanicus Zarud. et Loud. 1905, partim: una ♀ sine dato fl. Orchu).

Краткія сообщенія.—Kurze Mitteilungen.

Къ авифаунѣ Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи. — 1) 3. IX. 1912 въ березовыхъ и сосновыхъ посадкахъ у с. Полибина я замѣтилъ 3 экземпляра сойки-ронжи (Garrulus infaustus Linn.), перелетавшихъ съ дерева на дерево по направленію съ сѣвера на югъ. Птичекъ я хорошо разсмотрѣлъ, такъ какъ онѣ подпустили къ себѣ очень близко. Быть можетъ, соекъ-ронжъ загнали къ намъ большіе лѣсные пожары, густой дымъ которыхъ при сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтрахъ часто доносился до насъ.—2) Управляющій имѣнія княгини Волконской Ю. Ѳ. Беркганъ сообщилъ мнѣ, что ему былъ доставленъ экземпляръ въ сѣромъ опереніи молодого фламинго (Phoenicopterus roseus Pall.), пойманнаго 18. X. 1910 на хлѣбныхъ жнивахъ окрестностей деревни Глазовой, Натальинской волости. Птица прожила у Ю. Ѳ. Беркгана нѣсколько дней, но вскорѣ околѣла. Это—второй случай залета фламинго въ Бугурусланскій уѣздъ. Первая птица была здѣсь найдена замерзшей 10. XI. 1900 [1]).

А. Н. Карамзинъ.

Къ налету орѣховокъ.—Zum Tännenheherzug.—Г. М. Ружицкимъ въ имѣніи Кжижановекъ, Кутновскаго уѣзда, Варшавской губерніи, 23 іюля (5. VIII) 1912 года была добыта орѣховка, шкурка которой поступила въ Музей Кіевскаго Орнитологическаго Общества имени К. Ѳ. Кесслера. Это—♀ ad. типичной Nucifraga caryocatactes macrorhynchus Brhm. Ея размѣры въ миллиметрахъ: крыло — 184, хвостъ — 133, плюсна — 37, клювъ

[1]) А. Н. Карамзинъ: „Птицы Бугурусланскаго и сопредѣльныхъ съ нимъ частей Бугульминскаго и Бузулукскаго уѣздовъ, Самарской губерніи, и Белебейскаго уѣзда, Уфимской губерніи“ («Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи», отд. зоол., выпускъ 5, стр. 192). *Авт.*

(отъ оперенія лба)—43, длина бѣлаго пятна на крайнемъ рулѣ—24. О появленіи орѣховки въ 1912 году гдѣ-либо за предѣлами гнѣздовой области до послѣдняго времени ничего не было извѣстно, и, мнѣ кажется, возможно предположить, что добытый Г. М. Ружицкимъ экземпляръ N. c. macrorhynchus остался здѣсь съ послѣдняго извѣстнаго налета (въ 1911 году).

Э. В. Шарлеманъ—E. W. Scharleman.

Къ орнитофаунѣ Смоленской губерніи.—Большая работа о птицахъ Смоленской губерніи *В. В. Станчинскимъ* сдана въ печать.

Экскурсіи Кружка Любителей Естествознанія при Московскомъ Сельскохозяйственномъ Институтѣ въ 1911 году.—Весною (въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ) членами Кружка былъ сдѣланъ рядъ орнитологическихъ экскурсій подъ руководствомъ *В. В. Станчинскаго* съ цѣлью изученія птицъ Петровско-Разумовскаго. Особенно интересна была послѣдняя экскурсія—раннимъ утромъ 2-го іюня, когда участникамъ за три часа, не сходя съ мѣста, пришлось зарегистрировать по пѣснямъ 34 вида.

Къ изученію птицъ Царства Польскаго.—Въ 1911 году въ Зоологическій Музей Императорской Академіи Наукъ поступила коллекція *А. М. Быкова*, состоящая изъ 3106 шкурокъ, относящихся къ 362 видамъ и подвидамъ. Изъ птицъ этихъ 2253 экземпляра добыто въ предѣлахъ русской Польши (167 видовъ мѣстной орнитофауны).

Къ изслѣдованію орнитофауны Херсонской губерніи.—Въ 1911 г. въ Зоологическій Музей Императорской Академіи Наукъ поступила отъ *Естественно-Историческаго Музея Херсонскаго Губернскаго Земства* коллекція, состоящая изъ 315 шкурокъ, относящихся къ 164 видамъ.

Интересныя находки въ С.-Петербургской губерніи.—6. VII. 1911 добытъ впервые подъ Лахтой Phalaropus platyrrhynchus; 8. VIII. 1911 здѣсь же *А. Г. Раснеру* удалось убить Tadorna tadorna (juv.); 10. XI. 1911 между Лахтой и Лисьимъ Носомъ *А. Г. Раснеромъ* былъ добытъ Phalacrocorax carbo; 1. V. 1911 *О. И. Іону* удалось застрѣлить Coracias garrula вблизи де-

ревни Борки, Петергофскаго уѣзда; въ имѣніи „Плоское", Лужскаго уѣзда, *Ю. И. Бекманомъ* добытъ чудный экземпляръ Aquila chrysaëtus; 3. IX. 1911 у пароходной пристани „Лигово" на Ладожскомъ каналѣ, въ 70 верстахъ отъ Шлиссельбурга, *В. М. Третьяковымъ* добытъ Ciconia nigra. Всѣ эти птицы въ 1911 году поступили въ Зоологическій Музей Императорской Академіи Наукъ.

Къ орнитофаунѣ Московской губерніи.—16. X. 1907 въ Московскомъ уѣздѣ былъ добытъ Turdus atrogularis. Шкурка этой птицы принесена въ даръ профессоромъ *М. А. Мензбиромъ* въ Зоологическій Музей Императорской Академіи Наукъ.

Интересная находка въ Ярославской губерніи.—24. IV. 1910 на озерѣ Неро добытъ экземпляръ восточнаго подвида Limosa limosa (шкурка хранится въ Зоологическомъ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ).

Къ орнитофаунѣ Уфимской губерніи.—8. VII. 1910 на озерѣ Аслыкуль, въ Белебеевскомъ уѣздѣ, добыты два экземпляра Tringa subarquata.

Г. П.

Въ 1911 году *Н. П. Сокольниковъ* доставилъ съ Командорскихъ острововъ въ Зоологическій Музей Императорской Академіи Наукъ неописанныхъ еще птенцовъ Oceanodroma leucorhoa.

Г. П.

Новыя (напечатанныя) работы ученаго персонала Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ.—Въ 1911 году *В. Л. Біанки* напечаталъ предварительный списокъ птицъ Пермской губерніи въ изданіи „Иллюстрированный путеводитель по рѣкѣ Камѣ и по р. Вишерѣ съ Кальвой" (Пермь).—Въ этомъ же году подъ редакціей *Н. М. Книповича* вышелъ первый томъ русскаго перевода новаго изданія „Жизни животныхъ" Брема (т. VI, птицы).

О новѣйшихъ работахъ профессора П. П. Сушкина.—Въ настоящее время заканчивается печатаніемъ въ Бюллетеняхъ Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы (Bulletin

de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou) подробное извлеченіе на нѣмецкомъ языкѣ статьи „Птицы Минусинскаго края, западнаго Саяна и Урянхайской земли".

Г. Гроте (Hermann Grote) перевелъ на нѣмецкій языкъ резюме работы „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и восточная часть Уральской)".

Въ засѣданіи Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы, 14-го января с./г., профессоромъ *П. П. Сушкинымъ* было доложено о его поѣздкѣ въ русскій Алтай, состоявшейся въ предшествующемъ году при участіи *В. В. Переверзева, Н. Н. Поповой, В. В. Редикорцева* (занимающихъ должности ассистентовъ при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ и Харьковскихъ Медицинскихъ Курсахъ) и студента *П. В. Серебровскаго*. Къ необходимости совершить эту поѣздку *П. П. Сушкинъ* былъ приведенъ обработкою своихъ наблюденій и сборовъ въ Минусинскомъ краѣ, западномъ Саянѣ и Урянхайской землѣ. Съ дороги изъ Кошъ-агача изслѣдователемъ были доставлены въ редакцію свѣдѣнія о важнѣйшихъ орнитологическихъ результатахъ первой половины поѣздки, уже напечатанныя въ 3-й книгѣ журнала за прошлый годъ [1]). За все путешествіе добыто въ общей сложности около 1000 птицъ, обработка которыхъ производится въ настоящее время. Теперь выяснилась окончательно рѣзкая обособленность сѣверо-восточнаго Алтая (бассейнъ Абакана и горы около Телецкаго озера). Эта часть Алтая по своему рельефу, общему характеру растительнаго покрова и фауны тождественна съ таежною частью западнаго Саяна (Минусинскій уѣздъ). Остальной Алтай носитъ черты болѣе южныя какъ въ фаунѣ, такъ и въ растительномъ покровѣ и отличается сильнымъ развитіемъ альпійской зоны. Въ той части, которая изслѣдована *П. П. Сушкинымъ*, ясно намѣчается дѣленіе на юго-восточный Алтай (Чуйская степь) и центральный Алтай (горы у южной части Телецкаго озера, низовье Чулышмана, Улаганское плоскогорье, Курайскія альпы, сѣверные склоны Чуйской и Катунской цѣпей и отсюда вдоль Чуйскаго тракта до предѣловъ Алтая, приблизительно у станицы Комаръ). Кромѣ птицъ, перечисленныхъ въ упомянутой замѣткѣ *П. П. Сушкина*, можно отмѣтить слѣдующія находки: Accentor fulvescens dahuricus, Athene bactriana

[1]) П. П. Сушкинъ: „Новыя данныя къ распространенію птицъ въ русскомъ Алтаѣ и по Абакану", стр. 237.

(юго-восточный Алтай), Carpodacus rosea (очень обыкновенъ на гнѣздовьи по рѣчкѣ Тополевкѣ), Emberiza godlevskii, найденной теперь въ качествѣ широко распространенной вдоль Чуйскаго тракта до предѣловъ Алтая, и Gypaëtos barbatus (замѣченъ на сѣверномъ склонѣ Катунской цѣпи).

Къ отмѣткѣ птицъ кольцами.—*В. Р. Дицомъ* получено увѣдомленіе, что въ декабрѣ 1912 года около Visignano въ Истріи (вблизи Тріеста) застрѣленъ вальдшнепъ, отмѣченный имъ кольцомъ за № 4618 въ Гатчино 21-го іюля 1912 года.

Въ засѣданіи Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній 24-го января 1913 года была заслушана небольшая статья *Д. В. Померанцева*—„Къ вопросу о пищѣ нашихъ куликовъ изъ рода Scolopax". Авторъ излагаетъ результаты его изслѣдованій содержимаго желудковъ 39 вальдшневовъ, 25 бекасовъ и 8 дупелей и въ заключеніе говоритъ: „кулики уничтоженіемъ насѣкомыхъ не принесли замѣтной пользы сельскому и лѣсному хозяйству, и мы были бы въ правѣ отнести ихъ къ безразличнымъ птицамъ въ этомъ отношеніи".—Статья эта будетъ напечатана въ журналѣ „Птицевѣдѣніе и Птицеводство" (органъ Отдѣленія Орнитологіи).

Затѣмъ была избрана Коммиссія при Отдѣленіи согласно постановленію 2-ому Орнитологическаго совѣщанія 26-го ноября 1912 года [1]) изъ слѣдующихъ лицъ: *Д. М. Россинскаго* (по мѣткѣ птицъ), *Г. П. Полякова* (по наблюдательной сѣти), *Е. И. Свѣшниковой*, *П. Ф. Бузука* и *О. В. Кесарійской* (по защитѣ и охранѣ птицъ), *В. А. Тюкина* (казначей) и *Ф. А. Визенберга* (секретарь).

Г. П.

[1]) Постановленіе это гласитъ: „Для объединенія русскихъ работъ по опытному изученію перелетовъ птицъ кольцеваніемъ, упрочненія сѣти русскихъ орнитофенологическихъ наблюденій и популяризаціи берлепшевскихъ идей съ проведеніемъ ихъ въ жизнь по вопросамъ охраны и защиты птицъ при Отдѣленіи Орнитологіи организуется постоянный Комитетъ съ наименованіемъ его „Русскій Орнитологическій Комитетъ".

Обзоръ русской орнитологической литературы.

С. А. Бутурлинъ.

Rewiew of the Russian ornithological Literature.

By *S. A. Buturlin.*

(Продолженіе.—Continued.) [1]).

„Фауна Россіи и сопредѣльныхъ странъ, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. Птицы (Aves). Томъ I. Полутомъ первый. В. Л. Біанки. С.-Петербургъ. 1911 г. Цѣна 2 руб. 50 коп.“. 8⁰, 384 стр., 7 фототип. таблицъ.

Какъ видно изъ заглавія, книга эта составляетъ часть обширной серіи работъ, издаваемой подъ редакціей и по мысли директора Зоологическаго Музея Академіи Н. В. Насонова. Нужно ли подробно говорить о значеніи этого обширнаго предпріятія? Разработка фауны Россіи страшно отстала отъ современнаго уровня нашихъ знаній о животномъ населеніи не только западной и центральной Европы, но и Сѣверной Америки, и причина тому, къ сожалѣнію, не въ одной обширности нашихъ пространствъ. Наши ученыя и высшія учебныя учрежденія обладаютъ, въ сравненіи съ соотвѣтствующими учрежденіями не только старыхъ культурныхъ странъ, но и молодыхъ Соединенныхъ Штатовъ Америки, прямо нищенскими средствами. Да и помимо того встрѣчаютъ на своемъ пути нерѣдко совершенно

[1]) См. „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1912 г., кн. II, стр. 170—171.

неожиданныя препятствія. Напомню, что въ 1905 году наши Университеты были лишены права посылать и получать казенныя посылки въ твердой оболочкѣ, чѣмъ въ корнѣ была подрѣзана для университетскихъ музеевъ возможность дешеваго снаряженія маленькихъ коллекторскихъ экспедицій и снабженія своихъ частныхъ корреспондентовъ инструментами, ящиками со спиртомъ и другими реактивами, а также такого же дешеваго полученія отъ нихъ собранныхъ коллекцій. Это десятки лѣтъ практиковалось при „старомъ режимѣ", но оказалось, очевидно, несовмѣстимымъ съ „обновленнымъ строемъ" и порядку этому былъ положенъ рѣшительный конецъ. Теперь университетскіе музеи, имѣющіе штатный бюджетъ на препараторовъ, служителей, посуду, спиртъ, и пр. и пр. и пр.—по 600 рублей въ годъ (Нью-Іоркскій музей, второй въ Соединенныхъ Штатахъ,—какъ Московскій университетскій—второй въ Россіи,—имѣетъ бюджетъ 600 тысячъ рублей въ годъ) должны оплачивать разсылаемое снаряженіе и получаемыя коллекціи, какъ частныя посылки. Это грустно, но это законъ: dura lex, sed lex. Этого послѣдняго утѣшенія не имѣется въ слѣдующемъ примѣрѣ.

Многолѣтняя широкая и блестящая дѣятельность Императорскаго Русскаго Географическаго Общества на поприщѣ изученія природы и быта Россіи и сопредѣльныхъ странъ у всѣхъ передъ глазами. Закономъ 22 апрѣля 1906 года, опубликованнымъ въ Собр. Узак. и Распор. Прав. 9 іюня 1906 года (№ 138, отд. первый ст. 841), Обществу этому и его отдѣламъ предоставлено право посылать посылки вѣсомъ до 1 пуда въ закрытой, твердой или мягкой, оболочкѣ безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ, а также подобныя посылки, адресованныя на имя Общества или его отдѣловъ, должны приниматься на почту безъ этой оплаты.

Вотъ это-то законное право Общества не только посылать, но и получать, безразлично откуда, отъ кого и съ какимъ содержаніемъ, ящики до одного пуда, систематически нарушается почтовымъ вѣдомствомъ. Я говорю о томъ, что не отдѣльные мелкіе провинціальные чиновники не знаютъ закона или пренебрегаютъ имъ, но о дѣйствіяхъ цѣлаго вѣдомства, такъ какъ мнѣ извѣстны (частью происходили со мною лично) десятки отказовъ въ разныхъ концахъ Имперіи принимать безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ коллекціи въ пудовыхъ ящикахъ на имя Географическаго Общества, при чемъ жалобы въ управленія почтово-телеграфныхъ округовъ не приводили къ цѣли. Тутъ, значитъ, и законъ, утвер-

жденный Высочайшей властью и опубликованный во всеобщее свѣдѣніе, безсиленъ оказать помощь научной работѣ, почему-то не пользующейся сочувствіемъ одного изъ второстепенныхъ вѣдомствъ.

Вотъ это, иллюстрируемое двумя только что изложенными примѣрами, отношеніе правящихъ слоевъ къ научной работѣ является одною изъ крупныхъ причинъ нашей отсталости въ изученіи родной природы; другою же причиною является невозможная постановка школьнаго образованія, порождающая поразительную оторванность нашей интеллигенціи отъ всякаго интереса къ природѣ и пониманія ея жизни. Бороться съ этою второю причиной можно, между прочимъ, распространеніемъ руководствъ, которыя давали бы человѣку, мало-мальски заинтересовавшемуся животными (что почти неизбѣжно для охотника, рыболова, сельскаго хозяина) по какой бы то ни было причинѣ, возможность разобраться въ томъ, что онъ видитъ, хотя бы приблизительно опредѣлить заинтересовавшее его животное, ознакомиться съ его жизнью и распространеніемъ, можетъ быть убѣдиться, что въ собственныхъ наблюденіяхъ или самомъ фактѣ встрѣчи, есть что-либо новое. Все это естественно поддерживаетъ и развиваетъ разъ зародившійся интересъ, и съ теченіемъ времени случайный наблюдатель, какъ это часто и бывало, можетъ сдѣлаться серьезнымъ работникомъ и своего рода маленькимъ центромъ дальнѣйшей передачи интереса къ природѣ въ окружающей мѣстности.

Работать между прочимъ и въ этомъ отношеніи популяризаціи знанія—одна изъ прямыхъ задачъ Зоологическаго Музея Академіи Наукъ, и изданіемъ „Фауны Россіи“ очень и очень много дѣлается въ крайне необходимомъ направленіи [1]).

Для орнитологической части изданія, конечно, нельзя было бы найти лучшаго составителя, чѣмъ В. Л. Біанки. Планъ работы такой. Начинается она діагнозомъ и подробной характеристикой подотдѣла Colymbomorphae съ указаніемъ главнѣйшей литературы. Затѣмъ таблица для опредѣленія отрядовъ этого под-

---

[1]) Съ этимъ мы никакъ не можемъ согласиться, такъ какъ „Фауна Россіи“ и подобныя ей изданія вслѣдствіе своей спеціальности не могутъ дать лицамъ, мало-мальски заинтересовавшимся животными (охотникамъ, рыболовамъ, сельскимъ хозяевамъ и вообще любителямъ) возможность разобраться въ томъ, что они видятъ, хотя бы приблизительно опредѣлить заинтересовавшихъ ихъ животныхъ и т. д. *Ред.*

отдѣла, синонимика отряда гагарообразныхъ, діагнозъ и характеристика его, литературныя указанія о строеніи ихъ, параллельное перечисленіе отличительныхъ признаковъ Urinatores (гагары) и Colymbi (поганки), таблица для опредѣленія подотрядовъ этихъ, какъ для самихъ птицъ, такъ и для яицъ и скелетовъ. Затѣмъ, синонимика, діагнозъ и характеристика какъ подотряда, такъ и семейства гагаръ, область распространенія, станціи, образъ жизни семейства, тѣ же данныя для единственнаго рода семейства, обзоръ его видовъ, таблица для опредѣленія видовъ (оперенныхъ птицъ и яицъ). Далѣе для каждаго вида синонимика [1]), съ указаніемъ главнѣйшей біологической литературы и изображеній птицъ и яицъ, и чрезвычайно полный списокъ литературы, касающейся Россіи, въ хронологическомъ порядкѣ, при чемъ при каждой работѣ въ двухъ-трехъ словахъ указывается, что именно новаго есть въ ней о данномъ видѣ (по-латыни, если работа русская, и на языкѣ работы, если она иностранная). Полное вниманіе отведено и охотничьей литературѣ, такъ что списокъ этотъ для одной лишь краснозобой гагары занимаетъ 17 страницъ. Далѣе идетъ полный списокъ экземпляровъ Музея Академіи, списокъ мѣстныхъ названій съ указаніемъ источника. Затѣмъ, видовой діагнозъ (діагнозъ всегда дается не только по-русски, но и по-латыни), подробное описаніе нарядовъ, яицъ. Затѣмъ, географическое распространеніе, сначала сжатое, общее, затѣмъ подробное—въ нашихъ предѣлахъ и прилежащихъ странахъ, съ обстоятельнымъ выясненіемъ границъ гнѣздовой области. Данныя эти также приводятся со ссылками на наблюдателей. Далѣе, описаніе станцій, экологическія данныя: голосъ, сроки пролетовъ, прилета и отлета въ разныхъ мѣстахъ, построеніе гнѣзда, время кладки и вывода, время кочевокъ, линька—все это опять съ указаніями наблюдателей и года опубликованія наблюденія, какъ и въ другихъ случаяхъ, что позволяетъ по списку литературы сейчасъ же найти и мѣсто опубликованія наблюденія. Послѣ описанія по этому плану всѣхъ пяти нашихъ видовъ гагаръ, слѣдуетъ подобное же описаніе подотряда и семейства

[1]) Въ прежніе годы, и еще очень недавно, мнѣ не разъ приходилось съ сожалѣніемъ отмѣчать, что В. Л. Біанки все еще числится во все уменьшающемся числѣ сторонниковъ начала зоологической номенклатуры съ 1766 года. Тѣмъ пріятнѣе мнѣ теперь отмѣтить, что наконецъ В. Л. Біанки перешелъ на сторону большинства и въ этой работѣ исходнымъ пунктомъ номенклатуры принимаетъ 1758 годъ. *Авт.*

поганокъ. Далѣе идетъ синоптическій обзоръ (только на латинскомъ языкѣ) всѣхъ извѣстныхъ родовъ поганокъ (авторъ признаетъ ихъ 11), а затѣмъ уже на русскомъ языкѣ подробная таблица для опредѣленія палеарктическихъ родовъ, включая и пуховиковъ, такъ какъ въ этой группѣ они окрашены разнообразно, а гдѣ можно—и яицъ. Далѣе, таблица для опредѣленія видовъ, общая для всѣхъ палеарктическихъ родовъ, при чемъ въ нее вошли и внѣпалеарктическія формы этихъ родовъ. Таблица эта дается также для пуховиковъ и яицъ. Далѣе уже описаннымъ порядкомъ идетъ обзоръ по видамъ поганокъ, при чемъ три вида въ четырехъ формахъ вошли въ реферируемый полутомъ и два вида въ четырехъ формахъ еще не вошли.

О достоинствахъ этой обстоятельнѣйшей сводки распространяться особенно нечего, такъ какъ добросовѣстность работъ В. Л. Біанки извѣстна всякому орнитологу. Что касается недостатковъ, то вышеописанный планъ работы можно, въ извѣстномъ смыслѣ, считать и сильной, и слабой ея стороной.

Съ одной стороны такая подробность свѣдѣній, мелочность и точность указаній со ссылками на первоисточники, разумѣется, сразу вводятъ читателя in mediam rem и допускаютъ перекрестную провѣрку каждаго указанія и критическую оцѣнку каждаго вывода, и въ этомъ смыслѣ реферируемая работа останется навсегда превосходнѣйшимъ образцомъ полной и точной сводной работы. Слабая же сторона такой обстоятельности заключается въ томъ, что книга въ 384 страницы довольно убористой печати понадобилась для того, чтобы охватить *девять* формъ русской фауны, при томъ изъ группъ, не представляющихъ для обработки никакихъ особыхъ затрудненій. А такъ какъ всѣхъ формъ нашей орнитофауны (не считая даже сопредѣльныхъ странъ) оказывается около 1200, то понадобится болѣе 130 такихъ полутомовъ и свыше 50 тысячъ страницъ для подобнаго ихъ описанія. И такъ какъ для самаго подготовленнаго и трудолюбиваго человѣка, имѣющаго и другія текущія занятія, врядъ ли возможно изложить на бумагѣ и тщательно прокорректировать въ наборѣ свыше 5 листовъ (въ среднемъ, при большой работѣ) въ мѣсяцъ (по своему опыту могу сказать, что и эта норма крайне тяжелая), то на всю работу уйдетъ свыше 50 лѣтъ. Слѣдовательно на завершеніе ея врядъ ли можно разсчитывать.

Работа такого объема при всей тщательности не можетъ, конечно, обойтись безъ нѣкоторыхъ недочетовъ. Упомяну нѣко-

торые изъ замѣченныхъ мной. При всемъ богатствѣ использованной литературы замѣчаются и нѣкоторые существенные пробѣлы. Напримѣръ, не использована обширная и отличная работа Дрессера о яйцахъ западно-палеарктическихъ птицъ. Между тѣмъ въ ней впервые опубликовано не мало именно русскихъ матеріаловъ. Конечно, это не вина автора, а вина нищенскаго бюджета высшаго научнаго учрежденія Имперіи, не могущаго пополнять свои библіотеки хотя бы главнѣйшими современными работами.

Затѣмъ, въ столь обстоятельной работѣ были бы, мнѣ кажется, желательными болѣе подробныя измѣренія, независимо отъ вопроса, насколько они діагностичны. На страницѣ 215 работа покойнаго М. Житникова приписана Б. М. Житкову. На страницѣ 165 уважаемый авторъ сомнѣвается въ вѣрности приводимыхъ въ свое время Палласомъ, а въ недавнее время мною—данныхъ о встрѣчахъ съ бѣлоносою гагарою въ низовьяхъ Оби, подъ Березовымъ и даже въ 100 верстахъ ниже, полагая, что столь морская птица врядъ ли зайдетъ такъ глубоко внутрь материка. Однако, двумя страницами дальше самъ В. Л. Біанки говоритъ о гнѣздованіи этой гагары подъ Марковымъ, лежащимъ близъ верхняго теченія Анадыря и во всякомъ случаѣ не менѣе глубоко внутрь материка. По моимъ изслѣдованіямъ, несомнѣнно гнѣздится и на среднемъ теченіи Колымы подъ $67^1/_2{}^0$ с. ш. Поэтому во встрѣчахъ на нижней Оби трудно видѣть что-либо необычайное, да и трудно какую-либо другую птицу принять за бѣлоносую гагару. На страницѣ 108 авторъ говоритъ, что граница распространенія чернозобой гагары отъ Каретова на Колымѣ поворачиваетъ на Анадырь, и далѣе къ сѣверо-востоку гнѣздится только бѣлошейная гагара. Въ дѣйствительности заимка Каретова близъ Нижне-Колымска не имѣетъ вблизи себя никакихъ естественныхъ или фаунистическихъ границъ, и чернозобая гагара чрезвычайно многочисленна на гнѣздовьи во всей дельтѣ Колымы и на прилегающемъ съ востока материкѣ, т.-е. идетъ почти на градусъ сѣвернѣе и болѣе чѣмъ на полъ градуса восточнѣе, на что и есть указаніе въ упомянутой работѣ Дрессера (стр. 800, внизу).

Всѣ эти замѣчанія, какъ и нѣкоторыя другія, которыя можно бы сдѣлать—только совершенно незначительныя мелочи. Слѣдуетъ отъ всей души пожелать этой превосходной работѣ скорѣйшихъ продолженій.

„Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ".

Въ № 2 т. XV (1910 г.) этого изданія помѣщена статья С. И. Огнева и В. Б. Баньковскаго съ описаніемъ новой славки, Sylvia caucasica, изъ группы S. curruca. Объ этомъ обстоятельномъ описаніи я уже ранѣе говорилъ подробно. Въ томъ же номерѣ (стр. 248) статья В. Д. Андреева и В. Л. Біанки—„Къ авифаунѣ Устьсысольскаго уѣзда Вологодской губ.". Въ ней перечислено 105 видовъ, при чемъ не всѣ представлены въ коллекціи, почему опредѣленія не всегда доведены до подвидовъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и до видовъ. Отмѣчается гнѣздованіе какихъ-то гуменниковъ (Melanonyx sp.), неоднократныя встрѣчи съ перепелами, гнѣздованіе козодоевъ и кулика-сороки (у с. Иба), сѣверной и зеленой пѣночекъ, Columba palumbus, Loxia bifasciata. Малая кукушка является, повидимому, обыкновенной. Буроголовая гаичка отнесена къ западной формѣ („cincta"), а орѣховка (отъ 12 іюля)—къ восточной (macrorhyncha). Чирокъ-коростелекъ не найденъ. Скворецъ внесенъ подъ именемъ „Sturnus sophiae", хотя, во-1-хъ, имя это—лишь синонимъ болѣе ранняго названія (intermedius) и, во-2-хъ, это очевидно не самостоятельный видъ, а лишь подвидъ. Статья эта во всякомъ случаѣ весьма интересна, такъ какъ дополняетъ свѣдѣнія по мало изслѣдованной сѣверо-восточной части Европейской Россіи.

К. А. Сатунинъ: „Систематическій каталогъ птицъ Кавказскаго края", ч. II. Изъ „Записокъ Кавказскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества", кн. XXVIII, вып. 2. Тифлисъ, 1912 г. 8^0, стр. 85—195.

Я уже говорилъ въ свое время о первой части этого весьма полезнаго каталога и могу теперь привѣтствовать его окончаніе. Въ этой части число видовъ доведено до 466. Правда, нѣкоторые виды—я замѣтилъ такихъ два (Hieraëtus fasciatus и Chroicocephalus melanocephalus) приведены подъ номерами лишь на основаніи догадокъ о возможности ихъ залетовъ, а не на основаніи фактическихъ данныхъ. Въ двухъ случаяхъ подъ отдѣльными номерами приведены выродки (Circus aeruginosus var. unicolor и Syrnium aluco var. vilkonskii). Крайне сомнительнымъ мнѣ кажется распространеніе краснаго коршуна по всему Закавказью. Я вообще не видалъ этой птицы съ Кавказа и думаю, что если она тамъ и встрѣчается, то лишь въ западныхъ частяхъ.

А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матеріалы по птицамъ Енисейской губерніи“. Изъ „Записокъ Красноярскаго Подотдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“, т. I, вып. 2—4. Красноярскъ, 1911 г. 8°, VII + 440 стр.

Эта работа, несмотря на свой объемъ, является именно только матеріалами по птицамъ огромнаго и интереснаго края. Основана она главнымъ образомъ на матеріалахъ, собранныхъ А. Я. Тугариновымъ за его экскурсіи 1905—1908 годовъ включительно по Красноярскому уѣзду и внизъ по Енисею и заливу до $72^1/_4{}^0$ с. ш.; затѣмъ на матеріалахъ, собранныхъ С. А. Бутурлинымъ посылкою въ 1908 году коллектора въ юго-восточную часть края на самую границу Иркутской губерніи, для лучшаго выясненія примѣси восточно-сибирскихъ формъ,—наконецъ, на всѣхъ матеріалахъ, накопившихся въ Красноярскомъ музеѣ. Въ общемъ было изслѣдовано около четырехъ тысячъ экземпляровъ птицъ края.

Послѣ краткаго предисловія слѣдуетъ систематическая часть работы (стр. 1—365), таблицы измѣреній экземпляровъ (кромѣ включенныхъ въ текстъ) (стр. 367—386), характеристика обслѣдованныхъ мѣстностей (стр. 389—398), описаніе орнитологическихъ станцій съ ихъ типичными представителями (стр. 398—407), обзоръ орнитофауны по характеру пребыванія, таблица съ распредѣленіемъ видовъ по станціямъ и характеру пребыванія (стр. 407—428) и, наконецъ, алфавитный указатель. Попытки дать зоогеографическое раздѣленіе нѣтъ, такъ какъ огромный край даже чисто рекогносцировочно изслѣдованъ далеко недостаточно.

Систематическая часть содержитъ 285 видовъ и подвидовъ, исключительно такихъ, присутствіе которыхъ фактически доказано. Для каждой формы дано научное и русское названіе, цитата перваго описанія и очень краткая синонимика, сжатый обзоръ общаго распространенія птицы въ Азіи, подробныя указанія на встрѣчи съ нею въ описываемомъ краѣ (значитъ, къ югу только включая Красноярскій уѣздъ, но не Минусинскій край), подробный біологическій очеркъ (почти исключительно по личнымъ наблюденіямъ А. Я. Тугаринова), въ нужныхъ случаяхъ систематическія данныя и сравненія размѣровъ съ близкими формами.

Отвѣтственность между авторами распредѣляется такъ. А. Я. Тугаринову принадлежитъ большая (и, позволю себѣ прибавить, наиболѣе интересная) часть работы. С. А. Бутурлину принадлежитъ собственно чисто систематическая часть: опредѣленіе формъ,

сравненіе съ экземплярами европейскими, восточно-сибирскими и туркестанскими; описаніе опереній, номенклатура и синонимика; во многихъ случаяхъ очеркъ общаго распространенія и въ нѣкоторыхъ случаяхъ измѣренія.

Въ этой работѣ три формы описываются въ качествѣ новыхъ: Cyanistes cyanus yenisseensis, Coccothraustes coccothraustes verticalis и Perisoreus infaustus caudatus (послѣдняя попутно, для сѣверной Монголіи). Кромѣ того даются подробныя описанія птицъ, описанныхъ лишь въ самое послѣднее время (частью по этимъ же матеріаламъ), или же слишкомъ кратко, а именно: Emberiza schoeniclus parvirostris But., Dendrocopus major sibiricus But., Picoides tridactylus uralensis But., Cryptoglaux tengmalmi sibiricus But. и C. t. transvolgensis But., Scops scops sibirica But., Bubo bubo yenisseensis But., B. b. jakutensis But., B. b. ruthenus But. et Zhitk., Hierofalco lorenzi Menzb., Botaurus stellaris orientalis But., Larus affinis taimyrensis But..

Если сравнимъ списокъ птицъ реферируемой работы со спискомъ птицъ, помѣщенныхъ въ капитальной и до сихъ поръ единственной работѣ покойнаго Тачановскаго, законченной въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ, и при томъ для правильности сравненія откинемъ птицъ, въ то время еще неизвѣстныхъ (напр., Hierofalco lorenzi, Cyanecula s. robusta), или подвиды, еще не отличенные отъ типичныхъ (напр., Bubo b. yenisseensis) или такіе, отличенія коихъ Тачановскій не признавалъ правильнымъ (напр., Phylloscopus tr. eversmanni, Sylvia curruca affinis), или, наконецъ, такіе случаи, когда подвидъ отличенъ, а реферируемая работа его не отличаетъ (напр., Pica p. pica), — то, отбросивъ все это, все-таки находимъ 25 хорошихъ видовъ, не введенныхъ Тачановскимъ вовсе въ фауну Восточной Сибири (куда онъ относилъ и описываемый край), т.-е. не введенныхъ не только именно въ данной формѣ, можетъ быть уже позже описанной, но вообще ни въ какой формѣ.

Эти виды, входящіе теперь въ фауну Восточной Сибири и не указанные Тачановскимъ, слѣдующіе:

Pratincola rubetra (Linn.),
Sylvia c. icterops Ménétr.,
S. borin (Bodd.),
Phylloscopus viridanus Blyth.,
Iduna caligata (Licht.),
Acrocephalus dumetorum Blyth.,
A. schoenobaenus (Linn.),
Accentor atrogularis Brandt.,

Anthus trivialis (Linn.),
A. campestris (Linn.),
Lanius exc. homeyeri Cab.,
Chelidon urbica (Linn.),
Carduelis c. major Tacz.,
Emberiza hortulana Linn.,
Coloeus mon. collaris (Drumm.),
Scops scops sibirica But.,
Circus aeruginosus Linn.,
Buteo des. fuscoater Menzb.,
Pelecanus crispus Bruch.,
Columba livia Gm.,
Porzana porzana (Linn.),
Crex crex (Linn.),
Charadrius apricarius Linn.,
Haematopus ostr. longipes But. и
Hydrochelidon nigra (Linn.).

Сверхъ того имѣется цѣлый рядъ видовъ, которые у Тачановскаго приведены лишь въ формахъ дальне-восточныхъ, но не были указаны въ типичныхъ или болѣе западныхъ:

Motacilla a. dukhunensis Sykes,
Budytes f. beema Sykes,
Hirundo rustica Linn.,
Coccothraustes c. verticalis But.,
Perisoreus infaustus (Linn.),
Picoides tr. uralensis But.,
Glaucidium passerinum (Linn.),
Anser albifrons (Scop.),
Melanonyx arvensis (Brhm.),
Limicola platyrhinchus (Temm.) и
Numenius phaeopus (Linn.).

Итого съ предшествующими тридцать шесть формъ, не считая и здѣсь такихъ, которыя не различались Тачановскимъ (Falco peregrinus leucogenys Brhm) или не были еще описаны (Riparia r. diluta Sharpe). Названныя выше формы Coccothraustes и Picoides тоже не были описаны. Тачановскій приводитъ лишь чисто восточныя формы двухъ послѣднихъ видовъ, сильно отличныя отъ данныхъ, такъ что онъ несомнѣнно отличилъ бы ихъ, если бы имѣлъ изъ описываемыхъ предѣловъ.

Помимо этихъ западныхъ видовъ или формъ, въ спискѣ реферируемой работы имѣется цѣлый рядъ восточныхъ видовъ и подвидовъ, Тачановскимъ не приводимыхъ для описываемаго въ реферируемой книгѣ края. Таковы, не считая позже описанныхъ, Cyanecula s. robusta But. и Emberiza schoen. pallidior Hart., слѣдующія птицы:

Larvivora cyane (Pall.),
Phylloscopus proregulus (Pall.),
Herbivocula schwarzi (Radde),
Locustella lanceolata Temm.,
Motacilla alba baicalensis Swinh.,
Hemichelidon sibirica (Gm.),
Poliomyias mugimaki (Temm.),
Leucosticte curilica (Pall.),
Apus pacificus (Lath.),
Acanthylis caudacuta (Lath.),
Buteo plumipes Hodgs.,
Tadorna tadorna (Linn.),
Recurvirostra avosetta (Linn.),
Heteractitis brevipes (Vieil.) и
Limosa l. melanuroides Gould..

Разумѣется, далеко не всѣ эти находки впервые публикуются здѣсь, тѣмъ болѣе, что и тотъ, и другой изъ авторовъ рефери-

руемой книги во многихъ случаяхъ публиковали въ спеціальныхъ журналахъ особо интересныя данныя своихъ собственныхъ сборовъ по мѣрѣ ихъ хода. Съ другой стороны книга содержитъ новыя и интересныя, въ смыслѣ указанія предѣловъ распространенія видовъ, данныя и о другихъ, не отмѣченныхъ выше птицахъ, напримѣръ, Phragmaticola aëdon (Pall.) (м. Кемчугъ), Locustella fasciolata Gray (Кемчугъ, Чулымъ), Hirundo tytleri Jerd. (Чуна, Мура), Circus cyaneus taissiae But. (Енисей) и мн. др. Попутно иногда даются подробныя описанія рѣдкихъ видовъ, напр., Lanius mollis Ev. изъ Тянь-Шаня (не L. borealis sibiricus Bogd.=L. major Pall.).

Долженъ, наконецъ, оговорить, что ошибочное указаніе будто бы Turtur f. orientalis (Lath.) приводится Н. А. Заруднымъ для Ферганы, вкралось всецѣло по моей винѣ, вслѣдствіе какой то путаницы въ моихъ рукописныхъ замѣткахъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.—To be continued.)

Хроника.—Chronik.

Къ XIII Съѣзду Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей.—Съ 16 по 24 іюня 1913 года въ г. Тифлисѣ состоится XIII Съѣздъ Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей. Членомъ Съѣзда можетъ быть всякій, научно занимающійся естествознаніемъ, но правомъ рѣшающаго голоса на Съѣздѣ пользуются: ученые, лица, напечатавшія самостоятельное сочиненіе или изслѣдованіе по естественнымъ наукамъ, и члены Съѣзда изъ лицъ, получившихъ высшее образованіе по предметамъ, входящимъ въ программу Съѣзда.

Секціи Съѣзда слѣдующія: 1) Секція математики съ подсекціями: а) чистой математики, б) механики и в) астрономіи. 2) Физики съ подсекціей электротехники. 3) Физической географіи и метеорологіи съ подсекціями: а) сейсмологіи и б) воздухоплаванія. 4) Химіи съ подсекціей технической химіи. 5) Минералогіи и геологіи съ подсекціями: а) минералогіи, петрографіи и кристаллографіи, б) геологіи и в) палеонтологіи. 6) Ботаники съ подсекціями: а) анатоміи и физіологіи растеній, б) морфологіи и систематики растеній и ботанической географіи. 7) Зоологіи. 8) Анатоміи и физіологіи (со включеніемъ медицинской химіи, эмбріологіи и гистологіи). 9) Географіи, этнографіи и антропологіи, съ подсекціями: а) географіи, б) этнографіи и антропологіи, в) лингвистики, г) статистики. 10) Агрономіи съ подсекціями: а) почвовѣдѣнія, б) растеніеводства, в) лѣсоводства, г) зоотехніи. 11) Научной медицины съ подсекціей маляріи. 12) Научной гигіены съ подсекціей бальнеологіи и климатотерапіи. 13) Научной ветеринаріи и 14) Педагогическихъ вопросовъ съ подотдѣлами по высшему среднему и низшему образованію. Кромѣ секцій организуются слѣдующія бюро: Хозяйственно-административное, Редакціонное, Экскурсіонное.

Члены Академіи Наукъ, профессора и преподаватели учеб-

ныхъ заведеній, желающіе принять участіе въ трудахъ Съѣзда, могутъ получать для этой цѣли командировки, срокомъ отъ двухъ до четырехъ недѣль, смотря по разстоянію ихъ мѣстожительства отъ Тифлиса.

Каждый членъ Съѣзда вноситъ въ его кассу три рубля.

Продолжительность дѣйствія Съѣзда—въ теченіе недѣли, не считая дня открытія и закрытія. 15 іюня вечеромъ предположено предварительное собраніе для взаимнаго ознакомленія членовъ и разъясненія вопроса о выборѣ 16 іюня должностныхъ лицъ Съѣзда.

Дѣятельность Распорядительнаго Комитета Съѣзда, во главѣ котораго стоятъ Попечитель Кавказскаго учебнаго округа Н. Ф. Рудольфъ (онъ же завѣдующій секціей педагогическихъ вопросовъ), городской голова г. Тифлиса А. И. Хатисовъ и деканъ естественнаго отдѣленія частныхъ высшихъ женскихъ курсовъ въ Тифлисѣ К. В. Харичковъ (онъ же завѣдующій секціей химіи), до настоящаго времени выразилась въ слѣдующемъ. 1) Въ привлеченіи къ участію въ работахъ Съѣзда какъ выдающихся научныхъ силъ Россіи и лицъ, занимающихся изслѣдованіями и работами въ области естествознанія и медицины, такъ равно и вообще интересующихся вопросами въ области наукъ, входящихъ въ кругъ дѣятельности Съѣзда и педагоговъ. Съ этой цѣлью разослано до настоящаго времени болѣе 10.000 приглашеній научнымъ дѣятелямъ, научнымъ учрежденіямъ, обществамъ, союзамъ, комитетамъ и отдѣльнымъ лицамъ съ просьбою принять участіе въ работахъ Съѣзда и выступить съ докладами и сообщеніями какъ въ общихъ, такъ и въ секціонныхъ его собраніяхъ. Большое количество (до 2.000) приглашеній къ участію въ работахъ Съѣзда было разослано также и отъ имени бюро отдѣльныхъ секцій. 2) Въ привлеченіи къ участію въ организуемой при Съѣздѣ выставкѣ различныхъ научныхъ учрежденій, ученыхъ изслѣдователей, коллекціонеровъ и научно-промышленныхъ фирмъ въ Россіи и за границей, съ каковой цѣлью было разослано до 300 соотвѣтственныхъ приглашеній, а также исходатайствованы: разрѣшеніе департамента желѣзно-дорожныхъ дѣлъ на пользованіе экспонентами тарифными льготами (безплатный обратный провозъ съ выставки непроданныхъ экспонатовъ) и разрѣшеніе на безпошлинный пропускъ иностранныхъ экспонатовъ, при условіи внесенія за нихъ залога (въ размѣрѣ пошлины), подлежащаго возврату по принадлежности при вывозѣ экспонатовъ обратно

за границу не позднѣе 6-ти мѣсяцевъ. 3) Въ подготовительныхъ работахъ по организаціи экскурсій по Кавказу членовъ Съѣзда.

Маршруты экскурсій предположены слѣдующіе:

Маршрутъ I: По Черному морю (пароходомъ изъ Одессы, съ заходомъ въ Севастополь и Новороссійскъ) съ экскурсіями въ Гагры, Сухумъ, Батумъ и Чакву. Далѣе, по желѣзной дорогѣ, въ Боржомъ (Бакуріани или Абастуманъ) и Тифлисъ.

Маршрутъ II: По желѣзной дорогѣ изъ Ростова на Минеральныя Воды (съ экскурсіей на минераловодскую группу: Пятигорскъ—Желѣзноводскъ—Ессентуки—Кисловодскъ)—Бесланъ—Владикавказъ. Изъ Владикавказа на автомобиляхъ или экипажахъ по Военно-Грузинской дорогѣ (съ экскурсіей на Девдоракскій ледникъ Казбека) въ Тифлисъ. Для желающихъ ознакомиться съ нефтяными промыслами въ Грозномъ и Баку, съ системой орошенія Муганской степи и съ Зурнабадской противочумной станціей, II маршрутъ можетъ быть видоизмѣненъ слѣдующимъ образомъ: Ростовъ—Минеральныя Воды (съ экскурсіей на минераловодскую группу: Пятигорскъ—Желѣзноводскъ—Ессентуки—Кисловодскъ), Бесланъ—Грозный—Баку (съ экскурсіями въ предѣлахъ нефтеноснаго района), Елисаветполь (съ заѣздомъ въ Зурнабадъ), Тифлисъ (Маршрутъ IIа).

По окончаніи Съѣзда и до обратнаго отъѣзда членовъ Съѣзда въ Россію по вышеназваннымъ маршрутамъ, желающіе могутъ совершить желѣзнодорожную экскурсію въ Араратскую равнину по слѣдующему маршруту:

Маршрутъ III. Тифлисъ—Бамбакское ущелье (съ остановкой на Аллавердскомъ мѣдеплавильномъ заводѣ), Караклисъ — Александрополь — Ани — Эчміадзинъ — Эриванъ. Этотъ же маршрутъ будетъ исполненъ и въ обратномъ направленіи съ такимъ разсчетомъ, что на поѣздку въ Эриванъ и обратно будетъ затрачено не болѣе 3—4 дней, при чемъ, по возвращеніи въ Тифлисъ, экскурсанты маршрута III могутъ сейчасъ же примкнуть къ участникамъ экскурсіи по обратнымъ маршрутамъ I, II, IIа.

Всѣ морскія поѣздки членовъ Съѣзда по вышеуказаннымъ маршрутамъ предполагается организовать изъ слѣдующихъ пунктовъ: Одесса, Севастополь, Новороссійскъ.

Распорядительный Комитетъ обращается къ представителямъ русской науки и ко всѣмъ интересующимся задачами Съѣзда съ покорнѣйшей просьбой почтить Съѣздъ своимъ личнымъ присутствіемъ или присылкою ученыхъ трудовъ. Такъ какъ Комитету не-

обходимо заранѣе знать на какое число членовъ Съѣзда и докладчиковъ онъ можетъ разсчитывать, то онъ обращается съ просьбой къ лицамъ, желающимъ принять участіе въ Съѣздѣ своимъ личнымъ присутствіемъ или докладами, какъ получившимъ уже приглашеніе на Съѣздъ, такъ и къ тѣмъ, кто почему-либо до настоящаго времени приглашеній не получилъ, извѣстить Комитетъ никакъ не позже 15 апрѣля 1913 года о своемъ намѣреніи прибыть на Съѣздъ или представить сообщенія или доклады, адресуя письма на имя Распорядительнаго Комитета XIII Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей (Тифлисъ, канцелярія Попечителя Кавказскаго учебнаго округа), а также сообщить свои адреса и обозначить ту секцію, на которую они намѣрены записаться. Въ Комитетѣ же принимаются (до 1 марта 1913 г.) предварительныя записи на экскурсіи, а также принимаются членскіе взносы и выдаются всѣ свѣдѣнія и справки о Съѣздѣ.

Г. У. З. и З.

Копія.

ДЕПАРТАМЕНТЪ

ЗЕМЛЕДѢЛІЯ.

Циркулярно.

Отд. V-а, ст. 3.

3 сентября 1912 г.

№ 163.

Въ Губернскія и Уѣздныя Земскія Управы.

Въ цѣляхъ надлежащей подготовки инструкторскаго персонала, необходимаго для осуществленія мѣропріятій по улучшенію птицеводнаго промысла въ Россіи, Департаментомъ были учреждены въ 1911-мъ году инструкторскіе курсы птицеводства. Цѣль этихъ курсовъ—путемъ основательнаго изученія, теоретическаго и практическаго, связанныхъ съ птицеводствомъ, біологическихъ, зоотехническихъ и экономическихъ наукъ, подготовить молодыхъ людей къ инструкторской дѣятельности по птицеводству для правительственной и земской службы.

Въ наступающемъ 1912—1913 учебномъ году пріемъ на курсы будетъ ограниченный. При прочихъ равныхъ условіяхъ предпочтеніе будетъ отдаваться лицамъ, окончившимъ среднія учебныя заведенія высшаго типа, напримѣръ, 7 классовъ реальнаго училища, а не 6, въ женскихъ гимназіяхъ 8 классовъ, а не 7, и имѣющимъ лучшіе баллы, въ особенности по естественнымъ наукамъ, а также лицамъ, знающимъ иностранные языки. Замужнія на курсы не принимаются. Курсы не даютъ отсрочки по отбыванію воинской повинности.

Довольно обширная программа, а также обиліе демонстративныхъ и практическихъ занятій на курсахъ исключаютъ всякую возможность заниматься какимъ бы то ни было постороннимъ дѣломъ; слушатели должны быть въ распоряженіи администраціи курсовъ цѣлый день. При такихъ условіяхъ слушатели должны обладать крѣпкимъ здоровьемъ и значительной выносливостью, о чемъ и слѣдуетъ предупредить кандидатовъ. Присутствіе на лекціяхъ и практическихъ занятіяхъ безусловно обязательно. Экзамены назначаются по мѣрѣ прохожденія отдѣльныхъ предметовъ. Занятія на курсахъ будутъ продолжаться годъ и два мѣсяца, съ 1 октября 1912 года по 1 декабря будущаго года.

Преподаваемые на курсахъ предметы могутъ быть раздѣлены на три группы. Въ первую группу входятъ науки біологическія; сюда относятся:

Естественная исторія птицъ (орнитологія).

Анатомія птицъ.

Естественная исторія млекопитающихъ съ подробнымъ изученіемъ анатоміи кролика.

Физіологія животныхъ.

Эмбріологія птицъ и кроликовъ.

Микроскопическая анатомія.

Вторую группу составляютъ науки зоотехническія; сюда относятся: общая зоотехнія.

(Общіе законы о разведеніи животныхъ, о кормленіи ихъ, съ подробнымъ изученіемъ примѣняемыхъ въ птицеводствѣ и кролиководствѣ кормовыхъ средствъ).

Птицеводство.

Теорія и техника инкубаціи.

Теорія и техника откормочнаго дѣла.

Кролиководство.

Гигіена общая со включеніемъ методики бактеріологическихъ изслѣдованій и частная, примѣнительно къ птицеводству и кролиководству.

Патологія птицъ и кроликовъ (ученіе о болѣзняхъ и вредителяхъ), сельскохозяйственная архитектура (основы строительнаго искусства примѣнительно къ потребностямъ птицеводства и кролиководства, въ томъ числѣ знакомство со строительными матеріалами, съ черченіемъ плановъ и урочнымъ положеніемъ).

Сельскохозяйственное счетоводство примѣнительно къ птицеводству и кролиководству.

Третья группа охватываетъ экономическія науки и, такъ сказать, инструкторскіе предметы.

Сельскохозяйственную экономію.

Ученіе о кооперацiяхъ съ обзоромъ кооперативнаго дѣла въ Россіи и изученіемъ уставовъ кооперативовъ, имѣющихъ связь съ птицеводствомъ или отношеніе къ нему.

Сельскохозяйственную географію.

Холодильное дѣло.

Птицепромышленность въ Россіи, въ Западной Европѣ и Сѣверной Америкѣ, съ обращеніемъ особаго вниманія на рынки нашихъ конкуррентовъ и рынки нашего сбыта.

Законовѣдѣніе и общія основанія административнаго права съ цѣлью дать понятіе слушателямъ объ организаціи правительственныхъ и земскихъ учрежденій въ Россіи.

Агрономическую помощь населенію, ознакомленіе съ характеромъ дѣятельности спеціалистовъ и инструкторовъ по отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, съ обязанностями будущихъ инструкторовъ по птицеводству, ихъ отчетностью (съ практическими занятіями) и положеніемъ въ ряду состоящаго на правительственной и земской службѣ агрономическаго персонала.

Обозрѣніе литературы по птицеводству и по кооперативному дѣлу, технику фотографіи.

Въ основу преподаванія на курсахъ положена система репетицій и практическихъ занятій, что необходимо для облегченія усвоенія преподаваемыхъ предметовъ въ короткое время. Курсы состоятъ при сельско-хозяйственно-бактеріологической лабораторіи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, въ С.-Петербургѣ.

Практика по птицеводству проходится на птичникѣ при Богородицкомъ среднемъ сельскохозяйственномъ училищѣ, Тульской губерніи, а также въ птицеводномъ хозяйствѣ одного имѣнія въ Петербургской губ. Въ Петербургѣ слушатели

знакомятся съ научными, практическими и торгово-промышленными учрежденіями, имѣющими отношеніе къ птицеводству и птицепромышленности. Независимо отъ сего слушатели ежегодно отправляются въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ въ экскурсію для ознакомленія съ постановкою птицепромышленнаго дѣла въ наиболѣе важныхъ въ этомъ отношеніи губерніяхъ.

Руководство курсами возложено на особую коммиссію въ составѣ: Предсѣдателя, Члена Ученаго Комитета, Завѣдывающаго сельскохозяйственно-бактеріологическою лабораторіею М. Г. Тартаковскаго и членовъ: состоящихъ при Департаментѣ Земледѣлія старшаго спеціалиста по сельскохозяйственной части А. А. Фриде и спеціалиста по птицеводству М. А. Фриде. Преподавателями курсовъ состоятъ профессора, доценты и преподаватели различныхъ высшихъ учебныхъ заведеній и спеціалисты по отдѣльнымъ отраслямъ знаній.

За всякаго рода справками по дѣламъ курсовъ надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія (по Отдѣленію V-а) или къ Предсѣдателю Коммиссіи по организаціи курсовъ (адресъ: С.-Петербургъ, Арсенальная ул., домъ № 1).

Извѣщая объ организаціи курсовъ для подготовки инструкторовъ по птицеводству, Департаментъ Земледѣлія имѣетъ въ виду принимать на нихъ, вмѣстѣ съ другими кандидатами, также лицъ, командируемыхъ губернскими и уѣздными земствами въ качествѣ своихъ стипендіатовъ.

При этомъ Департаментъ проситъ Земскія Управы о своемъ желаніи командировать практикантовъ на означенные курсы сообщить Департаменту *заблаговременно*, не позже 25 сентября.

Подлинный подписалъ:
за директора *П. Суринъ*.

Скрѣпилъ: и. об. начальника отдѣленія *А. Шахназаровъ*.

Съ подлиннымъ вѣрно:
и. об. столоначальника *Л. Золотаревъ*.

Обмѣнъ орнитологическимъ матеріаломъ [1]).

Austausch ornithologischen Materials [2]).

6) В. Чузи заявилъ въ редакцію о желаніи пріобрѣтать покупкою или въ обмѣнъ шкурки птицъ изъ юго-восточной и южной Россіи, предлагая со своей стороны на продажу или въ обмѣнъ шкурки птицъ изъ Туниса, Италіи, Корсики, Сардиніи и съ Канарскихъ острововъ.

Адресъ: Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen, Villa Tännenhof bei Hallein, Salzburg (Österreich).

7) Wáclav Čapek обратился въ редакцію съ просьбою указать ему лицъ, у которыхъ онъ могъ бы покупать птицъ съ Урала въ видѣ тушекъ или необдѣланныхъ скелетовъ.

Адресъ: Wáclav Čapek, Oslavany, Morava (Österreich).

[1]) См. „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1911 г., кн. II стр. 207.

[2]) S. „Ornithologische Mitteilungen“, 1911, B. II, S. 207.

Изданія, присланныя въ редакцію.

Èditions parvenus à la rédaction.

Труды Сельскохозяйственно-Бактеріологической Лабораторіи, т. III. Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія, Департаментъ Земледѣлія, 1911 г.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, №№ 1—2 (январь—апрѣль) и 3—4 (май—августъ), 1912 г.

Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей, т. XXII, вып. 2 и 3—4, 1912 г.

Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, т. XLIII, 1912 г.

Ученыя записки Императорскаго Казанскаго Университета, кн. II (ноябрь) и 12 (декабрь), 1912 г.

Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, LV, 1912.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, № 8 (August), 1912.

Л. А. Молчановъ: „Поѣздка въ дельту Аму-Дарьи лѣтомъ 1911 г.“. Отдѣльный оттискъ изъ „Извѣстій Имп. Русскаго Географическаго Общества“, т. XLVIII, вып. I, 1912 г.

Труды Саратовскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Естествознанія, т. VI, вып. 2, 1912 г.

Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, книжка XXXVI, вып. I, 1912 г.

Труды Общества Испытателей Природы при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ (Орнитологическая работа: *В. Г. Аверинъ.*— «Степная овсянка—Emberiza citrinella somovi *nov. subsp.*»), т. XLV, 1911—1912 г.г.

Бюллетень Русскаго Горнаго Общества, № 6, ноябрь, 1912 г.

Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, 1911 г., т. XVI, № 3 (*П. В. Нестеровъ*—„Отчетъ о зоологическихъ изслѣдованіяхъ въ юго-западномъ Закавказьѣ (1909 и 1910) и Эрзерумскомъ вилайетѣ (1910)". *П. В. Нестеровъ*—„Матеріалы по орнитофаунѣ юго-западнаго Закавказья и сѣверо-восточной части Малой Азіи").

Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, 1911 г., т. XVI, № 4; 1912 г., т. XVII, № 1; 1912 г., т. XVII, № 2.

Ornithologisches Iahrbuch, Heft 5—6, 1912.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, № $^{9}/_{10}$, 1912.

Wilhelm Rüdiger: „Hermann Goebel" (Nachruf). Separat-Abdruck aus: Zeitschrift für Oologie und Ornithologie.

А. А. Яната: „Программы ботаническихъ экскурсій въ окрестностяхъ города Николаева", вып. 1, 2 и 3. Изданіе Николаевскаго Общества Любителей Природы, 1911 г.

Отчетъ о состояніи Московскаго Сельскохозяйственнаго Института за 1911 годъ.

М. Рузскій: „Мирмекологическія замѣтки". Оттискъ изъ „Ученыхъ записокъ Казанскаго Ветеринарнаго Иститута", т. XXIX—1912 г.

Варшавскія Университетскія Извѣстія, книги VIII и IX, 1912 г.; книга I, 1913 г.

Журналъ Николаевскаго Общества Любителей Природы.—**„Природа",** № 3 за 1911 г. и № 4 за 1912 г.

С. А. Теплоуховъ: „Матеріалы по орнитофаунѣ Пермской губерніи". (Сѣверная часть Чердынскаго уѣзда: верховья р.р. Колвы и Печоры съ Уньей). Приложеніе къ „Протоколамъ засѣданій Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. № 266".—1911 г.

С. А. Теплоуховъ: „Предварительный, краткій отчетъ о командировкѣ съ орнитологической цѣлью лѣтомъ 1911 года въ долину рѣки Обвы, Пермской губерніи". Приложеніе къ „Протоколамъ засѣданій Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. № 279".—1912 г.

Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института, кн. 3 и 4 за 1912 г.

Журналъ **„Рыболовъ и Охотникъ"** за 1912 г.
„ **„Семья Охотниковъ"** за 1912 г.
„ **„Природа"** за 1912 г.
„ **„Труды Бюро по прикладной ботаникѣ"** за 1912 г.
„ **„Землевѣдѣніе"** за 1912 г.

Журналъ **„Сельское Хозяйство и Лѣсоводство“** за 1912 г.

„ **„Лѣсной Журналъ“** за 1912 г.

„ **„Извѣстія по литературѣ, наукамъ и библіографіи“** за 1912 г.

„ **„Естествознаніе и Географія“** за 1912 г.

„ **„Любитель Природы“** за 1912 г.

„ **„Извѣстія Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера“** за 1912 г.

„Der Ornithologische Beobachter“, Heft 3 und 4, 1912—1913.

Jahresbericht pro 1911/12. Beilage zum „Ornithologischen Beobachter“, № 4, 1913.

Bericht der Kommission über die Wettbewerbe in Futterfinden und Nistkästen der Vögel (Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz). Beilage zum „Ornithologischen Beobachter“, Heft 3, Dez. 1912.

Журналъ **„Птицеводное Хозяйство“** за 1912 г.

Фауна Россіи и сопредѣльныхъ странъ, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. **Рыбы** (Marsipobranchii и Pisces), т. III, вып. I.

Фауна Россіи и сопредѣльныхъ странъ, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. **Гидроиды** (Hydroidea), т. II, вып. I.

Извѣстія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, №№ 1, 2 и 3 за 1913 г.

Бюллетени Харьковскаго Общества Любителей Природы, № 4, 1912. (*П. Г. Гирничъ.* „Замѣтки о нѣкоторыхъ птицахъ Харьковской губ.“).

Журналъ **„Птицевѣдѣніе и Птицеводство“**, кн. 3—4 за 1912.

Вышелъ изъ печати 5 марта (ст. ст.) 1913 г.—Ausgegeben am 5 März (a. St.) 1913.

Редакторъ-издатель: **Г. И. Поляковъ.** Herausgeber: **G. I. Poljakow.**

Тип. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°, Москва.

„Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1913 годъ.

Открыта подписка на 1913 годъ на:

ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ.

Продолжается подписка на 1913 годъ (XX годъ изданія) на журналъ, издаваемый Географическимъ Отдѣленіемъ Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи подъ редакціей проф. **Д. Н. Анучина.**

Журналъ „**ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ**“ посвященъ разработкѣ вопросовъ общаго землевѣдѣнія и страновѣдѣнія, особенно изученію Россіи. Содержаніе журнала составляется изъ оригинальныхъ изслѣдованій, очерковъ, замѣтокъ путешественниковъ, обзоровъ, историко-географическихъ и критическихъ статей, также переводныхъ статей, мелкихъ извѣстій, географической хроники, библіографіи. Въ программу журнала входятъ также вопросы о преподаваніи географіи, а въ приложеніи къ книжкамъ журнала помѣщаются отдѣльныя оригинальныя и переводныя общедоступныя сочиненія—по вопросамъ землевѣдѣнія и страновѣдѣнія, путешествіямъ и по соприкасающимся съ географіей областямъ знанія.

„**Землевѣдѣніе**“ выходитъ 4-мя книжками въ годъ, размѣромъ около 10—12 печатныхъ листовъ, съ приложеніемъ картъ, фототипій и рисунковъ въ текстѣ. Цѣна **ШЕСТЬ** рублей въ годъ съ доставкой и пересылкой. Гг. иногородніе благоволятъ обращаться по адресу: **Москва, Географическое Отдѣленіе О. Л. Е., Политехническій музей.**

Полная серія „ЗЕМЛЕВѢДѢНІЯ“, за 19 лѣтъ (1894—1912), безъ 1-й книжки 1894 г., можетъ быть пріобрѣтаема за **95** р., съ подпиской на 1913 г.—за **100** р., а съ 1-й книжкой 1894 г.—за **120** р.

Отдѣльныя изданія Географическаго Отдѣленія: *Ф. Нансенъ.* Среди льдовъ и во мракѣ полярной ночи. Перев. А. А. Крубера, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. Ц. 4 р. *Г. Н. Потанинъ.* Восточные мотивы въ средневѣковомъ европейск. эпосѣ. Ц. 2 р. *З. Гюнтеръ.* Исторія географическихъ открытій и успѣхи научнаго землевѣдѣнія въ XIX в. Переводъ Л. Д. Синицкаго, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. Ц. 1 р. *Гуго Гротъ.* По Европейской и Азіатской Турціи. Пер. подъ ред. С. Г. Григорьева. Ц. 1 р. *Геттнеръ.* Европейская Россія. Антропогеогр. этюдъ. Съ 21 карт. въ текстѣ. Пер. Л. Д. Синицкаго. М. 1907 г. Ц. 1 р. *Д. Анучинъ.* Японія и японцы. Съ 30 рис. и карт. 1907 г. Ц. 50 к. *Проф. А. Филиппсонъ.* Средиземье (Область Средиземнаго моря). Съ таблицами (ландшафтами) и картами. Пер. П. А. Бѣльскаго, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. М. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.

Складъ послѣдняго изданія: Т-во Кушнеревъ и К⁰, Москва, Пименовская ул., свой домъ.

ПРИРОДА.

Открыта подписка на 1913 г. (2-й годъ изданія) на ежемѣсячный популярный естественно-историческій съ иллюстраціями журналъ для самообразованія. Подъ редакціей проф. *В. А. Вагнера* (Спб.), проф. *Л. В. Писаржевскаго* (Спб.) и препод. В. Ж. К. *Л. А. Тарасевича* (Москва).

Содержаніе: Философія естествознанія. Астрономія. Физика. Химія. Геологія съ палеонтологіей. Минералогія. Общая біологія. Зоологія. Ботаника. Человѣкъ и его мѣсто въ природѣ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Проф. С. В. Аверинцевъ, В. Агафоновъ, проф. П. И. Андрусовъ, проф. В. М. Арнольди, лаб. Г. Ф. Арнольдъ, проф. П. А. Артемьевъ, проф. П. И. Боргманъ, проф. П. И. Бахметьевъ (София), А. П. Бахъ (Женева), прив.-доц. А. И. Бачинскій, докт. геогр. Л. С. Бергъ, астр. С. П. Блажко, прив.-доц. В. А. Бородовскій, П. А. Бѣльскій, проф. В. А. Вагнеръ, проф. Ю. П. Вагнеръ, акад. проф. П. И. Вальденъ, проф. Б. Ф. Веригo, акад. проф. В. И. Вернадскій, лаб. В. И. Верховскій, проф. Г. В. Вульфъ, М. П. Гольцсмитъ (Парижъ), проф. А. Г. Гурвичъ, проф. В. Я. Данилевскій, д-ръ П. И. Діатроптовъ, проф. А. С. Догель, В. А. Дубянскій, Е. А. Елачичъ, проф. В. В. Завьяловъ, проф. В. Р. Заленскій, проф. А. А. Ивановъ, проф. В. Н. Ипатьевъ, лаб. П. В. Казанецкій, проф. А. В. Клоссовскій, проф. П. К. Кольцовъ, преп. Инж. уч. Т. П. Кравецъ, проф. А. П. Красновъ, проф. П. И. Кузнецовъ, проф. П. М. Кулагинъ, прив.-доц. П. В. Култашевъ, проф. П. С. Курнаковъ, проф. П. П. Лазаревъ, прив.-доц. М. Ю. Лахтинъ, П. П. Лебедевко, лабор. Г. А. Левитскій, І. Д. Лукашевичъ, д-ръ Е. И. Марциновскій, проф. А. К. Медвѣдевъ, проф. М. А. Мензбиръ, проф. П. Г. Меликовъ, проф. С. П. Метальниковъ, П. А. Морозовъ, проф. Г. Морозовъ, прив.-доц. А. В. Немиловъ, проф. А. В. Нечаевъ, проф. А. М. Никольскій, докт. зоол. М. М. Новиковъ, лаб. А. Г. Огородниковъ, В. Л. Омелянскій, проф. А. В. Павловъ, проф. Л. В. Писаржевскій, проф. В. В. Подпысоцкій, проф. К. Д. Покровскій, Б. Е. Райковъ, А. А. Рихтеръ, А. Рождественскій (Лондонъ), П. А. Рубакинъ, проф. Д. П. Рузскій, Я. В. Самойловъ, проф. А. В. Сапожниковъ, Ю. Ф. Семеновъ, Л. Д. Синицкій, асс. по каѳ. физ. геогр. С. А. Совѣтовъ, препод. С. П. Созоновъ, лаб. И. И. Соковнинъ, проф. А. П. Сѣверцевъ, проф. С. М. Тапатаръ, д-ръ Л. А. Тарасевичъ, маг. хим. А. А. Титовъ, астрономъ Пулк. обсерв. Г. А. Тиховъ, проф. М. М. Тихвинскій, проф. В. Е. Тищенко, проф. П. А. Умовъ, прив.-доц. А. Е. Ферсманъ, проф. О. Д. Хвольсонъ, преп. А. А. Черновъ, проф. Л. А. Чугаевъ, А. И. Чураковъ, прив.-доц. В. В. Шипчинскій, пр.-доц. П. Ю. Шмидтъ, проф. Е. А. Шульцъ, д-ръ С. М. Щастный, проф. А. И. Щукаревъ, прив.-доц. А. П. Ющенко, преп. А. И. Янишкій, проф. А. П. Ярошкій.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: цѣна въ годъ (съ доставкой и пересылкой) — 5 руб.; на $^1/_2$ года—3 руб., на три мѣсяца—1 руб. 50 коп., за границу на годъ—7 руб. **Допускается разсрочка:** 3 руб. при подпискѣ и 2 руб. не позже 1 мая.

Подписка на $^1/_2$ года, 3 мѣсяца и въ разсрочку принимается только въ главной конторѣ (Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11).

Объявленія печатаются въ журналѣ по слѣдующей цѣнѣ: на обложкѣ: 4-я стр.—100 р., $^1/_2$ стр.—60 р., $^1/_4$ стр.—35 р.; 2-я и 3-я стр.—75 р., $^1/_2$ стр.—40 р., $^1/_4$ стр.—25 р.; послѣ текста: стр.—60 р., $^1/_2$ стр.—35 р., $^1/_4$ стр.—20 р.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА: Въ конторѣ журнала „Природа“ (Москва), по всѣхъ книжныхъ магазинахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отдѣленіяхъ.

Адресъ главной конторы и редакціи: Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11. Телефонъ № 4-10-81.

БИБЛІОТЕКА-ПРИРОДА (естественно-историческая). Открыта подписка на 1913 годъ.

Ежемѣсячный журналъ, подъ ред. проф. **Л. В. Писаржевскаго.** При ближайшемъ участіи сотрудниковъ журнала „Природа“.

За годъ подписчикамъ будетъ дано 12 книгъ (объемомъ свыше 1200 страницъ обычнаго книжнаго формата), посвященныхъ отдѣльнымъ наиболѣе интереснымъ вопросамъ естествознанія. „Библіотека-Природа“ ставитъ своею задачей популярное изложеніе въ болѣе глубокой и расширенной формѣ тѣхъ естественно-историческихъ вопросовъ, которые разсматриваются въ обычныхъ журнальныхъ статьяхъ лишь въ общихъ чертахъ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА (съ доставкой и пересылкой): за годъ—4 р. $^1/_2$ года—2 р. 40 к.; 3 мѣс.—1 р. 20 к.; за границу годъ—6 р.

Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подпискѣ и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Основныя начала естествознанія.

Популярная библіотека для самообразованія. Открыта подписка на 1913 годъ. Ежемѣсячный журналъ, подъ ред. проф. **Л. В. Писаржевскаго.** При ближайшемъ участіи сотрудниковъ журнала „Природа“.

Библіотека **„Основныя начала естествознанія“** предназначается для лицъ, не получившихъ систематическихъ естественно-историческихъ знаній и желающихъ пополнить этотъ пробѣлъ самообразованіемъ. Въ 1913 году всѣ 12 книгъ библіотеки (свыше 1200 страницъ обычнаго книжнаго формата) будутъ посвящены популярному изложенію основъ наиболѣе важныхъ отдѣловъ естествознанія.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА (съ доставкой и пересылкой): за годъ—4 р.; 1/2 года—2 р. 40 к.; 3 мѣс.—1 р. 20 к.; за границу—6 р.

Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подпискѣ и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Подписка принимается въ конторѣ журнала „Природа“, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отдѣленіяхъ.

Подписка на 1/2 года, 3 мѣсяца и въ разсрочку принимается исключительно главной конторой (**Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11**).

Естествознаніе и Географія.

Открыта подписка на ежемѣсячный научно-популярный и педагогическій журналъ. (Годъ XVIII.) Выходитъ ежемѣсячно, за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (іюня—іюля), книжками въ 5—6 печатныхъ листовъ.

Журналъ **ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія** для фундаментальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній и для учительскихъ библіотекъ учительскихъ институтовъ и семинарій и городскихъ училищъ; **Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ ОДОБРЕНЪ** за всѣ годы существованія и допущенъ на будущее время въ библіотеки подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеній; **Ученымъ Комитетомъ Министерства Торговли и Промышленности РЕКОМЕНДОВАНЪ** въ библіотеки коммерческихъ учебныхъ заведеній.

Журналъ ставитъ себѣ задачей удовлетворять научному интересу читателей въ области естествознанія и географіи, а также способствовать правильной постановкѣ и разработкѣ вопросовъ по преподаванію естествознанія и географіи. Въ журналѣ имѣются отдѣлы: 1) научно-популярныя статьи по всѣмъ отраслямъ естествознанія и географіи, статьи по вопросамъ преподаванія естествознанія теоретическаго и прикладного (садоводство, пчеловодство и т. п.) и географіи; 2) акваріумъ и терраріумъ; 3) библіографія (обзоръ русской и иностранной литературы по естествознанію и географіи); 4) хроника; 5) смѣсь; 6) вопросы и отвѣты по предметамъ программы.

Въ журналѣ были помѣщены статьи: П. Я. Акинфіева, А. П. Артари, проф. П. П. Бахметьева, В. Н. Болдырева, Л. И. Бородовскаго, проф. А. Ѳ. Брандта, В. В. Богданова, проф. В. А. Вагнера, П. Вольногорскаго, Н. П. Вакуловскаго, проф. С. П. Глазенапа, М. П. Голенкина, В. П. Граціанова, проф. А. С. Догеля, М. И. Демкова, Л. Н. Елагина, Е. В. Жадовскаго, Б. М. Житкова, В. Р. Заленскаго, проф. Н. Ю. Зографа, Н. О. Золотницкаго, А. П. Иванова, проф. Н. Ѳ. Кащенко, П. М. Книповича, проф. П. П. Кузнецова, проф. П. А. Каблукова, В. В. Кистяковскаго, проф. Н. М. Кулагина, проф. А. Кожевникова, М. А. Кожевниковой, проф. А. П. Краснова, А. Ф. Ляйстера, М. Э. Мендельсона, С. П. Меча, проф. Н. В. Насонова, Г. А. Надсона, проф. А. М. Никольскаго, К. Д. Носилова, проф. А. П. Павлова, А. Н. Рождественскаго, проф. В. В. Сапожникова, К. А. Сатунина, проф. К. К. Сентъ-Илера, М. М. Сіязова, В. П. Таліева, проф. К. А. Тимирязева, проф. А. А. Тихомирова, П. Р. Фрейберга, проф. П. А. Холодковскаго, проф. В. М. Шимкевича, П. Ю. Шмидта, проф. Я. П. Щелкановцева, проф. А. Эйхенвальда, Э. В. Эриксона и нѣкоторыхъ друг.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 руб. 50 коп., на полгода съ пересылкою и доставкою 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цѣну можно получать журналъ за 1903—1910 гг.; за остальные годы (1896—1902) по 4 руб. за каждый годъ съ пересылкою. Выписывающіе всю серію за первыя 10 лѣтъ платятъ 35 руб. съ перес. Книжки журнала въ отдѣльной продажѣ стоятъ 75 коп. каждая.

Книжные магазины, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и пересылку денегъ только 20 коп. съ каждаго годового полнаго экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается.

При непосредственномъ обращеніи въ контору допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб. 50 коп. и къ 1 іюня 2 руб. Другихъ условій разсрочки не допускается.

Контора редакціи: Москва, Донская ул., д. Даниловой, кв. № 3.

Редакторъ-издатель **М. П. Варавва.**

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ

Императорскаго Казанскаго Университета. Открыта подписка на 1913 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ заключаются: I. Отдѣлъ наукъ. II. Отдѣлъ критики и библіографіи. III. Университетская лѣтопись. IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей, памятники историческіе и литературные, съ научными комментаріями, и памятники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями съ пересылкою **7** руб.

Подписка принимается въ Правленіи Университета.

Редакторъ **А. Піонтковскій.**

Извѣстія Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера.

Открыта подписка на 1913 годъ на двухнедѣльный журналъ. Годъ изданія пятый. (Журналъ жизни сѣвернаго края.) Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца. Задачи и цѣли общества опредѣляютъ и задачи „Извѣстій“.

Программа журнала: Узаконенія. Распоряженія и постановленія правительственныхъ и общественныхъ учрежденій центральныхъ и мѣстныхъ, имѣющія отношенія къ жизни Сѣвера. Текущая дѣятельность Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера. Отдѣльныя статьи и доклады по изученію Сѣвера и выясненію условій его развитія. Обсужденіе предположеній, направленныхъ къ измѣненію условій жизни и производительности Сѣвера. Хроника частной, правительственной, общественной иниціативы въ дѣлѣ изученія Сѣвера, развитія его производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя замѣтки и сообщенія о жизни края и ея изученія. Очерки жизни. Сообщенія изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами Сѣвера. Обзоръ литературы о Сѣверѣ. Справочный отдѣлъ. Консультація по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества (отвѣты редакціи). Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: для членовъ Архангельскаго Общества для изученія Русскаго Сѣвера **3** руб. въ годъ; для прочихъ подписчиковъ **4** руб.

Допускается разсрочка по полугодіямъ и по четвертямъ года, при взносѣ денегъ впередъ.

Плата за объявленія на первой страницѣ журнала—20 коп. за строку петита, на послѣдней—10 коп.

Подписка на „Извѣстія А. О. И. Р. С.“ принимается во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Имперіи безъ уплаты **15** коп. за переводъ денегъ.

Въ Архангельскѣ подписка и объявленія принимаются: въ Библіотекѣ Общества въ зданіи Городской Думы, въ Городской Публичной библіотекѣ, въ магазинѣ Об-на Потребителей и въ книжныхъ магазинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ.

Гг. иногородніе публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по адресу: Архангельскъ, Правленіе Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера.

Рукописи слѣдуетъ направлять по адресу редакціи. Статьи и корреспонденціи оплачиваются по усмотрѣнію редакціи.

Пробные №№ высылаются за 4 семикоп. марки. За перемѣну адреса взимается 4 семикоп. марки.

Издатель **Архангельское Общество изученія Русскаго Сѣвера.**

Редакторъ **В. Ленгаузъ.**

Открыта подписка на 1913 годъ
НА ЖУРНАЛЪ
„ПТИЦЕВѢДѢНІЕ и ПТИЦЕВОДСТВО“.
(IV-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Органъ Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній.

Издаваемый при ближайшемъ участіи: В. К. Анфилова, С. А. Бутурлина, Г. С. Деревянко, В. Ч. Дорогостайскаго, В. Г. Дурова, П. Н. Елагина, П. Е. Ефимова, Б. М. Житкова, М. Т. Зароченцева, проф. Д. Н. Кайгородова, А. М. Кириллова, проф. Н. М. Кулагина, К. В. Лауницъ, бар. Г. В. Лоудонъ, Н. А. Мосолова, А. И. Ноневича, І. К. Пачоскаго, Ѳ. П. Половинкина. Г. И. Полякова, проф. М. И. Придорогина, И. А. Сатунина, Е. И. Свѣшникова, проф. И. П. Тарнани, кн. С. Н. Урусова, А. С. Хомякова, С. Ф. Фонъ-Штейна, М. В. Эпова и др. лицъ.

Журналъ посвященъ изученію птицъ вообще и русской орнитологіи по преимуществу, а равно домашнему и промысловому птицеводству Россіи.

Орнитологія: научная, экономическая, охотничья, промысловая, прирученныхъ и домашнихъ птицъ, физіологическая, патологическая, статистическая.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

Спеціальныя статьи по указаннымъ отдѣламъ орнитологіи. Обзоръ по орнитологіи русскихъ учрежденій. Орнитологическая библіографія. Смѣсь. Personalia. Вопросы и отвѣты.

Подписная цѣна:

На годъ **4** руб., на полгода **2** руб., отдѣльный номеръ **1** руб.

Выходитъ 4 раза въ годъ: два номера до лѣта и два номера послѣ лѣта.

Срокъ подписки съ 1-го января 1913 года.

Подписка принимается въ редакціи журнала: **Москва, Мясницкая, д. Липгартъ, реальное училище Воскресенскаго**, редакторомъ **Д. М. Россинскимъ**.

Плата за объявленія:

1 страница передъ текстомъ 25 руб., позади текста 15 руб.
½ „ „ „ 13 „ „ „ 8 „
¼ „ „ „ 8 „ „ „ 5 „

Редакторъ Предсѣдатель Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи *Д. М. Россинскій.*

Издатель Отдѣленіе Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи.

Der Ornithologische Beobachter.

Monatsberichte für Vogelkunde und Vogelschutz.

Offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz.

Einzige rein ornithologische Fachschrift in der Schweiz. Enthält einen deutschen und einen französischen Teil.

Preis Frs. 5,—jährlich.

Probehefte kostenfrei.—Bestellungen an die Expedition:

Buchdruckerei R. G. Zbinden, Rheinsprung 5, Basel (Schweiz).

ORNITHOLOGISCHES JAHRBUCH.

Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Herausgegeben

von

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.

XXIII Jahrgang.

Das „**Ornithologische Jahrbuch**“ bezweckt ausschliesslich die Pflege der palaearktischen Ornithologie und erscheint in 6 bez. 3 Doppelheften Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von Tafeln erfolgt nach Bedarf. — Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt bei direktem Bezuge für das Inland **10 Kronen**, für das **Ausland 10 Mk. (= 11.75 K) = 12.50 Frks. = 10 sh. = 4.50 Rbl. pränumerando**, im Buchhandel **12 Kronen = 12 Mark**. Volks- u. Mittelschulen erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von **6 Kronen** bez. **6 Mk.** (nur direkt). Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Raume auf dem Umschlage Aufnahme. Beilagen- und Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung. **Probehefte** nur gegen **Rücksendung**.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften zur Besprechung Abonnements, Annonzen und Beilagen bitten wir **an den Herausgeber**, Villa Tännenhof bei Hallein, Salzburg, zu adressieren.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, einziges seit 21 Jahren erscheinendes Fachorgan, herausgegeben von **Vilhelm Rüdiger, Hochzeit i. d. Neumark.** Der Abonnementspreis beträgt für das Jahr bei direkter Zusendung 5 Mk., nach den Ländern des Weltpostvereines 7 Frcs. pränumerando. Die Zeitschrift bringt aus Fachkreisen belehrende und einschlägige Artikel, Brut- und Sammelnotizen, Merkmale schwer zu unterscheidender Eier, Literatur, sowie eine grosse Anzahl Kauf- Verkaufs- und Tausch- Anzeigen.—Probenummern werden auf Wunsch frei zugesendet.

Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift. Im Auftrage der Dänischen ornithologischen Verein herausgegeben von O. Helms. Jährlich erscheint 4 Heften (je 3—4 Bagen), reich illustriert. **Preis des Jahrganges 4 Krone dansk (ca. 2 Rbl.).** Alle für die Redaction bestimmten Zusendungen sind an den Redactör, **O. Helms**, Pejrup, Danemark erbeten.

Памятка экстерна и учащагося.

(Гдѣ и какъ готовиться къ какому-нибудь экзамену?)

С. С. Рѣшетникова, при сотрудничествѣ проф. **К. Ѳ. Жакова** и др.

Цѣна 25 коп., съ пересылкой **50** коп. Можно 3 коп. марками. Наложеннымъ платежомъ не высылается.

Необходимое пособіе для всѣхъ, занимающихся **самообразованіемъ**, для экстерновъ, учащихся, ихъ родителей и учителей.

Брошюра-проспектъ высылается за 10 одноковесчныхъ марокъ.

Смѣлое, Полтавской губ., 139, С. С. Рѣшетникову.—Запишите.

РЫБОЛОВЪ и ОХОТНИКЪ.

Двухнедѣльный иллюстрированный журналъ охоты, рыболовства и рыбоводства. (Годъ изданія V-й.)

Въ 1913 году гг. подписчики получатъ: 24 №№ журнала „Рыболовъ-Охотникъ", посвященнаго рыболовству и рыбоводству, и отъ 12 до 24 №№ журнала „Охотникъ", посвященнаго охотѣ во всѣхъ видахъ и собаководству.

Программа журнала обширная: Законы по охотѣ и рыболовству.—Разсказы, стихотворенія, описанія. — Спеціальныя статьи по охотѣ и рыболовству. — Оружіе, рыболовныя свасти, приманки. — Портреты писателей-охотниковъ и рыбслововъ. — Жизнь обществъ.—За границей.—Корреспонденціи.—Отвѣты на вопросы.—Смѣсь.—Карикатуры.

Репродукціи съ фотографій **С. А. Лобовикова.**

Въ журналѣ принимаютъ участіе извѣстные писатели-рыболовы и охотники: Александровъ Л. Д., Генри Бартельсъ, Бялыницкій-Бируля В., Гладковъ Н. Н., Горчаковскій Ал., Диковъ В. П., Дѣдъ, Діанистъ, Евфратовъ П. П., Комаровъ И. П., Колмаковъ М. А., Кудряшовъ Н. В., Кучинъ П. В., Петровъ П. А., Плещеевъ В. А., Плетневъ П. Т., Спбилевъ Н. В., Скрывченко И. П., баронъ П. Г. Черкасовъ, Яблонскій П. І. и др.

Двѣ доплатныя преміи: 1) „Сборникъ статей по рыбоводству" барона **П. Г. Черкасова** и 2) „Охотничья собака. Руководство по воспитанію, дрессировкѣ и таскѣ охотничьихъ собакъ **Л. Яисона.**

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

безъ премій: на годъ — 2 руб., 1/2 года — 1 руб. 10 коп. Съ одной премісй (по выбору) на годъ — 2 руб. 50 коп., съ двумя преміями — 3 руб. Пробный № высылается за 7 коп. марку.

Адресъ редакціи: Вятка, Николаевская, д. Бермавъ.

Редакторъ-издатель **Ѳ. Куниловъ.** Издатель **А. Блювштейнъ.**

Отъ Редакціи.

1. Редакція не принимаетъ на себя отвѣтственности за своевременную доставку журнала, если подписка не была адресована непосредственно на ея имя.

2. При сообщеніи адреса подписчиковъ просятъ разборчиво обозначать имя, отчество, фамилію, а также губернію, уѣздъ и ближайшее почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяются Редакціей только въ тѣхъ случаяхъ, если таковыя поступаютъ отъ подписчиковъ не позже полученія ими слѣдующаго номера и съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы.

3. При заявленіи о неполученіи журнала и о перемѣнѣ адреса просятъ прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №. При заявленіи о перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4. Лицъ, обращающихся письменно въ Редакцію съ запросами, для полученія отвѣта просятъ прилагать почтовую марку. На вопросы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5. Наложеннымъ платежомъ выпуски журнала не высылаются.

6. Рукописи, посылаемыя въ Редакцію, должны быть четко написаны, обязательно за полной подписью автора и съ указаніемъ его точнаго адреса. При этомъ авторовъ просятъ писать на одной сторонѣ листа и оставлять поля. Желательно, чтобы статьи снабжались авторами, кромѣ русскихъ названій, названіями на какомъ-либо западноевропейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя наименованія птицъ въ работахъ были подчеркнуты авторами одинъ разъ. За номенклатуру въ научныхъ статьяхъ отвѣтственность лежитъ на авторахъ.

7. Непринятыя рукописи возвращаются за счетъ авторовъ въ видѣ посылки или подъ заказной бандеролью.

8. Для библіографическихъ отзывовъ просятъ присылать по два экземпляра работъ.

Редакція „Орнитологическаго Вѣстника“ покорнѣйше проситъ не отказать въ высылкѣ Вашихъ изданій въ порядкѣ обмѣна.

Почт. отд. „*Обнраловка*“ Моск. губ., им. „*Саввино*“

1913 г. Четвертый годъ изданія.—Quatrième année. № 2.

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Орнитологическій Вѣстникъ.

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN.

Выходитъ четыре раза въ годъ: два №№ до и два—послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна за 1 г.—4 руб., за 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу—8 р., за 1/2 страницы—4. р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половинною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просятъ адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle) l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakow, Russie, Chemin de fer Moscou — Nijninovgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savvino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein) jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poljakow, Russland, Postabteilung. «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut. «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

1. Къ орнитофаунѣ сѣверо-восточныхъ Саянъ. *А. Я. Тугаринов*ъ. 83
2. Овсянки въ различной степени переходныя между Emberiza leucocephalos S. G. Gm. и Emberiza citrinella erythrogenys Brehm. *Н. А. Зарудный* 91
3. Китайскій лебедь (Cygnus davidi Swinh.) въ Сибири. *В. Ч. Дорогостайскій* 110
4. Къ вопросу о систематическомъ положеніи бѣлокрылой сороки (Pica leucoptera Gould.). *С. И. Огнев*ъ 113
5. Къ распространенію ганчекъ. *С. А. Бутурлинъ* 116
6. Cyanistes cyanus yenisseensis But. et Tugar. въ Кіевѣ. *С. А. Бутурлинъ* 118
7. Новая форма клинтуха (Columba oenas hyrcana subsp. nov.). *Н. А. Зарудный и С. І. Билькевичъ* 120

8. **Краткія сообщенія:**

— Зимовка малиновки (Eritacus rubecula L i n n.) подъ Петербургомъ. *В. Бѣлоусовъ.*—Къ орнитофаунѣ Московской губерніи. *Г. И. Поляковъ.*—Замѣтка къ Cornix cornix L i n n. var. christophi A l p h. nova. *Н. А. Зарудный.*—Къ орнитофаунѣ Сувалкской губерніи. *Г. И. Поляковъ.*—Кое-что о пролетѣ чернаго аиста. *Е. Я. Кашинъ* 121

9. **Обзоръ русской орнитологической литературы.** (Продолженіе). *С. А. Бутурлинъ* 124

10. **Хроника:**

— 4-ое общее собраніе Международнаго Сельскохозяйственнаго Института. — Первое засѣданіе „Русскаго Орнитологическаго Комитета". — Награды, присужденныя нашимъ сотрудникамъ. — Засѣданіе Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній 132

Изданія, присланныя въ редакцію 133

Объявленія.

11. Поѣздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году. (Продолженіе). *Г. И. Поляковъ* . . . . . 141—188

SUJET.—INHALT.

P.

1. Zur Ornithologie des Nord-östlichen Sayan-Gebirges. Von *A. I. Tugarinow.* 83

2. Ueber diverse Uebergangsformen zwischen Gold-und Weiss-Kopf-Ammern (Emberiza citrinella erythrogenys B r e h m & Emberiza leucocephalos S. G. G m.). Von *N. A. Sarudny* 91

3. Chinesischer Schwan (Cygnus davidi S w i n h.) in Sibirien. Von *W. Dorogostaisky* 110

4. Zur Frage über die sistematische Stellung der weissflügligen Elster (Pica leucoptera G o u l d.). Von *S. I. Ognew* 113

5. Notes on Distribution of Penthestes (= Poecile). By *S. A. Buturlin* 116

6. Cyanistes cyanus yenisseensis B u t. et T u g a r. in Kiev. By *S. A. Buturlin* 118

7. Eine neue Form der Hohltaube (Columba oenas hyrcana s u b s p. n o v.). Von *N. A. Sarudny* und *S. I. Bilkewitsch* . . . 120

8. **Kurze Mitteilungen** 121

9. **Rewiew of the Russian ornithological Literature.** (Continued). By *S. A. Buturlin* 124

10. **Chronik** 132

Éditions parvenus à la rédaction 133

Inserate.

11. Ein ornithologischer Ausflug nach den Seen Saissan-nor und Marka-kul (in West-Sibirien) im Jahre 1909. (Fortsetzung). Von *G. I. Poljakow* . . . . . 141—188

Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб. д.
МОСКВА—1913.

Къ орнитофаунѣ сѣверо-восточныхъ Саянъ.

А. Я. Тугариновъ.

Zur Ornithologie des Nord-östlichen Sayan-Gebirges.

Von *A. J. Tugarinow.*

Истекшимъ лѣтомъ я совершилъ небольшую поѣздку въ предѣлы юго-восточной части Красноярскаго уѣзда. Центральнымъ пунктомъ экскурсій были окрестности селенія Выѣзжій Логъ, на берегу рѣки Маны, на границѣ Минусинскаго уѣзда. Отсюда совершались экскурсіи въ окрестностяхъ, дважды были сдѣланы экскурсіи на ближайшій хребетъ—Кутурчинъ, поднимающійся за предѣлы лѣсной растительности и достигающій высоты 1600 метровъ н. у. м. Кромѣ того, за время съ 7-го по 28-ое іюня была сдѣлана верховая экскурсія въ верховья рѣки Маны, къ ея истокамъ изъ одноименнаго озера. Послѣднее лежитъ уже на томъ водораздѣлѣ, который отдѣляетъ съ одной стороны системы правыхъ большихъ притоковъ Енисея (Канъ, Агулъ, Туманшетъ и др.), сбѣгающихъ на сѣверъ, и притоковъ Тубы: Шинды и Казыра, текущихъ на югъ и юго-западъ. Помянутый водораздѣлъ представляется въ видѣ обширнаго плоскогорія, болѣе или менѣе прорѣзаннаго долинами рѣкъ, то покрытаго рѣдколѣсьемъ изъ кедра и пихты, то уходящаго своими наиболѣе возвышенными частями за предѣлы лѣса и покрытаго альпійскими тундрами и зарослями горныхъ ивняковъ. Не рѣдки небольшія поля не стаивающихъ снѣговъ. Помянутый выше хребетъ Кутурчинъ представляетъ иную картину: въ верхней своей части это—обширный горный кряжъ со скалистыми выступами гранитовъ,

усыпанный по склонамъ обломками этой породы, а на вершинѣ увѣнчанный прихотливыми скалами, утесами и зубцами. Травянистый покровъ на большей части вершины почти отсутствуетъ, обломки породы покрыты лишь тощими лишайниками. На сѣверныхъ склонахъ и здѣсь не рѣдки не растаивающіе на лѣто снѣговые надувы. Окрестности Выѣзжаго Лога съ одной стороны имѣютъ уголки темной тайги, то съ бо́льшимъ, то съ меньшимъ преобладаніемъ какой-либо породы, до почти чистыхъ кедровниковъ, съ другой—имѣютъ широко развитую формацію чистыхъ березовыхъ насажденій или чистые лиственничные боры. Въ самой долинѣ Маны встрѣчаются болотистые луга, иногда сѣнокосные; не рѣдки темные ельники и кедровники.

Я счелъ необходимымъ предпослать настоящей замѣткѣ эти краткія свѣдѣнія о характерѣ обслѣдованной мѣстности, чтобы въ дальнѣйшемъ избѣжать подробностей при описаніяхъ той или иной находки. Къ сожалѣнію, до послѣдняго времени я не имѣлъ возможности детально просмотрѣть всѣ свои сборы, почему здѣсь и ограничиваюсь перечисленіемъ лишь наиболѣе интересныхъ находокъ, пополняющихъ наши свѣдѣнія по авифаунѣ бассейна Енисея [1]).

Turdus philomelus Brhm..—Выѣзжій Логъ. Не рѣдокъ въ долинѣ Маны по ельникамъ.

Turdus musicus Linn..—Здѣсь же. Гнѣздится въ окрестностяхъ селенія, въ березнякахъ.

Turdus ruficollis Pall..—Чрезвычайно характеренъ и многочисленъ въ полосѣ горнаго рѣдколѣсья въ верховьяхъ Маны, но на Кутурчинѣ не встрѣчается. Не разъ я находилъ гнѣзда этой птицы; во всѣхъ случаяхъ въ нихъ были уже птенцы. Гнѣзда помѣщались на нижнихъ вѣтвяхъ кустистыхъ кедровъ, на высотѣ груди. По конструкціи они однотипны съ гнѣздами чернозобаго дрозда; въ качествѣ строительнаго матеріала идетъ между прочимъ оленій лишайникъ. 13-го іюня въ гнѣздахъ были молодые съ едва пробивающимися маховыми; 22-го числа того же мѣсяца нѣкоторые выводки уже оставили гнѣзда и скрывались въ травѣ. Старики въ это время начали линьку. Родители къ дѣтямъ привязаны чрезвычайно и близко налетаютъ на человѣка. Выкармли-

---

[1]) А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матеріалы по птицамъ Енисейской губерніи“.

ваніе молодыхъ производится, главнымъ образомъ, дождевыми червями, которыхъ птицы добываютъ по берегамъ озеръ и лужъ. Вблизи Выѣзжаго Лога была добыта самка дрозда, представляющая помѣсь чернозобика съ краснозобикомъ. Это была взрослая птица въ поношенномъ перѣ, убитая при гнѣздѣ, что очевидно указываетъ на способность размноженія у подобныхъ гибридныхъ экземпляровъ. По сравненію съ самками типичныхъ T. ruficollis, эта птица имѣетъ слѣдующія отличія: рыжая надбровная полоса отсутствуетъ; рыжеватость зоба хотя и занимаетъ ту же область, но выражена несравненно слабѣе, будучи интенсивнѣе на бокахъ и почти теряясь на срединѣ зоба и груди, и замѣняясь здѣсь темнымъ окрасомъ, характернымъ для T. atrogularis; горло свѣтлѣе основного фона, какъ у послѣдняго вида, но съ примѣсью рыжеватыхъ перышекъ; большая часть груди и брюхо такого же грязнаго, а не чисто-бѣлаго цвѣта, какъ у T. ruficollis; рыжій цвѣтъ рулевыхъ гораздо темнѣе [1]); охристый оттѣнокъ на внутреннихъ опахалахъ маховыхъ выраженъ слабо, какъ у типичныхъ чернозобиковъ.

Turdus atrogularis Temm.. — Чрезвычайно многочисленъ въ окрестностяхъ Выѣзжаго Лога; попадался изрѣдка и въ горахъ, въ полосѣ рѣдколѣсья.

Pratincola rubetra margaretae Johans.. — Самецъ и самка этой формы были добыты 28-го іюня на лугу въ долинѣ Маны, около Выѣзжаго Лога. Указаннаго Г. Э. Іогансономъ признака—бѣлыхъ концовъ рулевыхъ—на моихъ экземплярахъ нѣтъ, но клювъ, сравнительно съ типичными, оказывается болѣе вытянутымъ и сжатымъ. Для подтвержденія только что сказаннаго привожу измѣреніе клювовъ:

	♂	♀
длина отъ угловъ рта	16	15,7
„ „ черепа	15,5	15,4
„ „ оперенія	12,9	11,1
„ „ ноздрей	8,5	8,3
киль нижней челюсти	7,2	7,2
ширина у передняго края ноздрей .	3,4	3,4
высота „ „ „ „ .	4	3,2

[1]) Нельзя впрочемъ не замѣтить, что и у типичныхъ экземпляровъ T. ruficollis (моей коллекціи) наблюдается замѣтное различіе въ характерѣ окраски хвоста. *Авт.*

Calliope calliope (Pall.).—Обыкновененъ повсюду; въ горы идетъ до полосы криволѣсья. Интересно, что въ горахъ это гораздо болѣе смирная птица. Въ бѣлкахъ онъ поетъ не иначе, какъ усѣвшись гдѣ-нибудь на вершинѣ дерева; въ другихъ мѣстахъ его не приходилось видѣть.

Larvivora cyane (Pall.).—Добыта 29-го іюня въ окрестностяхъ Выѣзжаго Лога, въ темномъ ельникѣ и кедровникѣ, по крутому склону долины Маны.

Philomela sibilans (Swinh.). — Встрѣчена вмѣстѣ съ предыдущей. Поющіе самцы наблюдались весною въ старыхъ березнякахъ ближайшихъ окрестностей селенія. Послѣ 29-го іюня пѣніе прекратилось.

Phylloscopus trochilus eversmanni (Bp.).—Изрѣдка наблюдалась въ долинѣ Маны.

Phylloscopus tristis Blyth..—Была обыкновенна подъ Выѣзжимъ Логомъ, гдѣ 6-го іюля добыты уже летныя молодыя. Ни въ предгорьяхъ, ни въ полосѣ рѣдколѣсья совершенно не наблюдалась.

Phylloscopus borealis Blas..—Неоднократно встрѣчена въ окрестностяхъ Выѣзжаго Лога въ чистыхъ березнякахъ; по Кутурчину поднимается до границы высокоствольныхъ деревьевъ; въ криволѣсьи не попадалась.

Phylloscopus superciliosus (Gm.). — Несомнѣнно гнѣздится въ окрестностяхъ селенія, гдѣ наблюдалась все лѣто въ чистыхъ березнякахъ. Пѣніе самцовъ было слышно въ послѣднихъ числахъ іюня.

Phylloscopus proregulus (Pall.). — Чрезвычайно характерна для области криволѣсья и горныхъ тундръ. Встрѣчена какъ на Кутурчинскомъ хребтѣ, такъ и во всемъ Манскомъ бѣлогорьѣ. Держится по преимуществу въ зарослякъ кустарныхъ ивняковъ.

Phragmaticola aëdon (Pall.).—Встрѣчена около Выѣзжаго Лога въ долинѣ Маны на лугахъ съ рѣдко разбросанными лиственницами. Любопытно, что вспугнутыя изъ чащи травы и кустарниковъ (спиреи) птицы искали убѣжища на деревьяхъ и садились довольно высоко, почти на открытыхъ вѣтвяхъ.

Lusciniola fuscata Blyth.. — Была находима какъ въ долинѣ Маны, среди кустарныхъ зарослей поймы, такъ и въ области альпійскаго рѣдколѣсья около Манскихъ озеръ. Здѣсь она была очень многочисленна и обыкновенна въ ивовыхъ зарослякъ.

Herbivocula schwarzi (Radde).—Въ долинѣ Маны и по окрестнымъ лѣсамъ Выѣзжаго Лога попадалась нерѣдко.

Locustella certhiola (Pall.). — Встрѣчена по болотамъ долины Маны около Выѣзжаго Лога; наблюдалась по сырымъ мѣстамъ въ верховьяхъ р. Топойбы, на хребтѣ Сорыхаи, на Манскомъ озерѣ и въ окрестностяхъ Б. Пезинскаго озера; всѣ послѣдніе пункты въ альпійской области.

Locustella fasciolata Gray.—Дважды я слышалъ характерное пѣніе этой птицы: 14-го іюня—на устьи рѣчки Каменный ручей, въ 15 верстахъ выше по Манѣ отъ Выѣзжаго Лога, и 3-го іюля—близъ устья рѣки Ангула, въ 10-ти верстахъ выше селенія.

Accentor montanellus (Pall.).—6-го іюля добыты два самца на хребтѣ Кутурчинъ, у границы лѣса.

Accentor himalayanus Blyth..—Всѣ мои экземпляры происходятъ съ хребта Кутурчинъ; добыты они 29-го мая и 4-го—5-го іюля. Птички держались въ верхнемъ поясѣ горъ, среди скалистыхъ розсыпей гранита. Среди іюльскихъ экземпляровъ попалось нѣсколько молодыхъ, хотя и летныхъ, но съ недоросшими маховыми и рулевыми. Старики, добытые одновременно, были въ очень поношенномъ перѣ, но линьки еще не начинали. У взрослыхъ радужина красная, у молодыхъ—темно-орѣховая. Привожу измѣренія взрослыхъ птицъ:

Полъ.	*Длина.*	*Крыло.*	*Хвостъ.*	*Размахъ.*	*Плюсна.*	*Клювъ.*
♀	15,3	8,7	5,5	—	2,1	1,6
♂	16,7	9,3	5,8	31,4	2,2	1,4
♂	16,4	9,4	6,1	29	2,2	1,45
♀	15,7	8,65	5,5	27,2	2,15	1,6
♀	14,6	8,5	5,1	26,8	2,1	1,4

Penthestes cincta sayana Suschkin.—17-го іюня въ полосѣ рѣдколѣсья въ окрестностяхъ Манскаго озера добытъ единственный экземпляръ. Длина его клюва отъ ноздрей—9,2, а крыла—7,3 m.m.; полосы хвоста сѣрыя, безъ охристаго.

Motacilla alba baicalensis Swinhoe. — Самецъ этой трясогузки былъ добытъ 26-го мая около Выѣзжаго Лога.

Budytes citreola (Pall.).—Была не рѣдка на гнѣздовьи по сырымъ участкамъ горной тундры въ окрестностяхъ Манскаго озера.

Anthus trivialis maculatus Jerd..—Найденъ—видимо гнѣздящимся—на Манскомъ озерѣ. Самецъ поетъ или сидя на деревѣ, или дѣлая небольшіе перелеты съ вѣтви на вѣтвь.

Anthus spinoletta blakistoni Swinh.. — Обыченъ въ альпійской зонѣ; придерживается сырыхъ, травянистыхъ участковъ. Мои на-

ходки относятся къ мѣстностямъ: Манское озеро, 12.VI; хребетъ Джалбуты, 22.VI; верховья рѣки Нички (система Казыра), 20.VI; озеро Б. Пезо, 19.VI; хребетъ Кутурчинъ, 3—4.VII. Здѣсь же были добыты летные молодые съ недоросшими хвостами.

Lanius cristatus Linn..—Не рѣдокъ подъ Выѣзжимъ Логомъ на открытыхъ мѣстахъ; встрѣченъ, кромѣ того, 13-го іюня въ горномъ рѣдколѣсьѣ въ верховьяхъ рѣчки Маргачи, по пути на Манское озеро.

Hemichelidon sibirica (Gm.).—Гнѣздуетъ въ чистыхъ березнякахъ окрестностей Выѣзжаго Лога; не рѣдка.

Arizelomyia daurica (Pall.).—Очень обыкновенна вмѣстѣ съ предыдущей.

Siphia albicilla (Pall.).—Встрѣчена около деревни въ высокостольномъ листвягѣ.

Poliomyias mugimaki (Temm.).—Добыта въ долинѣ Маны, окс[illegible] Выѣзжаго Лога, въ ельникѣ по склону къ рѣкѣ.

Leucosticte arctoa (Pall.).—Единственный экземпляръ—♀—добытъ 4-го іюля на хребтѣ Кутурчинъ въ розсыпяхъ, у снѣжныхъ полянъ.

Carpodacus erythrinus (Pall.).—Очень обыкновененъ всюду; идетъ въ горы до области рѣдколѣсья, гдѣ еще многочисленъ. Попадались только старые, ярко окрашенные экземпляры.

Pyrrhula pyrrhula (Linn.).— Встрѣченъ 30-го мая (стайкой) у подножья Кутурчина въ ельникѣ по рѣкѣ Ангулъ.

Pyrrhula cassini Baird..—Была замѣчена 29-го мая стайкой изъ десяти особей на границѣ лѣса на хребтѣ Кутурчинъ. Изъ стайки этой удалось добыть одинъ экземпляръ.

Emberiza aureola Pall..—Гнѣздуетъ въ горномъ рѣдколѣсьѣ во всемъ Манскомъ бѣлогорьѣ, но въ область низкорослыхъ ивъ не доходитъ.

Emberiza spodocephala Pall..—Очень обычна въ долинѣ Маны по ельникамъ.

Emberiza leucocephala Gm..—Изрѣдка попадалась въ окрестностяхъ Выѣзжаго Лога по открытымъ мѣстамъ у пашенъ.

Emberiza rustica Pall..—♂ и ♀ около гнѣзда были встрѣчены 3-го іюня вблизи Выѣзжаго Лога въ небольшомъ еловомъ колкѣ на болотистой почвѣ въ долинѣ Маны. Самка была съ червякомъ во рту. Мнѣ лично впервые удалось встрѣтиться съ гнѣздованіемъ овсянки-ремеза въ Красноярскомъ уѣздѣ.

Emberiza pallasi (Cab.).—Большой неожиданностью была для меня встрѣча съ этой птичкой въ Манскомъ бѣлогорьѣ, въ окрестностяхъ Манскаго озера. Птички держались на равнинномъ участкѣ

на вершинѣ увала, покрытаго разбросанными группами зарослей ивняковъ. Самцы то пѣли, сидя на верхушкахъ кустовъ, то съ особымъ крикомъ начинали носиться по-одиночкѣ высоко въ воздухѣ, описывая круги. Птички были довольно строги и не подпускали на близкій выстрѣлъ. Врядъ ли эта находка (17-го іюня) оставляетъ сомнѣніе въ гнѣздованіи Emberiza pallasi въ указанной мѣстности.

Coloeus dauricus (Pall.). — Въ окрестностяхъ Выѣзжаго Лога никакихъ галокъ я не видѣлъ, но по пути туда, около станицы Камарчацкой, на поляхъ были видны большія стаи этихъ птицъ, среди которыхъ на половину было бѣлобрюхихъ.

Apus pacificus (Lath.).—Отмѣчаю гнѣздованіе этого стрижа въ трещинахъ громадныхъ гранитныхъ столбовъ, возвышающихся на голой вершинѣ Кутурчина.

Chaetura caudacuta (Lath.).—За все время своихъ наблюденій въ Сибири я впервые имѣлъ случай присмотрѣться къ этой оригинальной птицѣ. Мѣста ея гнѣздовій для меня попрежнему остаются загадкой, но многочисленныя стаи ихъ не разъ навѣщали окрестности Выѣзжаго Лога. Стаи появлялись почти всегда послѣ ненастныхъ дней, когда—вмѣстѣ со стрижами, чернымъ и бѣлонадхвостнымъ — птицы эти пронизывали воздухъ по всѣмъ направленіямъ. Главный объектъ ихъ охоты—осы, которыми онѣ набиваютъ желудки и пищеводъ до того, что у убитыхъ комокъ насѣкомыхъ вываливается при встряхиваніи изо рта. Налетавшись надъ рѣкою (иногда очень низко, едва не касаясь воды) касатки, продолжая свою охоту, поднимаются все выше и выше и, наконецъ, исчезаютъ въ вышинѣ, а на слѣдующій день снова появляются здѣсь изъ небесной выси. Во время плаванія внизъ по Манѣ отъ Выѣзжаго Лога до Красноярска, съ 9-го по 18-ое іюля, я видѣлъ ихъ носящимися надъ рѣкой первый разъ около деревни Кошъ (10-го числа), затѣмъ у деревни Кожелакъ (11-го числа) и, наконецъ, у устья рѣки Колбы (12-го числа).

Oidemia fusca stejnegeri Ridgw.. — Этихъ турпановъ я встрѣтилъ на Манскомъ озерѣ, а также видѣлъ и на горныхъ озерахъ: Б. Пезо, М. Пезо и др. Самцы образовывали стайки, кочевавшія съ одного водоема на другой.

Lagopus lagopus (Linn.).—Найдена на Кутурчинскомъ хребтѣ и въ окрестностяхъ Манскаго озера.

Lagopus mutus rupestris (Gm.).—Встрѣчена на гранитныхъ розсыпяхъ на вершинѣ Кутурчина.

Gallinago stenura (Bp.).—За время поѣздки въ горы найденъ на хребтѣ Сарыхай и въ окрестностяхъ Манскаго озера, гдѣ я имѣлъ удовольствіе ежедневно по вечерамъ наблюдать его характерное токованіе. Къ тѣмъ наблюденіямъ надъ этой птицей, которыя я уже имѣлъ случай привести въ моей и С. А. Бутурлина работѣ [1]), долженъ добавить, что самецъ во время тока (по зорямъ, а иногда и днемъ), сидя на землѣ въ травѣ, издаетъ тѣ же крики, которыми онъ сопровождаетъ и свои воздушныя эволюціи. Вспугнутый въ это время самецъ перемѣщается лишь на 10—20 шаговъ.

Urinator arcticus (Linn.).—Встрѣчена на горномъ Большомъ Пезинскомъ озерѣ, гдѣ видимо гнѣздуетъ.

Пользуюсь случаемъ упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ интересныхъ находкахъ минувшей осени. Въ концѣ октября я получилъ экземпляръ Grus monacha Temm., добытый 15-го октября въ Минусинскомъ уѣздѣ, около мѣдныхъ рудниковъ „Юлія“. Насколько знаю, это—первая находка чернаго журавля въ Енисейской губерніи. Интереснымъ для осени явились находки такихъ обитателей сѣвера, какъ Calidris leucocephala (Pall.), Arenaria interpres (L.), Anser albifrons (Scop.) и Harelda hyemalis (Linn.).

Какъ уже указывалось въ упомянутой работѣ, песчанки добывались подъ Красноярскомъ очень рѣдко; камнешарка, морянка и бѣлолобая казарка мною лично здѣсь за время восьмилѣтнихъ экскурсій не наблюдались. Пролетъ песчанокъ замѣченъ въ первыхъ числахъ сентября; камнешарки летѣли въ послѣдней трети августа, при чемъ въ это время были добываемы молодыя птицы, а 29-го іюля были убиты старые экземпляры въ прекрасномъ лѣтнемъ нарядѣ; находки казарки и морянки относятся къ первой трети октября. Интересно, что пролетъ гуменниковъ въ истекшемъ году прошелъ очень дружно и окончился гораздо ранѣе обычнаго—уже въ концѣ августа, такъ что между пролетомъ гуменниковъ прошло болѣе мѣсяца. Камнешарки и песчанки были добыты А. П. Ермолаевымъ и П. Я. Мироновымъ на Ладейскихъ и Торгашинскихъ озерахъ.

---

[1]) „Матеріалы по птицамъ Енисейской губерніи“, стр. 297.

Овсянки въ различной степени переходныя между Emberiza leucocephalos S. G. Gm. и Emberiza citrinella erythrogenys Brehm.

Н. А. Зарудный.

Ueber diverse Uebergangsformen zwischen Gold-und Weiss-Kopf-Ammern (Emberiza citrinella erythrogenys Brehm & Emberiza leucocephalos S. G. Gm.).

Von *N. A. Sarudny.*

Со времени поселенія своего въ Ташкентѣ (въ 1906 году) до сихъ поръ я собралъ длинный рядъ туркестанскихъ бѣлошапочныхъ и желтыхъ овсянокъ, главнымъ образомъ въ Сыръ-Дарьинской области (преимущественно въ долинѣ Чирчика). Уже въ началѣ сборовъ мнѣ бросилось въ глаза то обстоятельство, что среди нормально окрашенныхъ птицъ нерѣдко здѣсь, въ районахъ моихъ обычныхъ экскурсій, попадаются особи, въ разныхъ степеняхъ занимающія среднее мѣсто между этими видами овсянокъ. Это обстоятельство заставило меня обратить на нихъ особенное вниманіе, и вотъ, къ настоящему моменту въ моей коллекціи скопился значительный матеріалъ, съ которымъ небезынтересно познакомить любителей орнитологіи.

Предварительно предпошлю нѣсколько замѣчаній.

E. leucocephalos гнѣздится у насъ только въ Семирѣчьѣ, но въ несмѣтномъ множествѣ встрѣчается на пролетахъ (главнымъ образомъ въ восточныхъ частяхъ страны), тамъ и здѣсь массами оставаясь и на зимовье. Обыкновенна на пролетѣ въ Закаспійской области (преимущественно на ея востокѣ) и въ восточной Персіи, гдѣ ея зимовья извѣстны мнѣ въ Сеистанѣ и

сѣверномъ Бѣлючистанѣ. — E. c. erythrogenys, осѣдлая на южномъ побережьѣ Каспійскаго моря и отсюда проникающая на гнѣздовье въ бассейнъ Атрека [1]), во множествѣ гнѣздящаяся также въ разныхъ мѣстахъ на сѣверъ отъ Туркестана,—въ предѣлахъ этого послѣдняго встрѣчается лишь въ холодное время года и не только въ сѣверо-западныхъ частяхъ края (М. А. Мензбиръ: „Птицы Россіи“, стр. 559 [2]), но и въ восточныхъ (долины Чирчика и Ангрена, Фергана, Семирѣчье), при чемъ даже въ гораздо большемъ количествѣ. Что касается въ частности до долины Чирчика, то здѣсь желтая овсянка, хотя и встрѣчающаяся въ числѣ неизмѣримо меньшемъ, чѣмъ бѣлошапочная, все же должна быть причислена къ обыкновеннымъ зимующимъ птицамъ, особенно въ нѣкоторые годы. Появляется позднѣе, чѣмъ бѣлошапочная, а отлетаетъ на сѣверъ раньше.—Промежуточныя формы рѣдкости никакой не составляютъ. Наиболѣе часто онѣ попадаются въ годы, обильные желтыми овсянками, при чемъ держатся частью среди этихъ послѣднихъ, частью среди ихъ бѣлошапочныхъ сородичей. Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ въ томъ или въ другомъ обществѣ овсянокъ *онѣ являлись даже преобладающими.* Могу указать такой примѣръ. Менѣе чѣмъ въ верстѣ отъ моего жилья имѣется на берегу Салара [3]) болотце, занятое камышевою плавнею и окруженное густымъ кустарникомъ и высокими деревьями. Въ глухое зимнее время, послѣ окончанія дневныхъ служебныхъ занятій, пользуясь нѣсколькими свѣтлыми часами, я частенько навѣщалъ это мѣстечко, гдѣ почти всегда—особенно послѣ свѣжевыпавшаго снѣга—заставалъ вальдшнепа, бекаса-отшельника (Scolopax solitaria) или фазана. Передъ солнечнымъ закатомъ подлетали сюда стаи овсянокъ и, посидѣвъ нѣкоторое время на вершинахъ деревьевъ, спускались ради ночлега вглубь камышей. И вотъ въ теченіе двухъ зимъ выстрѣлы, посылаемые мною въ эти стаи и сбивавшіе по нѣсколько особей сразу, доставляли мнѣ главнымъ образомъ переходныя формы. Въ послѣдующія зимы эти послѣднія сдѣлались рѣдкими, уступивъ по своей численности мѣсто типичнымъ.

---

[1]) Осѣдла также въ Загросскомъ участкѣ Персіи и найдена зимою въ персидской Месопотаміи. *Авт.*

[2]) Вѣроятно, на основаніи свѣдѣній Н. А. Сѣверцова, не совсѣмъ въ данномъ случаѣ точныхъ. *Авт.*

[3]) Большой оросительный каналъ, скорѣе похожій на рѣчку. *Авт.*

О помѣси между нашими овсянками впервые упоминаэтъ Ѳ. Д. Плеске въ своемъ „Beschreibung einiger Vogel Bastarde“ (Mémoires de l'Académie Jmpériale des Sciences de St-Pétersbourg, VII-e série, t. XXXV, № 5, 1887) по экземпляру, добытому 8-го марта Эверсманномъ близъ Казани. A. Suchetet, собравшій въ своемъ сочиненіи („Des Hybrides à l'état sauvage“, 1896) великое множество данныхъ относительно скрещиванія между птицами (даже такихъ данныхъ, которыя положительно невѣроятны), говоритъ только объ одномъ случаѣ помѣси между E. leucocephalos и E. c. erythrogenys (ссылаясь на работу Ѳ. Д. Плеске, приводитъ тотъ же примѣръ). О двухъ такихъ случаяхъ изъ Семирѣчья говорилъ я и Б. П. Корѣевъ („Орнитологическая фауна Семирѣченскаго края“, 1905 г.). Э. Хартертъ („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, S. 170) склоненъ считать гибридами тѣ особи E. leucocephalos, которыя имѣютъ желтоватую примѣсь въ опереніи и которыя были получены г-мъ Клейншмидтомъ изъ Томска.

Типичными E. leucocephalos я считаю такихъ, которыя нигдѣ въ своемъ опереніи не имѣютъ желтоватыхъ, зеленоватыхъ или оливковыхъ оттѣнковъ и примѣсей. Ни въ одномъ изъ существующихъ описаній E. leucocephalos — даже у Тачановскаго („Faune Ornithologique de la Sibérie Orientale“), у котораго она описана особенно подробно—либо совсѣмъ не упоминается объ этихъ особенностяхъ, либо имъ не придается значенія чего-либо нормальнаго. Эта овсянка представляетъ у насъ два основныхъ типа личныхъ измѣненій, у взрослыхъ ♂♂ очень рѣзкихъ.

1-ый. У ♂♂ на головѣ много рыжевато-каштановаго цвѣта. Этотъ послѣдній образуетъ очень широкую полосу, идущую отъ основанія надклювья черезъ весь глазъ за задній край ушной партіи (спереди, на лбу, обѣ полосы часто смыкаются); затѣмъ онъ занимаетъ всю нижнюю сторону головы, распространяясь отсюда на боковыя стороны шеи, и позади ушной партіи смыкается съ черезглазной полосой. Такимъ образомъ бѣлый цвѣтъ здѣсь занимаетъ верхнюю сторону головы, гдѣ справа и слѣва онъ отороченъ болѣе или менѣе широкой черной полосой, и поле, идущее отъ угла рта черезъ щеку на ушную партію, которая сверху и снизу оторочена черноватою полоскою.

У ♀♀ много рыжевато-каштановаго цвѣта [1]) на нижней сто-

[1]) Этотъ цвѣтъ у ♀♀ вообще болѣе блѣденъ. *Авт.*

ронѣ головы, вокругъ глазъ и въ полосѣ, идущей черезъ этотъ послѣдній отъ клюва къ заднему краю ушной партіи. Иногда, кромѣ того, на лбу и на затылкѣ развиваются неправильныя каштановыя пятна; сравнительно въ рѣдкихъ случаяхъ большая часть бѣлыхъ перьевъ шапочки имѣетъ каштановыя основанія.

2-ой. ♂♂ рыжевато-каштановый цвѣтъ головы развитъ въ далеко меньшей степени. Онъ образуетъ болѣе или менѣе широкіе усы, идущіе отъ основанія подклювья подъ щекой и подъ нижнимъ краемъ ушной партіи. Полоса, которая тянется отъ основанія надклювья черезъ глазъ за задній край ушной партіи, либо остается каштановой, либо становится сплошь бѣлой, оставляя для каштановаго цвѣта лишь отдѣльныя перышки вокругъ глаза и въ уздечкѣ. Многія особи этого типа окраски (по сильно развитому блѣдному и нѣжному сѣрому цвѣту на зашейкѣ и сзади ушныхъ партій) кажутся весьма красивыми.—Этотъ типъ окраски встрѣчается у насъ несравненно рѣже, чѣмъ первый.

♀♀ каштановый цвѣтъ на головѣ или вовсе отсутствуетъ, или занимаетъ лишь нѣкоторыя перышки въ раіонѣ усовъ и въ полосѣ, идущей отъ основанія надклювья черезъ глазъ за задній край ушной партіи (преимущественно около глаза).

Размѣры E. leucocephalos и E. c. erythrogenys болѣе или менѣе покрываютъ другъ друга. Однако среди особей первыхъ я не примѣчалъ такихъ мелкихъ, какія попадаются между представителями второй (и тѣ, и другія представлены въ моей коллекціи весьма длинными серіями) [1]).

Ниже слѣдуетъ описаніе „среднихъ“ формъ.

♂♂

1) Неся нарядъ самыхъ разнообразныхъ личныхъ измѣненій E. leucocephalos, отличаются отъ этихъ послѣднихъ развитіемъ желтизны *снизу края кисти* на разстояніи до 12 m.m. отъ корня 1-го маха *(абортивное перо въ счетъ нигдѣ здѣсь не принимаю)*, при чемъ эта желтизна по своей интенсивности колеблется

[1]) Нигдѣ въ Туркестанѣ между не менѣе какъ двумя сотнями перемѣренныхъ E. leucocephalos мнѣ ни разу не попались такія крупныя (съ крыломъ до 100 m.m.) особи, какія извѣстны мнѣ изъ Восточной Сибири (Чита и Благовѣщенскъ). Если крупная величина восточно-сибирскихъ бѣлошапочныхъ овсянокъ подтвердится, то ихъ можно будетъ обозначить названіемъ E. leucocephalos karpovi (subsp. nov.) по имени А. Б. Карпова, не мало подвизавшагося на поприщѣ охоты и орнитологіи на Дальнемъ Востокѣ. *Авт.*

отъ едва замѣтной до весьма явственной. Таковыя овсянки въ ряду остальныхъ промежуточныхъ наиболѣе обыкновенны. Въ моей коллекціи ихъ имѣется 30 экземпляровъ.

2) Такія же E. leucocephalos, но съ ясною, хотя и блѣдною желтизною *по всему краю всей кисти*, особенно интенсивною у корня 1-го маха.—28 экземпляровъ.

3) Такія же E. leucocephalos, но съ блѣдною, то весьма явственной, то лишь чуть намѣченной желтизной на бѣлой шапочкѣ.—4 экземпляра.

4) Такія же E. leucocephalos, но съ желтоватыми или блѣдно-желтыми бордюрами на внѣшнихъ опахалахъ первыхъ изъ большихъ маховъ, то на 2, 3 и 4-мъ, то только на одномъ, или двухъ изъ нихъ (рѣдко едва замѣтная желтизна наблюдается также по краю внѣшняго опахала 5-го маха). Желтоватость этихъ бордюровъ исчезаетъ въ ихъ расширенныхъ частяхъ [1]). — 22 экземпляра.

5) Такія же, какъ въ предшествующей группѣ, но желтизна наблюдается кромѣ того снизу края кисти на разстояніи до 14 m.m. отъ корня перваго маха, при чемъ она развивается по пространству и интенсивности въ такой же мѣрѣ, какъ въ группѣ 1-ой, а желтизна бордюровъ первыхъ маховъ иногда идетъ на всю расширенную часть ихъ. Степени развитія желтизны кисти и бордюровъ большею частью совпадаютъ одна съ другой.—18 экземпляровъ.

6) Такія же, какъ въ предшествующей группѣ, но желтизна кисти распространяется по всему ея краю.—14 экземпляровъ.

7) Такія же, какъ въ предшествующей группѣ, но желтизна распространяется на мелкія нижнія кроющія крыла, развиваясь отъ едва замѣтной до весьма явственной, при чемъ то совпадаетъ съ наибольшей желтизной бордюровъ на маховыхъ, то нѣтъ, напримѣръ, — въ соотвѣтствіи сильной степени своего развитія имѣетъ на нихъ лишь ничтожное проявленіе желтаго цвѣта (по интенсивности и распространенію).—16 экземпляровъ.

8) E. leucocephalos съ слабо замѣтною желтизною снизу края кисти, замѣтно сильнѣе развитою у корня перваго маха; малыя изъ аксилярныхъ съ болѣе явственною желтизною на внѣшнихъ опахалахъ; бордюры 2-го—4-го маховъ блѣдно-желтые,

---

[1]) Эти расширенныя части бордюровъ находятся передъ суженной частью наружнаго опахала. *Авт.*

при чемъ этотъ цвѣтъ захватываетъ всю ихъ расширенную часть; остальные большіе махи съ ясною желтоватою примѣсью на внѣшнихъ краяхъ наружныхъ опахалъ. Края малыхъ верхнихъ кроющихъ крыла обладаютъ легкимъ желтовато-сѣрымъ оттѣнкомъ.—10 экземпляровъ.

9) Такія же, какъ въ предшествующей группѣ, но перья нижней части голени съ ясно замѣтною желтизною.—7 экземпляровъ.

10) Такія же, какъ въ предшествующей группѣ, но всѣ аксилярныя окрашены въ блѣдно-желтый цвѣтъ; остальныя нижнія кроющія крыла то желтоваты, то бѣлы съ желтизною по краю кисти (то сверху и снизу, то только снизу), наиболѣе интенсивною у корня 1-го маха.—9 экземпляровъ.

11) E. leucocephalos съ такою окраскою большихъ маховыхъ и переднихъ изъ малыхъ, какъ у E. c. erythrogenys. Край кисти и перья вершинъ голеней съ легкою желтоватою примѣсью. Аксилярныя блѣдно-желты. Малыя верхнія кроющія съ слабою оливковою примѣсью.—5 экземпляровъ.

12) E. leucocephalos съ блѣдно-желтымъ цвѣтомъ кисти около корня 1-го маха. Бордюры внѣшнихъ опахалъ 2-го—4-го большихъ маховыхъ блѣдно-желты включительно до расширенныхъ частей. Малыя изъ аксилярныхъ чуть желтоваты. Верхнее изъ двухъ самыхъ большихъ перьевъ крылышка имѣетъ ясную желтизну на бордюрѣ внѣшняго опахала.—4 экземпляра.

13) E. leucocephalos со слабою желтизною вдоль середины брюха. Бордюръ наружнаго опахала 2-го маха ярко-желтый. Бордюры тѣхъ же опахалъ остальныхъ большихъ маховъ, за нимъ слѣдующихъ, съ легкою желтоватою примѣсью. Край кисти и малыя изъ аксилярныхъ съ легкою желтизною.—14 экземпляровъ.

14) E. leucocephalos съ блѣдною ясною желтизною на перьяхъ нижней части голени, на нижнихъ кроющихъ крыла, на аксилярныхъ (кромѣ самыхъ длинныхъ) и по краю кисти (со всѣхъ сторонъ). Бордюры наружныхъ опахалъ 2-го—5-го большихъ маховыхъ желтые, блѣднѣющіе въ расширенныхъ частяхъ. На остальныхъ большихъ и на переднихъ малыхъ маховыхъ эти бордюры имѣютъ желтоватую примѣсь. Верхнее изъ двухъ самыхъ большихъ перьевъ крылышка имѣетъ желтоватый бордюръ наружнаго опахала.—12 экземпляровъ.

15) E. leucocephalos съ блѣдно-желтыми шапочкой и пятномъ на шеѣ позади каштановаго поля низа головы; бѣлый цвѣтъ

щекъ съ сильною желтою примѣсью; неопятнанный районъ груди и брюха, нижняя часть голени, основная половина подхвостья и край кисти (сверху и снизу) съ ясною желтою примѣсью. Другіе экземпляры отличаются отъ этихъ лишь едва замѣтною желтизною на кисти (только снизу), третьи — кромѣ того отсутствіемъ желтизны на голеняхъ, легкою желтизною аксилярныхъ и желтымъ бордюромъ внѣшняго опахала 2-го махового.—10 экземпляровъ.

16) E. leucocephalos съ блѣдною желтою примѣсью на шапочкѣ (особенно ближе къ ея заднему краю) и на пятнѣ снизу шеи. Ясная желтизна на бѣлой полосѣ позади глаза надъ ушною партіей. Неопятнанный районъ брюха съ едва замѣтною желтизною. Край кисти со всѣхъ сторонъ блѣдно-желтый. Легкая желтизна на нижнихъ кроющихъ крыла и на аксилярныхъ. Бордюры внѣшнихъ опахалъ 2-го—4-го большихъ маховыхъ въ расширенныхъ частяхъ блѣдно-желты; въ остальныхъ частяхъ (по направленію къ корню), какъ и на остальныхъ большихъ маховыхъ, они имѣютъ весьма ясную желтоватую примѣсь. Бордюръ наружнаго опахала верхняго изъ двухъ самыхъ большихъ перьевъ крылышка явственно желтоватъ.—4 экземпляра.

17) E. leucocephalos съ блѣдно-желтыми нижними кроющими крыла, аксилярными и краемъ кисти. Верхнее изъ двухъ самыхъ большихъ перьевъ крылышка имѣетъ оливковый бордюръ наружнаго опахала. Малыя верхнія кроющія крыла съ сѣровато-оливковыми краями. Наружные края внѣшнихъ опахалъ кроющихъ большіе махи желтовато-оливковые. Основаніе бѣлаго бордюра внѣшняго опахала перваго маха явственно желтовато. Бордюры тѣхъ же опахалъ 2-го—3-го большихъ маховъ блѣдно-желты либо до расширенныхъ частей, либо до нихъ включительно. На остальныхъ большихъ и на переднихъ малыхъ маховыхъ края наружныхъ опахалъ имѣютъ явственную желтую примѣсь. Основаніе бордюра наружнаго опахала наружнаго руля смѣнило свой обычный бѣлый или бѣлесый цвѣтъ на блѣдно-желтый. Нѣкоторые экземпляры сверхъ всего этого обладаютъ блѣдно-желтою примѣсью на бѣломъ пятнѣ низа шеи, на шапочкѣ и на голеняхъ, а нѣкоторые кромѣ того—замѣтною желтизною по средней линіи брюха.—9 экземпляровъ.

18) E. leucocephalos съ ясною на шапочкѣ и съ самою легкою на бѣломъ пятнѣ низа шеи желтою примѣсью. Неопятнанный районъ груди и брюха съ чуть замѣтною желтою примѣсью. Нѣсколько перышекъ края кисти, прилегающихъ къ первому ма-

ховому, чуть желтоваты. Нѣкоторые экземпляры имѣютъ буровато-оливковую примѣсь на внутреннихъ изъ верхнихъ малыхъ кроющихъ крыла.—5 экземпляровъ.

19) E. leucocephalos съ блѣдно-желтой шапочкой и яснымъ блѣдно-желтымъ налетомъ на бѣломъ цвѣтѣ нижней стороны всего тѣла, особенно сильнымъ на пятнѣ снизу шеи (крылья нигдѣ не имѣютъ какой бы то ни было примѣси желтаго цвѣта).—2 экземпляра.

20) E. leucocephalos съ сильной желтизной перьевъ шапочки, особенно въ задней ея части. Легкая желтизна на щекахъ и болѣе сильная на ушной партіи. Перышки въ углу развилины нижней челюсти (передъ сплошнымъ каштановымъ полемъ) желтыя. Пятно снизу шеи, неопятнанный районъ груди и брюха, основная половина подхвостья и нижнія части голеней съ весьма явственною блѣдно-желтою примѣсью. Нижнія кроющія крыла, особенно ближе къ краю кисти, блѣдно-желтыя. Аксилярныя съ сильною желтою примѣсью. Бордюры большихъ маховыхъ какъ у E. c. erythrogenys, но желтый цвѣтъ блѣднѣе; на переднихъ малыхъ маховыхъ они имѣютъ оливковый оттѣнокъ. Внѣшнія опахала кроющихъ большія маховыя, а также малыхъ изъ перьевъ крылышка, съ желтоватою примѣсью.—2 экземпляра.

21) E. leucocephalos съ блѣдно-желтой шапочкой и ярко-желтымъ пятномъ снизу шеи. Щеки и центральная часть ушной партіи блѣдно-желты. Неопятнанный районъ груди съ едва замѣтной желтизной. Такой же районъ брюха блѣдно-желтый, при чемъ желтизна усиливается въ его задней части. Основаніе подхвостья чуть желтовато, какъ и краі кисти у корня 1-го махового. Голени съ легкой желтизной.—1 экземпляръ.

22) E. leucocephalos (2-й типъ окраски). Нижняя сторона головы и шеи блѣдно-желты. Среднія части брюха и зада груди съ ясной желтизной. Нижнія части голеней желтоваты. Бордюры внѣшнихъ опахалъ крайнихъ рулей желтовато-сѣры. Уздечки и полосы за глазомъ блѣдно-желтоваты; щеки съ желтоватою примѣсью. Бѣлыя перья шапочки съ ясною желтизной въ своихъ вершинныхъ частяхъ. Зашеекъ съ сильною зеленоватою примѣсью. Маховыя, не считая внутреннихъ изъ малыхъ, какъ у E. c. erythrogenys; таковы же всѣ кроющія крыла, но съ болѣе блѣднымъ оттѣнкомъ.—1 экземпляръ.

23) E. leucocephalos (2-й типъ окраски). Такая же, какъ предыдущая, но желтизна на брюхѣ и груди, на шапочкѣ и

пятнѣ снизу шеи развита много сильнѣе, тогда какъ зашеекъ и всѣ кроющія крыла остаются обычно окрашенными.—1 экземпляръ.

24) E. leucocephalos (2-ой типъ окраски) съ блѣдно-желтыми широкими заглазными полосами. Бордюры внѣшнихъ опахалъ 2-го—4-го маховъ желты, при чемъ этотъ цвѣтъ не доходитъ до ихъ расширенныхъ частей, далѣе смѣняясь обычнымъ бѣлымъ. Край кисти (сверху и снизу), а также мелкія изъ аксилярныхъ блѣдно-желты.—2 экземпляра.

25) E. leucocephalos (2-й типъ окраски). Пятно снизу шеи блѣдно-желтое. Нижняя сторона головы съ ясною, хотя и очень блѣдною желтизною. Широкая бѣлая полоса, идущая отъ корня надклювья черезъ глазъ до задняго края ушной партіи, съ сильною блѣдно-желтою примѣсью. Свѣтлыя части щекъ и ушныхъ партій явственно блѣдно-желтоваты. Перья боковъ шеи (позади ушныхъ партій) блѣдно-желты съ сѣрыми вершинами, нигдѣ не маскирующими желтаго цвѣта. Шапочка спереди съ слабою, а назади съ гораздо болѣе сильною блѣдно-желтою примѣсью. Узкое поле вдоль середины брюха, нижнія кроющія крыла и аксилярныя блѣдно-желтыя, какъ и весь край кисти. Бордюры внѣшнихъ опахалъ большихъ и переднихъ малыхъ маховъ, какъ у E. c. erythrogenys, но желтый цвѣтъ и вообще желтоватые оттѣнки на нихъ болѣе блѣдны. Края малыхъ верхнихъ кроющихъ крыла какъ у ней же, но желтоватая или зеленовато-желтая примѣсь ихъ развита слабѣе и болѣе мутна. Бордюры внѣшнихъ опахалъ кроющихъ большія маховыя явственно зеленовато-желтоваты. Окраска спины и плечевыхъ партій, какъ у E. c. erythrogenys, именно тѣхъ ея измѣненій, въ которыхъ желтоватыя или зеленоватыя примѣси названныхъ частей развиты слабо.—2 экземпляра.

26) E. leucocephalos, похожія на предыдущихъ, но съ такою же окраской спины и плечевыхъ, какъ у самыхъ типичнѣйшихъ E. leucocephalos.—3 экземпляра.

27) Emberiza болѣе близкая къ leucocephalos (2-ой типъ окраски), чѣмъ къ citrinella erythrogenys. Уздечка блѣдно-желтая. Полоса, идущая отъ глаза надъ ушной партіей, блѣдно-желтая, съ каштановыми отмѣтинами на перьяхъ. Продолженіе этой полосы надъ глазомъ и до основанія боковъ надклювья чистаго блѣдно-желтаго цвѣта. Такимъ же образомъ окрашена шапочка. Щеки чуть желтоваты, а средняя часть ушной партіи явственно желтовата. Нижняя сторона головы и пятно снизу шеи

блѣдно-желты. Бока шеи блѣдно-желты, съ сѣрыми вершинами перьевъ. Неопятнанный районъ груди и брюха съ очень явственною, хотя и легкою, блѣдно-желтою примѣсью. Голени блѣдно-желты. Таковы же нижнія кроющія крыла и аксилярныя, при чемъ этотъ цвѣтъ особенно ярокъ по краю кисти. Бордюры внѣшнихъ опахалъ большихъ маховыхъ какъ у E. c. erythrogenys, но желтый цвѣтъ блѣднѣе. Всѣ верхнія кроющія крыла, какъ у этой послѣдней, но желтовато-зеленоватые края перьевъ съ болѣе мутнымъ оттѣнкомъ. Задняя сторона шеи и самая передняя часть спины съ яснымъ, хотя и очень легкимъ, зеленовато-сѣрымъ оттѣнкомъ. Бордюры внѣшнихъ опахалъ крайнихъ рулевыхъ желтовато-сѣры. Остальное опереніе рѣшительно такое же, какъ у E. leucocephalos.—2 экземпляра.

28) Emberiza, по окраскѣ нижней стороны болѣе похожая на leucocephalos [1]), а по окраскѣ верхней—на citrinella erythrogenys. Нижняя сторона головы съ мѣстомъ, соотвѣтствующимъ пятну снизу шеи, блѣдно-желтыя (здѣсь этотъ цвѣтъ болѣе интенсивенъ, чѣмъ на остальныхъ частяхъ низа тѣла, не считая голеней и нижнихъ кроющихъ крыла, гдѣ онъ такой же интенсивный, какъ у E. c. erythrogenys. Шапочка и полосы, идущія отъ основанія надклювья надъ глазомъ къ заднему концу ушной партіи, блѣдно-желты; основанія перьевъ шапочки чисто-бѣлыя. Уздечки очень блѣднаго желтаго цвѣта. Щеки бѣлыя съ едва замѣтной желтизной. Свѣтлая часть ушной партіи съ ясной желтизной, которая значительно усиливается въ ея задней части. Бока шеи блѣдно-желтые съ сѣрыми и зеленовато-сѣрыми вершинами перьевъ. Неопятнанный районъ груди и брюха, особенно вдоль ихъ середины, блѣдно-желтый. Ясная, хотя и очень блѣдная, желтизна замѣчается на бѣломъ цвѣтѣ основного фона сопредѣльныхъ частей опятннаго района. Подхвостье съ ясною, блѣдною желтизною, особенно интенсивною въ основной его половинѣ. Верхняя сторона шеи и самая передняя часть спины съ яснымъ зеленовато-сѣрымъ оттѣнкомъ, болѣе сѣрымъ, чѣмъ у E. c. erythrogenys. Остальная часть спины, какъ у этой послѣдней, но безъ желтоватыхъ или зеленоватыхъ примѣсей. Таковы же и плечевыя партіи, но съ болѣе интенсивнымъ рыжевато-бурымъ цвѣтомъ. Аксилярныя

---

[1]) Каштановый цвѣтъ на головѣ образуетъ только очень широкіе усы, что далеко не рѣдко наблюдается у E. leucocephalos во 2-омъ типѣ окраски. *Авт.*

блѣдно-желты, болѣе блѣдны, чѣмъ у E. c. erythrogenys. Край кисти чуть желтоватъ. Окраска маховыхъ, кроющихъ большія маховыя, большихъ и среднихъ кроющихъ крыла, а также крылышка, какъ у желтой овсянки, но съ болѣе интенсивнымъ рыже-бурымъ цвѣтомъ. Верхнія малыя кроющія крыла съ зеленовато-желтыми и зеленовато-сѣрыми краями; основной же цвѣтъ ихъ яркій, рыже-бурый. Внѣшній край наружнаго опахала перваго (самаго наружнаго) руля блѣдно-желтый; 2-ой, 3-ій и 4-ый рули съ зеленовато-желтымъ внѣшнимъ краемъ наружнаго опахала при основаніи.—3 экземпляра.

29) Такая же, но съ ярко-желтымъ краемъ кисти и съ полнымъ отсутствіемъ желтизны на груди и брюхѣ. — 1 экземпляръ.

30) Emberiza очень близкая къ citrinella erythrogenys, съ очень широкими каштановыми усами, заходящими за конецъ нижняго края ушной партіи; надъ глазомъ (въ желтой надглазной полоскѣ) и за нимъ крупное продолговатое каштановое пятно. Отличается болѣе блѣднымъ оттѣнкомъ желтаго цвѣта, особенно на брюхѣ и подхвостьѣ, а также на нижнихъ кроющихъ крыла. Средняя часть ушной партіи (между черными полосами, оторочивающими ее сверху и снизу) блѣдно-желтая, бѣлѣющая близъ задняго своего края. Бѣлый цвѣтъ основаній желтыхъ перьевъ головы развитъ гораздо сильнѣе, чѣмъ у E. c. erythrogenys, особенно на шапочкѣ, хотя и здѣсь онъ нигдѣ не проглядываетъ наружу. Отмѣтины боковъ брюха и задней части груди, какъ у E. leucocephalos. Передняя часть груди зеленовато-желтая съ сѣрою примѣсью на бокахъ и черноватыми пятнами. Верхняя сторона шеи и самая передняя часть спины зеленовато-сѣрыя, не съ такою явственною, какъ у erythrogenys, примѣсью желтоватаго оттѣнка. Остальная часть спины и плечевыя партіи окрашены, какъ у E. leucocephalos. Маховыя, кроющія большихъ маховыхъ и крылышко, какъ у erythrogenys, но желтый и зеленовато-желтый цвѣта бордюровъ не такъ ярки и чисты. Большія и среднія кроющія крыла, какъ у leucocephalos. Малыя верхнія кроющія крыла съ зелено-желтоватыми краями, но не такими яркими, какъ у erythrogenys, и съ большимъ количествомъ сѣроватой примѣси (ихъ основанія черноваты на многихъ перьяхъ съ ржавчатымъ стержневымъ пятномъ). На трехъ крайнихъ рулях основанія бордюровъ внѣшнихъ опахалъ имѣютъ ясную желтоватую примѣсь.

Крестецъ и верхнія кроющія хвоста такіе же, какъ у leucocephalos [1]).—2 экземпляра.

31) Такая же, но съ полнымъ отсутствіемъ желтизны на брюхѣ и подхвостьѣ.—1 экземпляръ.

32) Emberiza по распространенію каштановаго цвѣта на головѣ представляетъ leucocephalos въ самой полной степени развитія 1-го типа окраски. Шапочка желтая, болѣе блѣдная, чѣмъ у большинства моихъ erythrogenys. Края перьевъ, составляющихъ тѣ черноватыя полосы, которыя съ обѣихъ сторонъ ограничиваютъ шапочку, зеленовато-сѣрые. Щека, свѣтлая часть ушной партіи и пятно снизу шеи такого же цвѣта, какъ шапочка. Бока передней части шеи каштановые. Перья боковъ задней части шеи желтыя, съ широкими каштановыми основаніями и зеленовато-сѣрыми вершинами. Верхняя сторона шеи, какъ у erythrogenys, желтовато-сѣрая съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Неопятнанный районъ груди и брюха блѣдно-желтый, значительно болѣе блѣдный сравнительно съ erythrogenys. Прилегающая часть опятнаннаго района съ очень ясною, хотя и блѣдною, желтизною. Основаніе подхвостья блѣдно-желтое, болѣе блѣдное, чѣмъ грудь и брюхо; вершина его чуть желтовата. Вездѣ на груди, брюхѣ и подхвостьѣ перья имѣютъ бѣловатыя вершины (птицы убиты весною), настолько широкія, что отчасти должны сохраниться и въ лѣтнемъ, обношенномъ опереніи. Опятненіе этихъ частей по цвѣту такое же, какъ у leucocephalos. Голени желтыя. Край кисти, нижнія кроющія крыла и аксилярныя блѣдно-желтые; желтый цвѣтъ наиболѣе интенсивенъ по краю кисти, наименѣе—на аксилярныхъ; вездѣ здѣсь онъ блѣднѣе, чѣмъ у erythrogenys. Верхнія малыя кроющія крыла, какъ у leucocephalos, но съ очень ясною зеленовато-желтоватою примѣсью по краю предплечья и во внутренней части своей партіи. Верхнее изъ двухъ самыхъ большихъ перьевъ крылышка съ зеленовато-желтымъ бордюромъ внѣшняго опахала. Края наружныхъ опахалъ кроющихъ большія маховыя, какъ у erythrogenys, желто-зеленовато-сѣраго цвѣта, только болѣе мутныхъ, не такихъ яркихъ оттѣнковъ. Окраска среднихъ и большихъ верхнихъ кроющихъ крыла по яркости ржавчато-буроватаго цвѣта,

---

[1]) Почти всѣ вышеописанныя птицы въ этомъ отношеніи не отличаются отъ E. leucocephalos (у рѣдкихъ, независимо отъ той или другой степени развитія желтизны, названныя части такія же, какъ у erythrogenys; у очень рѣдкихъ—болѣе блѣднаго цвѣта). *Авт.*

какъ у leucocephalos. Таковы же малые махи. Бордюры внѣшнихъ опахалъ 2-го—4-го большихъ маховыхъ блѣдно-желтые, гораздо болѣе блѣдные, чѣмъ у erythrogenys. Бордюры внѣшнихъ опахалъ 5-го—7-го маховъ мутнаго желтовато-сѣраго цвѣта. Самая передняя часть спины, какъ у erythrogenys, но болѣе сѣроватая и съ менѣе ясною зеленовато-желтоватою примѣсью. Остальная часть спины, плечевыя партіи, крестецъ и верхнія кроющія хвоста рѣшительно такіе же, какъ у leucocephalos. Основаніе бордюра наружнаго опахала крайняго руля съ едва замѣтною желтизною. 2-ой—4-ый рули (съ края) съ желтоватыми бордюрами основаній наружныхъ опахалъ. — 3 экземпляра.

33) Такая же, но каштановый цвѣтъ отсутствуетъ на бокахъ шеи, а желтизна брюха и груди блѣднѣе.—1 экземпляръ.

34) Такая же, какъ № 32, но съ желтыми вершинами каштановыхъ перьевъ головы и шеи; основной фонъ опятнаннаго района брюха и боковъ груди блѣдно-желтый; передъ груди (позади желтаго пятна низа шеи) оливково-сѣроватъ. Зашеекъ еще болѣе желтоватъ. Спина, плечевыя партіи и крестецъ, какъ у leucocephalos, но съ болѣе блѣднымъ коричневымъ полемъ вокругъ черноватыхъ стержневыхъ пятенъ. Желтизна вездѣ кажется болѣе блѣдною.—2 экземпляра.

♀ ♀

1) E. leucocephalos съ бѣлой шапочкой или безъ нея, съ каштановымъ цвѣтомъ на головѣ или безъ него. Едва замѣтная желтизна по краю кисти около корня 1-го маха. У нѣкоторыхъ экземпляровъ весь край кисти явственно желтоватъ, особенно снизу и у корня 1-го маха.—15 экземпляровъ.

2) E. leucocephalos такія же, но съ ясной желтизной на нѣсколькихъ перьяхъ по средней линіи вдоль брюха и зада груди.—4 экземпляра.

3) E. leucocephalos съ бѣлой шапочкой или безъ нея, съ каштановымъ цвѣтомъ на головѣ или безъ него. Край всей кисти желтоватъ, особенно снизу. Самая легкая блѣдно-желтая примѣсь на голеняхъ. Бордюры наружныхъ опахалъ 2-го—4-го большихъ маховъ желтоваты до расширенныхъ частей или включительно съ ними. Бордюръ того же опахала верхняго изъ двухъ самыхъ большихъ перьевъ крылышка имѣетъ оливковый оттѣнокъ.—5 экземпляровъ.

4) E. leucocephalos безъ бѣлой шапочки и съ каштановыми пятнами снизу головы. Легкая желтизна по краю кисти снизу. Сильная желтизна бѣлаго пятна снизу шеи. Неопятнанный районъ груди и брюха съ очень ясною, хотя и блѣдною, желтизною.—3 экземпляра.

5) E. leucocephalos безъ бѣлой шапочки и безъ каштановаго цвѣта на головѣ, или съ шапочкой, каштановыми бровями и сильнымъ развитіемъ каштановаго цвѣта снизу головы. Ясная желтизна на бордюрахъ 2-го—4-го большихъ маховъ, исчезающая въ расширенныхъ частяхъ этихъ бордюровъ. Иногда по краю кисти легкая желтизна.—5 экземпляровъ.

6) E. leucocephalos безъ бѣлой шапочки и каштановаго на головѣ. Ясная желтизна бѣлаго пятна снизу шеи. Нѣсколько блѣдно-желтыхъ перьевъ по средней линіи вдоль передней части брюха. Ясная блѣдно-желтая примѣсь на нижнихъ кроющихъ крыла и едва замѣтная на наружныхъ краяхъ аксилярныхъ. Бордюры наружныхъ опахалъ 2-го—3-го (или только 2-го, или 2-го—4-го) большихъ маховъ желтоваты до расширенныхъ частей (или вмѣстѣ съ ними). Край кисти желтоватъ со всѣхъ сторонъ.—4 экземпляра.

7) E. leucocephalos такія же, но при желтоватыхъ бордюрахъ наружныхъ опахалъ 2-го—3-го большихъ маховъ; остальные большіе махи, какъ и передніе изъ малыхъ, имѣютъ оливковую примѣсь на краяхъ наружныхъ опахалъ.—2 экземпляра.

8) E. leucocephalos безъ бѣлой шапочки и безъ каштановаго на головѣ. Замѣтная желтизна на бѣломъ пятнѣ снизу шеи. Бордюры наружныхъ опахалъ 2-го—4-го большихъ маховъ желтые; на остальныхъ большихъ маховыхъ они имѣютъ ясную желтую примѣсь; корень бѣлаго бордюра 1-го маха желтоватъ. Край кисти и ближайшія къ махамъ нижнія кроющія крыла съ желтою примѣсью; легкая желтоватая примѣсь на малыхъ изъ аксилярныхъ.—2 экземпляра.

9) E. leucocephalos безъ каштановаго снизу головы, но съ ясной шапочкой. Ясная желтоватая примѣсь на бѣломъ пятнѣ снизу шеи. Такая же примѣсь на нѣсколькихъ перьяхъ вдоль середины брюха и задней части груди. Край кисти, особенно снизу, около корня перваго маха желтоватъ. Бордюръ наружнаго опахала 2-го маха блѣдно-желтый. Самая легкая желтая примѣсь на краяхъ нѣкоторыхъ перьевъ зада и середины шапочки, особенно въ прикрытыхъ частяхъ ихъ.—1 экземпляръ.

10) E. leucocephalos съ каштановыми нижней стороной головы и широкими черезглазными полосами. Ясный желтый налетъ на нижнихъ кроющихъ крыла и аксилярныхъ. Бордюръ наружнаго опахала 2-го маха явственно желтый. Бордюры этихъ опахалъ на остальныхъ большихъ махахъ съ ясною грязно-желтоватою примѣсью.—2 экземпляра.

11) E. leucocephalos съ такимъ же развитіемъ каштановаго цвѣта. Пятно снизу шеи явственно желтовато (съ охристымъ оттѣнкомъ). Край кисти, нижнія кроющія крыла и аксилярныя (кромѣ вершинъ самыхъ длинныхъ) съ очень ясною блѣдно-желтою примѣсью. Бордюры наружныхъ опахалъ 2-го—4-го большихъ маховъ желтоваты, а на остальныхъ большихъ, за ними слѣдующихъ, съ неясною желтоватостью. На корняхъ бордюровъ внѣшнихъ опахалъ первыхъ двухъ рулей (считая съ края хвоста) явственная желтая примѣсь. Въ средней и въ задней частяхъ шапочки перья въ своихъ прикрытыхъ частяхъ имѣютъ очень явственный желтый оттѣнокъ.—4 экземпляра.

12) E. leucocephalos безъ каштановаго цвѣта снизу головы. Желтые бордюры на внѣшнихъ опахалахъ 2-го—3-го большихъ маховъ (до расширенныхъ частей этихъ бордюровъ или включительно до нихъ). Нѣсколько блѣдно-желтыхъ перьевъ вдоль середины брюха и задней части груди. Край кисти блѣдно-желтый. Голени грязнаго желтоватаго цвѣта. Блѣдная, но ясно замѣтная, желтая примѣсь въ закрытыхъ частяхъ перьевъ боковъ шеи.—2 экземпляра.

13) E. leucocephalos такія же, но на корняхъ бордюровъ внѣшнихъ опахалъ первыхъ двухъ рулей (считая съ края хвоста) явственная желтая примѣсь, а неопятнанный районъ брюха съ легкимъ желтымъ налетомъ.—3 экземпляра.

14) E. leucocephalos безъ каштановаго снизу головы. Замѣтная желтоватость на бѣломъ фонѣ верхней стороны головы и пятна снизу шеи. Бордюры наружныхъ опахалъ 2-го — 5-го большихъ маховъ включительно до расширенной своей части желты. Бордюры наружныхъ опахалъ 1-го—3-го рулей (считая съ края хвоста) при основаніи сѣро-зеленоваты. Нижнія части голени, край кисти и всѣ нижнія кроющія крыла (въ одномъ случаѣ и корни аксилярныхъ) сѣрно-желтоваты.—3 экземпляра.

15) E. leucocephalos такія же. Весь подбой крыльевъ, нижняя сторона головы, край кисти и въ особенности пятно снизу шеи блѣдно-желты. Голени желтоваты. Основной фонъ

шапочки и кольцо вокругъ глазъ желтоваты. Бордюры наружныхъ опахалъ 2-го—3-го большихъ маховъ включительно до расширенныхъ частей желты. Легкая желтая примѣсь на передней части брюха и на задней груди.—2 экземпляра.

16) E. leucocephalos такія же. Основной фонъ шапочки блѣдно-желтый. Блѣдная желтая примѣсь на всѣхъ бѣлыхъ цвѣтахъ нижней стороны, особенно ясная на пятнѣ снизу шеи. Щеки зеленовато-желты. Желтоватая примѣсь въ свѣтлой полосѣ позади глаза. Полное отсутствіе желтизны на крылѣ.—4 экземпляра.

17) E. leucocephalos такая же, какъ предыдущая, но безъ желтизны въ свѣтлой полосѣ позади глаза и съ легкимъ желтовато-сѣрымъ оттѣнкомъ на зашейкѣ.—1 экземпляръ.

18) E. leucocephalos безъ каштановаго на головѣ. Нижняя сторона головы и шеи, полоса надъ глазомъ и за нимъ блѣдно-желты. Верхняя сторона головы въ основномъ фонѣ явственно желто-зеленовата. Весь подбой крыла желтоватъ. Бордюры наружныхъ опахалъ большихъ маховыхъ (кромѣ 1-го и самыхъ внутреннихъ) блѣдно-желты. Бордюры наружныхъ опахалъ 1-го или 1-го и 2-го, или 1-го, 2-го и 3-го крайнихъ рулей при основаніи сѣро-зеленоваты. Нижняя часть голени у одного экземпляра желтовата.—3 экземпляра.

19) Emberiza, которая, не считая нижеупомянутыхъ особенностей, есть настоящая leucocephalos. Нижняя сторона головы и пятно снизу шеи блѣдно-желтыя съ охристымъ оттѣнкомъ. Бордюръ наружнаго опахала 2-го маха съ желтымъ цвѣтомъ, который въ расширенной части этого бордюра смѣняется чисто-бѣлымъ. Бордюры тѣхъ же опахалъ 3-го—5-го маховъ съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Верхняя сторона головы буровато-сѣрая съ яснымъ свѣтло-оливковымъ оттѣнкомъ и черно-бурыми стержневыми пятнами; перья въ закрытыхъ своихъ частяхъ при основаніи и около стержневыхъ пятенъ имѣютъ много мутной зеленовато-желтоватой примѣси. Заглазныя свѣтлыя полоски желтовато-сѣрыя съ чисто-желтою примѣсью въ закрытыхъ частяхъ перьевъ. Легкая желтоватая примѣсь наблюдается на ушныхъ партіяхъ, которыя въ общемъ буровато-сѣры. Весьма явственный желтоватый оттѣнокъ въ основныхъ частяхъ перьевъ боковъ шеи.—1 экземпляръ.

20) Такая же птица, но безъ желтоватой примѣси на ушныхъ партіяхъ и въ заглазныхъ полоскахъ; самое ничтожное ея количество на перьяхъ верхней стороны головы.—1 экземпляръ.

21) Emberiza средняя между leucocephalos и c. erythrogenys. Неопятнанный районъ задней части груди и брюха съ ясною, хотя и блѣдною, желтою примѣсью, которая особенно интенсивна вдоль середины этихъ частей. Подхвостье чисто-бѣлое съ узкими черно-бурыми стержневыми полосками и безъ всякаго намека на желтоватую примѣсь. Пятно снизу шеи блѣдно-желтое. Нижняя сторона головы такая же (этотъ цвѣтъ особенно чистъ между вѣтвями нижней челюсти и нѣсколько кзади отсюда); она усѣяна черновато-сѣрыми крапинками, и кромѣ того, каштановыми пятнышками; эти послѣднія составляютъ выходы каштановаго цвѣта, которымъ окрашены основныя части перьевъ и котораго особенно много въ районѣ усовъ. Остальное опереніе нижней стороны, какъ у leucocephalos, но не съ такимъ интенсивнымъ ржаво-каштановымъ и ржаво-коричневымъ цвѣтомъ въ центральныхъ частяхъ перьевъ (по сторонамъ темныхъ стержневыхъ полосъ); кромѣ того въ районѣ, лежащемъ непосредственно кзади отъ пятна внизу шеи и испещренномъ крупными сѣровато-бурыми пятнами, замѣчается ясная зеленовато-желтая примѣсь. Нижнія кроющія крыла, аксилярныя и край кисти блѣдно-желтые. Полоса, идущая отъ основанія надклювья черезъ глазъ до задняго края ушной партіи, грязно-сѣро-желтоватая съ повсюду пробивающимися каштановыми основаніями перьевъ. Каштановый цвѣтъ очень сильно развитъ въ основныхъ частяхъ перьевъ боковъ шеи позади ушныхъ партій, а также по заднему краю этихъ послѣднихъ. Ушныя партіи безъ всякаго признака желтоватости. Шапочка желтовато-сѣрая съ черноватыми стержневыми полосками; прикрытыя части ея перьевъ блѣдно-желтыя. Верхняя сторона крыльевъ, а также остальная верхняя сторона тѣла, какъ у erythrogenys, именно такихъ ея особей, у которыхъ на передней части спины не развиваются желтоватые или зеленоватые оттѣнки.—3 экземпляра.

22) Emberiza такія же, какъ предыдущія, но желтизна на брюхѣ развита сильнѣе, а вездѣ снизу крыла слабѣе.—2 экземпляра.

23) Emberiza средняя между leucocephalos и erythrogenys. Соотвѣтствуя блѣдно окрашеннымъ особямъ этой послѣдней, отличается отъ нихъ очень сильнымъ развитіемъ каштановаго цвѣта на корняхъ перьевъ усовъ, которые очень широки и идутъ включительно до задняго края ушныхъ партій. Легкая каштановая примѣсь замѣтна на корняхъ многихъ перьевъ ниж-

ней стороны головы. Въ свѣтлой грязно-желтоватой полосѣ, которая тянется отъ основанія надклювья черезъ глазъ до задняго края ушной партіи, корни перьевъ надъ глазомъ и на 4 m.m. отъ него надъ ушной партіей—каштановые.—1 экземпляръ.

24) Такая же, но на брюхѣ и груди нигдѣ нѣтъ хотя бы слабаго желтаго оттѣнка.—2 экземпляра.

25) Emberiza средняя между leucocephalos и erythrogenys. Вся верхняя сторона, хвостъ и крылья, какъ у наиболѣе тускло окрашенныхъ erythrogenys; таковы же боковыя стороны головы и шеи. Нижняя сторона головы блѣдно-желтая; пятно снизу шеи желтое. Брюхо и грудь въ основномъ своемъ фонѣ бѣлое съ самою слабою желтизною только въ самыхъ среднихъ частяхъ. Нижнія части голени грязно-желтоваты.—1 экземпляръ.

26) Emberiza такая же, какъ предыдущая, но съ сильнымъ развитіемъ каштановаго цвѣта на корняхъ перьевъ, соотвѣтствующихъ усамъ, съ такими же отмѣтинами груди и брюха, какъ у leucocephalos, и съ болѣе ограниченнымъ распространеніемъ желтаго цвѣта, который, сильно поблѣднѣвъ, занимаетъ только нижнюю сторону головы, пятно снизу шеи и нижнюю часть голени.—3 экземпляра.

27) Emberiza, отличающаяся отъ предыдущей полнымъ отсутствіемъ желтизны на нижней сторонѣ головы, шеи и туловища.—1 экземпляръ.

Замѣчу еще, что между ♀ ♀ E. leucocephalos нерѣдко попадаются такія особи, у которыхъ къ охристому цвѣту, часто развивающемуся на свѣтломъ пятнѣ снизу шеи, примѣшивается *желтый* оттѣнокъ.

Для того, чтобы собрать такое значительное количество „среднихъ“ формъ, намъ пришлось перебить обыкновенныхъ овсянокъ (особенно бѣлошапочныхъ) въ числѣ, во много разъ большемъ: часто случалось такъ, что и среди двухъ-трехъ десятковъ добытыхъ птичекъ всѣ оказывались чистокровными.

Вышеописанныя среднія формы между E. leucocephalos и E. c. erythrogenys могутъ считаться гибридами между этими видами. Громадное большинство ихъ представляетъ либо настоящихъ E. leucocephalos (у ♂ ♂ съ каштановой нижней стороной головы или — рѣже — только съ каштановыми широкими усами) съ самыми слабыми признаками примѣси крови E. c. erythrogenys, либо такихъ птицъ, которыя рѣшительно, не-

смотря на весьма явственные признаки этой примѣси, стоятъ ближе къ E. leucocephalos (съ тѣмъ же развитіемъ каштановаго цвѣта на головѣ). Ихъ можно разсматривать частью какъ продукты скрещиванія прямой помѣси съ E. leucocephalos, частью—какъ продукты скрещиванія дальнѣйшихъ поколѣній съ тою же E. leucocephalos, мало-по-малу теряющіе чуждую кровь. Крайне любопытнымъ остается порядокъ исчезновенія признаковъ примѣси крови E. c. erythrogenys, а также существованіе наиболѣе стойкихъ признаковъ этой примѣси (напримѣръ, желтизна на краю кисти, желтизна бордюровъ внѣшнихъ опахалъ большихъ маховыхъ и т. п.; у ♀♀, кромѣ того, присутствіе *желтовато*-охристой примѣси на свѣтломъ пятнѣ низа шеи). Образованіе прямыхъ помѣсей и постепенное превращеніе ихъ потомковъ въ E. leucocephalos легко объясняется преобладаніемъ этой послѣдней надъ E. c. erythrogenys въ тѣхъ странахъ, изъ которыхъ прилетаютъ къ намъ на зиму эти птицы. Рядъ послѣднихъ изъ описанныхъ мною промежуточныхъ формъ можетъ быть разсматриваемъ въ качествѣ прямыхъ помѣсей между E. leucocephalos и E. c. erythrogenys. При оцѣнкѣ ихъ какъ таковыхъ, непонятнымъ остается только сильное развитіе каштановаго цвѣта на головѣ у тѣхъ особей, которыя въ этомъ отношеніи относятся къ 1-му типу личныхъ измѣненій E. leucocephalos: *можно думать, что вслѣдствіе скрещиванія количество каштановаго цвѣта неминуемо должно было бы уменьшиться.* Не имѣемъ ли мы здѣсь, въ этихъ прямыхъ помѣсяхъ, совпаденія гибридизаціи съ явленіемъ атавизма? Не существовала ли когда-либо общая родоначальная форма для E. leucocephalos и для E. c. erythrogenys и не была ли эта E. antiqua окрашена болѣе или менѣе тождественно съ этими помѣсями?

Примѣчаніе. Э. Хартертъ (l. c.) совершенно правильно отождествляетъ мою E. mollessoni (Дополненія къ „Орнитологической фаунѣ Оренбургскаго края“, 1897 г.; „Ornithologisches Jahrbuch“, 1902, S. 58) съ E. c. erythrogenys. По моему мнѣнію, она составляется особями атавистическими и во всякомъ случаѣ не гибридными (E. leucocephalos въ Оренбургскомъ краѣ не гнѣздится; съ другой стороны, E. mollessoni въ своемъ желтомъ цвѣтѣ ничуть не блѣднѣе, чѣмъ E. c. erythrogenys). Что же касается до енисейскаго экземпляра, добытаго Popham'омъ (Abbildung Ibis, 1901, taf. 10) и приравниваемаго Э. Хартертомъ къ E. mollessoni, то я вижу въ немъ или прямую помѣсь между E. leucocephalos и E. c. erythrogenys, или атавистическую особь отъ E. leucocephalos.

Желтизна на кисти нѣкоторыхъ изъ „среднихъ“ формъ моей коллекціи съ теченіемъ времени исчезла.

Китайскій лебедь (Cygnus davidi Swinh.) въ Сибири.

В. Ч. Дорогостайскій.

Chinesischer Schwan (Cygnus davidi Swinh.) in Sibirien.


Von *W. Dorogostaisky.*

Вопросъ о принадлежности Cygnus davidi къ русской фаунѣ до настоящаго времени оставался окончательно нерѣшеннымъ. Дѣло въ томъ, что Тачановскій внесъ китайскаго лебедя въ списокъ восточно-сибирскихъ птицъ (L. Taczanowski: „Faune Ornithologique de la Sibérie Orientale", p. 1119), основываясь на добычѣ въ заливѣ Посьета итальянской экспедиціей двухъ молодыхъ лебедей, опредѣленныхъ профессоромъ Джильоли за Cygnus davidi. С. А. Бутурлинъ [1]) считаетъ опредѣленіе Джильоли ошибочнымъ, предполагая, что птицы принадлежали къ виду Cygnus bewicki. У нѣкоторыхъ орнитологовъ являлось даже сомнѣніе въ самостоятельности вида Cygnus davidi вообще. Настоящая замѣтка и имѣетъ цѣлью пролить нѣкоторый свѣтъ на эти два спорныхъ вопроса зоологической географіи и систематики.

Получивъ для обработки орнитологическую коллекцію Иркутскаго Музея Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, я обратилъ вниманіе на одинъ интересный экземпляръ лебедя, подробное изслѣдованіе котораго привело меня къ убѣжденію, что я имѣю дѣло съ Cygnus

---

[1]) „Синоптическія таблицы охотничьихъ птицъ Россійской Имперіи", стр. 40.



Рисовалъ съ натуры В. Ч. Дорогостайскій.

Китайскій лебедь, взрослый самецъ. Cygnus davidi Swinh., ♂ adlt.

ФОТОТИПІЯ ШЕРЕРЪ НАБГОЛЬЦЪ И КЕ, МОСКВА

davidi. Лебедь этотъ—взрослый самецъ—былъ добытъ крестьяниномъ Филипповымъ въ сентябрѣ 1902 года около Иркутска, на рѣкѣ Иркутѣ. Вотъ его описаніе.

Голова, шея, грудь и брюхо бѣлыя; маховыя, верхнія кроющія крыла и кроющія хвоста бѣлыя, съ чуть замѣтнымъ сѣроватымъ оттѣнкомъ; клювъ ярко-желтый за исключеніемъ коготка, наружнаго края верхней и нижней челюсти и небольшого пятна вокругъ ноздрей, каковыя части черныя; зубчиковъ на верхней челюсти 34; *уздечка оперена*; ноги (судя по шкуркѣ) свѣтло-бурыя и въ свѣжемъ видѣ не могли быть черными.

Размѣры (въ миллиметрахъ) этой птицы таковы. Вторыя цифры, приведенныя мною изъ работы Тачановскаго (l. c.), представляютъ размѣры экземпляра David'a

Клювъ: длина отъ лба	67	70
„ „ „ угла рта	80	80
„ высота у основанія	35	—
Крыло	478	520
Хвостъ	158	160
Плюсна	102	100
Средній палецъ съ когтемъ	116	—

Такимъ образомъ, всѣ характерные признаки Cygnus davidi, указанные Свинго, именно: сравнительно малая величина, сильное развитіе желтаго цвѣта на клювѣ и—особенно—оперенная уздечка и отсутствіе чернаго цвѣта на ногахъ (у взрослыхъ особей) у иркутскаго экземпляра имѣются налицо, и поэтому первый вопросъ, т.-е. можетъ ли быть Cygnus davidi включенъ въ списокъ русскихъ птицъ, рѣшается въ положительномъ смыслѣ.

Гораздо труднѣе рѣшить второй вопросъ, вопросъ о самостоятельности вида Cygnus davidi. Хотя имѣется слишкомъ мало фактическихъ данныхъ, чтобы высказаться окончательно, но я все же полагаю, что постоянство цѣлой категоріи отличительныхъ признаковъ, наблюдавшихся какъ у молодыхъ (экз. Giglioli и Salvadori) и не вполнѣ взрослыхъ птицъ (экз. David'a и Oustalet'a), такъ и у взрослаго (экз. Иркутскаго Музея), позволяетъ смотрѣть на Cygnus davidi скорѣе какъ на вполнѣ установившійся видъ, чѣмъ, какъ на результатъ личныхъ отклоненій другого вида, напримѣръ, Cygnus bewicki. Мало вѣроятно, чтобы Cygnus davidi оказался помѣсью близкихъ видовъ,

напримѣръ, C. bewicki и C. musicus, такъ какъ нѣкоторыхъ признаковъ (оперенной уздечки и оранжевыхъ лапъ у взрослыхъ особей) у этихъ видовъ нѣтъ совсѣмъ. И третье, что говоритъ въ пользу рѣшенія этого вопроса въ положительномъ смыслѣ, это то, что всѣ птицы съ характерными для C. davidi признаками были описаны изъ восточной части Азіи,—въ Европѣ же, хотя и гораздо болѣе изученной въ орнитологическомъ отношеніи, онѣ никогда не наблюдались.



Къ вопросу о систематическомъ положеніи бѣлокрылой сороки (Pica leucoptera Gould.).

С. И. Огневъ.

Zur Frage über die sistematische Stellung der weissflügligen Elster (Pica leucoptera Gould.).

Von *S. I. Ognew.*

Долгое время вопросъ о таксономическомъ положеніи бѣлокрылой сороки представлялся темнымъ для орнитологовъ. Большинство прежнихъ авторовъ считало эту форму особымъ видомъ, отличающимся отъ типичной Pica pica Linn.. Въ сравнительно недавнее время Dr. *E. Hartert* [1]) нашелъ возможнымъ признать всѣхъ сорокъ, встрѣчающихся отъ Урала до Берингова моря за одну бѣлокрылую форму—Pica pica bactriana Bp. (по пріоритету), придавая ей подвидовое значеніе. Но это указаніе, какъ правильно отмѣтилъ *С. А. Бутурлинъ* [2]), далеко не точно. Необходимо, во-первыхъ, замѣтить, что уже *Тачановскій* говоритъ о двухъ формахъ сороки, соотвѣтствующихъ бѣлокрылой и типичной, водящихся въ Сибири, и, во-вторыхъ, что такъ называемая Pica leucoptera Gould. распространена на западъ до Швеціи включительно. Итакъ, можно видѣть, что двѣ формы сороки встрѣчаются всюду параллельно другъ съ другомъ,—послѣднее

[1]) Dr. *Ernst Hartert*: „Die Vögel der paläarktischen Fauna", Heft I, S. 21, 1903. *Авт.*

[2]) *С. А. Бутурлинъ*: „Птицы Приморской Области" (Отд. отт. изъ журнала „Наша Охота" за 1910 г.), стр. 57. *Авт.*

обстоятельство не даетъ возможности считать бѣлокрылую за подвидъ. Какъ показали изслѣдованія *С. А. Бутурлина* [1]) и тщательный критическій очеркъ *Г. И. Полякова* [2]), нѣтъ основанія считать этихъ сорокъ близкими сливающимися видами; все скорѣе говоритъ за чисто-возрастной характеръ признаковъ отличія у этихъ птицъ, при чемъ старыми являются бѣлокрылыя, а молодыми—обычныя. Это косвеннымъ образомъ подтверждается тѣмъ, что ни одинъ изслѣдователь не имѣлъ въ рукахъ молодую птицу съ рисункомъ крыла типичной Pica leucoptera Gould.

Въ интересной коллекціи *А. В. Федюшина*, собранной въ Минской губерніи и частью переданной въ Зоологическій Музей



Императорскаго Московскаго Университета, нашелся экземпляръ сороки, какъ мнѣ думается, совершенно опредѣленно рѣшающій вопросъ въ смыслѣ послѣдняго толкованія. Эта сорока, добытая въ іюлѣ 1912 года въ Слуцкомъ уѣздѣ, Минской губерніи, находится въ состояніи интенсивной линьки. Какъ видно изъ прилагаемой фотографіи крыла этой особи, всѣ второстепенныя маховыя и часть первостепенныхъ перелиняли, при чемъ окраска ихъ является характерной для Pica leucoptera Gould. Три

---

[1]) l. c., стр. 57 и 58. *Авт.*

[2]) *Г. И. Поляковъ*: „Поѣздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 г.“. „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1912 г., № 4, стр. 73—79. *Авт.*

первыхъ маховыхъ, сильно обношенныхъ, еще не замѣнились другими и являются по рисунку типичными для Pica pica Linn.. Интересно отмѣтить, что у такъ называемыхъ „типичныхъ бѣлокрылыхъ“ особей распространеніе бѣлаго цвѣта больше, чѣмъ на перелинявшихъ махахъ нашего экземпляра. Это ясно указываетъ, что въ послѣдующихъ линькахъ площадь бѣлаго цвѣта все болѣе увеличивается параллельно съ уменьшеніемъ черной каймы. — Размѣры этого экземпляра таковы: длина клюва (отъ конца ноздри до кончика верхней челюсти) — 24,2; culmen — 37,6; плюсна—42,8; крыло—179; хвостъ—186 m.m..

Къ распространенію гаичекъ.

С. А. Бутурлинъ.

Notes on Distribution of Penthestes (=Poecile).

By *S. A. Buturlin.*

Въ сборахъ Кіевскаго Орнитологическаго Общества имени К. Ѳ. Кесслера, любезно предоставленныхъ мнѣ для осмотра В. М. Артоболевскимъ, оказалось три формы гаичекъ. Нѣкоторые факты распространенія этихъ птичекъ весьма интересны.

Сѣрая гаичка (P. atricapilla borealis Sel.) въ Волынской и Подольской губерніяхъ не найдены корреспондентами Общества, а въ Кіевской—лишь зимой; но изъ Черниговской губерніи имѣются и лѣтніе экземпляры: взрослый самецъ отъ 12. V. 1910 и совсѣмъ молодая птица отъ 6. VII. 1909 (сборъ г. А. Лубкина),—обѣ изъ Дубечанскаго лѣсничества Остерскаго уѣзда.

Бурая гаичка (P. palustris palustris Linn.) въ 1 взрослымъ экземплярѣ добыта г. Герхнеромъ 22. VIII. 1910 въ томъ же Дубечанскомъ лѣсу въ Черниговской губерніи, имъ же—взрослая самка 8. III. 1909 у хутора Нѣметчина въ Литинскомъ уѣздѣ, Подольской губерніи, и 1 взрослый самецъ—г. Бауманомъ 4. IV. 1910 въ Брацлавскомъ уѣздѣ, той же губерніи, у ст. Демковки. Наконецъ, два самца добыты г. А. Лубкинымъ 3 и 6. V. 1909 въ Костопольскомъ лѣсу, въ Ровенскомъ уѣздѣ, Волынской губерніи.

Рыжая гаичка (P. palustris stagnatilis Brhm) представлена многими экземплярами изъ Пензенской губерніи (я добывалъ ее въ Симбирской). В. М. Артоболевскій добылъ 18. VII. 1906 у Городища молодого „несомнѣнно мѣстнаго вывода". Гнѣз-

дится и подъ Кіевомъ (взрослый самецъ отъ 8. V. 1910 и экз. отъ 19. VII). Изъ Волынской губерніи этой формы нѣтъ вовсе, а изъ Подольской—6 зимнихъ экземпляровъ, что можетъ быть и случайность, но изъ Дубечанскаго лѣса (Черниговская губернія) есть 2 молодыя птицы отъ 2 и 8. VI. 1910.

P. atricapilla borealis Sel. seems to breed in Dubechany forest, Oster distr., south-western part of Chernigov gov.

P. palustris palustris (L.) procured in the same forest in autumn, and in Podolsk gov., Litin and Brazlav districts, in spring (21-st March and 17 April, new style); evidently breeds in Kostopol forest, Rovno distr., Volynia.

P. palustris stagnatilis Brehm breeds in the just named Dubechany forest, Chernigov gov., also in Kiev gov. and as far north-east as Gorodishche, Pensa gov. (eastern part).

Cyanistes cyanus yenisseensis But. et Tugar. въ Кіевѣ.

С. А. Бутурлинъ.

Cyanistes cyanus yenisseensis But. et Tugar. in Kiev.

By *S. A. Buturlin.*

Благодаря любезности В. М. Артоболевскаго, я могъ пересмотрѣть большія серіи синицъ въ коллекціи Кіевскаго Орнитологическаго Общества имени К. Ѳ. Кесслера. Между ними оказалось пять самокъ и одинъ самецъ, добытые между 25 и 30. X. 1910 близъ Кіева и опредѣленные, какъ C. c. tianshanicus. Всѣ эти экземпляры—вполнѣ взрослыя птицы съ крыльями около 65,3 (отъ 63 до 68) и хвостомъ (отъ корня рулей) около 63,2 m.m. (отъ 61 до 66)—нѣсколько крупны для обычныхъ размѣровъ туркестанской формы. Голова съ яснымъ пепельнымъ налетомъ, чего не бываетъ у типичной поволжской расы, но свойственно представителямъ азіатской. Бѣлая крыловая полоса (у внѣшнихъ второстепенныхъ) 8—$9^1/_2$ m.m. ширины, тогда какъ у волжскихъ 10—12 m.m. Спина отнюдь не блѣднѣе и не сѣрѣе, чѣмъ у типичныхъ волжскихъ птицъ того же сезона (это всегда ясно наблюдается на туркестанскихъ птицахъ); наоборотъ, кіевскія птицы скорѣе нѣсколько синѣе. Такимъ образомъ эти птицы ближе всего стоятъ къ сибирской расѣ (C. c. yenisseensis), залетъ которой, конечно, правдоподобнѣе, чѣмъ туркестанской.

---

1 male and 5 females, all quite adult birds, procured about 7—12 November 1910 (new style) near Kiev. They all have deci-

dedly greyish tinged heads never seen in large series of typical bird of the Volga bassin, and narrower white wing-bars,—but they are rather larger, than Turkestan birds (true C. c. tianshanicus), having wings 63–68 (mean 65,3) and tails from root of central feathers 61—66 (mean 63,2) millim.,—and differ strongly from these last in having backs not paler and greyer, than in typical Volga race, but, if angthing, rather of more saturated blue. Therefore they are very much like C. c. yenisseensis of Siberia.

Новая форма клинтуха (Columba oenas hyrcana subsp. nov.).

Н. А. Зарудный и *С. І. Билькевичъ.*

Eine neue Form der Hohltaube (Columba oenas hyrcana subsp. nov.).

Von *N. A. Sarudny* und *S. I. Bilkewitsch.*

Это—лѣтняя и отчасти осѣдлая птица лѣсныхъ пространствъ тѣхъ мѣстностей, которыя прилегаютъ къ южному побережью Каспійскаго моря (Астрабадъ, Мазандеранъ и Гилянъ). Зимою и на пролетахъ бываетъ въ Загросскомъ и Месопотамскомъ участкахъ Персіи, гдѣ въ это время года, повидимому, уступаетъ по своей численности настоящему клинтуху (Columba oenas Linn.). За типичныхъ представителей этой формы мы считаемъ тѣхъ, которые происходятъ изъ окрестностей Зіарета (около г. Астрабадъ).

Отличается отъ настоящаго клинтуха (изъ Оренбургской и Псковской губерній) *болѣе темнымъ оттѣнкомъ всѣхъ сѣрыхъ цвѣтовъ оперенія*, что особенно хорошо замѣтно на головѣ, задней части груди и на брюхѣ. По размѣрамъ кажется съ нимъ совпадаетъ (крыло ♂ ♂ = 218—225 m.m.; у ♀ ♀ оно = 216—220).

Краткія сообщенія.—Kurze Mitteilungen.

Зимовка малиновки (Erithacus rubecula Linn.) подъ Петербургомъ.—Въ декабрѣ прошлаго (1912) года, бродя по парку Лѣсного Института, я замѣтилъ одиночный экземпляръ малиновки, надъ которымъ имѣлъ возможность наблюдать впослѣдствіи до 18-го февраля. Изъ зданія Института въ паркъ отведена черезъ трубу бывшая въ употребленіи въ лабораторіяхъ вода, протекающая здѣсь ручейкомъ, незамерзающимъ зимою. Около этого ручейка и поселилась малиновка. Утромъ она обычно держалась въ ближайшихъ кустарникахъ, а часовъ въ 12 дня (или около 1 часа) прилетала на ручей, гдѣ проводила около четверти часа и затѣмъ снова улетала въ кустарники. Въ 4—5 часовъ вечера птичка иногда снова появлялась на короткое время у ручья, послѣ чего улетала на покой. 17-го февраля товарищи-студенты слышали ея пѣніе. 18-го февраля малиновку эту я добылъ для коллекціи зоологическаго музея Института. При препаровкѣ обнаружилось, что это былъ самецъ. Въ его желудкѣ я нашелъ сѣмена гравилата рѣчного (Geum rivale L.), въ изобиліи растущаго по берегамъ ручейка, и остатки какой-то гусеницы.

В. Бѣлоусовъ.

* * *

Къ орнитофаунѣ Московской губерніи.—С. В. Морозовъ сообщилъ мнѣ, что осенью минувшаго (1912) года ему пришлось необычайно поздно наблюдать изо дня въ день одинъ экземпляръ зорянки [Erithacus rubecula (Linn.)] въ Москвѣ, въ большомъ саду при его домѣ. Послѣдній разъ онъ видѣлъ здѣсь эту птичку 18-го ноября.

22-го ноября 1912 года мнѣ лично пришлось замѣтить и добыть одного самца зяблика (Fringilla coelebs Linn.) на опушкѣ некрупнаго смѣшаннаго лѣса въ нашемъ имѣніи „Саввино“, въ Богородскомъ уѣздѣ.

Г. П. Поляковъ.

* * *

Замѣтка къ Cornix cornix Linn. var. christophi Alph. nova.—Въ дополненіе къ описанію интересныхъ случаевъ эритризма у сѣрой вороны, приводимыхъ С. Н. Алфераки („Птицы Восточнаго Приазовья“ въ „Орнитологическомъ Вѣстникѣ“ за 1910 г., № 3, стр. 164—165), могу сослаться на свою работу „Орнитологическая фауна Оренбургскаго края“ (приложеніе къ LVII тому „Записокъ Императорской Академіи Наукъ“, 1888 г.), въ которой говорится:

> „Очень рѣдко встрѣчаются у насъ красные выродки сѣрой вороны, у которыхъ всѣ сѣрые цвѣта замѣнены красновато-грязно-малиновыми, а черные на головѣ и шеѣ—красновато-буроватыми. На рулях и маховыхъ перьяхъ красноватые цвѣта замѣчаются только при ихъ основаніяхъ и на внѣшнихъ опахалахъ; на всемъ остальномъ ихъ пространствѣ обыкновенно черные цвѣта замѣнены ржавчато-буроватымъ. Описаніе это составлено по одному экземпляру, добытому [1]) въ концѣ іюля 1882 г.“.

Н. А. Зарудный.

* * *

Къ орнитофаунѣ Сувалкской губерніи.—Е. Я. Катинъ сообщилъ мнѣ, что въ началѣ января сего (1913) года, когда морозъ доходилъ до 10°, были замѣчены имъ въ Владиславовѣ двѣ стайки скворцовъ (Sturnus intermedius Praz.), одна въ 7, другая въ 5 особей; попадались въ то время также и одиночные экземпляры. Скворцы наблюдались ежедневно въ теченіе января, ютились они вблизи строеній, разыскивая пищу по сорнымъ ямамъ. 6-го января парочка (♂ и ♀) залетѣла на дворъ при домѣ Е. Я. Катина, гдѣ и была добыта. Послѣдній разъ птицы были замѣчены 30-го января. Интересно, что позднѣе, когда наступила теп-

[1]) Станица Буранная на Илекѣ. *Авт.*

лая погода и Нѣманъ мѣстами поломалъ ледъ, скворцы исчезли. Въ нынѣшнемъ (1913) году весенній прилетъ ихъ начался 24-го февраля.

Г. П. Поляковъ.

* * *

Кое-что о пролетѣ чернаго аиста.—2-го октября 1912 года около 10 часовъ утра надъ городомъ Владиславовомъ Сувалкской губерніи пролетали 2 аиста (Ciconia ciconia Linn.), почему-то сильно запоздавшіе отлетомъ [1]). Птицы летѣли на высотѣ дробового выстрѣла, преслѣдуемыя стаей, особей въ 300—400, галокъ (Corvus monedula collaris Drum.). Послѣднія сильно нападали на аистовъ и щипали ихъ, главнымъ образомъ, сзади за красныя лапы. Аисты поджимали ноги и то и дѣло измѣняли направленіе полета. Наконецъ одинъ изъ нихъ, совершенно обезсиленный, опустился на крышу дома, а другой скрылся въ близъ стоящій лѣсокъ. Галки расположились по деревьямъ близъ перваго аиста, который въ безпомощномъ состояніи — съ опущенными крыльями и взъерошенными перьями — пробылъ на крышѣ около двухъ часовъ, а затѣмъ благополучно скрылся по направленію къ юго-западу.

Е. Я. Катинъ.

---

[1]) Отлетъ ихъ здѣсь обыкновенно заканчивается въ началѣ первой половины сентября. *Авт.*

Обзоръ русской орнитологической литературы.

С. А. Бутурлинъ.

Rewiew of the Russian ornithological Literature.

By *S. A. Buturlin.*

(Продолженіе. — Continued.) [1]).

В. Г. Аверинъ: „Орнитологическія наблюденія лѣтомъ 1909 и 1910 гг. въ окрестностяхъ станицы Митякинской, Донецкаго округа Области Войска Донского“. Харьковъ, 1911, 8°, 31 стр.

Настоящая статья (никакихъ слѣдовъ того, представляетъ ли она отдѣльный оттискъ изъ какого-либо изданія, на ней не имѣется) является результатомъ двухъ лѣтнихъ поѣздокъ автора, въ теченіе которыхъ ему удалось собрать свѣдѣнія о 115 видахъ и коллекцію изъ 132 шкурокъ. Упоминаетъ авторъ и о „независящихъ обстоятельствахъ“, мѣшавшихъ ему. Но были ли это заслуживающія вниманія помѣхи, остается неизвѣстнымъ. Есть хорошій обычай—благодарить лицъ, помогающихъ подобной работѣ; такъ дѣлаетъ и авторъ. Но вѣдь помощь научнымъ изслѣдованіямъ естественно предполагается со стороны всякаго сколько-нибудь культурнаго, даже всякаго разумнаго человѣка. И по меньшей мѣрѣ не менѣе полезно и интересно знать, откуда и отъ кого могутъ исходить и препятствія къ изученію природы нашей страны.

Подъ №№ авторъ приводитъ 102 вида. Отмѣчу нахожденіе имъ Sturnus tauricus, гнѣзда Astur brevipes и не гнѣз-

---

[1]) См. „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1913 г., кн. *I*, стр. 59–69.

дящейся пары аистовъ. Отмѣчу, что изъ чирковъ найденъ имъ только коростелекъ. Интересны наблюденія надъ Oedicnemus crepitans. Опредѣленія не вездѣ доведены до подвида. Говоря о разныхъ формахъ желтыхъ трясогузокъ, слѣдовало бы автору привести подробныя измѣренія, такъ какъ это очень помогаетъ разбираться съ этими птицами. Тогда и ♀ черноголовой трясогузки не оказалась бы тождественной съ B. f. flava и помимо пятнышекъ груди. Наконецъ, замѣчаніе автора, что у его экземпляра чернаго коршуна „кроющія уха въ своей верхней части темнѣе оперенія головы", а потому это экземпляръ переходный къ M. melanotis—совершенно неосновательно, такъ какъ это явленіе самое обыкновенное и у типичнаго M. migrans, который отличается отъ M. melanotis прежде всего пластикой и размѣрами.

„Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1910 годъ". Спб., 1911 г.

Въ „Отчетѣ" этомъ на страницахъ 17—22 помѣщенъ краткій предварительный отчетъ Н. А. Заруднаго о поѣздкѣ по Бухарскому ханству въ 1910 году, во время которой путешественникъ съ двумя препараторами сдѣлалъ со средины апрѣля по начало августа свыше 900 верстъ вьючно (т.-е., въ сущности, пѣшкомъ) и не меньше 200 верстъ на каюкахъ, и собралъ, помимо другихъ богатыхъ матеріаловъ, много болѣе 1000 экземпляровъ птицъ, между которыми несомнѣнно имѣются неописанные виды и формы, а также виды, ранѣе неизвѣстные въ Палеарктикѣ (напримѣръ, Chelidon smithi Leach.) или неожидавшіеся такъ далеко на сѣверѣ (сравнительно), какъ Бухара (напр., Lobivanellus indicus, Molpastes leucotis, Rhyacornis fuliginosa, Acridoteres tristis).

„Русское Энтомологическое Обозрѣніе", издаваемое Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

Прекрасный журналъ этотъ, конечно, не содержитъ орнитологическихъ статей, но въ немъ иногда появляются статьи широкаго общаго значенія для зоологовъ. Такъ, въ т. X (за 1910 г., опубл. 18. II. 1911) № 4 статья *В. Ѳ. Ошанина* —„Къ вопросу о номенклатурѣ въ зоологической систематикѣ" (стр. 264—272). Въ этой статьѣ глубокоуважаемый авторъ сжато, но рельефно и

остроумно, выставляетъ всѣ неудобства, проистекающія отъ частой за послѣдніе годы перемѣны видовыхъ и групповыхъ названій животныхъ, перемѣны, происходящей отъ нахожденія до сихъ поръ остававшихся забытыми старыхъ зоологическихъ изданій, или отъ болѣе тщательнаго изученія давно извѣстныхъ, и со своей стороны категорически высказывается противъ правила пріоритета въ номенклатурѣ, предлагая свои ограничительныя правила.

Нельзя не сознаться, что обиліе синонимовъ и частыя переименованія—огромное зло въ зоологіи, и особенно въ орнитологіи. Безусловно справедливо и то, что весь вопросъ о правилахъ номенклатуры—чисто практическій. Никто и ничто не мѣшаетъ перекраивать эти правила какъ угодно въ зависимости отъ выясняющихся обстоятельствъ, но во всякомъ случаѣ правила эти должны быть таковы, чтобы давать надежду рано или поздно достичь съ ихъ помощью единства научной номенклатуры.

Весь вопросъ въ томъ, на какой почвѣ проще и легче достигнуть такого результата: на основаніи принципа „auctorum plurimorum“, принципа давности или принципа первенства описанія (пріоритета). Для тѣхъ, кто вообще серьезно не вѣритъ въ самую возможность когда-либо достичь единства номенклатуры—казалось бы послѣдовательнѣе совершенно не интересоваться дѣломъ, котораго упорядочить, съ ихъ точки зрѣнія, невозможно, и не обнажать оружія противъ какой-либо изъ сторонъ въ этой борьбѣ, въ которой все равно всѣ обречены на пораженіе. Весь вопросъ объ упорядоченіи номенклатуры, мнѣ думается, долженъ бы занимать только людей, сколько-нибудь вѣрящихъ въ возможность ея упорядоченія хотя бы въ отдаленномъ будущемъ.

Что принципъ пріоритета примѣняется иногда неосмотрительно, поспѣшно, даже ошибочно, это безусловно вѣрно. Но ошибки, неосмотрительность—возможны, и будутъ случаться при примѣненіи любого мыслимаго принципа, и если пріоритетъ выдвинулъ особо значительное число такихъ погрѣшностей, то вѣдь причина этому лежитъ, очевидно, не въ свойствахъ этого принципа, но въ томъ фактѣ, что принципъ этотъ примѣняется теперь значительнымъ большинствомъ біологовъ. Тѣ принципы, которые никѣмъ на практикѣ не примѣняются, конечно, не создаютъ практическихъ ошибокъ, но развѣ это доводъ въ ихъ пользу.

Принципъ пріоритета хорошъ, прежде всего уже тѣмъ, что въ

основѣ его лежитъ общепонятная и со всякой точки зрѣнія справедливая идея: разъ животное впервые кѣмъ-либо описано и названо, такъ это имя и должно за нимъ оставаться. Если другой ученый по ошибкѣ, незнанію и т. п. назвалъ это же животное впослѣдствіи иначе—его ошибка или незнаніе не должны служить достаточнымъ основаніемъ для отбрасыванія болѣе ранняго имени. Второе достоинство этого принципа—тотъ несомнѣнный фактъ, что старыя забытыя изданія хотя и находятся вновь, но во всякомъ случаѣ вновь не нарождаются, а потому этотъ главнѣйшій источникъ такъ называемаго созданія „новыхъ“ названій (т.-е., въ сущности возстановленія старыхъ)—обязательно долженъ рано или поздно разъ навсегда исчезнуть.

Принципъ же давности и въ основаніи споренъ, такъ какъ разъ сдѣланная ошибка и черезъ 50, и черезъ 500 лѣтъ въ истину не превращается, да и принятіе его не улаживаетъ дѣла, такъ какъ безконечно спорнымъ останется вопросъ о наилучшемъ срокѣ давности. Если и будетъ постановлено, чтобы имена, бывшіе въ употребленіи, скажемъ, съ 1859 года (годъ опубликованія знаменитыхъ работъ Дарвина и Уоллеса)—впредь не переименовывались изъ-за находокъ болѣе старыхъ работъ, то вѣдь по существу это будетъ то же самое правило пріоритета, какъ и сейчасъ дѣйствующее, только съ переносомъ исходной точки съ 1758-го на 1859-й годъ. При этомъ самъ глубокоуважаемый Василій Ѳедоровичъ ставитъ условіемъ, чтобы въ теченіе давностнаго срока данное названіе „было принимаемо всѣми спеціалистами“. И, очевидно, вопросъ о томъ, кого считать, и кого не считать „спеціалистомъ“—весьма удобенъ для вѣчныхъ разногласій, внося совершенно субъективный элементъ [1]). А вопросъ о томъ, „всѣми“ или не всѣми спеціалистами употреблялось извѣстное названіе сводится опять къ той же зоо-археологіи и переворотамъ изъ-за случайной находки забытой статьи.

---

[1]) Да и какимъ „спеціалистомъ“: по какой-нибудь отрасли зоологіи, или по данному классу, или именно данному семейству и т. д.? Напр., Мадарашъ, говорятъ, хорошій спеціалистъ по южно-американскимъ птицамъ, а въ области Палеарктики онъ пока занимается тѣмъ, что „описываетъ“ въ качествѣ самостоятельныхъ новыхъ видовъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ, случайно попавшихся ему въ руки: попался случайно рябчикъ съ Иркутскаго рынка—и готовъ новый видъ. А такъ какъ „точное происхожденіе неизвѣстно“, описаніе всего въ нѣсколько общихъ словъ, плохое и неясное, рисунки не лучше, то и изволь догадываться въ чемъ дѣло. А это орнитологъ-спеціалистъ, только въ другой области. Мнѣ лично много лѣтъ приходится спеціально заниматься палеарктическими птицами и случилось опубликовать

Наконецъ, принципъ увѣковѣченія ошибокъ на почвѣ давности врядъ ли способенъ собрать вокругъ себя значительное большинство натуралистовъ, принципъ же пріоритета уже и сейчасъ имѣетъ за себя солидное большинство, все растущее. Большинство голосовъ ровно ничего не значитъ въ научныхъ вопросахъ, гдѣ для каждаго работника есть только одинъ верховный авторитетъ: свободное сужденіе, направляемое исканіемъ истины,—но въ такихъ чисто практическихъ вопросахъ, какъ правила номенклатуры, весь вопросъ въ сущности только и заключается въ томъ, чтобы установить согласіе значительнаго большинства, которое со временемъ естественно обратится въ единогласіе.

Въ виду характера примѣровъ, приводимыхъ Василіемъ Ѳедоровичемъ Ошанинымъ противъ принципа пріоритета, я долженъ сдѣлать оговорку: все вышесказанное я примѣняю къ родовымъ и низшимъ названіямъ, но не къ именамъ группъ, высшихъ чѣмъ родъ. Такое различіе не есть произвольная непослѣдовательность, но вытекаетъ изъ сущности дѣла, такъ какъ при группировкѣ родовъ и высшихъ таксономическихъ единицъ затрагиваются не только чисто номенклатурные, но и, главнымъ образомъ, вопросы классификаціи, т.-е. уже чисто-научные и притомъ чрезвычайно сложные.

Не соглашаясь, такимъ образомъ, съ первымъ предложеніемъ автора, не могу согласиться и съ четвертымъ, и съ пятымъ: сократить объемъ понятія nomen praeoccupatum, и предоставить въ предѣлахъ одного рода варьететамъ разныхъ видовъ носить одинаковыя имена, и притомъ по только что упомянутой причинѣ: тутъ опять затрагиваются вопросы классификаціи. Что такое „предѣлы одного рода“? Др. Каупъ, В. Л. Біанки и мн. др. стремятся создавать особый родъ почти для каждаго вида—Зибомъ, др. Э. Хартертъ и мн. др. объединяютъ въ одинъ родъ турухтана съ мородункой и щеголемъ, грязовика съ чернозобикомъ, остро-

---

болѣе сотни родовыхъ, видовыхъ и подвидовыхъ именъ этихъ птицъ. Въ этой области, кажется, сотоварищи по работѣ признаютъ меня до нѣкоторой степени спеціалистомъ. Но вотъ безъ всякаго дурного умысла мнѣ случилось довольно давно уже и не въ научномъ, хотя спеціальномъ изданіи („Псовая и Ружейная Охота“, X годъ, № 11, отъ 20 апрѣля 1904 г.) опубликовать имя Bison bonasus caucasicus nov. subsp., раньше употреблявшееся лишь какъ nomen nudum, съ краткимъ, но все-таки діагнозомъ. Положимъ, всѣмъ, и мнѣ въ томъ числѣ, ясно, что я не спеціалистъ по Mammalia. Но если въ будущемъ я занялся бы ими и, скажемъ для примѣра, опубликовалъ бы систематическую работу именно по семейству быковъ, то вопросъ, очевидно усложнился бы, если ставить его на точку зрѣнія разбираемаго положенія о давности. *Авт.*

крылыхъ дятловъ (Yungipicus) съ большими пестрыми и со средними, почти всѣхъ мухоловокъ, всѣхъ соловьевъ съ варакушками, всѣхъ завирушекъ. Поэтому вопросъ, было ли данное тождественное названіе употреблено въ предѣлахъ той же группы или нѣтъ—окажется нерѣдко неразрѣшимымъ сколько-нибудь согласно и вообще разрѣшается не по чисто внѣшнимъ объективнымъ признакамъ, но на основаніи выводовъ классификаціи. Точно также, несмотря на превосходный трудъ А. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго до сихъ поръ нѣтъ общепринятаго твердаго критерія для отличенія вида отъ подвида, слѣдовательно это опять есть поприще для споровъ, перемѣнъ, субъективныхъ сужденій, новыхъ данныхъ для переобсужденій и т. д. Словомъ, считать каждую данную форму самостоятельнымъ видомъ или же только подвидомъ—есть вопросъ научный, а номенклатура, какъ вопросъ чисто практическій, должна опираться на совершенно внѣшніе, объективные факты, какъ это и устанавливаетъ международный кодексъ номенклатуры.

Зато нельзя не присоединиться всецѣло къ предложенію шестому, о созданіи особой номенклатурной коммиссіи. Если за послѣдніе годы въ сѣверо-американскихъ орнитологическихъ публикаціяхъ замѣчается почти полное единство номенклатуры, то это именно благодаря тому, что тамъ послѣдовательное примѣненіе началъ пріоритета находится въ рукахъ особой постоянной коммиссіи Американскаго Орнитологическаго Союза, время отъ времени выпускающей въ свѣтъ свои превосходные списки мѣстной орнитофауны (Check-Lists). Пора выполнить эту работу и для Палеарктики.

Наконецъ, коснусь того соображенія автора (предполагая, что оно высказано серьезно), что если даже принципъ пріоритета со временемъ приведетъ къ совершенно однообразной номенклатурѣ—это все-таки будетъ вредно, такъ какъ Дарвинъ, Уоллесъ—пользовались иной номенклатурой. Вѣдь никто изъ насъ не причисляетъ теперь турача къ роду тетеревовъ и не считаетъ куличка-лопатня—маленькой колпицей, какъ считалъ его Линней. Это не мѣшаетъ намъ и теперь съ интересомъ читать путешествія Гассельквиста и работы Линнея и понимать ихъ. Сѣрошевскій въ недавнее время прямо называетъ кита—рыбой [1]), что не мѣшаетъ

[1]) „Якуты“ В. Л. Сѣрошевскаго. Т. I, СПБ., 1896, Введеніе, отдѣлъ „Фауна“, подотдѣлъ „Рыбы“, стр. 122: „О крупныхъ морскихъ рыбахъ, какъ китъ, бѣлуга, которыя изрѣдка являются у населенныхъ береговъ“... *Авт.*

намъ съ интересомъ знакомиться съ его капитальнымъ трудомъ о якутахъ. И если въ новѣйшихъ изданіяхъ „Происхожденія видовъ“ придется редактору дѣлать примѣчанія, что подъ сальпами или голотуріями Дарвинъ разумѣлъ животныхъ, теперь называемыхъ иначе—врядъ ли это хотя на волосъ кого-либо затруднитъ. Генія Дарвина никто не оспариваетъ, но были геніальные натуралисты и до него, если не производившіе такого переворота въ міровоззрѣніи современниковъ, зато больше занимавшіеся систематикой, что ближе касается вопросовъ номенклатуры. Кювье былъ великимъ натуралистомъ. Палласъ былъ великимъ натуралистомъ. И мы съ пониманіемъ и интересомъ читаемъ „Le Règne animal“ и „Zoographia Rosso-Asiatica“, несмотря на огромныя перемѣны съ тѣхъ поръ въ классификаціи и номенклатурѣ, и не требуя зафиксировать номенклатуру на 1811 или на 1817 годахъ.

Въ томъ же номерѣ (страницы 301—308) статья *С. Н. Алфераки*—„Нѣсколько соображеній по поводу понятій „родъ“ и „подродъ“ въ зоологической систематикѣ“—имѣетъ не менѣе общее значеніе. Одна частность этой статьи—нѣсколько строкъ противъ увлеченія изслѣдованіемъ строенія половыхъ органовъ для цѣлей систематики бабочекъ—вызвала уже большое возраженіе О. Іона („О «новомъ теченіи» въ Лепидоптерологіи“, тотъ же журналъ, томъ XI, № 1, стр. 71—79) и еще болѣе длинное и горячее—Н. Я. Кузнецова („По поводу нѣкоторыхъ методовъ изслѣдованія въ энтомологіи“, ib. стр. 124—137), а затѣмъ обстоятельное и безпристрастное встрѣчное возраженіе—главнымъ образомъ Н. Я. Кузнецову — А. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго („Suum Cuique“, тотъ же журналъ, томъ XII, № 1, стр. 115—129). Вся эта полемика весьма интересна, касаясь широкихъ общихъ вопросовъ систематической зоологіи, но, какъ мнѣ кажется, она ничего не даетъ какъ разъ по тому вопросу, который, повидимому, имѣлъ въ виду въ своихъ краткихъ первоначальныхъ замѣчаніяхъ самъ С. Н. Алфераки.

Такой зоологъ, какъ С. Н. Алфераки, конечно, не могъ отрицать значенія анатомическихъ изслѣдованій и, въ частности, ихъ важности для систематики. Его точка зрѣнія ясно выражена словами „совокупность признаковъ представляетъ болѣе данныхъ, чѣмъ признакъ одиночный“. Слѣдовательно онъ предостерегалъ именно лишь противъ односторонихъ увлеченій. Его оппоненты, однако, очевидно имѣя въ виду не только печатную замѣтку, но и устныя пренія въ ученыхъ собраніяхъ и обществахъ, упоминаютъ, вскользь

и съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, о „традиціонной неприкосновенности „коллекцій“ (Н. Я. Кузнецовъ, ibid., стр. 134, прим. 7-ое). Между тѣмъ это—пунктъ чрезвычайно большой важности.

Переводя этотъ послѣдній вопросъ на орнитологическую почву, скажемъ такъ. Никто никогда и не помышлялъ отрицать важность и интересъ изслѣдованій цвѣтности пера птицъ съ точки зрѣнія его структуры и химическаго состава пигментовъ и можно лишь пожалѣть, что въ направленіи этихъ изслѣдованій сдѣлано еще сравнительно очень мало. Но если кто-либо начнетъ въ зоологическомъ музеѣ вываривать въ спирту птичьи шкурки, выбирая ихъ изъ числа типовъ научныхъ описаній, оригиналовъ научныхъ работъ, или униковъ данной коллекціи, ради химическаго изученія пигментовъ, то мы вправѣ будемъ назвать такого изслѣдователя ученымъ вандаломъ, не понимающимъ основной задачи всякаго музея—хранить научные документы для грядущихъ поколѣній, а не истреблять ихъ. Для химическихъ же, анатомическихъ и иныхъ изслѣдованій должны служить соотвѣтствующія лабораторіи, снабжаемыя спеціально для того собираемыми матеріалами, или передаваемыми изъ музеевъ абсолютными дублетами. Слѣдовательно, „традиціонная неприкосновенность коллекцій“ есть основной постулатъ самаго понятія „музей“, и во избѣжаніе ошибокъ, недоразумѣній и нареканій лучше всего было бы совершенно не допускать въ одномъ учрежденіи смѣшенія задачъ музейскихъ и лабораторныхъ.

Относительно главной темы статьи С. Н. Алфераки—недопустимость категоріи „подродъ“—не буду здѣсь распространяться, надѣясь поговорить въ другомъ мѣстѣ.

(Продолженіе слѣдуетъ.—To be continued.)

Хроника.—Chronik.

Международный Сельскохозяйственный Институтъ созываетъ въ маѣ сего года четвертое очередное Общее Собраніе представителей странъ. Въ программу занятій сессіи включенъ между прочимъ и вопросъ (2) о защитѣ птицъ. Докладчикъ *E. de Miklòs de Miklòsvar* (делегатъ Венгріи въ постоянномъ комитетѣ) сообщитъ о результатахъ анкеты о мѣрахъ, принятыхъ правительствами участвующихъ въ Институтѣ странъ. Открытіе Общаго Собранія предположено на 6-ое мая (нов. ст.).

* * *

Въ 1-омъ засѣданіи „Русскаго Орнитологическаго Комитета“, состоявшемся 7-го февраля сего года, *Г. П. Полякова* былъ избранъ Товарищемъ Предсѣдателя Комитета.

* * *

Награды, присужденныя нашимъ сотрудникамъ.—Въ минувшемъ (1912) году *К. А. Сатунинымъ* за труды получены: золотая медаль отъ Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній, премія К. П. Ренара отъ Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы и премія академика К. М. Бэра отъ Императорской Академіи Наукъ.—Въ январѣ сего года Императорское Русское Географическое Общество присудило *С. А. Бутурлину* золотую медаль имени П. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго.

* * *

Въ годичномъ засѣданіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній, состоявшемся 3-го февраля сего года, *Г. П. Полякову* присуждена премія великаго князя Сергѣя Александровича за работу „Къ орнитологической фаунѣ Московской губерніи“.

Изданія, присланныя въ редакцію.

Éditions parvenus à la rédaction.

Варшавскія Университетскія Извѣстія, кн. II, 1913 г.

„Природа“, журналъ Николаевскаго Общества Любителей Природы, № 5—6 за 1912 г. (*Б. Токарскій.* „О перелетѣ вальдшнеповъ“) и № 1 за 1913 г.

Ученыя записки Императорскаго Казанскаго Университета, кн. I, II и III за 1913 г.

Professor Dr. **J. Thienemann: „Herrenlose Vogelringe“.**

Professor Dr. **J. Thienemann: „XI. Jahresbericht (1911) der Vogelwarte Rossitten** der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft“. (Vergl. Journ. f. Orn. 1912, S. 429 u. ff.).

Д. Соболевъ и **Н. Соболевъ: „О ледниковыхъ отложеніяхъ въ окрестностяхъ г. Вильны“.** 1912 г.

Отчетъ о дѣятельности **Костромского научнаго общества** по изученію мѣстнаго края **за 1912 г.**

Протоколы Общества Испытателей Природы при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ. Вып. 1—1912 г.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, № 11—12, 1912.

Отчетъ о научно-образовательной **экскурсіи въ Барабинскую степь**, совершенной весною **1909 г.** членами Студенческаго О-ва Любителей Естествознанія при Томскомъ Университетѣ. 1912 г.

Полковникъ **І. И. Соломко: „Практическія указанія для коллектированія птицъ** и **инструкція для приготовленія ихъ шкурокъ.** Изданіе Виленскаго Общества Любителей Естествознанія. 1911 г.

Записки Виленскаго Общества Любителей Естествознанія. Вып. I, 1910 г.

„Der Ornithologische Beobachter“, Heft. 5 und 6, 1913.

Отчетъ за 1911 годъ Общества изученія Амурскаго края (Филіальное отдѣленіе Приамурскаго отдѣла Императорскаго Географическаго Общества).

С. К. Линда: „О фосфоритахъ Сѣверо-Западнаго края“. Изданіе Сѣверо-Западнаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 1911 г.

Н. Н. Соболевъ: „Къ геологіи Сѣверо-Западнаго края Россіи.“ Изданіе Виленскаго Общества Любителей Естествознанія.

Д. Филатовъ: „О кавказскомъ зубрѣ“. Записки Императорской Академіи Наукъ. По физико-математическому отдѣленію. Т. XXX, № 8, 1912 г.

Записки Императорскаго Харьковскаго Университета. Кн. 4, 1912 г.

Р. К. Пённеттъ: „Менделизмъ“. Подъ редакціей прив.-доц. Московскаго Университета В. С. Елпатьевскаго: Изд. „Bios“. 1913 г.

Л. Донкастеръ: „Наслѣдственность въ свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій“. Подъ редакціей прив.-доц. Московскаго Университета В. С. Елпатьевскаго. Изд. „Bios“. 1913 г.

„Ежегодникъ по геологіи и минералогіи Россіи“, т. XIII, вып. 1—2, 3—4, 5—6 и 7 за 1911 г.; т. XIV, вып. 1, 2, 3, 4—5, 6 и 7—8 за 1912 г.

„Школьныя Экскурсіи и Школьный Музей“, январь 1913 г.

К. В. Лауницъ: „Матеріалы для орнитофауны Черноморскаго побережья Кавказа“. Отд. оттискъ изъ вып. 3—4 журнала „Птицевѣдѣніе и Птицеводство за 1912 г.

Ѳ. С. Щербаковъ: „По поводу 20-лѣтія дѣятельности С. А. Мокржецкаго“. Отд. оттискъ изъ „Русскаго Энтомологическаго Обозрѣнія“, № 3 за 1912 г.

Ѳ. С. Щербаковъ: „Списокъ уховертокъ (Dermatoptera) Крыма“. Отд. оттискъ изъ „Записокъ“ Крымскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Природы, т. II, 1912 г.

Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, 1912 годъ. Т. XLIII, 3. Отдѣленіе Ботаники, № 2; выпускъ 1-ый, Протоколы засѣданій, № 4.

Бюллетени Харьковскаго Общества Любителей Природы, № 1, 1913 г.

Труды Саратовскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Естествознанія, т. VI, вып. 3, Работы Волжской Біологической Станціи, т. IV, № 2, и № 3.

А. Н. Карамзинъ: „Климатъ Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи“. 1912 г., Самара. Самарское Губернское Земство.

Вышелъ изъ печати 4 мая (ст. ст.) 1913 г.—Ausgegeben am 4 mai, (a. St.) 1913

Редакторъ-издатель: **Г. И. Поляковъ.** Herausgeber: **G. I. Poljakow.**

Тип. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Москва.

„Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1913 годъ.

Открыта подписка на 1913 годъ на:

ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ.

Продолжается подписка на 1913 годъ (XX годъ изданія) на журналъ, издаваемый Географическимъ Отдѣленіемъ Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи подъ редакціей проф. **Д. Н. Анучина.**

Журналъ „**ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ**“ посвященъ разработкѣ вопросовъ общаго землевѣдѣнія и страновѣдѣнія, особенно изученію Россіи. Содержаніе журнала составляется изъ оригинальныхъ изслѣдованій, очерковъ, замѣтокъ путешественниковъ, обзоровъ, историко-географическихъ и критическихъ статей, также переводныхъ статей, мелкихъ извѣстій, географической хроники, библіографіи. Въ программу журнала входятъ также вопросы о преподаваніи географіи, а въ приложеніи къ книжкамъ журнала помѣщаются отдѣльныя оригинальныя и переводныя общедоступныя сочиненія—по вопросамъ землевѣдѣнія и страновѣдѣнія, путешествіямъ и по соприкасающимся съ географіей областямъ знанія.

„**Землевѣдѣніе**“ выходитъ 4-мя книжками въ годъ, размѣромъ около 10—12 печатныхъ листовъ, съ приложеніемъ картъ, фототипій и рисунковъ въ текстѣ. Цѣна **ШЕСТЬ** рублей въ годъ съ доставкой и пересылкой. Гг. иногородніе благоволятъ обращаться по адресу: **Москва, Географическое Отдѣленіе О. Л. Е., Политехническій музей.**

Полная серія „ЗЕМЛЕВѢДѢНІЯ“, за 19 лѣтъ (1894—1912), безъ 1-й книжки 1894 г., можетъ быть пріобрѣтаема за **95** р., съ подпиской на 1913 г.—за **100** р., а съ 1-й книжкой 1894 г.—за **120** р.

Отдѣльныя изданія Географическаго Отдѣленія: *Ф. Нансенъ.* Среди льдовъ и во мракѣ полярной ночи. Перев. А. А. Крубера, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. Ц. 4 р. *Г. Н. Потанинъ.* Восточные мотивы въ средневѣковомъ европейск. эпосѣ. Ц. 2 р. *З. Гюнтеръ.* Исторія географическихъ открытій и успѣхи научнаго землевѣдѣнія въ XIX в. Переводъ Л. Д. Синицкаго, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. Ц. 1 р. *Гуго Гротъ.* По Европейской и Азіатской Турціи. Пер. подъ ред. С. Г. Григорьева. Ц. 1 р. *Геттнеръ.* Европейская Россія. Антропогеогр. этюдъ. Съ 21 карт. въ текстѣ. Пер. Л. Д. Синицкаго. М. 1907 г. Ц. 1 р. *Д. Анучинъ.* Японія и японцы. Съ 30 рис. и карт. 1907 г. Ц. 50 к. *Проф. А. Филиппсонъ.* Средиземье (Область Средиземнаго моря). Съ таблицами (ландшафтами) и картами. Пер. П. А. Бѣльскаго, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. М. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.

Складъ послѣдняго изданія: Т-во Кушнеревъ и К⁰, Москва, Пименовская ул., свой домъ.

ПРИРОДА.

Открыта подписка на 1913 г. (2-й годъ изданія) на ежемѣсячный популярный естественно-историческій съ иллюстраціями въ текстѣ журналъ для самообразованія. Подъ редакціей проф. *В. А. Вагнера* (Свб.), проф. *Л. В. Писаржевскаго* (Спб.) и препод. В. Ж. К. *Л. А. Тарасевича* (Москва).

Содержаніе: Философія естествознанія. Астрономія. Физика. Химія. Геологія съ палеонтологіей. Минералогія. Общая біологія. Зоологія. Ботаника. Человѣкъ и его мѣсто въ природѣ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Проф. С. В. Аверинцевъ, В. Агафоновъ, проф. П. И. Андрусовъ, проф. В. М. Арнольди, лаб. Г. Ф. Арнольдъ, проф. П. А. Артемьевъ, проф. И. И. Боргманъ, проф. П. И. Бахметьевъ (София), А. Н. Бахъ (Женева), прив.-доц. А. П. Бачинскій, докт. геогр. Л. С. Бергъ, астр. С. П. Блажко, прив.-доц. В. А. Бородовскій, П. А. Бѣльскій, проф. В. А. Вагнеръ, проф. Ю. Н. Вагнеръ, акад. проф. П. П. Вальденъ, проф. Б. Ф. Верюго, акад. проф. В. П. Вернадскій, лаб. В. Н. Верховскій, проф. Г. В. Вульфъ, М. И. Гольцмитъ (Парижъ), проф. А. Г. Гурвичъ, проф. В. Я. Данилевскій, д-ръ П. П. Діатроптовъ, проф. А. С. Догель, В. А. Дубянскій, Е. А. Елачичъ, проф. В. В. Завьяловъ, проф. В. Р. Заленскій, проф. А. А. Ивановъ, проф. В. П. Ипатьевъ, лаб. П. В. Казанецкій, проф. А. В. Клоссовскій, проф. П. К. Кольцовъ, прив. Инж. уч. Т. П. Кравецъ, проф. А. П. Красновъ, проф. Н. П. Кузнецовъ, проф. П. М. Кулагинъ, прив.-доц. П. В. Култашевъ, проф. Н. С. Курпаковъ, проф. П. П. Лазаревъ, прив.-доц. М. Ю. Лахтинъ, П. П. Лебеденко, лабор. Г. А. Левитскій, І. Д. Лукашевичъ, д-ръ Е. И. Марциновскій, проф. А. К. Медвѣдевъ, проф. М. А. Мензбиръ, проф. П. Г. Меликовъ, проф. С. П. Метальниковъ, Н. А. Морозовъ, проф. Г. Морозовъ, прив.-доц. А. В. Немиловъ, проф. А. В. Нечаевъ, проф. А. М. Никольскій, докт. зоол. М. М. Новиковъ, лаб. А. Г. Огородниковъ, В. Л. Омелянскій, проф. А. В. Павловъ, проф. Л. В. Писаржевскій, проф. В. В. Подвысоцкій, проф. К. Д. Покровскій, Б. Е. Райковъ, А. А. Рихтеръ, А. Рождественскій (Лондонъ), Н. А. Рубакинъ, проф. Д. П. Рузскій, Я. В. Самойловъ, проф. А. В. Савожниковъ, Ю. Ф. Семеновъ, Л. Д. Синицкій, асс. по каѳ. физ. геогр. С. А. Совѣтовъ, препод. С. П. Созоновъ, лаб. Н. Н. Соковнинъ, проф. А. П. Сѣверцевъ, проф. С. М. Танатаръ, д-ръ Л. А. Тарассевичъ, маг. хим. А. А. Титовъ, астрономъ Пулк. обсерв. Г. А. Тиховъ, проф. М. М. Тихвинскій, проф. В. Е. Тищенко, проф. П. А. Умовъ, прив.-доц. А. Е. Ферсманъ, проф. О. Д. Хвольсонъ, прив. А. А. Черновъ, проф. Л. А. Чугаевъ, А. П. Чураковъ, прив.-доц. В. В. Шипчинскій, пр.-доц. П. Ю. Шмидтъ, проф. Е. А. Шульцъ, д-ръ С. М. Щастный, проф. А. П. Щукаревъ, прив.-доц. А. И. Ющенко, прив. А. П. Яницкій, проф. А. П. Ярошкій.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: цѣна въ годъ (съ доставкой и пересылкой) — 5 руб.; на ½ года—3 руб., на три мѣсяца—1 руб. 50 коп., за границу на годъ—7 руб. **Допускается разсрочка:** 3 руб. при подпискѣ и 2 руб. не позже 1 мая.

Подписка на ½ года, 3 мѣсяца и въ разсрочку принимается только въ главной конторѣ (Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11).

Объявленія печатаются въ журналѣ по слѣдующей цѣнѣ: на обложкѣ: 4-я стр.—100 р., ½ стр.—60 р., ¼ стр.—35 р.; 2-я и 3-я стр.—75 р., ½ стр.—40 р., ¼ стр.—25 р.; послѣ текста: стр.—60 р., ½ стр.—35 р., ¼ стр.—20 р.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА: Въ конторѣ журнала „Природа“ (Москва), во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отдѣленіяхъ.

Адресъ главной конторы и редакціи: Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11. Телефонъ № 4-10-81.

БИБЛІОТЕКА-ПРИРОДА (естественно-историческая). Открыта подписка на 1913 годъ.

Ежемѣсячный журналъ, подъ ред. проф. **Л. В. Писаржевскаго.** При ближайшемъ участіи сотрудниковъ журнала „Природа“.

За годъ подписчикамъ будетъ дано 12 книгъ (объемомъ свыше 1200 страницъ обычнаго книжнаго формата), посвященныхъ отдѣльнымъ наиболѣе интереснымъ вопросамъ естествознанія. „Библіотека-Природа“ ставитъ своею задачей популярное изложеніе въ болѣе глубокой и расширенной формѣ тѣхъ естественно-историческихъ вопросовъ, которые разсматриваются въ обычныхъ журнальныхъ статьяхъ лишь въ общихъ чертахъ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА (съ доставкой и пересылкой): за годъ—4 р. ½ года—2 р. 40 к.; 3 мѣс.—1 р. 20 к.; за границу годъ—6 р.

Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подпискѣ и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Основныя начала естествознанія.

Популярная библіотека для самообразованія. Открыта подписка на 1913 годъ. Ежемѣсячный журналъ, подъ ред. проф. **Л. В. Писаржевскаго.** При ближайшемъ участіи сотрудниковъ журнала „Природа“.

Библіотека **„Основныя начала естествознанія“** предназначается для лицъ, не получившихъ систематическихъ естественно-историческихъ знаній и желающихъ пополнить этотъ пробѣлъ самообразованіемъ. Въ 1913 году всѣ 12 книгъ библіотеки (свыше 1200 страницъ обычнаго книжнаго формата) будутъ посвящены популярному изложенію основъ наиболѣе важныхъ отдѣловъ естествознанія.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА (съ доставкой и пересылкой): за годъ—4 р.; $^1/_2$ года—2 р. 40 к.; 3 мѣс.—1 р. 20 к.; за границу—6 р.

Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подпискѣ и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Подписка принимается въ конторѣ журнала „Природа“, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отдѣленіяхъ.

Подписка на $^1/_2$ года, 3 мѣсяца и въ разсрочку принимается исключительно главной конторой (**Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11**).

Естествознаніе и Географія.

Открыта подписка на ежемѣсячный научно-популярный и педагогическій журналъ. (Годъ XVIII.) Выходитъ ежемѣсячно, за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (іюня—іюля), книжками въ 5—6 печатныхъ листовъ.

Журналъ **ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія** для фундаментальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній и для учительскихъ библіотекъ учительскихъ институтовъ и семинарій и городскихъ училищъ; **Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ ОДОБРЕНЪ** за всѣ годы существованія и допущенъ на будущее время въ библіотеки подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеній; **Ученымъ Комитетомъ Министерства Торговли и Промышленности РЕКОМЕНДОВАНЪ** въ библіотеки коммерческихъ учебныхъ заведеній.

Журналъ ставитъ себѣ задачей удовлетворять научному интересу читателей въ области естествознанія и географіи, а также способствовать правильной постановкѣ и разработкѣ вопросовъ по преподаванію естествознанія и географіи. Въ журналѣ имѣются отдѣлы: 1) научно-популярныя статьи по всѣмъ отраслямъ естествознанія и географіи, статьи по вопросамъ преподаванія естествознанія теоретическаго и прикладного (садоводство, пчеловодство и т. п.) и географіи; 2) аквaріумъ и террaріумъ; 3) библіографія (обзоръ русской и иностранной литературы по естествознанію и географіи); 4) хроника; 5) смѣсь; 6) вопросы и отвѣты по предметамъ программы.

Въ журналѣ были помѣщены статьи: П. Я. Акинфіева, А. П. Артари, проф. П. И. Бахметьева, В. Н. Болдырева, Л. И. Бородовскаго, проф. А. Ѳ. Брандта, В. В. Богданова, проф. В. А. Вагнера, П. Вольногорскаго, П. Н. Вакуловскаго, проф. С. П. Глазенапа, М. П. Голенкина, В. П. Граціанова, проф. А. С. Догеля, М. П. Демкова, Л. Н. Елагина, Е. В. Жадовскаго, Б. М. Житкова, В. Р. Залѣскаго, проф. Н. Ю. Зографа, Н. О. Золотницкаго, А. П. Иванова, проф. П. Ѳ. Кащенко, И. М. Кипіонича, проф. П. П. Кузнецова, проф. П. А. Каблукова, В. В. Кистяковскаго, проф. Н. М. Кулагина, проф. А. Коженникова, М. А. Кожевниковой, проф. А. П. Краснова, А. Ф. Лайстера, М. Э. Мендельсона, С. П. Меча, проф. П. В. Насонова, Г. А. Надсона, проф. А. М. Никольскаго, К. Д. Носилова, проф. А. П. Павлова, А. П. Рождественскаго, проф. В. В. Сапожникова, К. А. Сатунина, проф. К. К. Сентъ-Илера, М. М. Сіязова, В. П. Таліева, проф. К. А. Тимирязева, проф. А. А. Тихомирова, П. Р. Фрейберга, проф. Н. А. Холодковскаго, проф. В. М. Шимкевича, П. Ю. Шмидта, проф. Я. П. Щелкановцева, проф. А. Эйхенвальда, Э. В. Эриксона и нѣкоторыхъ друг.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 руб. 50 коп., на полгода съ пересылкою и доставкою 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цѣну можно получать журналъ за 1903—1910 гг.; за остальные годы (1896—1902) по 4 руб. за каждый годъ съ пересылкою. Выписывающіе всю серію за первыя 10 лѣтъ платятъ 35 руб. съ перес. Книжки журнала въ отдѣльной продажѣ стоятъ 75 коп. каждая.

Книжные магазины, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и пересылку денегъ только 20 коп. съ каждаго годового полнаго экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается.

При непосредственномъ обращеніи въ контору допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб. 50 коп. и къ 1 іюня 2 руб. Другихъ условій разсрочки не допускается.

Контора редакціи: Москва, Донская ул., д. Даниловой, кв. № 3.

Редакторъ-издатель **М. П. Варавва.**

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ

Императорскаго Казанскаго Университета. Открыта подписка на 1913 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ заключаются: I. Отдѣлъ наукъ. II. Отдѣлъ критики и библіографіи. III. Университетская лѣтопись. IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей, памятники историческіе и литературные, съ научными комментаріями, и памятники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями съ пересылкою **7** руб.

Подписка принимается въ Правленіи Университета.

Редакторъ **А. Піонтковскій.**

Извѣстія Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера.

Открыта подписка на 1913 годъ на двухнедѣльный журналъ. Годъ изданія пятый. (Журналъ жизни сѣвернаго края.) Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца. Задачи и цѣли общества опредѣляютъ и задачи „Извѣстій“.

Программа журнала: Узаконенія. Распоряженія и постановленія правительственныхъ и общественныхъ учрежденій центральныхъ и мѣстныхъ, имѣющія отношенія къ жизни Сѣвера. Текущая дѣятельность Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера. Отдѣльныя статьи и доклады по изученію Сѣвера и выясненію условій его развитія. Обсужденіе предположеній, направленныхъ къ измѣненію условій жизни и производительности Сѣвера. Хроника частной, правительственной, общественной иниціативы въ дѣлѣ изученія Сѣвера, развитія его производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя замѣтки и сообщенія о жизни края и ея изученіи. Очерки жизни. Сообщенія изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами Сѣвера. Обзоръ литературы о Сѣверѣ. Справочный отдѣлъ. Консультація по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества (отвѣты редакціи). Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: для членовъ Архангельскаго Общества для изученія Русскаго Сѣвера **3** руб. въ годъ; для прочихъ подписчиковъ **4** руб.

Допускается разсрочка по полугодіямъ и по четвертямъ года, при взносѣ денегъ впередъ.

Плата за объявленія на первой страницѣ журнала—20 коп. за строку петита, на послѣдней—10 коп.

Подписка на „Извѣстія А. О. И. Р. С.“ принимается во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Имперіи безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ.

Въ Архангельскѣ подписка и объявленія принимаются: въ Библіотекѣ Общества въ зданіи Городской Думы, въ Городской Публичной библіотекѣ, въ магазинѣ Об-ва Потребителей и въ книжныхъ магазинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ.

Гг. иногородніе публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по адресу: Архангельскъ, Правленіе Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера.

Рукописи слѣдуетъ направлять по адресу редакціи. Статьи и корреспонденціи оплачиваются по усмотрѣнію редакціи.

Пробные №№ высылаются за 4 семиков. марки. За перемѣну адреса взимается 4 семиков. марки.

Издатель **Архангельское Общество изученія Русскаго Сѣвера.**

Редакторъ **В. Ленгауэръ.**

ЕЖЕГОДНИКЪ

по Геологіи и Минералогіи Россіи.

Программа: I. Оригинальныя статьи и замѣтки. II. Систематическіе указатели литературы. III. Систематическіе обзоры литературы. IV. Рефераты. V. Извѣстія объ экспедиціяхъ, экскурсіяхъ и пр. VI. Личныя извѣстія. VII. Разныя извѣстія. VIII. Музеи и коллекціи.

Въ программу журнала входятъ: 1) Минералогія и Кристаллографія, 2) Петрографія, 3) Палеонтологія, 4) Гео-ботаника, 5) Гео-зоологія, 6) Физическая Геологія, 7) Гидрологія, 8) Историческая Геологія, 9) Доисторическая Археологія (камен. вѣкъ), 10) Прикладная Геологія, Горное Дѣло, полезныя ископаемыя, 11) Почвовѣдѣніе, 12) Техника изслѣдованій, 13) Популяризація и учебныя пособія, 14) Біографіи и некрологи и 15) Библіографія.

„Ежегодникъ“ печатается на русскомъ и параллельно на французскомъ или нѣмецкомъ языкахъ.

Выходитъ ежемѣсячно, исключая двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (10 выпусковъ въ годъ, каждый выпускъ объемомъ въ пять печатныхъ листовъ).

Редакціонный годъ съ 1 апрѣля по 1 апрѣля.

Подписная цѣна за годъ съ пересылкой—6 рублей въ Россіи, за границу—15 марокъ = 20 франковъ.

Подписка принимается въ Редакціи (г. Ново-Александрія, Люблинской губ.) и въ книжныхъ магазинахъ: Эггерса, Суворина, Риккера, Карбасникова, Оглоблина, Іогансона и во всѣхъ др.

Плата за объявленія—на всѣхъ европейскихъ языкахъ—за одинъ разъ: за страницу (in 4^0) 40 рублей, за $^1/_2$ страницы 20 рублей, за $^1/_4$ страницы 10 рублей, за $^1/_8$ стр. 5 рублей.

Редакторъ-издатель **Н. І. Криштафовичъ.**

Открыта подписка на 1913 годъ на богато иллюстрированный журналъ охоты и рыболовства.

VI-й годъ. **„Семья Охотниковъ“** VI-й годъ.

Выходитъ два раза въ мѣсяцъ.

24 №№ 4 р. 50 к. Допускается подписка по четвертямъ года и по полугодіямъ (1 руб. 25 коп. и 2 р. 50 коп.).

Въ журналѣ принимаютъ участіе лучшія силы Охотничьей Литературы.

Программа журнала: Охота. Важнѣйшіе законы и распоряженія правительства, касающіеся охоты. — Изящная беллетристика. — Воспоминанія о былыхъ охотахъ.— Описаніе различныхъ способовъ охотъ.—Спеціальныя статьи по ружейной техникѣ (новѣйшія изобрѣтенія въ области ружейной техники), орнитологіи, дичеразведенію, собаководству. — Обзоръ выставокъ, полевыхъ испытаній, садокъ. — Обзоръ охотничьихъ журналовъ.—Сообщенія изъ жизни охотничьихъ Обществъ и Кружковъ.— Охотничья хроника.—Корреспонденціи.—Отвѣты на вопросы читателей.

Рыболовство. Законы и распоряженія правительства, касающіеся рыболовства.— Беллетристика.—Наши прѣсноводныя рыбы: ихъ описаніе и способы ловли (съ рис.).— Спортивное уженье.—Сборка снастей: удилища, крючки, лески и т. д. (съ рис.).— Приманки и прикормки.—Полезные совѣты и указанія. — Новѣйшія изобрѣтенія въ области рыболовной техники.

Практическія статьи по сел.-хоз. и любительскому рыбоводству.— Искусственное разведеніе рыбы въ прудахъ.—Акклиматизація рыбъ, ихъ болѣзни и лѣченіе. — Новости по рыбоводству.—Корреспонденціи.

Ветеринарнымъ отдѣломъ завѣдуютъ: П. М. Иловайскій (Ветеринарный врачъ Моск. О-ва Охоты имени Императ. Александра II) и Я. А. Тоболкинъ (Ветеринарный врачъ Императорскаго О-ва правильной Охоты).

Отдѣломъ рыболовства завѣдуетъ П. И. Комаровъ.

Подписчики журнала получатъ безплатную Премію „Лѣчебникъ собакъ“, составл. Ветерин. врач. Московск. О-ва Охоты имени Импер. Александра II—П. М. Иловайскимъ. Книга будетъ разсыл. при журн., начиная съ 3-го №, по 1 печатному листу въ 16 страницъ.

Лица, внесшія деньги частями, получатъ указанную премію при послѣднемъ взносѣ.

Подписка принимается въ редакціи: Москва, Сокольники, Камеръ-Колежскій валъ, домъ 4, кв. 6 (временный адресъ), въ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина (Негли нный пр.) и П. П. Карбасникова (Мохов ая), въ магазинѣ рыболовныхъ принадлежностей Т-го Дома „С. А. Малиновскій“ (Рождественка) и во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи.

Редакторъ-Издатель **Влад. Сатинскій.**

Открыта подписка на 1913 годъ

НА ЖУРНАЛЪ

„ПТИЦЕВѢДѢНІЕ и ПТИЦЕВОДСТВО“.

(IV-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Органъ Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній.

Издаваемый при ближайшемъ участіи: В. К. Анфилова, С. А. Бутурлина, Г. С. Деревянко, В. Ч. Дорогостайскаго, В. Г. Дурова, П. Н. Елагина, П. Е. Ефимова, Б. М. Житкова, М. Т. Зароченцева, проф. Д. Н. Кайгородова, А. М. Кириллова, проф. Н. М. Кулагина, К. В. Лауницъ, бар. Г. В. Лоудонъ, Н. А. Мосолова, А. П. Ноневича, І. К. Пачоскаго, Ѳ. П. Половинкина, Г. И. Полякова, проф. М. И. Придорогина, П. А. Сатунина, Е. П. Свѣшникова, проф. И. И. Тарнани, кн. С. Н. Урусова, А. С. Хомякова, С. Ф. Фонъ-Штейна, М. В. Эпова и др. лицъ.

Журналъ посвященъ изученію птицъ вообще и русской орнитологіи по преимуществу, а равно домашнему и промысловому птицеводству Россіи.

Орнитологія: научная, экономическая, охотничья, промысловая, прирученныхъ и домашнихъ птицъ, физіологическая, патологическая, статистическая.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

Спеціальныя статьи по указаннымъ отдѣламъ орнитологіи. Обзоръ по орнитологіи русскихъ учрежденій. Орнитологическая библіографія. Смѣсь. Personalia. Вопросы и отвѣты.

Подписная цѣна:

На годъ **4** руб., на полгода **2** руб., отдѣльный номеръ **1** руб.

Выходитъ 4 раза въ годъ: два номера до лѣта и два номера послѣ лѣта.

Срокъ подписки съ 1-го января 1913 года.

Подписка принимается въ редакціи журнала: **Москва, Мясницкая, д. Липгартъ, реальное училище Воскресенскаго**, редакторомъ **Д. М. Россинскимъ.**

Плата за объявленія:

1 страница передъ текстомъ 25 руб., позади текста 15 руб.
½ „ „ „ 13 „ „ „ 8 „
¼ „ „ „ 8 „ „ „ 5 „

Редакторъ Предсѣдатель Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи *Д. М. Россинскій.*

Издатель Отдѣленіе Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи.

Der Ornithologische Beobachter.

Monatsberichte für Vogelkunde und Vogelschutz.

Offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz.

Einzige rein ornithologische Fachschrift in der Schweiz. Enthält einen deutschen und einen französischen Teil.

Preis Frs. 5,—jährlich.

Probehefte kostenfrei.—Bestellungen an die Expedition:

Buchdruckerei R. G. Zbinden, Rheinsprung 5, Basel (Schweiz).

ORNITHOLOGISCHES JAHRBUCH.

Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Herausgegeben

von

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.

XXIII Jahrgang.

Das „**Ornithologische Jahrbuch**“ bezweckt ausschliesslich die Pflege der palaearktischen Ornithologie und erscheint in 6 bez. 3 Doppelheften Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von Tafeln erfolgt nach Bedarf. — Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt bei direktem Bezuge für das Inland **10 Kronen**, für das **Ausland 10 Mk. (= 11.75 K) = 12.50 Frks. = 10 sh. = 4.50 Rbl. pränumerando**, im Buchhandel **12 Kronen = 12 Mark.** Volks- u. Mittelschulen erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von **6 Kronen** bez. **6 Mk.** (nur direkt). Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Raume auf dem Umschlage Aufnahme. Beilagen- und Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung. **Probehefte** nur gegen **Rücksendung.**

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften zur Besprechung Abonnements, Annonzen und Beilagen bitten wir **an den Herausgeber**, Villa Tännenhof bei Hallein, Salzburg, zu adressieren.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, einziges seit 21 Jahren erscheinendes Fachorgan, herausgegeben von **Vilhelm Rüdiger, Hochzeit i. d. Neumark.** Der Abonnementspreis beträgt für das Jahr bei direkter Zusendung 5 Mk., nach den Ländern des Weltpostvereines 7 Frcs. pränumerando. Die Zeitschrift bringt aus Fachkreisen belehrende und einschlägige Artikel, Brut- und Sammeluotizen, Merkmale schwer zu unterscheidender Eier, Literatur, sowie eine grosse Anzahl Kauf- Verkaufs- und Tausch- Anzeigen.—Probenummern werden auf Wunsch frei zugesendet.

Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift. Im Auftrage der Dänischen ornithologischen Verein herausgegeben von O. Helms. Jährlich erscheint 4 Heften (je 3—4 Bagen), reich illustriert. **Preis des Jahrganges 4 Krone dansk (ca. 2 Rbl.).** Alle für die Redaction bestimmten Zusendungen sind an den Redactör, **O. Helms**, Pejrup, Danemark erbeten.

Памятка экстерна и учащагося.

(Гдѣ и какъ готовиться къ какому-нибудь экзамену?)

С. С. Рѣшетникова, при сотрудничествѣ проф. **К. Ѳ. Жакова** и др.

Цѣна 25 коп., съ пересылкой **50** коп. Можно 3 коп. марками. Наложеннымъ платежомъ не высылается.

Необходимое пособіе для всѣхъ, занимающихся **самообразованіемъ**, для экстерновъ, учащихся, ихъ родителей и учителей.

Брошюра-проспектъ высылается за 10 однокопеечныхъ марокъ.

Смѣлое, Полтавской губ., 139, С. С. Рѣшетникову.—Запишите.

РЫБОЛОВЪ и ОХОТНИКЪ.

Двухнедѣльный иллюстрированный журналъ охоты, рыболовства и рыбоводства. (Годъ изданія V-й.)

Въ 1913 году гг. подписчики получатъ: 24 №№ журнала „Рыболовъ-Охотникъ“, посвященнаго рыболовству и рыбоводству, и отъ 12 до 24 №№ журнала „Охотникъ“, посвященнаго охотѣ во всѣхъ видахъ и собаководству.

Программа журнала обширная: Законы по охотѣ и рыболовству.—Разсказы, стихотворенія, описанія. — Спеціальныя статьи по охотѣ и рыболовству. — Оружіе, рыболовныя снасти, приманки. — Портреты писателей-охотниковъ и рыболововъ. — Жизнь обществъ.—За границей.—Корреспонденціи.—Отвѣты на вопросы.—Смѣсь.—Карикатуры.

Репродукціи съ фотографій **С. А. Лобовикова.**

Въ журналѣ принимаютъ участіе извѣстные писатели-рыболовы и охотники: Александровъ Л. Д., Генри Бартельсъ, Бялыницкій-Бируля В., Гладковъ П. Н., Горчаконскій Ал., Диковъ В. И., Дѣдъ, Діанистъ, Евфратовъ П. Н., Комаровъ И. Н., Колмаковъ М. А., Кудряшовъ П. В., Кучинъ П. В., Петровъ П. А., Плещеевъ В. А., Плетеневъ П. Т., Сибилевъ П. В., Скрынченко П. П., баронъ П. Г. Черкасовъ, Яблонскій Н. І. и др.

Двѣ доплатныя преміи: 1) „Сборникъ статей по рыбоводству“ барона **П. Г. Черкасова** и 2) „Охотничья собака. Руководство по воспитанію, дрессировкѣ и таскѣ охотничьихъ собакъ **Л. Янсона.**

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

безъ премій: на годъ — 2 руб., $^1/_2$ года — 1 руб. 10 коп. Съ одной преміей (по выбору) на годъ — 2 руб. 50 коп., съ двумя преміями — 3 руб. Пробный № высылается за 7 коп. марку.

Адресъ редакціи: Вятка, Николаевская, д. Бермавъ.

Редакторъ-издатель **Ѳ. Куниловъ.** Издатель **А. Блювштейнъ.**

Открыта подписка на 1913 г.

— НА —

„ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ".

„Messager Ornithologique", — „Ornithologische Mitteilungen".

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Выходитъ въ годъ четыре книжки, объемомъ каждая не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ, двѣ до и двѣ послѣ лѣтняго сезона.

Журналъ имѣетъ цѣлью объединять орнитологическія работы русскихъ ученыхъ и способствовать ознакомленію любителей съ нашей орнитофауной, съ литературой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изученіемъ. Въ журналѣ имѣются слѣдующіе отдѣлы: 1) Статьи и замѣтки по систематикѣ и біологіи птицъ; 2) Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и библіографія; 4) Корреспонденція; 5) Хроника; 6) Заявленія гг. подписчиковъ о взаимномъ обмѣнѣ шкурками, гнѣздами и яйцами птицъ; 7) Вопросы и отвѣты.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: В. Г. Аверинъ, С. Н. Алфераки, В. М. Артоболевскій (предс. Кіевск. Орнит. Общ. им. К. Ѳ. Кесслера), В. Л. Біанки, С. І. Бильковичъ, Е. А. Бихнеръ, В. Н. Бостанжогло, А. А. Браунеръ, С. А. Бутурлинъ, А. М. Быковъ, Б. С. Вальхъ, М. М. Гермсъ, Г. Л. Граве, А. Г. Гржибовскій, К. М. Дерюгинъ (прив.-доц. Имп. С.-Пет. Унив.), Б. А. Домбровскій, В. С. Елпатьевскій (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Б. М. Житковъ (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. Зарудный, Г. Э. Іоганзенъ, Е. И. Исполатовъ, Д. Н. Кайгородовъ (профес. Лѣсн. Инст.), А. Н. Карамзинъ, Е. Я. Катинъ, Т. А. Кожевниковъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. Ф. Котсъ, К. В. Лауницъ, Г. В. баронъ Лоудонъ, Р. С. Магницкій, Л. А. Молчановъ, П. В. Нестеровъ, С. И. Огневъ, Бенно Отто, І. К. Пачоскій, Ѳ. Д. Плеске, Г. И. Поляковъ, Д. М. Россинскій, С. А. Рѣзцовъ, К. А. Сатунинъ, А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскій, Н. А. Смирновъ, П. Ф. Соловьевъ, В. В. Станчинскій, П. П. Сушкинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. И. Сѣницкій, Е. В. Тарасовъ, И. К. Тарнани (профес. Н. Аленс. Инст. С.-Х. и Лѣс.), А. Я. Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ, В. А. Хахловъ, Э. В. Шарлеманъ и др.

— ПОДПИСНАЯ ЦѢНА —

съ пересылкой въ Россіи и за границу: на 1 годъ — 4 руб., на ½ года — 2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб.

Полные годовые комплекты журнала за 1911 и 1912 г.г., имѣющіеся въ настоящее время въ небольшомъ числѣ, высылаются по 4 руб. за годъ.

Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка", Московск. губ., имѣніе „Саввино", Телефонъ № 7-51.

Кромѣ конторы редакціи, подписка принимается въ Москвѣ и С.-Петербургѣ въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, Карбасникова и „Новаго Времени".

Редакторъ-издатель Г. И. Поляковъ. Herausgeber G. I. Poljakow.

Тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко. Москва.
1913



№ 3

ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

QUATRIEME ANNEE

1913 г.

Отъ Редакціи.

1. Редакція не принимаетъ на себя отвѣтственности за своевременную доставку журнала, если подписка не была адресована непосредственно на ея имя.

2. При сообщеніи адреса подписчиковъ просятъ разборчиво обозначать имя, отчество, фамилію, а также губернію, уѣздъ и ближайшее почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяются Редакціей только въ тѣхъ случаяхъ, если таковыя поступаютъ отъ подписчиковъ не позже полученія ими слѣдующаго номера и съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы.

3. При заявленіи о неполученіи журнала и о перемѣнѣ адреса просятъ прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №. При заявленіи о перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4. Лицъ, обращающихся письменно въ Редакцію съ запросами, для полученія отвѣта просятъ прилагать почтовую марку. На вопросы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5. Наложеннымъ платежомъ выпуски журнала не высылаются.

6. Рукописи, посылаемыя въ Редакцію, должны быть четко написаны, обязательно за полной подписью автора и съ указаніемъ его точнаго адреса. При этомъ авторовъ просятъ писать на одной сторонѣ листа и оставлять поля. Рукописи, посылаемыя въ Редакцію, должны быть снабжены хотя бы самымъ краткимъ авторскимъ резюме на одномъ изъ западно-европейскихъ языковъ. Желательно, чтобы статьи снабжались авторами, кромѣ русскихъ названій, названіями на какомъ-либо западно-европейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя наименованія птицъ въ работахъ были подчеркнуты авторами одинъ разъ. За номенклатуру въ научныхъ статьяхъ отвѣтственность лежитъ на авторахъ.

7. Непринятыя рукописи возвращаются за счетъ авторовъ въ видѣ посылки или подъ заказной бандеролью.

8. Для библіографическихъ отзывовъ просятъ присылать по два экземпляра работъ.

1913 г. Четвертый годъ изданія.—Quatrième année. № 3.

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Орнитологическій Вѣстникъ.

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN.

Выходитъ четыре раза въ годъ: два №№ до и два—послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна: за 1 годъ—4 руб., за 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу—8 р., за 1/2 страницы—4 р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половинною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просятъ адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle): l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakow, Russie, Chemin de fer Moscou — Nijninovgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein): jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poljakow, Russland, Postabteilung. «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut. «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

1. Замѣтки по орнитологіи Туркестана. (Продолженіе). *Н. А. Зарудный.* 137
2. О птицахъ Айбугира. *Л. А. Молчановъ* 151
3. Кое-что о бѣлолобой казаркѣ (Anser albifrons Scop.). *Н. А. Смирновъ* 158
4. Бѣлый турпанъ [Oidemia fusca (Linn.)]. *В. Е. Ушаковъ* 161
5. Линька пустельги. *В. А. Хахловъ* 163
6. Краткая замѣтка о новой формѣ розоваго снѣгиря (Carpodacus rhodochlamys kotschubeii subsp. nov.). *Н. А. Зарудный* 165
7. Caudalanius erythronotus jaxartensis Buturl. *Н. А. Зарудный* . . 167
8. Къ орнитофаунѣ Закавказья. *П. В. Нестеровъ* 175
9. **Краткія сообщенія:**
   — Къ распространенію дубровника (Emberiza aureola Pall.) въ Московской губерніи. *В. А. Линдольмъ.*—Къ орнитофаунѣ Уссурійскаго края. *Г. И. Поляковъ.*—Къ вопросу о миграціяхъ саджи [Syrrhaptes paradoxus (Pall.)] *Г. И. Поляковъ* 180
10. **Орнитофенологическія наблюденія:**
    — 1) Урочище Славянка, Приморской области. *А. Медвѣдевъ.*—2) Окрестности города Смоленска. *А. Г. Гржибовскій.* — 3) Имѣніе „Милое", Смоленской губерніи. *В. А. Меландеръ.*—1) Николаевъ, Херсонской губерніи. *Б. Л. Токарь* и *Г. П. Ивановъ.*—2) Ставка Ачикулакъ, Ставропольской губерніи. *А. С. Рудневъ.*— 3) Днѣпровская біологическая станція въ Черниговской губерніи. *П. Г. Емельяненко* 182
11. **Отъ редакціи** 214

Стр.

12. **Хроника:**

— Къ изслѣдованію озера Марка-куль.—Къ изслѣдованію низовьевъ Оби и Обской губы.—Къ изслѣдованію Печеры.—Къ охранѣ природы.—Отъ постоянной Природоохранительной Коммиссіи при Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ.—Засѣданіе Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи.—Вопросъ объ охранѣ птицъ на Общемъ Собраніи Международнаго Сельскохозяйственнаго Института въ Римѣ въ 1913 году.—Выставка охраны природы.—Къ свѣдѣнію собирающихъ оологическія коллекціи.—Новыя изданія Департамента Земледѣлія . . . 215

13. **Библіографія:**

П. П. баронъ *фонъ-Винклеръ*: „Враги птицеводства“. *Ѳ. С. Щербаковъ* . 226

Циркуляръ Коммиссіи по организаціи Инструкторскихъ курсовъ птицеводства Департамента Земледѣлія 229

Изданія, присланныя въ редакцію 233

Поправки 243

Объявленія.

14. Поѣздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году. (Продолженіе). *Г. П. Поляковъ* . . . . . 189—252

SUJET. — INHALT.

P.

1. Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan. (Fortsetzung). Von *N. A. Sarudny* 137

2. Über die Vögel von Ajbugir. Von *L. A. Moltschanow* 151

3. Einiges über die Blässengans (Anser albifrons Scop.). Von *N. A. Smirnow* 158

4. Eine weisse Trauer-Ente [Oidemia fusca (Linn.)]. Von *W. E. Uschakow* 161

5. Über „die Mause“ des Tinnunculus tinnunculus (Linn.). Von *W. A. Hachlow* 163

6. Kurze Bemerkung über eine neue Form des Rosengimpels (Carpodacus rhodochlamys kotschubeii subsp. nov.). Von *N. A. Sarudny* 165

7. Caudalanius erythronotus jaxartensis Buturl. Von *N. A. Sarudny* . 167

8. Zur ornithologischen Fauna Transkaukasiens. Von *P. W. Nesterow* . 175

9. **Kurze Mitteilungen** 180

10. **Ornithophenologische Beobachtungen** 182

11. **Von der Redaktion** 214

12. **Chronik** 215

13. **Bibliographie** 226

Éditions parvenus à la rédaction 233

Berichtigung 243

Inserate.

14. Ein ornithologischer Ausflug nach den Seen Saissan-nor und Markakul (in West-Sibirien) im Jahre 1909. (Fortsetzung). Von *G. J. Poljakow*. 189—252

Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб. д.
МОСКВА—1913.

Замѣтки по орнитологіи Туркестана.

Н. А. Зарудный.

Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan.

Von *N. A. Sarudny.*

(Продолженіе. — Fortsetzung.) [1]).

---

153. **Jynx torquilla torquilla** Linn..

Типичная форма вертишейки встрѣчается въ Туркестанѣ только на пролетѣ и притомъ, повидимому, только по самымъ западнымъ окраинамъ страны. Она извѣстна мнѣ по одному экземпляру, добытому 2. IV. 1909 въ Красноводскѣ, и по двумъ другимъ, происходящимъ изъ окрестностей Казалинска, отъ 22. IV. 1910.

Встрѣчается, повидимому, рѣдко и случайно [2]).

154 **Jynx torquilla sarudnyi** Loud..

Эта форма вертишейки отличена Г. В. барономъ Лоудономъ въ 1912 году („Ornithologische Monatsberichte“, S. 44—45) по 9-ти экземплярамъ, добытымъ на пролетѣ въ апрѣлѣ въ Закаспійской области. Ея отличія установлены по сравненіи съ балтійскими (лифляндскими) экземплярами и выражаются какъ въ срав-

---

[1]) См. „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1912 г., кн. III, стр. 197—228.
S. „Ornithologische Mitteilungen“, 1912, B. III, S. 197—228.

[2]) Экземпляры (безъ обозначенія пола) съ крыломъ въ 87,5—88,4 и 89,8 m.m.. *Авт.*

нительно маломъ ростѣ (по барону Лоудону, крыло около 85 m.m.), такъ и въ блѣдности оперенія верхней стороны, на которой рыжеватые оттѣнки развиты слабѣе. По словамъ Г. В. барона Лоудона, вертишейки изъ Семирѣчья кажутся болѣе темными сравнительно съ закаспійскими, но размѣрами не отличаются. На это могу замѣтить, что въ серіяхъ экземпляровъ указанныя цвѣтовыя различія семирѣченскихъ птицъ по сравненіи съ громаднымъ большинствомъ происходящихъ изъ другихъ мѣстъ Туркестана сводятся на нѣтъ.

Изучивъ свой матеріалъ по туркестанскимъ вертишейкамъ, я нахожу, что подавляющее ихъ количество дѣйствительно отличается отъ типичныхъ (Псковской губерніи) и меньшимъ ростомъ, и большею блѣдностью верхней стороны, которая сѣрѣе и не столь рыжевата весною, лѣтомъ и осенью.

Вотъ размѣры моихъ экземпляровъ, распредѣленныхъ по степени убыванія длины крыла. Измѣрены не всѣ, а только такіе, которые могли дать болѣе или менѣе точныя данныя.

	Клювъ (отъ угла рта).	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).
♂♂	m.m.	m.m.	m.m.
1). 12. IV. 1907; Ташкентъ . .	19,5	89	73
2). 26. IV. 1907; ib.	20	88,4	71
3). Ib.	20	87	70,5
4). 18. IV. 1907; Дурмень . . .	21	87	68,5
5). 24. VIII. 1909; ib.	21,8	87	def.
6). 15. VIII. 1907; Ташкентъ . .	19,4	86,4	72
7). 30. IV. 1900; Тышканъ . .	20	86,4	69
8). 22. IV. 1911; Ташкентъ . .	22,2	86,2	68,4
9). 18. IV. 1900; Джаркентъ . .	19,8	86,2	68,5
10). 18. IV. 1908; Туркестанъ .	20	86	68,9
11). 13. VII. 1908; Ташкентъ . .	22,2	85,8	70
12). Ib.	22,2	85,5	69
13). 19. IV. 1911; г. Бухара . .	22	85,5	70
14). 15. VIII. 1910; ст. Кауфмановская	20,4	85,4	70,2
15). 20. IV. 1909; Наманганъ . .	19,5	85,4	70
16). 22. IV. 1910; Чарджуй . . .	19,6	85,4	67
17). 28. IV. 1912; Ауліеата . . .	20	85,2	67,3

	Клювъ (отъ угла рта).	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).
♂♂	m.m.	m.m.	m.m.
18). 4. IX. 1909; Дурмень . . .	20	85,2	67,4
19). 1. IX. 1909; ib.	21	85	67
20). 28. IV. 1912; Ауліеата . . .	22,1	84,8	66,8
21). 27. VIII. 1908; Ташкентъ . .	20	84,4	64
22). 19. IV. 1912; Джизакъ . . .	21,2	84,4	67
23). 13. IV. 1909; Ошъ	21,7	84,4	67,2
24). 15. IV. 1911; Ташкентъ . .	22	84,3	68
25). 27. VIII. 1908; ib.	22,7	84	66,7
26). 8. IX. 1909; ib.	22,4	84	59
27). 11. IV. 1911; Маргеланъ . .	21,2	84	60,2
28). 25. VIII. 1909; Ташкентъ . .	21	83,6	68
29). 27. VIII. 1909; Дурмень . .	20,4	83	66
30). 19. IV. 1912; Джизакъ . . .	21,5	82,8	67,2
31). 5. V. 1907; Ташкентъ . . .	20,8	82	64
32). 9. IV. 1910; ib.	21	81,3	65
33). 15. IV. 1907; Самаркандъ . .	20,3	81	64,2
♀♀			
1). 28. VIII. 1909; Ташкентъ . .	20,5	87,3	72
2). 31. VIII. 1909; ib.	21,2	87,3	72
3). 1. V. 1900; Тышканъ . . .	20,4	87	68
4). 19. V. 1912; Джизакъ . . .	21	87	70,4
5). 11. IV. 1911; Маргеланъ . .	20,3	86,8	69,2
6). 15. IV. 1909; Ташкентъ . .	21	86,3	71
7). 15. VIII. 1907; Дурмень . .	21,8	86,2	68
8). 13. IV. 1909; Ошъ	21,5	86,2	68,8
9). 31. VIII. 1912; Дурмень . .	21	85,3	65,3
10). 28. VIII. 1907; Ташкентъ . .	20,5	85	66,1
11). 29. VIII. 1908; ib.	22,1	85	67
12). 15. VIII. 1910; ст. Кауфманновская	20	85	65
13). 27. VIII. 1912; ib.	21,3	84,2	67,3
14). Ib.	21,3	83,5	68,4
15). 1. IX. 1910; ib.	20,6	83,3	66,3
16). 11. IV. 1908; Ташкентъ . .	20	83	67

♀♀	*Клювъ* (отъ угла рта). m.m.	*Крыло.* m.m.	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы). m.m.
17). 19. IV. 1912; Ташкентъ . .	23	82,5	66,6
18). 23. IV. 1911; ib.	20,3	81,5	66
19). Ib.	20,8	81,2	65
20). 19. IV. 1911; г. Бухара . . .	20	79,5	64,5

По E. Hartert'у, длина крыла у типичной формы вертишейки (28 экземпляровъ ♂♂ и ♀♀) равняется 86—92 m.m.. Подробности о свойствахъ пребыванія у насъ описываемой птицы [1]) сообщу въ составляемой мною „Орнитологіи Туркестана".

Всѣ данныя, приведенныя въ моей книгѣ „Орнитологическая фауна Закаспійскаго края" (1896 г.) для Jynx torquilla Linn., не считая предположенія о гнѣздованіи ея въ Южно-каспійскомъ участкѣ, должны относиться къ J. torquilla sarudnyi.

155. **Jynx torquilla** subsp.?

Вертишейка, которую я ввелъ въ списокъ гнѣздящихся птицъ Южно-каспійскаго участка (Гилянъ, Мазандеранъ и Астрабадъ) сначала предположительно („Орнитологическая фауна Закаспійскаго края"), а потомъ и утвердительно („Verzeichnis der Vögel Persiens" [2])), въ настоящее время имѣется у меня лишь въ одномъ экземплярѣ старой самки, обладающей широкимъ оголеннымъ пространствомъ на брюхѣ, добытой, очевидно, съ гнѣзда или отъ дѣтей (г. Рештъ, 28. V. 1906). Относительно гнѣздованія вертишейки въ указанной странѣ у меня произведены собственныя наблюденія въ 1904 году, но въ то время экземпляровъ я не бралъ, предполагая ихъ идентичность съ типичными. Сейчасъ упомянутый экземпляръ очень рѣзко отличается не только отъ J. t. sarudnyi, но и отъ J. t. torquilla темнымъ основнымъ фономъ верхней стороны, совершенно такимъ же, какъ у J. t tschusii Kleinschm., одинъ сардинскій экземпляръ которой

---

[1]) Судя по сохранившимся у меня экземплярамъ, въ восточной Персіи и Персидскомъ Белючистанѣ встрѣчается на пролетахъ и на зимовьи только эта форма. *Авт.*

[2]) „Journal für Ornithologie", 1911. *Авт.*

имѣется въ моей коллекціи отъ г-на Чузи. Окраска нижней стороны кажется еще болѣе густой и насыщенной, чѣмъ у этой послѣдней, что особенно сильно бросается въ глаза на исподѣ головы и шеи, а также на передней части груди. По размѣрамъ, повидимому, совпадаетъ съ J. t. sarudnyi: крыло—87, хвостъ—68,5 m.m. (по E. Hartert'y [1]), у J. t. tschusi: крыло—82—85, а у J. t. mauretanica Rothsch.—76—82,5 m.m.). Совокупность темноты окраски и пониженнаго роста отличаетъ мою птицу отъ типичной формы, темнота окраски—отъ вертишейки моего имени и повышенный ростъ—отъ обѣихъ остальныхъ формъ. Я склоненъ видѣть въ ней представительницу особой формы, которой даю названіе J. torquilla hyrcana.

Сохранившійся у меня пролетный экземпляръ изъ Загросскаго участка Персіи (Альхорширъ, 30. IV. 1904) представляетъ не эту форму, какъ можно было бы предполагать, а типичную, съ крыломъ въ 90.5 m.m.. Мѣстовыхъ птицъ изъ Сѣверо-западнаго участка Персіи, къ сожалѣнію, я не бралъ: слишкомъ много было работы.

156. **Poecile lugubris hyrcanus** Zar. & Loud..

Привожу размѣры еще одного экземпляра (♂ ad. въ отличномъ осеннемъ перѣ) этой рѣдкой синицы (см. Орнитологическій Вѣстникъ за 1913 г., кн. I, стр. 31), добытаго 4. VIII. 1912 около Ахъ-Имама.

Клювъ: длина отъ угла рта—12; отъ передняго края ноздри—8; крыло — 70,4; хвостъ (отъ основанія кобчиковой железы) — 57,5; плюсна (сзади)—17,5 m.m..

157. **Erythrospiza mongolicus** Swinh..

Erythrospiza incarnata Severtz. („Вертикальное и горизонтальное распредѣленіе Туркестанскихъ животныхъ", стр. 64 и 117, 1873 г.; Cabanis: „Journal für Ornithologie", S. 173, 1875).

Монгольскій пустынный снѣгирь принадлежитъ еще къ очень мало изслѣдованнымъ птицамъ какъ вообще, такъ и по отношенію къ Туркестану въ частности. Къ тому же то немногое, что извѣстно изъ его распространенія и образа жизни, нуждается въ существенномъ исправленіи.

---

[1]) „Die Vögel der paläarktischen Fauna", Heft VII (Band II, 1), S. 940. *Авт.*

По E. Hartert'y („Die Vögel der paläarktischen Fauna", S. 90), область распространенія этой птицы занимаетъ центральную Азію включительно отъ Афганистана, Белючистана, Туркестана и восточной Персіи черезъ Монголію включительно до сѣверо-западнаго Китая. Въ сѣверномъ Кашмирѣ она распространена, смотря по времени года, на высотѣ между 5000 и 10.000 англійскихъ футовъ. Что касается до Туркестана, то вотъ что извѣстно отсюда. Н. А. Сѣверцовъ („Вертикальное и горизонтальное распредѣленіе Туркестанскихъ животныхъ") говоритъ: „Эта птица въ туркестанскомъ краѣ осѣдла, встрѣчается послѣ гнѣздованія стаями до 50—100 штукъ, спорадически. Добыта въ концѣ сентября на Иссыкъ-кулѣ, въ августѣ и въ октябрѣ на верхнемъ Нарынѣ, на высотахъ 9—10 тысячъ футовъ; въ октябрѣ же и зимой у Келеса, не выше 2000 футовъ, въ степи—но всегда и вездѣ, лѣтомъ, осенью и зимой, и въ горахъ, и въ высокихъ степяхъ, и у подошвы горъ, эта птица встрѣчалась исключительно у обрывовъ, каменныхъ или глинистыхъ. Осенью и зимой она ведетъ жизнь бродячую, питаясь мелкими сѣменами и избѣгая лѣса, и даже кустарника. Проворно бѣгаетъ, несмотря на короткія ноги; полетъ быстрый и неутомимый" [1]). Въ статьѣ „Замѣтки о фаунѣ позвоночныхъ Памира" [2]) Н. А. Сѣверцовъ сообщаетъ слѣдующее: „Bucanetes mongolicus Swinh. (B. incarnatus Sev.); гнѣздится въ Алайскомъ хребтѣ и почти по всему Памиру, по скаламъ; еще въ половинѣ августа птенцы только что на взлетѣ, а взрослые не начинали линять; линяетъ въ сентябрѣ, и тогда

---

[1]) Въ сочиненіи своемъ „Путешествія по Туркестанскому краю и изслѣдованіе горной страны Тянъ-Шаня" (1873 г.), на стр. 200—201, Н. А. Сѣверцовъ относительно первыхъ своихъ находокъ пишетъ: эту птицу „я нашелъ въ началѣ октября 1864 г. у р. Келеса, между Ташкентомъ и Чимкентомъ; почти въ это же время 1867 года, на Иссыкъ-кулѣ и, недѣлю спустя, у Нарына, но не иначе, какъ на голыхъ глиняныхъ обрывахъ, изрытыхъ водомоинами; по крутымъ же безлѣснымъ утесамъ, непосредственно подъ вѣчными снѣгами, въ горахъ, вокругъ Чатыръ-куля, нашелъ эту красивую птичку и г. Скорняковъ, при походѣ г. Полторацкаго, въ концѣ іюля и началѣ августа 1867 года; вообще я нашелъ, что E. incarnata осенью весьма постепенно спускается съ подснѣжныхъ высотъ, на которыхъ проводитъ лѣто, и старыя вмѣстѣ съ молодыми; въ стайкахъ постоянно особи разнаго возраста, держащіяся такъ близко другъ къ другу, что однимъ выстрѣломъ можно убить нѣсколькихъ, хотя стайки и не велики, 2—3 выводка вмѣстѣ, иногда и отдѣльные выводки, пара старыхъ съ 4—6 молодыми". *Авт.*

[2]) „Записки Туркестанскаго Отдѣла Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи", т. I, вып. 1-й, 1879 г., Ташкентъ. *Авт.*

прячется. Всего чаще встрѣчалась мнѣ на Алаѣ и Памирѣ; затѣмъ спорадически по всему Тянъ-Шану". „Въ туркестанскомъ краѣ, лѣтомъ, это птица самаго верхне-альпійскаго пояса, живетъ выше предѣла лѣсовъ, впрочемъ въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ и немного ниже, напримѣръ, на нижнемъ Алаѣ; осенью остается возможно дольше на тѣхъ же высотахъ, и сгоняется внизъ только снѣгами, но только немногія временно спускаются въ культурный поясъ, гдѣ встрѣчались у Келеса и въ ходжентскихъ предгоріяхъ, въ октябрѣ. Большинство птицъ этого вида вѣроятно зимуетъ на горныхъ солнопекахъ,—но вѣрно не знаю; зимой, позднѣе конца октября не добывалъ" [1]). До 1893 года личныя мои знакомства съ монгольскимъ пустыннымъ вьюркомъ въ Туркестанѣ ограничивались лишь довольно частыми встрѣчами во второй и въ началѣ послѣдней трети апрѣля 1892 года въ песчаной пустынѣ между Мервскимъ оазисомъ и Аму-Дарьею. Онъ попадался въ это время *пролетными* обществами, особей до 30-ти въ каждомъ, въ такихъ мѣстахъ среди саксауловыхъ насажденій, которыя были не особенно обильно покрыты травою (Н. А. Зарудный: „Орнитологическая фауна Закаспійскаго Края", стр. 270—271, 1896 г. [2])).—Остальные авторы, писавшіе о нашей птицѣ изъ предѣловъ Туркестана, ограничивались лишь перечисленіемъ осмотрѣнныхъ экземпляровъ. Такъ г-нъ Штольцманнъ („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou", № 3, 1892; здѣсь статья „Contribution à l'Ornithologie de la Transcaspie"), упоминаетъ о двухъ самкахъ, добытыхъ Т. И. Бареемъ въ Султанъ-бендѣ (Мервскій оазисъ) въ ноябрѣ 1889 года [3]), и многочисленныхъ экземплярахъ изъ Ферганской области (статья „Oiseaux de la Ferghana" въ томъ же журналѣ за 1897 г., въ выпускѣ 1-омъ), именно изъ Зордали (май, іюнь, августъ и сентябрь) и Гульчи (сентябрь).—С. А. Бутурлинъ („Семья Охотниковъ" за 1908 г., стр. 250) сообщаетъ о полученныхъ имъ нѣсколькихъ экземплярахъ изъ Джаркента (Семирѣчье) отъ 8. IV. 1908.—Г. Э. Іоганзенъ („Птицы Семирѣчья

---

[1]) По удобнымъ мѣстамъ зимуетъ въ нашемъ краѣ и на значительныхъ высотахъ. N. Gyldenstolpe въ статьѣ своей „Short notes on a collection of Birds from Russian Turkestan" (Arkiv för Zoologi, b. 7, № 14, 1911) приводитъ рядъ экземпляровъ (♂♂ и ♀♀), добытыхъ въ Нарынѣ (къ югу отъ Иссыкъ-куля) 29. I—27. II. 1910 (нов. ст.) на высотѣ 2140 м. *Авт.*

[2]) Въ статьѣ о E. mongolicus въ этой книгѣ передъ словомъ „особенно" пропущено „не". *Авт.*

[3]) Очевидно на пролетѣ или на зимовьи. *Авт.*

и Туркестана, собранныя экспедиціей профессора В. В. Сапожникова", Томскъ, 1908 г.) приводитъ два экземпляра (безъ указанія времени добычи) съ береговъ Иссыкъ-куля близъ рѣки Улахолъ.

За время постояннаго своего жительства въ Туркестанѣ у меня накопилось довольно много разнообразныхъ свѣдѣній и о монгольскомъ пустынномъ снѣгирѣ. Эти свѣдѣнія значительно дополняютъ и отчасти исправляютъ нѣкоторыя изъ вышеприведенныхъ категорическихъ утвержденій Н. А. Сѣверцова. Прежде всего наша птичка лѣтомъ не есть представительница только самаго верхняго альпійскаго пояса или зоны, лежащей немного ниже... Далекій отъ мысли отрицать ея гнѣздованіе на такихъ высотахъ въ томъ или другомъ мѣстѣ нашего обширнаго края, я долженъ сказать, что въ періодъ гнѣздовья она навѣрное отсутствовала въ альпійскихъ и субъ-альпійскихъ областяхъ на верховьяхъ рѣки Пскемъ (одинъ изъ истоковъ Чирчика) въ Таласскомъ Ала-тау въ 1907-мъ, на верховьяхъ Кшемыша и Чичака (истоки р. Исфара-су въ Ферганѣ) въ хребтѣ Туркестанскомъ въ 1908-мъ и на верховьяхъ рѣкъ Падша-ата и Итокаръ въ сѣверной Ферганѣ въ 1909-мъ годахъ. Съ другой стороны я нашелъ ее въ хорошо замѣтномъ числѣ на гнѣздовьи близъ мѣста впаденія Пскема въ Чаткалъ, а также невдалекѣ отсюда около с. Хумсанъ на р. Угамъ; затѣмъ она оказалась очень обыкновенной на гнѣздовьи во многихъ мѣстахъ въ горахъ по самымъ низовымъ частямъ Чичака и Кшемыша, а также на южныхъ склонахъ горъ Ахунъ-тау и, въ особенности, въ окрестностяхъ с. Варухъ (4886 футовъ). Не обнаруженная на вершинѣ Падша-ата, она гнѣздилась, правда въ очень небольшомъ числѣ, въ горахъ Кукъ-сарай, а затѣмъ въ низовой части названной рѣки около с. Нанай и въ горахъ Унгаръ-тюбэ. Затѣмъ она найдена на гнѣздовьи въ горахъ Моголъ-тау (къ сѣверу отъ Ходжента) и въ Кара-тау по рѣкѣ Бишъ-арыкъ. Всѣ сейчасъ перечисленныя мѣстности лежатъ частью въ зонѣ древовиднаго можжевельника, частью (и это гораздо чаще) ниже ея предѣловъ. Въ 1910 году мы нашли ее гнѣздящеюся въ небольшомъ числѣ въ Бухарскомъ ханствѣ, именно въ горахъ Койтанъ-тау между с. Койтанъ и урочищемъ Ходжа-филь-ата, ниже зоны древовиднаго можжевельника; въ томъ же числѣ и также на гнѣздовьи она попалась намъ въ зонѣ фисташки въ горахъ Баба-тагъ въ районѣ, окружающемъ могилу Хазретъ-баба верстъ на 15—20; нѣсколько парочекъ гнѣздилось въ горахъ около г. Кабадіанъ, лежащихъ ниже полосы какого бы то ни было

дикаго горнаго лѣса. Чтобы покончить съ перечисленіемъ лично мнѣ извѣстныхъ мѣстъ гнѣздовій монгольскаго пустыннаго вьюрка въ Туркестанѣ, упомяну о частомъ гнѣздованіи его по холмамъ Тамды и въ горахъ Аристанъ-бель-тау (на высотѣ 1400 футовъ), Акъ-тау и Тохта-тау, невысокими островами выдвинувшихся изъ песчанаго моря центральной части пустыни Кизылъ-Кумъ. Здѣсь онъ найденъ мною въ 1912 году, на ряду съ удивительнымъ для этихъ широтъ Erythrospiza githaginea crassirostris! Здѣсь нѣтъ ничего, что напоминало бы самый верхній альпійскій поясъ или полосу, лежащую немного ниже.

О распространеніи нашей птицы въ Персіи, гдѣ она гнѣздится во многихъ мѣстахъ, я сообщалъ уже давно („Экскурсія по Сѣверо-Восточной Персіи и птицы этой страны“ [1]), „Птицы Восточной Персіи“ [2]). Довольно интересныя данныя были добыты мною также во время путешествій по этой странѣ въ 1900—1901 и 1903—1904 г.г. Эти данныя еще не опубликованы. Выбирая изъ нихъ особенно любопытное, долженъ упомянуть о гнѣздованіи въ горахъ Эльбурсъ около мѣстъ Молла-Али и Па-Чинаръ (въ провинціи Гилянъ), а также въ горахъ около с. Бэндунъ (къ западу отъ озера Хамунъ-и-Фаррахъ въ Сеистанѣ). Въ первомъ случаѣ она достигаетъ крайняго запада своего общаго распространенія, а во второмъ—крайняго юга. Въ персидскомъ Белючистанѣ бываетъ только зимою. Вездѣ въ Персіи мѣста ея гнѣздованія лежатъ значительно ниже альпійской и субъ-альпійской зоны.

Въ Туркестанѣ монгольскій пустынный снѣгирь является осѣдлымъ не безусловно, а только отчасти. Уже выше было сказано о пролетѣ между Мервскимъ оазисомъ и Аму-Дарьею, а также о находкахъ въ ноябрѣ въ томъ же оазисѣ. Мои наблюденія въ Персіи подтверждаютъ пролетъ его изъ Туркестана. Въ этомъ послѣднемъ въ не гнѣздовой періодъ и внѣ мѣстъ гнѣздовій я часто наблюдалъ пролетныя стайки (особей до 20-ти въ каждой), на разстояніи выстрѣла проносившіяся къ югу черезъ урочище Сардаба (въ Голодной степи) 17—20. X и 7—10. XI. 1908; нѣсколько такихъ же стаекъ было примѣчено въ дни 24—26. IX. 1910 въ урочищѣ Кокъ-булакъ (на Сыръ-Дарьѣ при устьи Келеса); стайка особей въ 30-ть попалась около с. Той-тюбэ (долина Чирчика) 19. IX. 1911; нѣсколько маленькихъ стаекъ (экземпляровъ до 10-ти въ каждой)

---

[1]) „Записки Императорской Академіи Наукъ“, 8-я серія, т. X, № 1, 1900 г. *Авт.*

[2]) „Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“, 1903 г. *Авт.*

въ дни 29—30. XI. 1908 присаживались на отдыхъ въ буграхъ Чаулача (около ст. Келесъ) и потомъ летѣли прямо на югъ. Лишь изрѣдка примѣчалась въ разные годы по долинѣ Ангрена въ январѣ и февралѣ.

Наблюдалось мною и весеннее движеніе черезъ Кокъ-булакъ (1—4. III. 1907), Сардабу (16—18. II. 1908, 7—9. III. 1909, 19—21. II. 1910 и 16—18. II. 1911) и разливы низовой части р. Бугунь (20—22. II и 22—25. III. 1913); летѣли стаями (до 40 особей каждая) прямо на сѣверъ.

Встрѣчаясь въ періодъ гнѣздованія на самыхъ разнообразныхъ высотахъ включительно до альпійской области, наша птичка поселяется всегда въ пустынныхъ и полупустынныхъ сухихъ гористыхъ или, по крайней мѣрѣ, сильно пересѣченныхъ мѣстностяхъ, частью каменистыхъ и скалистыхъ, частью глинистыхъ, особенно если глина проникнута или усыпана камнемъ. Чѣмъ круче склоны и чѣмъ больше состоитъ въ наличности обрывовъ и лощинъ, тѣмъ многочисленнѣе становится снѣгиное населеніе. На болѣе значительныхъ высотахъ выбираются почти исключительно такія мѣста, которыя въ теченіе дня подольше остаются освѣщенными солнцемъ. Лѣсъ и густыя кустарныя заросли рѣшительно избѣгаются, какъ и слишкомъ густой травянистый покровъ. Широко разбросанные невысокіе кусты, порою одинокія деревья, отдѣльные кустики травъ—вотъ обычная растительность на мѣстахъ гнѣздовья. Эти послѣднія располагаются вообще невдалекѣ отъ ближайшей воды, безразлично прѣсной или солоноватой. Наша птица нѣсколько разъ въ день является на водопой и потому естественно селится поближе къ водѣ. Обладая общественными наклонностями, она не ищетъ уединенія и устраивается цѣлой колоніей, паръ до 30-ти въ каждой, закладывая свои гнѣзда въ сотнѣ шаговъ и меньше одно отъ другого. Тоже наблюдалъ я и въ Персіи, гдѣ на скалистой сторонѣ одной изъ цѣпей хребта Багыранъ-кухъ около с. Рекутъ 5. V. 1896 нашелъ 6 гнѣздъ другъ отъ друга въ 30—100 шагахъ (Н. А. Зарудный: „Экскурсія по Сѣверо-Восточной Персіи и птицы этой страны“).

Гнѣзда и яйца E. mongolicus извѣстны до сихъ поръ только по находкѣ, сдѣланной Н. М. Пржевальскимъ („Монголія и страна тангутовъ“, стр. 94, 1876 г.) въ началѣ мая 1872 года въ хребтѣ Хара-нарынъ-ула. Здѣсь было найдено гнѣздо съ тремя совершенно свѣжими яйцами. Оно описывается *сдѣланнымъ въ густыхъ вѣтвяхъ молодого илъма, не выше сажени надъ землею.*


Основаніемъ постройки служили сухія вѣтки чернобыльника; *внутренность была выложена толстымъ (на 1/3 дюйма) слоемъ козлиной шерсти* [1]). При всемъ своемъ преклоненіи передъ Н. М. Пржевальскимъ и полномъ довѣріи къ его наблюденіямъ, это описаніе возбуждаетъ во мнѣ немалое сомнѣніе въ точности опредѣленія вида птицы, которой гнѣздо принадлежитъ. Судя по мѣстоположенію гнѣзда и его устройству, оно чрезвычайно рѣзко отличается отъ всѣхъ моихъ персидскихъ и туркестанскихъ находокъ и во всѣхъ отношеніяхъ походитъ на гнѣздо Rhodospiza obsoleta Licht.. На яйца этой послѣдней совершенно походитъ и изображеніе яйца E. mongolicus, данное Н. М. Пржевальскимъ на 19-ой таблицѣ вышеупомянутаго сочиненія; оно рѣзко отличается отъ извѣстныхъ мнѣ яицъ подлинной E. mongolicus изъ Персіи и Туркестана. Къ тому же R. obsoleta найдена Н. М. Пржевальскимъ въ томъ же хребтѣ Хара-нарынъ-ула.

Armand David и M. Oustalet („Les Oiseaux de la Chine", S. 350) правда сообщаютъ о гнѣздованіи E. mongolicus въ *кустарникахъ* и естественныхъ углубленіяхъ, но не описываютъ ни гнѣздъ, ни яицъ.

По моимъ наблюденіямъ, монгольскій пустынный снѣгирь закладываетъ свои гнѣзда въ небольшихъ выбоинахъ и трещинахъ не слишкомъ крутыхъ скалъ и обрывовъ, въ особенности въ ямкахъ, часто имъ самимъ вырываемыхъ, по землистымъ склонамъ, усыпаннымъ крупнымъ и мелкимъ камнемъ. Эти ямки располагаются у подножія какого-нибудь особенно тѣнистаго кустика или, что, повидимому, бываетъ всего чаще, то подъ краемъ камня, то сбоку основанія какого-нибудь бугорка или кочки такимъ образомъ, что камень или земля совсѣмъ, или почти совсѣмъ, закрываютъ гнѣздо сверху, образуя навѣсъ. Высота между этимъ послѣднимъ и дномъ гнѣздовой ямки въ извѣстныхъ мнѣ случаяхъ не превосходила 140 m.m.. Ходъ къ такимъ прикрытымъ гнѣздамъ имѣетъ видъ довольно высокой поперечной щели; рѣже онъ имѣетъ кругловатое очертаніе; почти во всѣхъ гнѣздахъ этого рода на дно хода положенъ помостъ, ведущій отъ края гнѣздового отверстія. Собственно гнѣзда представляютъ довольно плоскія, нигдѣ не просвѣчивающія, плотныя, но по матеріалу хрупкія и непрочныя постройки. Наружный слой состоитъ изъ тонкихъ стебельковъ злаковъ и изъ нешироко топорщащихся пру-

[1]) Курсивъ мой. *Авт.*

тиковъ; средній — изъ тонкихъ, хрупкихъ стебельковъ злаковъ, изъ полосокъ ихъ листьевъ и изъ жилокъ этихъ послѣднихъ, выбранныхъ изъ истлѣвшаго матеріала; внутренній,—поднимающійся до краевъ гнѣздового отверстія,—изъ конскаго волоса. Помостъ, достигающій въ длину до 80 m.m., выстроенъ изъ матеріаловъ наружнаго слоя, но болѣе грубыхъ.



Схемы профилей расположенія гнѣздъ:

a—гнѣздо; *b*—помостъ; *c*—камень; *d*—глина; *i*—глиняный бугорокъ; *l*—кустикъ передъ входомъ въ гнѣздо; *R*—кустикъ травы, свисающій надъ входомъ въ гнѣздо.

Размѣры гнѣздъ.

	Глубина.	*Высота.*	*Ширина.*	*Діаметръ отверстія.*
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
1). 31. V. 1907; с. Ходжакентъ	21,5	38	113	70
2). 6—8. VI. 1908; с. Варухъ (при устьѣ р. Чичакъ) . . .	30	45,2	118,5	68
3). Ib.	25	39,5	115	70
4). Ib.	23	38	114	69
5). Ib.	28	44	120	70
6). 16. VI. 1908; м. Чатъ (на р. Кшемышъ).	25	39	118	69
7). 5. VI. 1909; горы Кукъ-сарай . . .	38	58	125	70

	Глубина.	*Высота.*	*Ширина.*	*Діаметръ отверстія.*
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
8). 2. VI. 1909; горы Унгаръ-тюбэ . .	25	40	120	74
9). 11. V. 1910; ур. Ходжа-филь-ата . .	28	38	114	72
10). 6. VI. 1911; могила Хазретъ-баба . .	35	55	140	65
11). 30. V. 1912; Аристанъ-бель-тау .	24	37	115	69

Гнѣзда эти заключали:

1)—3 совершенно свѣжихъ яйца;
2)—4 такихъ же;
3)—5 такихъ же;
4)—4 слегка насиженныхъ;
5)—5 слегка насиженныхъ;
6)—5 сильно насиженныхъ;
7)—4 довольно сильно насиженныхъ;
8)—5 птенцовъ недѣльнаго возраста;
9)—5 сильно насиженныхъ яицъ;
10)—4 птенца примѣрно полуторанедѣльнаго возраста;
11)—5 очень сильно насиженныхъ яицъ.

Основной фонъ яицъ блѣдно-голубоватый, иногда пріобрѣтающій зеленоватый оттѣнокъ. Отмѣтинъ мало: ихъ можно легко и быстро пересчитать. Онѣ мелки и большею частью имѣютъ видъ точекъ разной величины. Иногда эти точки достигаютъ такихъ размѣровъ, что могутъ быть названы круглыми или кругловатыми мелкими пятнышками. Иногда кромѣ этихъ отмѣтинъ встрѣчаются завитушки и каракульки, по 1—3 на каждомъ яйцѣ всей кладки или только на нѣкоторыхъ. Цвѣтъ отмѣтинъ черно-бурый, почти черный. На тупой половинѣ яйца и въ частности на тупой вершинѣ его ихъ больше, чѣмъ на остальной поверхности.

Размѣры яицъ по кладкамъ.

	Длина.	*Ширина.*		*Длина.*	*Ширина.*
	m.m.	m.m.		m.m.	m.m.
1	18,2	14,5	2	18,6	14,5
	19,3	14,3		19,4	14,8
	19,5	14,8		19,4	14,5
				19,1	14,6

	Длина.	*Ширина.*
	m.m.	m.m.
3	19	15
	18,8	14,6
	18,8	15
	18	15,7
	18,7	14,5
4	19	def.
	19,4	def.
	def.	14,6
	19,5	14,8
5	19,1	14,7
	19	14,7
	19,4	14,5
	19,5	14,8
	18	14,6
6	18,2	14,5
	19,5	14,8
	19,5	14,8
	18,2	14,5
	19,3	15
7	18,5	14,6
	19,3	14,9
	18,7	14,8
	18,8	14,6
9	18,5	14,6
	19,4	14,8
	19	14,6
	18,8	14,5
	19,5	14,8
11	18,8	15
	18,9	14,9
	19	14,8
	18,7	14,5
	19,3	14,3

Судя по обширнымъ голымъ пространствамъ на брюшкѣ и груди самцовъ, убитыхъ около гнѣздъ, труды насиживанія раздѣляются обоими полами.

Къ гнѣздованію наши птички приступаютъ разновременно. Въ горахъ Аристанъ-бель-тау (пустыня Кизылъ-Кумъ) 30. V. 1912 я нашелъ гнѣздо съ 5-тью очень сильно насиженными яйцами, а въ невдалекѣ отсюда лежащихъ холмахъ Тамды-тау 1—3. VI. 1912 наблюдалъ выводки молодыхъ въ вполнѣ развитомъ первомъ нарядѣ.

Старыя птицы, доставленныя мнѣ изъ горъ Моголъ-тау (около Ходжента) и добытыя 23—25. VIII. 1908, почти закончили линяніе мелкаго оперенія. Всѣ рулевыя и почти всѣ маховыя (кромѣ пары крайнихъ) были обновлены, но еще не отросли до нормальныхъ размѣровъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.—Fortsetzung folgt.)

О птицахъ Айбугира.

Л. А. Молчановъ.

Über die Vögel von Ajbugir.

Von *L. A. Moltschanow.*

Районъ моихъ изслѣдованій лѣтомъ 1912 года охватывалъ Айбугирскую котловину, расположенную между западными рукавами дельты Аму-Дарьи и чинкомъ Усть-Урта. Нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ бо̀льшая часть Айбугира была залита прѣсной водой: озеро это питалось протоками, впадающими въ его южную часть и отходящими отъ Аму-Дарьи около нынѣшняго города Ходжейли. Когда протоки начали пересыхать, сплошное сначала озеро распалось на большое количество мелкихъ водоемовъ, со временемъ осолонившихся; изъ нихъ многіе нанесены на карту 1890 года (издана 1905 года). Дольше всего оставалась вода въ южной части Айбугира, гдѣ дно его во многихъ мѣстахъ лежитъ ниже уровня Аральскаго моря. Нынѣ вся южная и средняя часть Айбугира совершенно высохла и заросла на югѣ густыми зарослями гребенщика; въ средней части преобладаетъ верблюжья колючка и нѣкоторыя другія степныя травы; сѣверъ Айбугира залитъ теперь Араломъ, сильно повысившимъ свой уровень за послѣднее время. Глубокій заливъ вдался между болѣе высокой полосой по лѣвому берегу протока Талдыкъ и чинкомъ Усть-Урта; залита приблизительно половина пространства между берегомъ моря (по съемкѣ 1890 года) и городомъ Кунградомъ. Этотъ разливъ морской воды за послѣдніе 2—3 года прорѣзанъ прѣсной водой Аму-Дарьи, сильно отклонившейся на западъ и дошедшей до мыса Урга на Усть-Уртѣ. Прибрежье

и значительная часть мелкаго вышеупомянутаго залива заросли густыми тростниками. Фауна здѣсь теперь такая же, какъ и въ другихъ разливахъ дельты Аму-Дарьи. Я перечислю здѣсь тѣхъ птицъ, которыхъ встрѣтилъ на берегахъ разливовъ и во время кратковременной поѣздки на лодкѣ поперекъ залива къ мысу Урга и которыя не встрѣчаются къ югу въ сухихъ частяхъ Айбугира.

Emberiza luteola Sparrm.,
Acrocephalus stentoreus (вѣроятно brunnescens) Jerd.,
Tringa minuta Leisl.,
„ subarquata Güld.,
Totanus ochropus Linn.,
Machetes pugnax Linn. (многочисленныя стаи на берегахъ разливовъ около аула Кіятъ),
Glareola pratincola Linn.,
Larus ridibundus Linn.,
Sterna minuta Linn.,
„ fluviatilis Naum.,
Hydrochelidon nigra Linn.,
„ hybrida Pall.,
Ardea purpurea Linn. и
Haliaëtos leucoryphus Pall..

Кромѣ того, къ сѣверу отъ города Кунграда попадаются галки (Corvus monedula Linn.), о чемъ упоминаетъ уже М. Н. Богдановъ. Раза два издали я видѣлъ стаи птицъ, очень напоминающихъ грачей (Corvus frugilegus Linn.), которые, по свидѣтельству М. Н. Богданова, тоже гнѣздятся въ дельтѣ, но не отмѣчены здѣсь другими изслѣдователями.—Чаекъ (Larus ridibundus Linn.) и зуйковъ (Aegialitis dubia Scop.) къ югу отъ разливовъ я видѣлъ раза два-три въ концѣ іюля; птицы летѣли съ запада, направляясь къ дельтѣ.

Фауна средней и южной части Айбугира совершенно иная. Необходимо отмѣтить бѣдность и однообразіе ея; даже среди рептилій встрѣчаются немногія формы, а въ южномъ Айбугирѣ и ящерицъ (не говоря уже о змѣяхъ и черепахахъ), кромѣ рѣдкихъ здѣсь Eremias velox, вовсе нѣтъ. Болѣе богаты жизнью склоны чинка. Здѣсь на обрывистыхъ скалахъ, среди обвалившихся глыбъ красноватаго песчаника и бѣлаго известняка, въ узкихъ и крутыхъ оврагахъ, въ старыхъ заброшенныхъ селеніяхъ и кладбищахъ встрѣчается сравнительно не мало птицъ, не за-

мѣченныхъ раньше. Пройдя вдоль чинка до южнаго конца Айбугира и пересѣкши равнину Айбугиръ отъ мыса „Айбугиръ“ на востокъ къ укрѣпленію Яны-Кала (на истокахъ Кунградской дарьи), я составилъ списокъ птицъ этой мѣстности—правда, неполный вслѣдствіе кратковременности поѣздки (съ 6-го по 24-ое іюля),—но достаточно характеризующій означенный районъ.

Изъ орнитологовъ, насколько мнѣ извѣстно, лишь профессоръ М. Н. Богдановъ посѣтилъ Кунградъ [1]) да профессоръ А. М. Никольскій пересѣкъ мѣстность (теперь въ значительной части затопленную) между городомъ Кунградомъ и мысомъ Урга [2]).

Искреннюю благодарность приношу я Н. А. Зарудному за помощь при опредѣленіи собраннаго матеріала.

Saxicola isabellina Rüpp..

Часто встрѣчается по всему Айбугиру.

Saxicola morio Ehrb..

Встрѣчается на чинкѣ Усть-Урта.

Saxicola deserti atrogularis Blyth..

Встрѣчается преимущественно въ средней и южной частяхъ Айбугира.

Примѣчаніе. По дорогѣ въ Нукусъ изъ Петро-Александровска на лѣвомъ (хивинскомъ) берегу Аму-Дарьи мнѣ удалось добыть въ тугаѣ 28. VI самку Pratincola caprata rossorum Hart.; форма эта, безъ сомнѣнія, гнѣздится здѣсь (М. Н. Богдановъ).

Sylvia mystacea Ménétr..

♀, 22. VII, южный Айбугиръ.

Попадается въ низкихъ кустарниковыхъ зарослях южнаго Айбугира.

---

[1]) „Очерки природы хивинскаго оазиса и пустыни Кизилъ-Кумовъ“. 1882 г. *Авт.*

[2]) „Къ фаунѣ млекопитающихъ и птицъ пріаральскихъ степей“ „Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“, № 4, 1892. *Авт.*

Sylvia nana Hempr. & Ehrb..

Встрѣчается кое-гдѣ по рѣдкимъ зарослямъ, преимущественно въ южномъ Айбугирѣ.

Iduna rama Sykes.

Встрѣчается часто.

Aëdon familiaris Ménétr..

Не рѣдокъ, особенно близъ чинка въ южномъ Айбугирѣ.

Budytes melanocephalus melanogriseus Hom..

Встрѣчено нѣсколько экземпляровъ около колодца на южномъ Айбугирѣ.

Otomela phoenicuroides karelini Bogd..

13. VII, средній Айбугиръ.

Встрѣченъ и добытъ лишь одинъ разъ.

Lanius pallidirostris Cass..

♀, 20. VII; ♂, 20. VII; ♀, 22. VII; ♂, 22. VII—южный Айбугиръ. 2 ♂, 9. VII; 2 ♂ и ♀, 23. VII—Яны-Кала. ♀, 30. VII, окрестности Нукуса. 2 ♂, 30. VII, Бешъ-тюбе, къ югу отъ Нукуса.

Изрѣдка попадается въ средней части Айбугира, очень многочисленъ въ южной, особенно близъ чинка; здѣсь—прямо царство этихъ сорокопутовъ; десятками сидятъ на вершинахъ кустовъ гребенщика и на камняхъ среди осыпей крутого склона. Ближе къ дельтѣ встрѣчается рѣже, хотя около Яны-Кала еще обыченъ.

Hirundo rustica Linn..

Встрѣчается кое-гдѣ на сѣверѣ Айбугира.

Cotile riparia diluta Sharpe & Wyatt..

Попадается кое-гдѣ на Айбугирѣ, въ сѣверной и восточной частяхъ его.

Passer indicus Jard. & Selby и **Passer montanus dilutus** Richm..

Встрѣчаются преимущественно въ восточномъ Айбугирѣ.

Galerida magna Hume.

Попадается преимущественно на сѣверѣ Айбугира.

Calandrella minor leucophaea Sew..

Не рѣдокъ въ подходящихъ мѣстахъ, особенно въ сѣверномъ Айбугирѣ.

Pastor roseus Linn..

Небольшая стайка встрѣчена около мыса Урга, а также въ концѣ іюля верстахъ въ 40 къ югу отъ Нукуса.

Corvus corone Linn..

Встрѣчается на чинкѣ Усть-Урта близъ мыса Урга.

Примѣчаніе. Podoces panderi Fisch., замѣченная А. М. Никольскимъ близъ Кунграда, нигдѣ на Айбугирѣ мнѣ не попадалась.

Pica pica bactriana Bonap..

Попадается кое-гдѣ въ восточныхъ частяхъ Айбугира.

Picus albipennis Buturl..

Попадается въ южной и восточной частяхъ Айбугира, среди зарослей ивы, гребенщика и другихъ кустарниковъ.

Cuculus canorus Linn..

Встрѣчается въ сѣверной и восточной частяхъ Айбугира.

Coracias garrula semenovi Loud. & Tschusi.

Встрѣчается въ мѣстностяхъ, ближайшихъ къ культурной полосѣ.

Merops apiaster Linn..

Встрѣчается кое-гдѣ среди стай персидскихъ щурокъ (Merops persicus Pall.).

Merops persicus Pall..

Попадается всюду на Айбугирѣ.

Upupa epops Linn..

Не рѣдокъ на южныхъ склонахъ Усть-Урта.

Caprimulgus aegyptianus Licht..

Въ подходящихъ мѣстахъ попадается нерѣдко.

Asio accipitrinus pallidus Zarudn. & Loud..

♂, 22. VII, южный Айбугиръ.

Встрѣченъ одинъ экземпляръ среди рѣдкой кустарниковой растительности.

Scops brucei Hume.

Попадается кое-гдѣ близъ культурной полосы. Очень обычна и въ Нукусѣ.

Athene bactriana Blyth..

♂, 20. VII, южный Айбугиръ.

Не рѣдокъ по склонамъ Усть-Урта.

Cenchris alaudarius Briss..

Нерѣдко встрѣчается по склонамъ Усть-Урта.

Примѣчаніе 1-ое. Hierofalco sp.?—Два экземпляра какого-то крупнаго сокола видѣлъ я издали на Усть-Уртѣ близъ мыса Урга.

Примѣчаніе 2-ое. Milvus ater Gmel., упоминаемая, какъ рѣдкая птица сѣвернаго Айбугира А. М. Никольскимъ, мнѣ не попадалась вовсе.

Примѣчаніе 3-ье. Aquila sp.?—Орлы, повидимому беркуты, гнѣздятся на южномъ Айбугирѣ по обрывамъ Усть-Урта.

Peristera cambayensis Gmel..

Нерѣдко встрѣчается въ Кунградѣ и въ Нукусѣ (пропущена въ моей статьѣ „Лѣтняя орнитофауна дельты Аму-Дарьи“ [1]).

Columba fusca Pall. (?).

Вѣроятно, этотъ видъ голубя гнѣздится въ небольшомъ количествѣ среди брошенныхъ селеній средней части Айбугира.

Pterocles arenarius Pall..

Встрѣчается преимущественно въ сѣверномъ Айбугирѣ.

Phasianus chrysomelas Sev..

Встрѣчается лишь въ сѣверо-восточной, ближайшей къ культурной полосѣ, части Айбугира, да и то въ незначительномъ количествѣ.

Oedicnemus crepitans Temm..

Встрѣчается въ южной и восточной частяхъ Айбугира.

Otis macqueeni Gray.

Довольно часто встрѣчается въ восточной части южнаго Айбугира, гдѣ растутъ каперцы, плодами которыхъ охотно питается эта птица. Джекъ здѣсь очень остороженъ и далеко не подпускаетъ на выстрѣлъ. Держится въ это время (20—22. VII) обычно по 2—4 особи вмѣстѣ.

---

[1]) „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1912 годъ, книга 4-ая, стр. 261. *Авт.*

Кое-что о бѣлолобой казаркѣ (Anser albifrons Scop.).

Н. А. Смирновъ.

Einiges über die Blässengans (Anser albifrons Scop.).

Von *N. A. Smirnow.*

Въ 1911 и 1912 годахъ мнѣ случалось бывать на Дунаѣ во время пролетовъ бѣлолобыхъ казарокъ и я рѣшаюсь привести здѣсь то, что мнѣ пришлось наблюдать лично.

Далеко не вся наша дунайская граница (отъ устья Прута до устья Дуная) захватывается пролетными путями казарки; такъ, стай этихъ птицъ ни мнѣ, ни моимъ спутникамъ на охотахъ не пришлось видѣть въ предѣлахъ Килійскаго рукава Дуная; равнымъ образомъ, лишь не часто и въ сравнительно небольшихъ количествахъ попадается эта птица и въ самой верхней части нашей дунайской границы—въ долинѣ Прута. Главнымъ же мѣстомъ пролета и довольно продолжительныхъ остановокъ стай казарки является часть Дунайской долины отъ пограничнаго кордона Раздѣльнаго, лежащаго у развѣтвленія Дуная на Сулинскій и Килійскій рукава, внизу, и до кордона Промежуточнаго вверху; словомъ, полоса главнаго пролета казарки немного не доходитъ до города Рени. Захваченная пролетомъ часть Дунайской долины характерна слѣдующими двумя особенностями: 1) наличіемъ большихъ прѣсныхъ озеръ, каковы: Кагулъ, Карталы, Кугурлуй съ Ялпугомъ и др., лежащихъ въ недалекомъ разстояніи отъ самой рѣки, и подходящихъ къ ней мѣстами всего на одну версту, а въ разливъ и того ближе; 2) рельефомъ мѣстности, свойственнымъ низовьямъ большинства крупныхъ рѣкъ: по берегу самой

рѣки, а равно и тѣхъ постоянныхъ или временныхъ протоковъ, которыми въ разливъ сообщаются рѣка и ея придаточныя воды (озера, полои [1]), камышовая плавня и т. д.), идутъ сравнительно возвышенныя гряды; при этомъ разливъ нормальной высоты (8—8½ футовъ) въ описываемой мѣстности оставляетъ прибрежную Дунайскую гряду незалитой на большей части ея протяженія, заливая, однако, гряды второстепенныхъ протоковъ, или, такъ сказать, внутреннія гряды. Всѣ эти гряды до недавняго времени не подвергались культурѣ и были покрыты сочной луговой растительностью, служившей для покосовъ и выпаса скота; въ ближайшіе годы начался новый періодъ: значительная часть придунайской гряды, какъ болѣе высокой, была обращена подъ распашку, и лишь низменныя внутреннія гряды остались въ прежнемъ состояніи. Вотъ это-то сочетаніе съ одной стороны—обширныхъ озеръ съ ихъ чистыми и безопасными для крупныхъ птицъ плесами, а съ другой—грядъ съ сочной луговой травой и привлекаетъ, повидимому, многочисленные табуны казарокъ, задерживая ихъ осенью съ сентября до середины или даже конца декабря (ст. стиля), когда, наконецъ, замерзаніе озеръ гонитъ птицу далѣе на югъ. Зато весенній пролетъ значительно короче и, по словамъ мѣстныхъ охотниковъ, въ нѣкоторые годы проходитъ даже незамѣтно. Лично мнѣ пришлось видѣть весенній пролетъ въ началѣ марта 1911 года и въ 20-хъ числахъ февраля 1912 года. Какой-либо правильности въ суточной жизни пролетныхъ казарокъ здѣсь я не замѣтилъ; быть можетъ, для этого у меня недостаточно еще наблюденій, но полагаю, что и въ будущемъ врядъ ли удастся замѣтить эту правильность, такъ какъ сильное преслѣдованіе со стороны охотниковъ не можетъ ея не нарушать.

Держится здѣсь казарка стайками въ нѣсколько десятковъ особей, при чемъ, однако, на удобныхъ мѣстахъ отдыха, а въ особенности кормежки, стай этихъ собирается столько, что общая численность гусей, сидящихъ вмѣстѣ и тѣсно на какой-либо грядѣ, доходитъ до тысячи и болѣе; въ случаѣ тревоги вся эта масса разлетается опять-таки отдѣльными стайками, а не уходитъ вся въ одну сторону одной громадной стаей.

Осторожность казарокъ въ отношеніи къ человѣку хорошо извѣстна. Однако, не могу не привести слѣдующаго примѣра, свидѣтельствующаго о томъ, что птицы эти замѣчаютъ, какъ ведетъ себя другое стадо ихъ, и сообразно съ этимъ дѣйствуютъ сами. Однажды,

---

[1]) Пойма. *Авт.*

въ началѣ декабря я замѣтилъ, что табуны казарокъ пролетаютъ вдоль края разлива надъ копной соломы, оставшейся съ осени и почти окруженной мелкой водой; я засѣлъ въ эту копну, тщательно закрывъ соломой и себя, и наготовѣ лежащее ружье; вскорѣ съ запада показалось на горизонтѣ стадо казарокъ, а затѣмъ другое и третье; всѣ тянули прямо на меня; первое стадо, далеко не долетѣвъ до копны, поднялось молча на высоту бо́льшую самаго дальняго дробового выстрѣла, но, такъ какъ выстрѣла не послѣдовало и я сохранилъ неподвижность, то, пролетѣвъ копну, гуси опустились и далѣе пошли низомъ; второе стадо, которое не могло не видѣть перваго, прошло надъ моей головой, значительно ниже; третье же стадо, летѣвшее вслѣдъ за вторымъ, протянуло надо мной на высотѣ уже нормальнаго выстрѣла крупной дробью.

При изслѣдованіи свѣже-убитыхъ птицъ пришлось убѣдиться, что окраска клюва и кольца около глаза совершенно точно соотвѣтствовала описанію С. Н. Алфераки [1]); лишь счетъ пластинокъ въ верхней челюсти вышелъ, какъ будто, изъ тѣхъ предѣловъ, какіе могъ на основаніи своихъ матеріаловъ дать названный авторъ, въ сторону приближенія къ крайнимъ экземплярамъ Anser finmarchicus Gunner. Однако, размѣры клюововъ, оставили меня въ увѣренности, что я имѣлъ дѣло все-таки съ Anser albifrons. Размѣры (въ миллиметрахъ) клюововъ и число зубцовъ привожу въ нижеслѣдующей табличкѣ.

№№ по журналу.	Мѣсто добычи.	Время добычи [2]).	Длина: Клюва.	Длина: Коготка.	Число зубцовъ: Слѣва.	Число зубцовъ: Справа.
64	Районъ „Скупы“ на Дунаѣ.	22. II. 1912.	48	8,5	25	25
65			41,5	7,5	27	27
87		5. XII. 1912.	47	8	29	29
88			40	7	26	24
89			43	9	25	24



[1]) „Гуси Россіи“, стр. 55. *Авт.*

[2]) Даты по старому стилю. *Авт.*

Бѣлый турпанъ [Oidemia fusca (Linn.)].

В. Е. Ушаковъ.

Eine weisse Trauer-Ente [Oidemia fusca (Linn.)].

Von *W. E. Uschakow.*

Въ концѣ мая 1910 года на озерѣ близъ деревни „Чирналы", въ 80-ти верстахъ на югъ отъ г. Тары [1]), между многочисленными экземплярами турпановъ я замѣтилъ одну птицу, по habitus'у принадлежащую къ этимъ же ныркамъ, но только бѣлую. Турпаны плавали парами (♂ и ♀); при приближеніи нашей лодки птицы взлетали, при чемъ самки всегда держались впереди самцовъ. Бѣлый экземпляръ также плавалъ съ обыкновеннымъ самцомъ турпана и при полетѣ всегда держался впереди. Подъѣхать на вѣрный ружейный выстрѣлъ къ этой парочкѣ мнѣ не удалось: птицы были очень осторожны и далеко не подпускали къ себѣ.

Въ концѣ мая 1912 года одному татарину изъ деревни „Чирналы" удалось подранить снова появившагося здѣсь бѣлаго турпана; послѣ выстрѣла птица эта осталась на водѣ и начала проворно нырять. Случайно у татарина зарядовъ болѣе не оказалось, и онъ принужденъ былъ отправиться за ними домой; вернувшись же на озеро, онъ уже не могъ найти запрятавшуюся тѣмъ временемъ куда-то птицу. Спустя нѣсколько дней она здѣсь снова появилась, при чемъ наблюдали ее не только на водѣ, но и летающей попрежнему.

Въ нынѣшнемъ (1913) году турпаны появились на Чирналинскомъ озерѣ во второй трети мая. Одинъ изъ охотниковъ раз-

---

[1]) Тобольской губерніи. *Авт.*

сказывалъ мнѣ, что ему пришлось замѣтить этихъ птицъ летѣвшими стаей (особей до 40), представляющей уголъ, въ вершинѣ котораго держался бѣлый турпанъ. 6-го іюня одному изъ охотниковъ посчастливилось, наконецъ, добыть эту утку, а на слѣдующій день она была доставлена мнѣ. По вскрытіи экземпляръ этотъ оказался самкой. Опереніе ея все сплошь бѣлое, съ едва замѣтнымъ желтоватымъ налетомъ; ноги ненормально яркаго розовато-оранжеваго цвѣта (такой яркой окраски ногъ мнѣ не приходилось видѣть даже у старыхъ самцовъ турпана); клювъ ярко-желтаго цвѣта, при чемъ нижняя челюсть темнѣе верхней; радужина сѣровато-бѣловатая, напоминающая окрасомъ радужину Coloeus monedula collaris Drumm.; глазное кольцо—блѣдно-красное. Вѣсъ самки этой $2^{7}/_{8}$ фунта; она довольно сытая, но не жирная. По размѣрамъ—это старая птица. Опереніе изношено; особенно сильно отрепаны маховыя и рулевыя.

Линька пустельги.

В. А. Хахловъ.

Über „die Mause“ des Tinnunculus tinnunculus (Linn.).

Von *W. A. Hachlow.*

Взрослый нарядъ наша обыкновенная пустельга [Tinnunculus tinnunculus (Linn.)] одѣваетъ въ первую же весну. При этомъ путь, избранный природой въ данномъ случаѣ, интересенъ хотя бы уже потому, что́ тутъ можно усмотрѣть извѣстную приспособленность организма къ условіямъ. Поэтому я и рѣшаюсь остановить на немъ вниманіе любителей природы.

Дѣло въ томъ, что эта пустельга въ Зайсанской котловинѣ зимуетъ и ей приходится во время „линьки“, которая продолжается съ января по апрѣль включительно, подвергаться зимнимъ холодамъ и другимъ неблагопріятнымъ условіямъ. Поэтому излишняя трата силъ на смѣну пера въ такое время могла бы отозваться на организмѣ въ дурномъ направленіи, подвергая его извѣстному риску. И вотъ природой былъ избранъ путь, который устраняетъ эти неудобства. Къ описанію его въ краткихъ словахъ я и перехожу.

Начну съ головы. Рыжій пигментъ начинаетъ понемногу исчезать, и на его мѣсто появляется голубовато-сѣрый, а темныя широкія наствольныя пестрины, сокращаясь въ ширину, представляютъ все болѣе и болѣе узкія полоски вдоль стержня и подъ конецъ исчезаютъ совершенно. Въ перьяхъ спины, плечевыхъ и кроющихъ крыла исчезаетъ черный поперечный рисунокъ, который остается только на концѣ пера. Надхвостье теряетъ рыжій и темный пигменты и становится голубымъ. Въ хвостѣ замѣчается

такое явленіе: рыжій и темный пигменты начинаютъ пропадать съ основанія хвоста, и на мѣсто перваго появляется голубой, второй же медленно исчезаетъ. Вмѣстѣ съ этимъ черная предвершинная полоса дѣлается шире, и получается впечатлѣніе, будто темный пигментъ, исчезая съ большей части пера, концентрируется затѣмъ здѣсь. Окраска низа мѣняется въ томъ смыслѣ, что темный пигментъ, расположенный у молодой птицы вдоль стержня широкой полоской, скопляется у конца пера, почему получается черное, рѣзко ограниченное пятно близъ вершины. Такъ происходитъ смѣна окраски у самца. Такимъ образомъ здѣсь дѣло линьки сводится *только* къ перемѣнѣ пигмента. Что происходитъ съ послѣднимъ—исчезаетъ ли онъ совершенно, переносится ли въ другое мѣсто, или переходитъ въ новый—вопросъ сложный, рѣшить который, не имѣя подъ руками необходимыхъ средствъ, крайне трудно. Мое намѣреніе было указать на самое характерное и очевидное во всемъ этомъ явленіи.

Краткая замѣтка о новой формѣ розоваго снѣгиря (Carpodacus rhodochlamys kotschubeii subsp. nov.).

Н. А. Зарудный.

Kurze Bemerkung über eine neue Form des Rosengimpels (Carpodacus rhodochlamys kotschubeii subsp. nov.).

Von *N. A. Sarudny.*

Предпринятая мною ревизія розовыхъ снѣгирей (Carpodacus) Туркестана выяснила необходимость отличать отъ Carpodacus rhodochlamys (Brandt), кромѣ Carpodacus rhodochlamys grandis Blyth., еще одну форму. Рѣчь идетъ о снѣгиряхъ, обитающихъ въ лѣтнее время на болѣе или менѣе значительныхъ высотахъ въ горахъ, ограничивающихъ долину Ферганы съ сѣвера и, особенно, съ юга, куда типичный C. rhodochlamys только внѣдряется отдѣльными поселеніями.

За C. rhodochlamys (Brandt) эти снѣгири не могутъ быть приняты по крупному своему росту, по значительной разницѣ въ длинѣ крыла и хвоста и по отсутствію на лбу между бровями серебристо-розовыхъ перьевъ. Не могутъ быть они приняты и за C. rhodochlamys grandis Blyth. по уменьшеннымъ размѣрамъ крыла и хвоста, а также по отсутствію буроватыхъ оттѣнковъ на краяхъ перьевъ спины и плечевыхъ партій (эти части у моихъ птицъ одинаковы съ типичнымъ C. rhodochlamys). Считая этихъ снѣгирей принадлежащими къ особливой формѣ, обозначаю эту послѣднюю названіемъ Carpodacus rhodochlamys kotschubeii (по имени Г. С. Кочубея, путешествовавшаго

неоднократно по Туркестану, а въ нынѣшнемъ году собравшему большую коллекцію птицъ [1]), мною теперь обрабатываемую).

Оставляя до ближайшаго будущаго подробное описаніе этой формы и ея отношеній къ сородичамъ, даю въ этой краткой замѣткѣ необходимые размѣры для ♂♂.

	C. rhodochlamys.	C. r. kotschubeii.	C. r. grandis.
	m.m.	m.m.	m.m.
Крыло.			
maximum . . .	90	94	97
minimum . . .	84	88	94
Хвостъ.			
maximum . . .	90	80	?
minimum . . .	83	74	?

[1]) Въ хребтахъ Алайскомъ, Заалайскомъ и Петра I-го. *Авт.*

Caudalanius erythronotus jaxartensis Buturl..

Н. А. Зарудный.

Caudalanius erythronotus jaxartensis Buturl..

Von *N. A. Sarudny.*

С. А. Бутурлинъ обратилъ вниманіе на крупный ростъ сыръдарьинскихъ чернохвостыхъ сорокопутовъ и справедливо отличилъ ихъ отъ индійско-афганскаго Caudalanius erythronotus (Vig.) [1]), котораго, по его словамъ, онъ знаетъ по верхнебухарскимъ сборамъ графа А. А. Бобринскаго и Н. В. Богоявленскаго. Изъ этихъ сборовъ С. А. Бутурлинымъ измѣренъ, повидимому, только одинъ экземпляръ, который онъ считаетъ старымъ самцомъ и для котораго даетъ такіе размѣры: крыло—90,5, хвостъ—112, клювъ отъ ноздрей—11 и плюсна—28 m.m.. Тутъ же, вѣроятно, согласно указаніямъ Э. Хартерта [2]), онъ прибавляетъ, что даже въ свѣжемъ перѣ C. erythronotus имѣетъ крыло не болѣе 92, а хвостъ не болѣе 115 m.m..

По моимъ изслѣдованіямъ, вездѣ въ русскомъ Туркестанѣ, считая въ его предѣлахъ и Бухарскія владѣнія, а также въ сѣверномъ Афганистанѣ по Аму-Дарьѣ и Пянджу (экземпляры изъ южной части Закаспійской области въ настоящее время у меня отсутствуютъ, и потому эту страну я пока исключаю) обитаетъ одна и та же крупная раса. Что же касается до упомянутой верхне-бухарской птицы, дѣйствительно удивительно малой для самца, то я думаю, что ея полъ опредѣленъ невѣрно и что на

---

[1]) „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1911 г., стр. 144. *Авт.*

[2]) E. Hartert: „Die Vögel der paläarktischen Fauna“, S. 452. *Авт.*

самомъ дѣлѣ она представляетъ самку (различать полы нашей птицы по цвѣту не такъ просто, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда).

Вотъ размѣры нѣкоторыхъ экземпляровъ моей коллекціи (располагаются по степени убыванія длины крыла).

Старые и прошлогодніе ♂♂.

	Клювъ (отъ переднего края ноздри).	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ кобчиковой железы).
	m.m.	m.m.	m.m.
1). 31. V. 1908; Кайракъ-кумъ (Фергана) . .	11	99,6	125,3
2). 23. IV. 1911; Ташкентъ	11	99,6	124,8
3). 5. V. 1906; Туркестанъ	11,8	98,8	123,5
4). 6. V. 1908; Ташкентъ.	11,2	98	122,6
5). 22. V. 1908; Джулекъ.	11	97,8	122
6). 20. IV. 1908; Ташкентъ	11	97,5	121,3
7). 5. V. 1907; ib. . . .	11,5	97	122
8). 5. V. 1908; Маргеланъ	10,5	97	121
9). 3. V. 1910; Келифъ (Бухара)	11,2	97	120
10). 11. V. 1911; Ташкентъ	10,5	97	120
11). 2. VI. 1910; Кокайты (Бухара)	11	96,8	120,8
12). 7. V. 1911; Ташкентъ.	11	96,5	120,8
13). 17. VIII. 1910; ib. .	10,7	96,3	def.
14). Ib.	11	96,3	120,5 (не отросли).
15). 19. VI. 1911; Кабадіанъ (Бухара) . . .	11,5	96,3	126
16). Ib.	10,8	96,2	125
17). Ib.	11	96	125
18). 11. VI. 1908; Ташкентъ	11,4	96	125
19). 10. V. 1907; ib. . . .	11,4	96	121

	Клювъ (отъ передняго края ноздри).	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ кобчиковой железы).	
	m.m.	m.m.	m.m.	
20). 7. V. 1907; ib. . . .	11	95,8	121,5	
21). 4. VII. 1910; Іолъ (Бухара)	11,2	95,5	122	
22). Ib.	10,4	95,2	121	
23). 11. V. 1908; Ташкентъ	10,5	95	119	
24). 15. V. 1911; ib. . . .	11,6	95	118	
25). 15. IV. 1911; ib. . .	12	95	116,6	
26). 19. VI. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара) . .	11	95	115	
27). Ib.	11,8	94,8	120	
28). 4. VII. 1910; Іолъ (Бухара)	11	94,8	117	
29). 3. VII. 1907; Туркестанъ	11,2	94,6	118	
30). 17. IV. 1909; Ташкентъ	11,8	94	117	
31). 21. VII. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара) . .	11,6	93,7	120	
32). 27. IV. 1908; Ташкентъ	10,6	93,5	117,6	
33). 21. VII. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара) . .	11	93	118	(сильно отрепанъ).
34). 11. V. 1908; Ташкентъ	11,5	93	118	
35). 3. VII. 1907; Туркестанъ	11,2	93	def.	
36). 22. V. 1908; Джулекъ.	11,2	92,8	116	
37). 23. IV. 1908; Ташкентъ	11,7	92	121	

Старыя и прошлогодніе ♀♀.

1). 17. VII. 1910; Ташкентъ	10,7	96,3	108	(не отросли).
2). 7. V. 1907; ib. . . .	11	95,6	118,5	

	Клювъ (отъ передняго края ноздри).	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ кобчиковой железы).	
	m.m.	m.m.	m.m.	
3). 23. VI. 1910; Чубэкъ (Бухара)	12,2	95	119	
4). 25. IV. 1907; Ташкентъ	12,2	94,4	116,4	
5). 23. IV. 1911; ib. . .	11,3	94,4	112,6	
6). 21. VII. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара) . .	11	94,2	108	(сильно отрепанъ)
7). 6. V. 1908; Ташкентъ.	11,4	94,1	107	
8). 20. IV. 1911; ib. . .	12,4	94	112	
9). 6. V. 1908; ib. . . .	11,2	94	112	
10). 20. IV. 1911; ib. . .	12,4	94	111	
11). 31. V. 1908; Кайракъкумъ (Фергана) . .	11,8	93,5	111	
12). 7. V. 1907; Ташкентъ.	11	93	110,5	
13). 3. V. 1910; Келифъ (Бухара)	12	93	110	
14). 31. V. 1908; Кайракъкумъ (Фергана) . .	11,2	92,3	108	(отрепанъ).
15). 23. VI. 1910; Чубэкъ (Бухара)	11	91,5	110	
16). 29. IV. 1908; Ташкентъ	10,5	91,3	108,4	
17). 25. IV. 1908; ib. . .	10,2	91	107	
18). 3. VI. 1908; ст. Мельникова (Фергана) .	11	90,8	111,8	
19). Ib.	12	90,8	111,6	
20). 29. IV. 1907; Ташкентъ	10	90,8	111,5	
21). 3. VI. 1908; ст. Мельникова (Фергана) .	11	90,5	109	(отрепанъ).
22). 11. V. 1908; Ташкентъ	11,5	90,4	110	
23). 22. V. 1908; Джулекъ.	11,4	90,2	109	
24). Ib.	11,4	90	111	
25). 2. VI. 1910; Кокайты (Бухара)	11,2	90	109	

Такимъ образомъ для взрослыхъ ♂♂ получаемъ:

	maximum m.m.	*minimum* m.m.
крыло	99,6	92
хвостъ	126	115
клювъ	12	10,4

Для взрослыхъ ♀♀:

	maximum m.m.	*minimum* m.m.
крыло	96,3	90
хвостъ	119	107
клювъ	12,4	10

По С. А. Бутурлину, его четыре майскіе ♂♂ съ Сыръ-Дарьи имѣли въ крылѣ—93—100, въ хвостѣ (отъ кобчика)—110—122 и въ клювѣ (отъ ноздрей) около — 11,5 — 12,5 m.m.. Э. Хартертъ (l. c.) для типичнаго C. erythronotus (сѣверо-западная Индія и Афганистанъ [1]) принимаетъ длину крыла въ 86—92, а хвоста 105—115 m.m.. Вѣроятно онъ имѣлъ въ виду взрослыхъ птицъ.

Туркестанскіе чернохвостые сорокопуты въ вполнѣ развитомъ первомъ нарядѣ, а также въ нарядѣ первой осени частью совпадаютъ съ размѣрами, данными Э. Хартертомъ, частью рѣшительно ихъ превосходятъ. Это видно изъ слѣдующей таблички [2]).

♂♂	*Клювъ* (отъ передняго края ноздри). m.m.	*Крыло.* m.m.	*Хвостъ.* m.m.	
1). 9. VII. 1908; Бага-Шамаль (Фергана) .	11,5	94,5	118	(почти законченный нарядъ первой осени).
2). 9. VIII. 1908; Ташкентъ	10,5	94,3	116	(такой же).
3). Ib.	10,5	94	115	(такой же).
4). 27. VIII. 1906; ib. . .	11,2	94	110,5	(такой же).

[1]) Вѣроятно *не* сѣверный. *Авт.*

[2]) Маховыя и рулевыя осенью у молодыхъ не мѣняются. *Авт.*

♂♂.	*Клювъ* (отъ передняго края ноздри).	*Крыло.*	*Хвостъ.*	
	m.m.	m.m.	m.m.	
5). 21. VII. 1910; Камаръ-Сарай (Бухара) . .	10,3	94	114	(такой же).
6). 19. VIII. 1908; Майрамъ-куль	10,4	93,6	116,4	(мелкое опереніе перебралось на половину).
7). Ib.	10,5	93,5	116	(такой же).
8). 1. IX. 1910; Ташкентъ.	10,4	92,9	115	(такой же).
9). Ib.	10,4	92,7	106,5	(еще далеко не перебравшійся въ осенній нарядъ).
10). 4. VIII. 1910; Чарджуй	10,8	92,5	110	(вполнѣ развитой нарядъ 1-ой осени).
11). 11. IX. 1911; Ташкентъ	10,8	92,3	110,5	(такой же).
12). 2. IX. 1907; ib. . . .	10,2	92	107,4	(такой же).
13). 2. IX. 1908; ib. . . .	11	91,6	111,2	(такой же).
14). 9. VIII. 1909; Кауфмановская	11,2	91	104,4	(такой же).
15). 9. VII. 1908; Бага-Шамаль (Фергана) .	11	91	109	(начало линянія мелкаго оперенія).
16). 30. VIII. 1910; Ташкентъ	10	90,8	110	(вполнѣ развитой нарядъ 1-ой осени).
17). 30. VII. 1907; ib. . .	10	90,5	110	(первый нарядъ безъ признаковъ линянія).
♀♀.				
1). 18. VIII. 1906; Ташкентъ	10,3	94,5	113,8	(вполнѣ развитой нарядъ 1-ой осени).
2). 25. VIII. 1909; ib. . .	11,8	94,3	111	(такой же).
3). 9. VII. 1908; Бага-Шамаль (Фергана) .	10,2	94,3	112	(первый нарядъ безъ признаковъ линянія).
4). 25. VIII. 1909; Ташкентъ	11	93,5	111	(еще далеко не перебравшійся нарядъ 1-ой осени).

♀♀.	*Клювъ* (отъ передняго края ноздри).	*Крыло.*	*Хвостъ.*	
	m.m.	m.m.	m.m.	
5). 27. VIII. 1908; Ташкентъ	10,5	93,3	106	(почти полный нарядъ 1-ой осени).
6). 5. VII. 1910; Шуробъ-дара (Бухара) . . .	11,2	93,3	113	(1-ый нарядъ безъ признаковъ линянія).
7). 7. VIII. 1907; ст. Кауфмановская	11,3	92,6	108	(полный нарядъ 1-ой осени).
8). 29. VIII. 1908; ib. . .	10,3	92	111,7	(такой же).
9). 10. VIII. 1907; Майрамъ-куль	11	91,2	103,7	(почти полный нарядъ 1-ой осени).
10). 27. VIII. 1908; ст. Кауфмановская . . .	10	91	116	(такой же).
11). 8. VIII. 1907; ib. . .	11,3	90,5	102	(полный нарядъ 1-ой осени).
12). 8. IX. 1911; Ташкентъ.	10	89,3	105,5	(такой же).
13). Ib.	9,4	89,2	104	(такой же).
14). Ib.	11,3	89,2	111,1	(такой же).
15). 15. VIII. 1910; ст. Кауфмановская . . .	10,2	89	100,3	(почти полный нарядъ 1-ой осени).
16). 13. VII. 1909; Минъбулакъ (Фергана) .	11,2	88,8	109	(1-ый нарядъ, только что начавшій линьку).
17). 9. VII. 1908; Бага-Шамаль (Фергана) .	11,1	88,6	109	(такой же).
18). 11. VII. 1910; г. Перовскъ	10	88,4	100,5	(вполнѣ развитой 1-ый нарядъ безъ признаковъ линянія).
19). 9. VIII. 1908; Ташкентъ	10,5	88,2	103	(полный нарядъ 1-ой осени).
20). 7. VIII. 1908; ib. . .	10,2	85,5	99,2	(почти полный нарядъ 1-ой осени).
21). 5. VII. 1910; Шуробъ-дара (Бухара).	11,5	85,5	99	(вполнѣ развитой 1-ый нарядъ безъ признаковъ линянія).

Слѣдовательно для сформировавшихся молодыхъ птицъ получаемъ:

♂♂.	*maximum*	*minimum*
	m.m.	m.m.
крыло	94,5	90,5
хвостъ	118	104,4
клювъ	11,5	10

♀♀.	*maximum*	*minimum*
	m.m.	m.m.
крыло	94,5	85,5
хвостъ	113,8	99
клювъ	11,8	9,4

Цифры говорятъ сами за себя.

Къ орнитофаунѣ Закавказья.

П. В. Нестеровъ.

Zur ornithologischen Fauna Transkaukasiens.

Von *P. W. Nesterow.*

Въ своихъ „Замѣткахъ о Закавказскихъ птицахъ“ [1]) я, между прочимъ, позволилъ себѣ—основываясь отчасти на собственныхъ наблюденіяхъ, отчасти на имѣющихся въ литературѣ данныхъ—критически отнестись къ нѣкоторымъ изъ наблюденій К. А. Сатунина. Во второй книжкѣ „Орнитологическаго Вѣстника“ за 1912 годъ К. А. Сатунинъ [2]) по этому поводу дѣлаетъ нѣкоторыя разъясненія: одни изъ своихъ наблюденій онъ признаетъ ошибочными, но, страннымъ образомъ, считаетъ за нихъ отвѣтственными не себя, а свою рукопись, вѣрность же другихъ продолжаетъ отстаивать, приводя въ пользу ихъ „новыя“ доказательства.

Passer montanus (Linn.).

Считая этотъ видъ воробья рѣдкимъ для Закавказья, я, между прочимъ, писалъ: „Изъ изслѣдователей Закавказья до г. Михаловскаго никто не приводитъ этого вида, а изъ изслѣдователей послѣ него—одни (Ф. В. Вильконскій, К. М. Дерюгинъ) также не упоминаютъ о немъ, другіе (А. М. Кобылинъ, К. А. Сатунинъ) приводятъ, какъ исключительно рѣдкую находку“. Ясно,

---

[1]) „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1911 г., № 2, стр. 99—108. *Авт.*

[2]) „Мелкія замѣтки о птицахъ Закавказья“, стр. 157—159. *Авт.*

что конецъ фразы относится не только къ К. А. Сатунину, который писалъ, что „полевой воробей сравнительно съ домашнимъ *встрѣчается очень рѣдко*“ [1]), но и къ А. М. Кобылину, который эту птицу *добылъ всего одинъ разъ* [2]). Я полагалъ, что сущность дѣла отъ того, что у меня сказано „рѣдкая находка“, а у К. А. Сатунина написано: „встрѣчается очень рѣдко“—ни чуть не пострадала. Свои выводы о распространеніи Passer montanus въ Закавказьѣ я тогда же [3]) ясно резюмировалъ словами: „Въ восточной части (Закавказья) этотъ видъ встрѣчается *правильно* и болѣе или менѣе *постоянно, но въ довольно ограниченномъ количествѣ,* въ западномъ же Закавказьѣ до послѣдняго времени былъ извѣстенъ всего одинъ случай нахожденія этого вида“ [4]). Я думалъ и думаю, что résumé находится въ полномъ соотвѣтствіи и съ выше приведенными словами К. А. Сатунина, т.-е., что этотъ видъ принадлежитъ къ числу болѣе или менѣе рѣдкихъ для Закавказья. Однако К. А. Сатунинъ заявляетъ, что таковымъ онъ его никогда не считалъ и какъ новое доказательство приводитъ тотъ фактъ, что въ садахъ около Тифлиса ему посчастливилось однажды изъ стайки въ 20 штукъ однимъ выстрѣломъ убить 11 особей.

Coloeus monedula collaris (Drumm.).

Въ „Матеріалахъ къ познанію птицъ Кавказскаго Края“ (стр. 5) К. А. Сатунинъ между прочимъ пишетъ: „Останется, вѣроятно, вѣчною загадкой, какимъ образомъ Г. И. Радде проглядѣлъ *массовое гнѣздованіе галки въ Закавказьѣ*“ [5]).

На основаніи отчасти собственныхъ наблюденій, но, главнымъ образомъ, на основаніи критическаго разбора литературныхъ данныхъ, въ томъ числѣ принадлежащихъ и самому К. А. Сатунину, я позволилъ себѣ не согласиться съ мнѣніемъ послѣдняго относительно „массоваго гнѣздованія галки въ Закавказьѣ“. При этомъ я исходилъ изъ слѣдующихъ соображеній. Такіе надежные (въ

---

[1]) „Матеріалы къ познанію птицъ Кавказскаго Края“, стр. 23. *Авт.*

[2]) Курсивъ мой. *Авт.*

[3]) „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1911 г., № 2, стр. 100. *Авт.*

[4]) Мною приводился второй случай, а нынѣ можетъ быть указанъ и третій: лѣтомъ 1912 года, Passer montanus былъ добытъ близъ Сочи Н. С. Дороватовскимъ. *Авт.*

[5]) Курсивъ мой. *Авт.*

смыслѣ опытности) изслѣдователи, какъ К. Ѳ. Кесслеръ, М. Н. Богдановъ, Михаловскій этой птицы вовсе не встрѣчали. Ф. В. Вильконскій и А. М. Кобылинъ встрѣчали этотъ видъ въ Кутаисской губерніи, но только осенью и зимой. К. М. Дерюгинъ одну птицу наблюдалъ въ Батумѣ, но тоже уже осенью. Я лично за время обѣихъ поѣздокъ въ Батумской области этой птицы совсѣмъ не встрѣчалъ; въ Карсской же области встрѣчалъ только въ одномъ мѣстѣ—близъ м. Ольты (11-го и 16-го іюля), но это были уже кочевавшія птицы; въ предѣлахъ сосѣдняго Эрзерумскаго вилайета Турціи я нѣсколько разъ встрѣчался съ ними, но уже поздно осенью. Бланфордъ утверждаетъ, что этотъ видъ не гнѣздится и въ Персіи. Наконецъ, авторъ „Птицъ Россіи", профессоръ М. А. Мензбиръ, про эту птицу пишетъ: „*Въ Закавказьѣ едва ли гнѣздится и даже зимою бываетъ очень рѣдко*" [1]). Что же касается самого К. А. Сатунина, то первоначально онъ говоритъ о „массовомъ гнѣздованіи галки *въ Закавказьѣ*" [2]); въ слѣдующей же строкѣ выясняется, что подъ послѣднимъ нужно подразумѣвать только „все *восточное Закавказье и Кубинскій уѣздъ*" [3]), строчкой же ниже авторъ поясняетъ, что подъ этими частями онъ разумѣетъ *южный Дагестанъ* и то не весь, *а только Кюринскій округъ*, а изъ Кубинскаго уѣзда еще ниже исключаетъ всю южную, степную, его часть. Въ конечномъ счетѣ изъ всего Закавказья остается *лишь Кюринскій округъ* (*уѣздъ*) *и сѣверная часть Кубинскаго уѣзда*, а изъ еще болѣе опредѣленныхъ мѣстонахожденій приводится *только Аджи-Кабулъ*.

Сопоставляя съ одной стороны показанія всѣхъ вышеприведенныхъ авторовъ (Г. И. Радде, К. Ѳ. Кесслеръ, М. Н. Богдановъ, Михаловскій, Ф. В. Вильконскій, К. М. Дерюгинъ, М. А. Мензбиръ, А. М. Кобылинъ, Бланфордъ) и съ другой—столь неопредѣленныя показанія К. А. Сатунина, я не видѣлъ никакихъ основаній отдать предпочтеніе послѣднему. Вмѣсто того, чтобы опереться на фактическія данныя, К. А. Сатунинъ пробуетъ доказать, что это предпочтеніе должно быть отдано ему уже по одному тому, что онъ прожилъ на Кавказѣ „18 лѣтъ, въ теченіе которыхъ могъ, конечно (!), увидѣть во много разъ больше, чѣмъ выше упомянутые изслѣдователи при всей ихъ неоспоримой на-

---

[1]) Т. II, стр. 478. Курсивъ мой. *Авт.*

[2]) Курсивъ мой. *Авт.*

[3]) Курсивъ мой. *Авт.*

дежности". Къ сожалѣнію, К. А. Сатунинъ забываетъ упомянуть, что Г. П. Радде прожилъ на Кавказѣ 40 лѣтъ, въ теченіе которыхъ занимался главнымъ образомъ орнитологическими изслѣдованіями. К. А. Сатунинъ же занимается ими побочно и притомъ главнымъ образомъ только послѣднее время. Только на основаніи всѣхъ вышеприведенныхъ соображеній, я и позволилъ себѣ высказать предположеніе, что наблюденія К. А. Сатунина относительно *массоваго* гнѣздованія галки *въ Закавказьѣ* по всей вѣроятности относятся къ осеннему или весеннему времени, а тогда наблюденія эти могли и не относиться къ мѣстнымъ гнѣздящимся птицамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ я высказалъ сожалѣніе, что К. А. Сатунинъ не даетъ никакихъ датъ, подразумѣвая подъ послѣдними не только время, но и болѣе опредѣленное указаніе мѣстонаблюденій. По этому поводу К. А. Сатунинъ замѣчаетъ: „крайне удивленъ высказанному мнѣ здѣсь недовѣрію [1]) къ моимъ многолѣтнимъ наблюденіямъ. Но не менѣе удивительно неумѣніе нашего автора читать по-русски" и нѣсколькими строками ниже поясняетъ: „онъ не нашелъ у меня датъ, а тамъ есть фразы: въ первой половинѣ мая каждый татарченокъ обязательно носитъ на плечѣ галченка... Далѣе вѣдь подробно указано, что въ Кубинскомъ уѣздѣ галки гнѣздятся въ дуплахъ, около Аджи-Кабула въ норахъ"... Слѣдовательно, по мнѣнію К. А. Сатунина, если бы я умѣлъ читать по-русски, *то изъ того факта, что въ сѣверной части Кубинскаго уѣзда галки гнѣздятся въ дуплахъ*, а въ маѣ каждый татарченокъ носитъ на плечѣ галченка,—я смогъ бы сдѣлать *заключеніе о массовомъ гнѣздованіи галки во всемъ Закавказьѣ!*

Upupa epops (Linn.).

Въ отношеніи этого вида К. А. Сатунинъ признаетъ свою ошибку, но объясняетъ ее тѣмъ, что въ статью, печатавшуюся въ его отсутствіи, вслѣдствіе неразборчивости рукописи *вкралось сильное искаженіе словъ* [2]); на самомъ же дѣлѣ онъ будто бы „хотѣлъ только подтвердить показанія П. В. Нестерова, что это дѣйствительно обыкновеннѣйшая птица второй половины лѣта", а не гнѣздящаяся, какъ, вопреки моимъ наблюденіямъ, онъ первоначально утверждалъ въ своей статьѣ. Но я беру смѣлость

---

[1]) Причемъ тутъ недовѣріе? *Авт.*

[2]) Курсивъ мой. *Авт.*

утверждать, что и здѣсь виновата не рукопись. Во-первыхъ, К. А. Сатунинъ, вѣроятно, забылъ, что въ предисловіи къ своей статьѣ [1]) *онъ писалъ*: „въ нижеслѣдующемъ *я совершенно не упоминаю птицъ, относительно которыхъ мои наблюденія сходятся съ наблюденіями г. Нестерова* [2]), а говорю только о такихъ, относительно которыхъ наши наблюденія расходятся или мои дополняютъ". Слѣдовательно, если наши наблюденія были сходны, подтверждать ихъ К. А. Сатунинъ не сталъ бы, тѣмъ болѣе и новаго я ничего не вносилъ, а подтверждалъ только наблюденія прежнихъ авторовъ (Ф. В. Вильконскаго и К. М. Дерюгина). Во-вторыхъ, столь сильнаго искаженія смысла (не говоря уже словъ), которое, по словамъ К. А. Сатунина, произошло— мнѣ кажется даже при стараніи сдѣлать не возможно. Вѣдь К. А. Сатунинъ такъ категорически и *авторитетно* заявлялъ [3]): „Нестеровъ всѣхъ удодовъ, видѣнныхъ имъ на низменности, счелъ пролетными и гнѣздованіе этой птицы признаетъ только въ Артвинскомъ округѣ.

На самомъ дѣлѣ это одна изъ самыхъ обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ низменности, выводящаяся, напримѣръ, въ Кобулетахъ, въ очень большомъ числѣ. Турки считаютъ «апопи» очень вкусною птицей и ожесточенно преслѣдуютъ.

(Ubique in planitiae nidans)".

(*Продолженіе слѣдуетъ.—Fortsetzung folgt.*)

---

1) „Къ орнитологіи Батумской области" („Извѣстія Кавказскаго Музея", т. V), стр. 281. *Авт.*

2) Курсивъ мой. *Авт.*

3) „Къ орнитологіи Батумской области" („Извѣстія Кавказскаго Музея", т. V), стр. 286. *Авт.*

Краткія сообщенія.—Kurze Mitteilungen.

Къ распространенію дубровника (Emberiza aureola Pall.) въ Московской губерніи.—Въ дополненіе къ замѣткѣ Г. И. Полякова [1]) о нахожденіи этой красивой птички въ долинѣ Оки вблизи Старой Каширы (въ Коломенскомъ уѣздѣ) позволяю себѣ сообщить, что Emberiza aureola Pall. мною наблюдалась въ долинѣ рѣки Оки еще въ 1908 году, во время двухдневной экскурсіи, совершенной 1-го и 2-го іюня Коммиссіей для изслѣдованія фауны Московской губерніи. Дубровникъ былъ весьма многочисленъ на всемъ протяженіи пройденнаго пути по лѣвому берегу Оки отъ села Прилуки до села Лужняки (Серпуховской уѣздъ) и держался, главнымъ образомъ, въ низкорослomъ ивнякѣ по заливнымъ лугамъ. — Позднѣе мнѣ удалось наблюдать дубровника и въ Московскомъ уѣздѣ, а именно—26-го мая 1913 года въ окрестностяхъ Николо-Угрѣшскаго монастыря, гдѣ онъ попадался въ большомъ числѣ въ ивнякѣ по лугамъ лѣваго берега рѣки Москвы, въ особенности же вблизи Кривого озера. Какъ на Окѣ, такъ и здѣсь птицы подпускали къ себѣ совсѣмъ близко; самцы усердно пѣли свою характерную пѣсенку.

В. А. Линдгольмъ.

* * *

Къ орнитофаунѣ Уссурійскаго края.—А. И. Черскій сообщаетъ, что ему удалось найти въ южной части Уссурійскаго края массовое гнѣздованіе загадочной до сихъ поръ Emberiza jankowskii Tacz..

Г. И. Поляковъ.

* * *

[1]) „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1912 годъ, кн. III, стр. 46. *Авт.*

Къ вопросу о миграціяхъ саджи [Syrrhaptes paradoxus (Pall.)].—Э. А. Борсовъ, приславшій мнѣ изъ Хабаровска 4 экземпляра Syrrhaptes paradoxus (Pall.), добытые вблизи Харбина 1-го января текущаго (1913) года, сообщаетъ въ своемъ письмѣ между прочимъ слѣдующее: „Копытки появились этой зимой около Харбина и вдоль Китайской Восточной желѣзной дороги въ большомъ количествѣ". Объ этомъ массовомъ появленіи саджи подъ Харбиномъ зимою 1912—1913 г.г. мнѣ пришлось слышать и отъ одного моего родственника, А. В. Хаваева, живущаго въ названномъ городѣ. По словамъ послѣдняго, саджи во множествѣ и по очень низкой цѣнѣ продавались въ серединѣ зимы на городскомъ рынкѣ.

Г. П. Поляковъ.

Орнитофенологическія наблюденія.

Ornithophenologische Beobachtungen.

Въ началѣ марта и затѣмъ въ первыхъ числахъ іюля с./г. редакторомъ „Орнитологическаго Вѣстника“ (Товарищемъ Предсѣдателя Русскаго Орнитологическаго Комитета) были разосланы нашимъ подписчикамъ и другимъ лицамъ, стоящимъ болѣе или менѣе близко къ природѣ, листки съ опросами относительно весенняго и осенняго пролетовъ. Съ цѣлью установленія научной равноцѣнности сообщаемыхъ данныхъ опросные листки эти были составлены Г. И. Поляковымъ въ такомъ родѣ.

Лицевая сторона:

РУССКІЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ КОМИТЕТЪ
при отдѣленіи орнитологіи
Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя:.....

.....

.....

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи:.....

.....

.....

Весна (или осень) 19 года [1]).

Названіе вида птицы.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчаніе.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			

[1]) Фенологическія наблюденія просятъ писать на отдѣльныхъ листкахъ.

Оборотная сторона:

Инструкція для наблюдателей.

1. Наблюдательной станціей, или пунктомъ, считается мѣстность, выбранная для систематическихъ наблюденій гдѣ-либо вблизи постояннаго мѣстопребыванія наблюдателя. Относительно мѣстонахожденія такой станціи или пункта на этомъ листѣ должны быть даны *точныя* и *возможно полныя* указанія (названіе ближайшаго селенія, уѣзда, губерніи или области), при чемъ такъ, чтобы ихъ возможно было найти на наиболѣе распространенныхъ географическихъ атласахъ (Маркса, Andree и друг.). Для нѣкоторыхъ видовъ птицъ (городская ласточка, стрижъ, коршунъ и друг.) наблюдательныя станціи или пункты, понятно, возможны и въ предѣлахъ городовъ и другихъ селеній.

2. Свѣдѣнія о наблюденіяхъ необходимо давать лишь относительно тѣхъ птицъ, которыя хорошо извѣстны наблюдателю и въ вѣрности опредѣленія которыхъ у наблюдателя *не можетъ возникать никакихъ сомнѣній* даже на значительномъ разстояніи.

3. Срокъ перваго появленія птицъ долженъ быть отмѣченъ возможно точнѣе, для чего наблюдательную станцію или пунктъ необходимо посѣщать не рѣже какъ *черезъ два или три дня*.

4. Можно ограничиться обозначеніемъ въ соотвѣтствующей графѣ настоящаго опроснаго листа лишь русскихъ (популярныхъ) названій птицъ, предпочтительно же приводить и научныя съ опредѣленіемъ объектовъ наблюденій до подвида (subspecies).

5. Даты (мѣсяцъ и число) приводятся по старому стилю; при обозначеніи же этихъ данныхъ *по новому* стилю, это *обязательно* должно быть *оговорено*. Въ цѣляхъ сокращенія *мѣсяцы*, въ соотвѣтственныхъ графахъ настоящаго опроснаго листа, лучше обозначать *римскими* цифрами, *числа* мѣсяца—*арабскими* цифрами, а при указаніи направленія пролета (въ предпослѣдней графѣ) приводить лишь заглавныя буквы частей свѣта (С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ).

6. Помимо наблюденій, перечисленныхъ въ графахъ настоящаго опроснаго листа относительно каждаго вида птицъ желательны еще слѣдующія указанія:

а) въ какое время сутокъ происходитъ пролетъ?

б) летятъ ли птицы въ данной мѣстности широкимъ фронтомъ или придерживаются опредѣленнаго пути?

7. Весьма желательно, чтобы наблюдатель попутно слѣдилъ за поступательнымъ ходомъ весны (или осени) и отмѣчалъ всѣ наиболѣе важныя фенологическія явленія.

8. *Опросные листы просятъ возвращать (весенніе — къ 30-му іюня, осенніе — къ 1-му января) въ редакцію журнала „Орнитологическій Вѣстникъ“* по адресу: *почт. отд. „Обираловка“, Московской губерніи, имѣніе „Саввино“*. Пересылка ихъ, какъ печатныхъ произведеній или рукописей, возможна и въ незакрытыхъ конвертахъ (бандеролью).

9. Результаты опроса относительно пролета птицъ по обработкѣ ихъ публикуются въ органахъ Русскаго Орнитологическаго Комитета, журналахъ „Орнитологическій Вѣстникъ“ и „Птицевѣдѣніе и Птицеводство“, оттиски же (въ числѣ 20-ти экземпляровъ) будутъ высланы своевременно наблюдателямъ.

Приступая въ настоящее время къ печатанію весеннихъ наблюденій, редакція съ чувствомъ живѣйшей радости можетъ констатировать тотъ отрадный фактъ, что результатъ ея первой попытки въ этомъ новомъ дѣлѣ далеко превзошелъ ожиданія. Несмотря на вынужденное неблагопріятными обстоятельствами сокращеніе объема каждаго выпуска нашего журнала, мы все же находимъ необходимымъ теперь же удѣлить нѣсколько страничекъ „Вѣстника“ для новаго отдѣла—„ *Орнитофенологическія наблюденія*“ [1]), такъ какъ своевременное опубликованіе такихъ сообщеній имѣетъ огромное значеніе для самихъ наблюдателей: знакомя своевременно съ тѣмъ, что происходитъ въ другихъ частяхъ нашего отечества—иногда въ сравнительно близкомъ сосѣдствѣ—оно подготовляетъ ихъ къ болѣе продуктивной работѣ въ слѣдующую же весну или осень.

Въ настоящее время не мало орнитологовъ любителей и спеціалистовъ разбросано въ разныхъ уголкахъ на огромномъ пространствѣ Россійской Имперіи, и многіе изъ нихъ, намъ думается, могли бы изъ года въ годъ наблюдать на мѣстахъ картины пролета. Объединеніе же такихъ наблюденій могло бы до извѣстной степени замѣнить работу сѣти спеціальныхъ орнитологическихъ станцій, что, конечно, является лучшимъ способомъ изученія этого явленія, но что, къ сожалѣнію, врядъ ли осуществимо у насъ въ ближайшемъ будущемъ. Поэтому мы, пользуясь удобнымъ случаемъ, снова обращаемся теперь съ просьбою ко всѣмъ, кто будетъ имѣть возможность наблюдать надъ пролетомъ птицъ въ послѣдующіе годы, сообщать въ редакцію о результатахъ своихъ наблюденій. Само собой разумѣется, что чѣмъ больше ежегодно окажется наблюдательныхъ пунктовъ и чѣмъ больше зарегистрируется наблюдателями пролетающихъ въ каждой мѣстности видовъ, тѣмъ продуктивнѣе будетъ эта совмѣстная работа. Редакція же „Орнитологическаго Вѣстника“ обѣщаетъ со своей стороны обработку данныхъ о пролетахъ птицъ. Со временемъ весь матеріалъ этотъ можно было бы свести воедино и, иллюстрировавъ картограммами, предоставить во всеобщее пользованіе. *Редакція.*

---

[1]) Отдѣлъ этотъ мы начинаемъ съ печатанія наблюденій А. Медвѣдева, А. Г. Гржибовскаго и В. А. Меландера, относящихся къ предшествующему (1912) году и присланныхъ въ редакцію наканунѣ разсылки опросныхъ листовъ. Данныя о весеннемъ пролетѣ названныхъ наблюдателей были изложены такъ, что мы нашли возможнымъ занести ихъ безъ существенныхъ измѣненій на опросные листы выработаннаго нами образца.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: А. Медвѣдевъ, капитанъ 8-го Сибирскаго стрѣлковаго полка. Урочище Новокіевское, Приморской области.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: урочище Славянка (наблюденія велись: въ Славянкѣ, расположенной на Амурскомъ заливѣ, въ бухтѣ Туламу; на мысѣ Брюсса, непосредственно примыкающемъ и составляющемъ южный берегъ бухты; по рѣкѣ Адими, впадающей верстахъ въ пяти южнѣе урочища въ бухту Манчжуръ).

Весна 1912 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Alauda arvensis	II	18	—	—	—	—	—	24. II. пѣли.
	Anas acuta L.	—	—	—	II	26	—	—	Небольшія, но многочисленныя станички въ бухтѣ Манчжуръ.
	Fuligula cristata L. . . .	—	—	—	II	26	—	—	
	Ardea cinerea L.	II	28	пара	—	—	—	—	На открытой протокѣ Адими.
	Mergus albellus L. . . .	II	28	4	—	—	—	—	
	Totanus fuscus L. . . .	II	28	пара	—	—	—	—	
	Circus cyaneus L. . . .	II	29	1	—	—	—	—	Вблизи Адими.
	Anas boschas L.	II	29	—	—	—	—	—	На Адими; большею частью тройками; исключительно селезни.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (авангардныя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Anas clypeata Briss. . .	III	3	—	—	—	—	—	На среднемъ теченіи Адими изъ налетѣвшей пары добытъ селезень.
	Anas crecca L.	III	8	4	—	—	—	—	На протокѣ Адими.
	Cygnus musicus Bechst.	III	9	стайка въ 9 особей	III	27	—	—	—
	Botaurus stellaris L. . .	III	10	1	—	—	—	—	Въ зарослях Адими.
	Aix galericulata L. . . .	III	10	1	—	—	—	—	Селезень на протокѣ Адими.
	Anas glocitans Pall. . .	III	10	станичка	IV	2	—	—	—
	Vanellus cristatus M. et W.	III	11	2—3	—	—	—	—	По гарямъ берега нижняго теченія Адими.
	Aegialitis placida Gray. .	III	11	пара	—	—	—	—	На отмеляхъ Адими.
	Anser sp.?	III	13	стайка въ 6 особей	—	—	—	—	Надъ бухтою Манчжуръ.
	Motacilla leucopsis Gould.	III	14	1	—	—	—	—	На каменистыхъ розсыпяхъ Адими.
	Turdus naumanni Temm.	III	15	3	—	—	—	—	Въ паркѣ урочища.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Sturnus cineraceus Temm.	III	17	—	—	—	—	—	Одинъ утромъ на отбросахъ около кухонъ и два вечеромъ въ паркѣ.
	Turtur ferrago orientalis (Lath.)	III	18	1	—	—	—	—	Въ кустарникахъ на берегу Адими.
	Ruticilla aurorea Gmel. .	III	22	—	—	—	—	—	Видѣлъ самца въ паркѣ урочища. Говорятъ, что появились днями 3—4 ранѣе.
	Scolopax gallinago raddei Buturl.	III	23	1	—	—	—	—	На протокѣ Адими.
	Numenius tahitiensis Swinh.	III	26	1	III	27	—	—	26. III слышалъ голосъ одной птицы въ бухтѣ Манчжуръ; говорятъ, что 27. III на озерѣ Рязаново видѣли значительное количество.
	Emberiza elegans Temm.	III	31	пара	—	—	—	—	Самки; вблизи Славянки.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Scolopax rusticola L. . .	—	—	—	III	31	—	—	Значительныя высыпки; прибыли надняхъ, такъ какъ 27-го числа обходилъ излюбленныя мѣста и не поднялъ ни одного.
	Budytes flava	IV	1	1	—	—	—	—	На болотахъ Адими.
	Nemura cyanura Pall. .	IV	1	1	—	—	—	—	Видѣлъ самца на корейскомъ кладбищѣ.
	Turdus dubius Bechst. .	—	—	—	IV	1	—	—	Большія станички на гаряхъ.
	Emberiza spodocephala Pall.	IV	4	—	IV	23	—	—	—
	Aegialitis dibia Scop. . .	IV	5	1	—	—	—	—	На Туламу.
	Upupa epops L.	IV	5	1	—	—	—	—	Вблизи Славянки.
	Jynx torquilla L.	IV	5	1	—	—	—	—	На мысѣ Брюсса.
	Turdus pelios Bp. . . .	IV	7	—	—	—	—	—	—
	Scolopax megala Swinh.	IV	8	—	—	—	—	—	По склонамъ сопокъ незначительныя высыпки.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Pratincola maura Pall. .	IV	8	—	—	—	—	—	Вечеромъ слышалъ пѣніе двухъ-трехъ самцовъ.
	Cettia canturians Pleske.	IV	8	1	IV	14	—	—	На корейскомъ кладбищѣ; 14-го слышалъ пѣніе самцовъ повсюду на мысѣ Брюсса.
	Hirundo rustica gutturalis Scop.	IV	11	4	—	—	—	—	Въ урочищѣ.
	Monticola solitarius philippensis	IV	12	2	—	—	—	—	Самцы на скалахъ мыса Брюсса.
	Totanus ochropus Linn..	IV	14	1	—	—	—	—	На ручьѣ.
	Aegialitis cantiana (?) . .	IV	22	стайка въ 8 особей	—	—	—	—	Бухта Манчжуръ.
	Limosa lapponica baueri St.	IV	22	1	—	—	—	—	Здѣсь же.
	Sterna camtschatica Pall.	IV	23	—	—	—	—	—	Въ бухтѣ Туламу.
	Turdus obscurus Gm. .	—	—	—	V	3	—	—	Въ паркѣ урочища.
	Larvivora cyane Pall. . .	V	3	1	—	—	—	—	Самецъ; на мысѣ Брюсса.
	Phyllopneuste superciliosa Gm.	V	3	нѣсколько	—	—	—	—	На мысѣ Брюсса.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Emberiza aureola Pall. .	—	—	—	V	3	—	—	На мысѣ Брюсса; прибыли вѣроятно днями четырьмя ранѣе.
	Cuculus poliocephalus Lath.	—	—	—	V	6	—	—	Въ урочищѣ.
	Xanthopygia tricolor Hartl.	V	9	3	—	—	—	—	На мысѣ Брюсса; самцы.
	Cypselus pacificus Lath. .	V	10	—	—	—	—	—	—
	Cuculus canorus Linn. .	V	12	—	—	—	—	—	Слышалъ впервые; говорятъ, что слышали и ранѣе.
	Totanus incana brevipes Vieill.	—	—	—	V	12	—	—	Въ бухтѣ Манчжуръ три стайки по 4—6 особей.
	Oriolus diffusus Sharpe. .	V	12	—	—	—	—	—	Мысъ Брюсса.
	Calamoherpe turdoides orientalis (?)	—	—	—	V	17	—	—	Слышалъ пѣніе и поднялъ нѣсколько особей въ зарослях Адими и въ травянистой растительности на мысѣ Брюсса.
	Squatarola helveticus Briss.	V	22	1	—	—	—	—	Въ бухтѣ Манчжуръ; самецъ, или случайно залетѣвшій, или отбившійся отъ пролетной стаи.

Зима стояла обычная для Уссурійскаго края—безснѣжная. Все же въ ноябрѣ откочевали жаворонки. Въ продолженіе января не было снѣга; дней большее число ясныхъ, солнечныхъ. Тянулъ NW. Бухта Туламу покрыта льдомъ, Манчжуръ въ тихіе дни тоже; въ сильные же вѣтры ледъ надламывало прибоями и то выносило далеко въ открытое море, то вновь прибивало къ берегамъ. Рѣка Адими въ нижнемъ теченіи вся подо льдомъ, въ среднемъ фарватерѣ открыта. Нѣкоторые изъ протоковъ Адими и ручьи не замерзали.

Февраль.

Въ концѣ первой половины мѣсяца выпалъ глубокій снѣгъ, губительно отозвавшійся на зазимовавшихъ перепелахъ (Coturnix ussuriensis Bogd.).—Во второй половинѣ преобладали ясные солнечные дни. Съ утра тянулъ N или NW, усиливавшійся къ двумъ часамъ дня и затихавшій къ вечеру. 17-го, 25-го и 27-го были замѣтны слабыя теплыя теченія Sud'a. 23-го—мокрый снѣгъ, 26-го и 27-го по утрамъ густые туманы. Въ ночь съ 26-го на 27-ое выпалъ порядочный снѣгъ, стаявшій подъ лучами солнца въ тотъ же день. Средняя полуденная температура ± 0 R.

Мартъ.

Первая половина мѣсяца состояла почти вся изъ ясныхъ, солнечныхъ дней и теплыхъ южныхъ вѣтровъ. 7-го шелъ мокрый снѣгъ. Средняя полуденная температура $+2{,}4$ R. Значительно расширился фарватеръ на рѣкѣ. На нижнемъ теченіи Адими и озерахъ ледъ ноздреватый и сильно осѣлъ. Болота сверху покрыты водою, подъ которою чувствуется твердая корка льда. Пашни сухи.—Вторая половина мѣсяца дала почти равное число ясныхъ и сѣрыхъ дней. Преобладалъ NW, достигавшій высшаго напряженія къ двумъ часамъ дня и прекращавшійся обычно съ наступленіемъ сумерекъ. 16-го сыпала „крупа“, перешедшая въ дождь. 21-го при сильномъ Sud'ѣ съ утра шелъ густой снѣгъ, покрывшій аршиннымъ слоемъ ровныя мѣста. 24-го и 27-го—туманы; въ послѣдній день туманъ перешелъ въ дождь.—Средняя полуденная температура $+4{,}4$ R. По утрамъ стояли заморозки.—Санная дорога продержалась дня два. Къ концу мѣсяца снѣгъ сошелъ совершенно. На пашняхъ сильная грязь. Рѣка Адими открыта по всему теченію. Показались первые желтые цвѣточки. 17-го слышалъ первыхъ лягушекъ. 31-го на солнцѣ рѣяли бабочки павлиній глазъ (Vanessa jo).

Апрѣль.

Въ первой половинѣ мѣсяца большее число дней сѣрыхъ или „пестрыхъ“ и только четыре ясныхъ. 1-го, 2-го, 8-го и 9-го—густые туманы. 1-го туманъ перешелъ въ дождь, а 2-го въ мокрый снѣгъ. Въ ночь съ 5-го по 6-ое выпалъ большой снѣгъ, а 6-го шелъ дождь.—Дни стояли вѣтряные, преобладалъ Sud. По утрамъ заморозки. Средняя полуденная температура + 7,7 R. — Стаявшій снѣгъ развелъ сильную грязь на пашняхъ и по дорогамъ. Пробивается травка и гари южныхъ склоновъ сопокъ въ зеленой дымкѣ. Сильно набухли почки деревьевъ мягкихъ породъ, а къ концу половины мѣсяца черемуха выбросила первые листочки. Общій колоритъ окрестностей ранне-весенній. 8-го видѣлъ мелкихъ махаоновъ (Papilio sp.), 14-го—бѣлянокъ (Pieris sp.)! Въ послѣдній же день на мысѣ Брюсса слышалъ пискъ молодыхъ, пуховыхъ, орлановъ (Haliaëtos albicilla). Лягушки выметали икру. Большой ловъ крабовъ и мелкой корюшки.—Во второй половинѣ мѣсяца дней ясныхъ и сѣрыхъ ровное число. 16-го, 20-го, 27-го и 29-го стояли туманы. 16-го, 20-го, 24-го, 25-го, 27-го, 29-го и 30 го—дожди. Тянулъ преимущественно Sud. Средняя полуденная температура + 9,5 R. Замѣтно поднялась трава; прибавилось цвѣтовъ. Распустился богульникъ; къ концу мѣсяца сезонъ цвѣтенія фіалокъ въ разгарѣ. На мягкихъ породахъ деревъ показались первые листы. Общій колоритъ весенній.

Май.

Въ первой половинѣ мѣсяца ясныхъ и сѣрыхъ дней ровное число. 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 11-го, 12-го и 13-го стояли туманы. 5-го, 6-го, 7-го, 13-го и 15-го—дожди. 15-го—первая гроза при лѣтнемъ ливнѣ. Преобладалъ Sud, стихавшій, какъ и обычно, къ вечеру. Средняя полуденная температура + 9,5 R. Сильно развилась зелень. Орѣшникъ (лещина) выбросилъ листъ.—Во второй половинѣ мѣсяца большее число ясныхъ солнечныхъ дней. 17-го, 18-го, 21-го, 23-го, 24-го, 25-го и 29-го шли дожди лѣтняго характера; 18-го дождь съ грозою; 21-го и 22-го туманъ. Зацвѣли: барбарисъ, ирисы, піоны. На солнцѣ много бабочекъ бѣлянокъ (Pieris sp.?). Корейцы приступили къ посѣву чумизы.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: А. Г. Гржибовскій. Смоленскъ, Воскресенская, д. Возненко.
Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: ближайшія окрестности Смоленска.

Весна 1912 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Larus canus Linn. . . .	III	19	—	III	28	—	—	19—28. III летѣли по-одиночкѣ или стайками до 6-ти особей, придерживаясь русла Днѣпра; 28. III летѣли весь день съ промежутками отъ 30-ти минутъ до 1 часа между отдѣльными стайками.
	Larus ridibundus Linn. .	IV	9	пара	—	—	—	—	Летѣли вверхъ по Днѣпру.
	Scolopax rusticola Linn. .	—	—	—	IV	2	—	—	2. IV началась тяга.
	„ gallinago Briss. .	—	—	—	IV	9	—	—	9. IV слышалъ первое токованіе.
	Totanus hypoleucus Linn.	III	28	пара	—	—	—	—	На Днѣпрѣ.
	„ ochropus Linn. .	III	28	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Totanus glottis Linn. . .	IV	12	—	—	—	—	—	
	Numenius arquatus L. .	IV	7	—	—	—	—	—	
	Vanellus cristatus Meyer.	III	10	—	—	—	—	—	
	Charadrius minor M. et W.	IV	12	—	—	—	—	—	
	Grus cinerea Bechst. . .	III	28	—	IV	6	12	съ SW на NE	
	Crex pratensis Bechst. .	IV	8	—	—	—	—	—	По словамъ мѣстнаго крестьянина-охотника.
	Columba oenas Briss. . .	III	14	стайка	—	—	—	—	
	Mergus albellus Linn. . .	—	—	—	IV	15	—	—	
	„ merganser Linn. .	—	—	—	IV	10	—	—	
	Fuligula clangula Linn. .	III	23	—	—	—	—	—	
	„ cristata Leach. .	III	23	пара	—	—	—	—	
	Anas crecca Linn. . . .	III	22	—	—	—	—	—	
	„ boschas Linn. . .	III	14	пара	—	—	—	—	
	„ acuta Linn. . . .	IV	5	—	—	—	—	—	
	„ penelope Linn. . .	III	16	пара	—	—	—	—	
	Ciconia alba Briss. . . .	III	28	пара	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Ardea cinerea Briss. . .	IV	17	—	—	—	—	—	
	Tinnunculus alaudarius Briss.	III	23	1	—	—	—	—	
	Milvus ater Gm.	IV	3	—	—	—	—	—	
	Buteo vulpinus Licht. . .	III	28	1	—	—	—	—	
	Asio accipitrinus Pall. .	III	24	1	—	—	—	—	
	Coracias garrula Linn. .	IV	25	—	—	—	—	—	
	Upupa epops Linn. . . .	IV	9	стайка	—	—	—	—	
	Alauda arvensis Linn. .	II	26	—	III	11	—	съ SWW на NOO	Птицы летѣли небольшими стайками.
	„ arborea Linn. . .	III	10	—	III	14	—	—	
	Corvus frugilegus Linn. .	II	24	—	—	—	33	съ SW на NO и съ W на O	29. II наблюдались небольшія стайки; 3. III были замѣчены первыя стаи съ примѣсью галокъ; 11. III грачи уже заняли гнѣзда, но пролетъ продолжался; 28. III наблюдалась послѣдняя пролетная стая.
	Sturnus vulgaris Linn. .	II	26	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Emberiza schoeniclus Linn.	III	21	—	—	—	—	—	
	Fringilla coelebs Linn. .	III	11	—	—	—	—	—	
	Acanthis cannabina Linn.	III	3	нѣсколько стаекъ	—	—	—	съ SW на NE	
	„ linaria Linn. .	IV	4	—	—	—	—	—	
	Lanius excubitor Linn. .	III	19—24	—	—	—	—	—	Небольшой пролетъ.
	„ rapax Brehm. . .								
	Anthus arboreus Briss. .	IV	9	—	—	—	—	—	Самцы начали пѣть.
	„ pratensis Briss. .	III	16	—	—	—	—	—	
	Motacilla flava Linn. . .	IV	9	—	—	—	—	—	
	„ alba Linn. . .	III	11	—	—	—	—	—	
	Erithacus rubecula Linn.	III	21	—	—	—	—	—	Самцы пѣли.
	Ruticilla phoenicurus Linn.	IV	16	1	—	—	—	—	
	Turdus viscivorus Linn. .	III	3	1	—	—	—	—	
	„ musicus Linn. .	III	10	—	—	—	—	—	
	„ iliacus Linn. . .	IV	4	—	—	—	—	—	Были заняты станціи.
	„ pilaris Linn. . .	III	10	—	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: В. А. Меландеръ. Смоленская губернія, имѣніе „Милое“.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: Смоленская губернія, имѣніе „Милое“, расположенное въ 46—50 верстахъ къ SEE отъ Смоленска.

Весна 1912 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Larus ridibundus Linn. .	III	31	2 стаи особей по 60	—	—	—	съ N на S	
	Scolopax rusticola Linn.	III	21	—	—	—	—	—	
	„ major Gm. . .	III	23	—	—	—	—	—	
	„ gallinago Briss.	III	24	—	—	—	—	—	
	Totanus pugnax Briss. .	III	23	—	—	—	—	—	
	„ ochropus Linn. .	III	31	—	—	—	—	—	
	Numenius arquatus Linn.	III	31	—	—	—	—	—	
	Vanellus cristatus Meyer.	III	3	—	—	—	—	—	
	Grus cinerea Bechst. . .	III	17	—	—	—	—	—	
	Crex pratensis Bechst. .	V	5	—	—	—	—	—	
	Porzana maruetta Leach.	IV	8	—	—	—	—	—	
	Coturnix communis Bonnat.	V	3	—	—	—	—	—	Слышали „бой“.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Turtur auritus Gray. .	V	7	—	—	—	—	—	
	Columba palumbus Linn.	III	26	—	—	—	—	—	
	„ oenas Briss. . .	III	24	—	—	—	—	—	
	Anas circia Linn. . . .	III	22	—	—	—	—	—	
	„ boschas Linn. . .	III	15	—	—	—	—	—	
	Ciconia alba Briss. . . .	III	29	—	—	—	—	—	
	Botaurus stellaris Linn. .	IV	4	—	—	—	—	—	
	Pandion haliaëtos Linn. .	III	19	—	—	—	—	—	
	Tinnunculus alaudarius Briss.	III	29	—	—	—	—	—	
	Falco subbuteo Linn. . .	IV	4	—	—	—	—	—	
	Pernis apivorus Linn. . .	IV	5	—	—	—	—	—	
	Milvus ater Gm.	III	28	—	—	—	—	—	
	Buteo vulpinus Licht. . .	IV	9	—	—	—	—	—	
	Circus cyaneus Linn. . .	III	12	—	—	—	—	—	
	Cuculus canorus Linn. .	IV	15	—	—	—	—	—	Началось кукованіе.
	Jynx torquilla Linn. . .	IV	14	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Coracias garrula Linn.	IV	30	—	—	—	—	—	
	Caprimulgus europaeus Linn.	V	3	—	—	—	—	—	
	Cypselus apus Linn.	V	13	—	—	—	—	—	
	Upupa epops Linn.	IV	12	—	—	—	—	—	
	Alauda arvensis Linn.	II	26	—	—	—	—	—	
	„ arborea Linn.	III	19	—	—	—	—	—	
	Corvus frugilegus Linn.	II	25	—	—	—	—	—	
	Sturnus vulgaris Linn.	III	2	—	—	—	—	—	
	Emberiza schoeniclus Linn.	III	19	—	—	—	—	—	
	Fringilla coelebs Linn.	III	10	—	—	—	—	—	
	„ montifringilla Briss.	III	21	—	—	—	—	—	
	Carpodacus erythrinus Pall.	IV	14	—	—	—	—	—	
	Hirundo rustica Linn.	IV	13	—	—	—	—	—	
	Chelidon urbica Linn.	IV	29	—	—	—	—	—	
	Muscicapa grisola Linn.	V	5	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
	Oriolus galbula Linn. . .	V	8	—	—	—	—	—	
	Anthus arboreus Briss. .	IV	5	—	—	—	—	—	
	„ pratensis Briss. .	III	19	—	—	—	—	—	
	Motacilla flava Linn. . .	IV	9	—	—	—	—	—	
	„ alba Linn. . .	III	12	—	—	—	—	—	
	Acrocephalus phragmitis Bechst.	IV	5	—	—	—	—	—	
	Phylloscopus trochilus Linn.	IV	8	—	—	—	—	—	
	Phylloscopus collybita Vieill.	IV	5	—	—	—	—	—	
	Erithacus philomela Bechst.	IV	24	—	—	—	—	—	
	Erithacus rubecula Linn.	III	22	—	—	—	—	—	
	Saxicola oenanthe Linn.	IV	10	—	—	—	—	—	
	Accentor modularis Linn.	III	23	—	—	—	—	—	
	Merula merula Linn. . .	III	21	—	—	—	—	—	
	Turdus viscivorus Linn. .	III	12	—	—	—	—	—	
	„ iliacus Linn. .	III	21	—	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: 1) Борисъ Лазаревичъ Токарь. Николаевъ, Херсонской губ., Московская ул., 32, и 2) Георгій Петровичъ Ивановъ. Николаевъ, Херсонской губ., Рыбная ул., 10/2.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: Николаевъ, Херсонской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
Скворецъ	Sturnus.?	II	4	нѣсколько	II	25	—	—	Появившись скрылись, вѣроятно, вслѣдствіе наступившихъ вдругъ морозовъ. Появились вновь 18.II въ большомъ количествѣ.
Кряква	Anas boschas	III	3	много	III	10	—	—	
Чирокъ-свистунокъ .	„ crecca	III	3	много	III	10	—	—	
Чибисъ	Vanellus cristatus . . .	III	3	нѣсколько	—	—	—	съ Ю на С	
Горлица	Turtur auritus	III	3	2 особи	—	—	—	—	
Удодъ	Upupa epops	III	10	2 особи	—	—	—	—	
Гусь	Anser.?	III	10	около 140 особей; пять стай	III	20	—	съ ЮЗ на СВ	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
Журавль	Grus cinerea	III	12	20 особей	—	—	—	—	
Вальдшнепъ	Scolopax rusticola . . .	III	12	4 особи	—	—	—	—	Черезъ два дня пропали.
Дроздъ черный . . .	—	III	12	много	—	—	—	—	
„ рябинникъ .	—	III	17	много	—	—	—	—	
Аистъ бѣлый	Ciconia alba	IV	5	2 особи	—	—	—	съ Ю на С	
Трясогузка	Motacilla alba	—	—	—	III	17	—	—	
Сова ушастая . . .	Asio otus	III	16	нѣсколько	—	—	—	—	12. IV сѣли на яйца.
Жаворонокъ	Alauda.?	—	—	—	III	24	—	—	
Зимородокъ	—	IV	6	1	—	—	—	—	
Перепелка	Coturnix communis . .	IV	15	много	—	—	—	—	Летѣли ночью.
Ласточка городская.	Hirundo urbica	III	26	нѣсколько	III	27	—	—	

3. III зацвѣли желтые луговые цвѣточки изъ семейства чистиковыхъ. Кое-гдѣ на пахотной землѣ лежитъ въ ямахъ снѣгъ. Температура на солнцѣ + 13° R. Появились божьи коровки. 7. III показались фіалки.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Авксентій Степановичъ Рудневъ.
Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: ставка Ачикулакъ, Ставропольской губерніи, аулъ Шалашъ.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
Жаворонокъ степной.	—	II	21	18 особей	III	3	—	—	
Кряква	—	II	23	7 особей	III	6	—	—	
Скворецъ обыкновенный	—	—	—	3 особи	III	7	—	—	
Овсянка обыкновенная	—	II	24	3 особи	III	2	4	съ ЮЗ на СВ	
* Чибисъ	—	II	24	5 особей	III	4	7	съ Ю на С	
Чирокъ-свистунокъ .	—	II	25	9 особей	III	4	3	съ ЮЗ на СВ	
Жаворонокъ полевой.	—	II	25	14 особей	—	—	—	—	
Жаворонокъ малый .	—	—	—	8 особей	—	—	—	—	
Утка красная . . .	—	II	27	3 особи	—	—	—	—	
Дроздъ рябинникъ .	—	III	1	3 особи	—	—	—	—	
Гоголь	—	III	1	2 особи	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
* Казарка бѣлолобая.	—	—	—	—	III	4	2	съ Ю на С	
Чеканъ плясунъ . .	—	III	3	2 особи	—	—	—	—	
* Кроншнепъ большой	—	III	4	1 особь	III	9	5	съ ЮЗ на С	
Утка пѣганка . . .	—	III	5	2 особи	—	—	—	—	
Орелъ степной . . .	—	—	—	5 особей	—	—	—	—	
Нырокъ красноголовый	—	III	6	3 особи	—	—	—	—	
* Кречетка	—	III	7	4—7 особей	—	—	3—5	съ Ю на СВ	
* Ржанка	—	—	—	—	III	10	3—5	съ ЮЗ на СВ	
Коршунъ	—	III	8	4 особи	III	19	—	—	
Бекасъ	—	III	10	2 особи	—	—	—	—	
Поганка малая . . .	—	—	—	3 особи	—	—	—	—	
Улитъ большой . .	—	III	11	2 особи	—	—	—	—	
Удодъ	—	III	11	2 особи	—	—	—	—	
Стрепетъ	—	—	—	13 особей	III	19	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
Журавль красавка .	—	—	—	—	III	21	—	—	
Куликъ черныщъ . .	—	III	14	3 особи	—	—	2	—	
Клинтухъ	—	—	—	7 особей	III	20	4	—	
Зябликъ	—	III	15	23 особи	III	17	3	—	
Шилоклювка	—	III	21	7 особей	—	—	—	—	
Лунь степной . . .	—	—	—	2 особи	—	—	—	—	
Варакушка обыкновенная	—	III	22	2 особи	—	—	2	—	
Пѣночка желтобровая	—	III	27	5 особей	—	—	3	—	
Дроздъ пѣвчій . . .	—	III	28	3 особи	—	—	1	—	
Малиновка	—	—	—	1 особь	—	—	1	—	
Ходулочникъ . . .	—	III	28	15 особей	—	—	—	—	
Чеканъ черноголовый европейскій . . .	—	—	—	2 особи	—	—	—	—	
Ласточка деревенская	—	—	—	3 особи	IV	4	—	—	
Стрижъ земляной .	—	—	—	—	IV	9	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ?)		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.			
Пѣночка весничка .	—	IV	2	3 особи	—	—	2	—	
Чеканъ плѣшанка .	—	IV	8	1 особь	—	—	1	—	
Авдотка	—	IV	9	5 особей	—	—	—	—	
Каравайка	—	—	—	7 особей	—	—	—	—	
Пеликанъ кудрявый .	—	IV	11	2 особи	—	—	1	—	
Славка ястребиная .	—	—	—	3 особи	—	—	2	—	
Щурка золотистая .	—	IV	16	17 особей	—	—	—	—	
Сизоворонка	—	—	—	2 особи	—	—	—	—	
Овсянка черноголовая	—	IV	22	5 особей	—	—	—	—	
Сорокопутъ чернолобый	—	—	—	7 особей	—	—	—	—	
Скворецъ розовый .	—	—	—	—	IV	22	—	—	
Славка	—	—	—	3 особи	—	—	—	—	

Птицы, отмѣченныя звѣздочкой (*), летѣли широкимъ фронтомъ. 27. II—таяніе снѣга. 17. III—появленіе насѣкомыхъ. 2. IV—начало сокодвиженія растеній. 7. IV—распусканіе листьевъ. 8, 11 и 12. IV—заморозки. 13. IV—зацвѣли растенія. 13. V – первая гроза.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Петръ Григорьевичъ Емельяненко. Г. Кіевъ, Обсерваторный переулокъ, № 12, кв. 4.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: „Днѣпровская Біологическая станція". Наблюденія производились главнымъ образомъ въ окрестностяхъ станціи, у села „Вигуровка", Слободской волости, Остерскаго уѣзда, Черниговской губ.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.		
Клинтухъ	Columba oenas Briss.	II	18	4	II	—	—	съ ЮЗ на СВ
Жаворонокъ полевой .	Alauda arvensis Linn.	II	19	1 ♂	II	25	—	съ Ю на СВ
Зябликъ	Fringilla coelebs Linn.	II	23	—	II	27	—	—
Гуменникъ	Anser segetum Gm.	III	3	8	III	10	—	съ ЮЗ на СВ
Гусь сѣрый	„ cinereus Meyer.	III	3	15	III	10	съ начала марта по 1-ыя числа апрѣля	съ ЮЗ на СВ
Кряква	Anas boschas Linn.	III	3	отъ 2 до 30	III	7	съ 1-го по 25 марта	съ Ю на С
Свіязь	„ penelope Linn.	III	3	отъ 5 до 60	III	10	съ марта до средины апрѣля	съ Ю на СВ
Лутокъ	Mergus albellus Linn.	III	3	2—6	III	—	—	—
Чернь морская	Fuligula marila Linn.	III	3	1—20	III	18	до средины марта	съ Ю на СВ

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (вереловыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.		
Крохаль большой . . .	Mergus merganser Linn. . . .	III	3	2	III	—	до конца марта	съ Ю на СВ
Трясогузка бѣлая . . .	Motacilla alba Linn.	III	3	3	III	—	—	—
Пигалица	Vanellus cristatus Meyer. . . .	III	3	4	III	15	—	—
Зеленушка	Chloris chloris Briss.	III	5	1	III	9	—	—
Вальдшнепъ	Scolopax rusticola Linn. . . .	III	6	3	III	18	до конца марта	—
Шилохвость	Anas acuta Linn.	III	6	5	III	17	—	съ ЮЗ на СВ
Гоголь	Fuligula clangula Linn.	III	6	2	III	—	—	съ ЮЗ на В
Чирокъ свистунокъ . .	Anas crecca Linn.	III	6	12	III	15	—	—
„ трескунокъ . .	„ circia Linn.	III	7	8	III	20	—	—
Травникъ	Totanus calidris Linn. . . .	III	6	2	III	20	—	—
Дроздъ пѣвчій	Turdus musicus Linn.	III	6	1	III	21	—	—
„ черный	Merula merula Linn.	III	6	1	III	21	—	—
Скворецъ	Sturnus.?	III	6	6	III	16	—	—
Бекасъ	Scolopax gallinago Linn. . . .	III	8	1	III	18	—	—
Поганка большая . . .	Podiceps cristatus Linn. . . .	III	10	3	III	—	—	—

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.		
Чайка обыкновенная .	Larus ridibundus Linn.	III	10	1	III	17	—	съ Ю на СВ
Цапля сѣрая	Ardea cinerea Linn.	III	12	1	III	17	—	—
Аистъ бѣлый	Ciconia alba Briss.	III	13	5	III	—	—	—
Журавль сѣрый	Grus cinerea Bechst.	III	13	35	III	15	съ марта по 1-ыя числа апрѣля	съ ЮЗ на СВ
Пѣночка	Phylloscopus trochilus Linn. .	III	14	1	III	—	—	—
Чернь красноголовая .	Fuligula ferina Linn.	III	15	8	III	18	по конецъ марта	съ Ю на С
„ хохлатая	„ cristata Leach.	III	14	отъ 2 до 12	III	18	—	съ Ю на С
Широконоска	Anas clypeata Briss.	III	16	2	III	28	—	—
Куликъ чернышъ . . .	Totanus ochropus Linn. . . .	III	17	1	III	—	—	—
Коршунъ	Milvus ater Gm.	III	17	2	III	—	—	—
Завирушка	Accentor modularis Linn. . .	III	17	4	III	—	—	—
Пустельга	Tinnunculus alaudarius Briss. .	III	18	1	III	—	—	—
Лысуха	Fulica atra Linn.	III	18	2	III	20	—	—
Выпь большая	Botaurus stellaris Linn. . . .	III	18	1	III	20	—	—

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.		
Казарка бѣлолобая . .	Anser albifrons Scop.	III	18	12	III	—	—	—
Пѣночка теньковка . .	Phylloscopus collybita Vieill. .	III	21	2	III	—	—	—
Трясогузка желтая . .	Motacilla flava Linn.	III	22	1	III	27	—	—
Кроншнепъ большой . .	Numenius arquatus Linn. . . .	III	22	9	III	—	—	съ З на СВ
Зимородокъ	Alcedo ispida Linn.	III	20	1	III	—	—	—
Ремезъ	Aegithalus pendulinus Linn. . .	III	22	1	III	26	—	—
Удодъ	Upupa epops Linn.	III	24	2	III	26	—	—
Лунь полевой	Circus cyaneus Linn.	III	24	4	III	—	до средины апрѣля	съ З на СВ
Ласточка деревенская .	Hirundo rustica Linn.	III	24	12	III	27	—	—
Турухтанъ	Totanus pugnax Briss.	III	24	15	III	29	—	—
Перевозчикъ	„ hypoleucus Linn. . . .	III	24	2	III	—	—	—
Вертишейка	Jynx torquilla Linn.	III	27	1	III	—	—	—
Соловей	Erithacus philomela Bechst. . .	IV	2	1	IV	11	—	—
Зуекъ галстучникъ . .	Charadrius hiaticula Linn. . . .	IV	8	4	IV	12	—	—
Сиворакша	Coracias garrula Linn.	IV	3	5	IV	12	—	—

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.		
Камышевка барсучокъ .	Acrocephalus phragmitis Bechst.	IV	3	1	IV	—	—	—
Мухоловка бѣлошейка .	Muscicapa collaris Bechst. . .	IV	3	2	IV	—	—	—
Лунь камышевый . . .	Circus aeruginosus Linn. . . .	IV	3	1	IV	—	—	—
Чеглокъ	Falco subbuteo Linn.	IV	3	2	IV	12	—	—
Конекъ лѣсной	Anthus arboreus Briss.	IV	3	1	IV	—	—	—
Мухоловка пеструшка .	Muscicapa atricapilla Linn. . .	IV	3	5	IV	9	—	—
Варакушка	Erithacus suecicus Linn. . . .	IV	3	4	IV	10	—	—
Ласточка городская . .	Chelidon urbica Linn.	IV	11	5	IV	15	—	—
„ береговая . .	Cotile riparia Briss.	IV	11	12	IV	15	—	—
Кукушка	Cuculus canorus Linn.	IV	11	1	IV	15	—	—
Поганка ушастая . . .	Podiceps nigricollis C. L. Brehm.	IV	15	4	IV	—	—	—
Скопа	Pandion haliaëtos Linn.	IV	—	10	IV	15	—	—
Сорокопутъ чернолобый.	Lanius minor Gm.	IV	15	10	IV	18	—	—
Сорокопутъ-жуланъ . .	„ collurio Linn.	IV	18	1	IV	—	—	—
Крачка рѣчная	Sterna fluviatilis Naum.	IV	18	1	IV	22	—	—

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены.	Мѣсяцъ.	Число.		
Иволга	Oriolus galbula Linn.	IV	19	1	IV	27	—	—
Перепелка	Coturnix communis Bonnat. .	IV	19	1	IV	—	—	—
Клуша	Larus fuscus Linn.	IV	20	9	IV	23	—	—
Гагара чернозобая . . .	Colymbus arcticus Linn. . . .	IV	20	2	IV	—	—	—
Чернозобикъ	Tringa schinzii Br. [1])	IV	23	5	IV	—	—	—
Стрижъ	Cypselus apus Linn.	IV	23	3	IV	—	—	—
Горлица	Turtur auritus Gray	IV	19	2	IV	25	—	—

1) Жаль, что наблюдатель не упоминаетъ, былъ ли добытъ экземпляръ этой формы. Если опредѣленіе сдѣлано на разстояніи, т.-е. не по добытымъ экземплярамъ, то было бы болѣе основаній привести пролетающихъ въ Черниговской губерніи чернозобиковъ подъ именемъ Tringa alpina Linn.. *Ред.*

Съ половины февраля установилась теплая погода, земля отогрѣлась и изъ нея начали показываться побѣги нѣкоторыхъ растеній: подснѣжника, крапивы и друг.—21. II найденъ въ полномъ цвѣту подснѣжникъ; быстро пошелъ въ ростъ очитокъ ѣдкій.—23. II появились первыя бабочки: многоцвѣтницы и божьи коровки.—25. II температура воздуха по Ц.: 7 часовъ утра—0,0, 1 часъ дня—2,4 и 9 часовъ вечера—0,3; направленіе вѣтра соотвѣтственно времени дня СЗ, ЗСЗ и З.

3. III вскрылся Днѣпръ почти до Могилева. Въ послѣдніе дни установилась теплая погода. На кустахъ сирени, смородины и бузины зазеленѣли почки; показались бабочки лимонницы, крушинницы, клопы-солдатики и жужжелицы. Щуки начали метать икру. На освѣщенныхъ южныхъ склонахъ берега Днѣпра зацвѣла мать-мачеха.—4. III пылитъ лещина. Замѣчена первая летучая мышь. У березы наблюдается движеніе сока.—6. III замѣченъ шмель.—10. III температура въ полдень + 19° R. Зацвѣтаетъ сонъ. Показались побѣги хохлатки. Вылетѣли бабочки траурницы. Лягушки начали метать икру. Показались жерлянки.—17. III зацвѣтаетъ медуница и пахучая фіалка.—18. III въ полномъ цвѣту хохлатка; на бузинѣ открылись цвѣточныя почки, цвѣтетъ вязъ. Температура по Ц.: 7 часовъ утра—0,2, 1 часъ дня—8,8 и 9 часовъ вечера—5,0. Направленіе вѣтра ЮЮЗ.—20. III на многихъ деревьяхъ и кустахъ разворачиваются почки. Пролѣска въ полномъ цвѣту.—22. III зацвѣтаетъ трехцвѣтная фіалка (Иванъ-да-Марья).—27. III первый весенній громъ. Въ полномъ цвѣту болотная калужница, береза, пирамидальный тополь и кленъ. Ива покрылась листочками. Цвѣтетъ одуванчикъ. Зацвѣтаетъ абрикосъ. Груша покрылась листочками. У домашняго воробья и сѣрой вороны—полная кладка яицъ. Зацвѣтаетъ первоцвѣтъ.

5. IV вечеромъ появились въ огромномъ количествѣ майскіе жуки (хрущи). Начали метать икру древесницы. Въ гнѣздѣ сороки яица, а у вороны птенцы стали покрываться перьями.—6. IV отцвѣтаетъ сонъ. Выползли изъ своихъ гнѣздъ ужи.—8. IV цвѣтутъ груша, вишня и миндаль (Prunus). Вылетѣли бабочки авроры.—11. IV запѣлъ соловей.—16. IV зацвѣтаетъ яблоня, сирень и конскій каштанъ.

Отъ редакціи.—Von der Redaktion.

Въ послѣднее время редакціей было получено отъ орнитологовъ-иностранцевъ не мало писемъ съ выраженіемъ сожалѣнія, что „Орнитологическій Вѣстникъ", печатающійся лишь на одномъ русскомъ языкѣ, почти совершенно не распространенномъ внѣ предѣловъ Россіи, остается не доступнымъ для огромнаго большинства лицъ, работающихъ за границею надъ птицами той же палеарктической области. При этомъ нѣкоторые указывали на необходимость изданія журнала параллельно на двухъ языкахъ—на русскомъ и на какомъ-либо изъ западно-европейскихъ.

Цѣлесообразность подобнаго изданія очевидна, но на него у насъ нѣтъ въ настоящее время ни средствъ, ни досуга. Однако, не признавать полную обоснованность заявленій иностранныхъ орнитологовъ редакція не можетъ и, потому, не находя возможнымъ брать на себя отвѣтственность за пересказъ чужихъ мыслей, вынуждена теперь поставить непремѣннымъ условіемъ печатанія статей въ „Орнитологическомъ Вѣстникѣ" снабженіе каждой рукописи хотя бы самымъ краткимъ авторскимъ резюме на одномъ изъ западно-европейскихъ языковъ.

Хроника.—Chronik.

Къ изслѣдованію озера Марка-куль.—А. Н. Сѣдельниковъ по порученію Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества лѣтомъ 1912 года производилъ изслѣдованіе Марка-куля. Экспедиція направилась изъ станицы Алтайской черезъ Сарымсактинскій перевалъ къ деревнѣ Нижней Еловкѣ на сѣверномъ берегу озера, откуда двинулась берегомъ на востокъ до устья рѣчки Урянхайки и отсюда по южному берегу до истока Кальджира, гдѣ и были закончены работы. Обратный путь былъ сдѣланъ той же дорогою въ станицу Алтайскую. На озерѣ произведены промѣры, измѣренія температуры и прозрачности воды, сборы ботаническихъ, зоологическихъ и петрографическихъ коллекцій, записи различныхъ наблюденій и свѣдѣній о рыболовствѣ, земледѣліи и проч. Работы не закончены: остается изслѣдовать сѣверо-западный уголъ озера. А. Н. Сѣдельниковымъ между прочимъ была сдѣлана экскурсія въ сосѣднюю долину рѣки Кабы для выясненія ея связи съ Маркакульской котловиной.

* * *

Къ изслѣдованію низовьевъ Оби и Обской губы.—И. Н. Шуховъ (членъ-сотрудникъ Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества) лѣтомъ 1912 года во второй разъ ѣздилъ въ низовья Оби и въ Обскую губу. Маршрутъ поѣздки: Омскъ, Тобольскъ, д. Сузгунъ, с. Самаровское, Березовъ, Обдорскъ и Хэ. Въ Обской губѣ, кромѣ Хэ, были посѣщены острова: Нижній, Лай, Мура, Орни, Юба, Наречи, Худобэ, Яюсале, промыслы Ярцинга и устье Ныды. Въ числѣ собраннаго экскурсантомъ матеріала имѣется между прочимъ 70 шкурокъ птицъ.—Экспедиція для сбора коллекцій въ Обской губѣ была снаряжена Тобольскимъ музеемъ.

* * *

Къ изслѣдованію Печоры.—Лѣтомъ текущаго (1913) [1]) года было предположено произвести экономическое обслѣдованіе, сборъ зоологическихъ и ботаническихъ коллекцій, метеорологическія наблюденія и геологическое обслѣдованіе въ сѣверо-восточной части Печорскаго уѣзда, Архангельской губерніи, и водораздѣла рѣкъ Печоры и Оби, для чего соорганизовалась экспедиція на средства, предложенныя Н. А. Шаховымъ. Въ снаряженіи экспедиціи приняли участіе Академія Наукъ, Московское Общество Испытателей Природы, Главная Физическая Обсерваторія и Лѣсной Департаментъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія. Ближайшее участіе въ организаціи экспедиціи принимали профессоръ М. А. Мензбиръ и В. А. Дейнега.

* * *

Къ охранѣ природы.—Въ „Трудахъ 8-го международнаго съѣзда зоологовъ въ Грацѣ 1910 года", вышедшихъ въ свѣтъ въ предшествующемъ году, напечатана рѣчь извѣстнаго швейцарскаго зоолога и путешественника П. Саразена, озаглавленная „Weltnaturschutz". Посвящена она вопросу охраны животнаго и растительнаго міра и можетъ быть интересной не только для спеціалиста-естественника, но и для каждаго любителя природы. Авторъ въ рѣчи этой указываетъ, между прочимъ, что забота объ охранѣ живой природы—обязанность каждаго біолога. П. Саразенъ полагаетъ, что уже давно настало время защищать отъ истребленія арктическую и антарктическую животную жизнь и предлагаетъ сдѣлать изъ Шпицбергена (эта группа острововъ еще не присоединена ни къ одному государству) такую землю, гдѣ не нарушалось бы естественное соотношеніе животнаго и растительнаго міра.—По иниціативѣ П. Саразена на Съѣздѣ была образована международная коммиссія изъ членовъ, при чемъ на каждаго изъ послѣднихъ была возложена обязанность хлопотать и дѣйствовать въ соотвѣтственныхъ государствахъ въ интересахъ охраненія природы.

— Въ 1911 году г. Окуличемъ, управляющимъ Государственными Имуществами Енисейской губерніи, былъ составленъ проектъ устройства заповѣднаго зоопромышленнаго парка въ 200.000 де-

[1]) По сообщенію „Русскихъ Вѣдомостей".

сятинъ въ Минусинскомъ уѣздѣ, при чемъ было высчитано, что единовременныхъ затратъ на это дѣло потребуется до 17.000 рублей, а ежегоднаго расхода—до 10.000 рублей.—„Западно-Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ выпускѣ 1-мъ перваго тома „Извѣстій“ высказываетъ пожеланіе, чтобы заповѣдные участки были учреждены и въ степныхъ областяхъ, гдѣ „они особенно необходимы, такъ какъ, благодаря значительной колонизаціи, измѣненіе во флорѣ и фаунѣ совершается быстро и въ значительной степени“. По мнѣнію Отдѣла, такими заповѣдными „участками могли бы быть теперешніе оазисы степи—Кокчетавскія горы и Каркаралинскія, самой природой предназначенныя для такой роли“.

Отъ постоянной Природоохранительной Коммиссіи при Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ.—Императорское Русское Географическое Общество, изучая уже болѣе 60 лѣтъ наше отечество, неоднократно констатировало въ своихъ научныхъ трудахъ тѣ большія измѣненія въ его природѣ, которыя происходятъ подъ вліяніемъ культуры.—Въ многочисленныхъ изслѣдованіяхъ О-ва имѣется длинный рядъ описаній и замѣтокъ, указывающихъ на исчезаніе первобытныхъ лѣсовъ, степей, скалъ и проч., или на коренное измѣненіе ихъ характера. Подъ натискомъ культуры исчезаютъ не только отдѣльныя животныя и растенія, но грозятъ исчезнуть даже цѣлыя географическія явленія и среди нихъ прежде всего такія, какъ дѣвственныя ковыльныя степи, сосновые боры на мѣловыхъ горахъ и другія, которыя въ предѣлахъ Европы уцѣлѣли до сихъ поръ только на необъятныхъ пространствахъ нашей родины и, исчезнувъ на ней, останутся вѣчной загадкой для грядущихъ поколѣній. А между тѣмъ каждая изъ такихъ загадокъ является большимъ тормозомъ для развитія географическихъ дисциплинъ и основывающихся на нихъ практическихъ мѣропріятій, ибо полное познаніе настоящаго состоянія различныхъ формъ земной поверхности и предвидѣніе ихъ измѣненій въ будущемъ, крайне важное и для раціональной эксплоатаціи ихъ, невозможно безъ пониманія прошлаго этихъ географическихъ явленій.—Въ Европѣ и особенно въ Америкѣ уже давно сознана вся важность и необходимость сохраненія въ неприкосновенномъ видѣ наиболѣе интересныхъ и важныхъ уча-

стковъ нетронутой природы. Совокупными усиліями многочисленныхъ союзовъ, обществъ и правительства образовано, выдѣлено и дѣятельно охраняется и изучается большое число „памятниковъ природы", начиная съ колоссальныхъ по площади и затратамъ національныхъ парковъ Сѣверной Америки и кончая даже отдѣльными деревьями и камнями въ Германіи.—„Россія не можетъ не примкнуть къ этому широкому движенію, охватившему Западную Европу", говоритъ въ статьѣ „Охрана памятниковъ природы" одинъ изъ иниціаторовъ этого дѣла въ Россіи, академикъ И. П. Бородинъ: „это нашъ нравственный долгъ передъ родиной, человѣчествомъ и наукой. Мы уже поняли необходимость охранять памятники нашей старины; пора намъ проникнуться сознаніемъ, что важнѣйшими изъ нихъ являются остатки той природы, среди которой когда-то складывалась наша государственная мощь, жили и дѣйствовали наши предки. Растерять эти остатки было бы преступленіемъ".—„Сколько бы защитныхъ участковъ ни устроили у себя наши сосѣди, они не въ состояніи замѣнить нашихъ будущихъ заповѣдниковъ. Раскинувшись на огромномъ пространствѣ въ двухъ частяхъ свѣта, мы являемся обладателями въ своемъ родѣ единственныхъ сокровищъ природы. Это такія же уники, какъ картины, напримѣръ, Рафаэля, — уничтожить ихъ легко, но возсоздать нѣтъ возможности."—„Созданіе защитныхъ участковъ чрезвычайно важно и въ цѣляхъ педагогическихъ, такъ какъ обезпечиваетъ наличность объектовъ для нагляднаго изученія природы. Что касается строго научнаго значенія защитныхъ участковъ, то едва ли стоитъ о немъ распространяться. Такіе участки сохраняютъ намъ объекты для дальнѣйшаго, часто едва начатаго, изслѣдованія, и даютъ незамѣнимый матеріалъ для рѣшенія многихъ спорныхъ вопросовъ ботанической географіи, выдвинутыхъ наукою въ послѣднее время, какъ, напримѣръ, вопросъ о естественной смѣнѣ растительныхъ формацій, о роли человѣка и т. п."—„Медлить съ этимъ дѣломъ нельзя въ виду особыхъ условій, въ которыхъ находится наша страна именно въ настоящую эпоху усиленнаго землеустройства и переселенія. Неотложнымъ является, напримѣръ, образованіе степныхъ заповѣдныхъ участковъ. Степные вопросы—это наши, чисто русскіе вопросы, между тѣмъ именно степь, дѣвственную степь, мы рискуемъ потерять скорѣе всего. Въ научномъ отношеніи, конечно, не менѣе важны защитные участки въ лѣсахъ различныхъ типовъ"...—Послѣ доклада академика И. П. Бородина, изложеннаго

въ упомянутой статьѣ, Императорское Русское Географическое Общество учредило особую Постоянную Природоохранительную Коммиссію съ цѣлью возбуждать интересъ въ широкихъ слояхъ населенія и у правительства къ вопросамъ объ охраненіи памятниковъ природы Россіи и осуществлять на дѣлѣ сохраненіе въ неприкосновенности отдѣльныхъ участковъ или цѣлыхъ мѣстностей, а также и отдѣльныхъ видовъ растеній и животныхъ, важныхъ въ научномъ отношеніи.—Глубоко убѣжденная въ томъ, что ея задачи не могутъ не быть дороги каждому, любящему свое отечество, Постоянная Природоохранительная Коммиссія обращается ко всѣмъ съ горячимъ призывомъ принять посильное участіе въ этомъ національномъ дѣлѣ, сохраненія природы родного края, въ которое каждый можетъ и долженъ внести свою лепту.—Пропаганда любви и бережливаго отношенія къ окружающей насъ природѣ, ея животнымъ, растеніямъ, скаламъ и проч., описаніе и фотографированіе интересныхъ участковъ природы, видовъ растеній и животныхъ и даже замѣчательныхъ чѣмъ-либо экземпляровъ ихъ и затѣмъ доведеніе до свѣдѣнія Коммиссіи объ этомъ представляется дѣломъ, доступнымъ каждому, и въ то же время наиболѣе обезпечивающимъ осуществленіе задачъ и желаній Коммиссіи. За всякія сообщенія такого рода и присылку соотвѣтствующихъ описаній и фотографій Коммиссія будетъ глубоко признательна.—Всѣхъ, интересующихся дѣломъ сохраненія природы, Коммиссія приглашаетъ обращаться за справками, литературой, указаніями, совѣтами и пр. по адресу: Императорское Русское Географическое Общество, Природоохранительная Коммиссія, Демидовъ пер., домъ № 8а, С.-Петербургъ.

29-го апрѣля 1913 года въ старой большой аудиторіи Политехническаго музея состоялось публичное засѣданіе Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, въ которомъ между прочимъ было доложено: *Д. Н. Анучинымъ*—„Объ охранѣ памятниковъ природы“ и *Н. А. Шиловымъ*—«О „національныхъ паркахъ“ и „національныхъ памятникахъ“ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки».

Вопросъ объ охранѣ птицъ на Общемъ Собраніи Международнаго Сельскохозяйственнаго Института въ Римѣ въ 1913 году [1]).— По вопросу 2-му программы послѣдняго общаго собранія Международнаго Сельскохозяйственнаго Института въ Римѣ объ охранѣ полезныхъ для сельскаго хозяйства птицъ, разсматривавшемуся въ III коммиссіи (Renseignements agricoles et Maladies des Plantes) было представлено два доклада: делегатомъ Венгріи г. Miklòs de Miklòsvár и делегатомъ Россіи А. А. Силантьевымъ.

Г. Миклосъ, докладчикъ постояннаго комитета, ссылаясь на постановленія 2 общаго собранія Института въ 1911 году о необходимости собирать, черезъ посредство комитета, свѣдѣнія о всѣхъ мѣропріятіяхъ, принимаемыхъ разными государствами земного шара по вопросу объ охранѣ полезныхъ птицъ, сдѣлалъ въ своемъ докладѣ сводку всего полученнаго матеріала. Изъ этого доклада мы узнаемъ, что ко времени созыва общаго собранія въ 1911 году 20 государствъ уже имѣли законы для охраны полезныхъ птицъ, при чемъ въ трехъ изъ нихъ таковые получили свой починъ вслѣдствіе постановленій перваго общаго собранія Института 1909 года. Въ промежутокъ времени между вторымъ и третьимъ общими собраніями, т.-е. въ теченіе 1911 и 1912 годовъ, законы объ охранѣ полезныхъ птицъ были изданы еще въ пяти государствахъ, а именно: въ Австріи, Британской Индіи, Нидерландахъ, Швеціи и Египтѣ. Во многихъ же другихъ государствахъ, уже имѣвшихъ подобные законы послѣдніе за это время пополнялись спеціальными общаго характера распоряженіями и постановленіями, при чемъ г. Миклосомъ приведены данныя о 14 государствахъ, а именно: Германіи, Венгріи, Бельгіи, Даніи, Испаніи, Франціи, Тунисѣ, Греціи, Великобританіи, Австраліи, Южной Африкѣ, Италіи, Японіи и Швейцаріи.

Приступивъ къ чтенію резолюцій по вопросу объ охранѣ полезныхъ птицъ, г. Миклосъ выразилъ чувство полнѣйшаго удовлетворенія по поводу того, что и Россія откликнулась, наконецъ, на приглашеніе принять участіе въ общей работѣ по охранѣ птицъ и что изъ доклада русскаго делегата онъ узналъ о новомъ законопроектѣ объ охотѣ въ Россіи, нѣкоторыя статьи котораго оказываются даже строже соотвѣтствующихъ положеній Парижской конвенціи 1902 года.

---

[1]) Изъ № 29 „Извѣстій Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія“ за 1913 годъ.

Докладъ русскаго делегата А. А. Силантьева „Охрана птицъ въ Россіи“ посвященъ выясненію естественноисторическихъ и культурно-бытовыхъ условій нашего отечества, въ связи съ тѣми мѣропріятіями, при помощи которыхъ осуществляется въ настоящее время охрана птицъ въ Россіи и предполагается реформировать ее въ ближайшемъ будущемъ по новому законопроекту объ охотѣ. Основныя положенія доклада были предложены на обсужденіе III коммиссіи въ видѣ слѣдующихъ тезисовъ:

1. Промыслово-охотничьи районы Европейской и Азіатской Россіи, въ силу особенностей быта населенія, являются какъ бы естественными заповѣдниками для мелкихъ неохотничьихъ птицъ, въ предѣлахъ которыхъ онѣ могутъ безпрепятственно размножаться, не подвергаясь преслѣдованію со стороны человѣка.

2. Большинство видовъ птицъ, служащихъ предметомъ промысла, ведетъ осѣдлый образъ жизни или въ значительной своей массѣ за предѣлы Россіи не улетаетъ, почему и не представляетъ интереса съ международной точки зрѣнія.

3. Русское населеніе въ своей главной массѣ не привыкло употреблять въ пищу мелкихъ неохотничьихъ птицъ и массоваго промысла съ этой цѣлью въ Россіи не существуетъ. Незначительное количество мелкихъ птицъ, предъявляемое на рынкахъ въ большихъ городахъ, относится къ сѣвернымъ, преимущественно растительноядным видамъ птицъ, зимующимъ въ умѣренныхъ широтахъ, каковы: *свиристели, снѣгири, подорожники, рябинники* и другіе, не играющимъ сколько-нибудь замѣтной роли въ сельскомъ хозяйствѣ русскаго сѣвера.

4. Причинами исчезновенія мелкихъ неохотничьихъ видовъ птицъ въ Россіи являются: a) разореніе гнѣздъ бродячими кошками, собаками и ребятами; b) уничтоженіе, подъ вліяніемъ культуры, мѣстъ удобныхъ для гнѣздованія въ связи съ отсутствіемъ мѣръ ухода за птицами; c) безпорядочное птицеловство для содержанія птицъ въ неволѣ; d) массовое истребленіе мелкихъ птицъ на пути ихъ пролета и въ мѣстахъ зимовокъ въ южныхъ странахъ Западной Европы; e) нарождающійся въ Россіи, подъ вліяніемъ требованій моды и рынка, вредный промыселъ массоваго истребленія всевозможныхъ неохотничьихъ птицъ для дамскихъ нарядовъ и прочихъ украшеній, не предусмотрѣнный дѣйствующимъ закономъ объ охотѣ.

5. Для парализованія причинъ, изложенныхъ въ пунктахъ a), c) и e) предыдущаго отдѣла, русскимъ правительствомъ вклю-

чены въ проектъ новаго закона объ охотѣ, находящійся на разсмотрѣніи законодательныхъ учрежденій, нижеслѣдующія положенія [1]): a) законъ объ охотѣ предполагается распространить на всю Имперію; b) воспрещается разореніе гнѣздъ и уничтоженіе птенцовъ ихъ, за исключеніемъ птицъ, признаваемыхъ мѣстными охотничьими комитетами вредными, или гнѣздящихся на усадьбахъ; c) воспрещается примѣненіе самоловныхъ приборовъ и какихъ бы то ни было способовъ массоваго добыванія всякаго рода звѣрей и птицъ, какъ охотничьихъ, такъ и неохотничьихъ; d) птицеловство для содержанія птицъ въ неволѣ дозволяется только по особымъ свидѣтельствамъ, стоимостью въ 3 рубля, выдаваемымъ подходящимъ для того лицамъ мѣстными охотничьими комитетами; e) воспрещается покупать, продавать, переводить и вывозить за границу мелкихъ птицъ за исключеніемъ дроздовъ и свиристелей какъ для ѣды, такъ и въ видѣ шкурокъ и частей ихъ для украшеній; исключенія возможны только въ интересахъ научныхъ; f) вслѣдствіе крайняго разнообразія природныхъ и экономическихъ условій Россіи составленіе списковъ птицъ особенно полезныхъ и особенно вредныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ, общаго для всей территоріи, невозможно. Этотъ вопросъ по новому закону объ охотѣ предполагается разрѣшить такимъ образомъ, что мѣстные охотничьи комитеты, при участіи представителей интересовъ сельскаго и лѣсного хозяйства, будутъ сами признавать однихъ звѣрей и птицъ подлежащими особой охранѣ, а другихъ—истребленію; g) основной запретный срокъ для добыванія всѣхъ звѣрей и птицъ, не имѣющихъ спеціальныхъ запретныхъ сроковъ, будетъ съ 1 февраля по 15 іюля, а для птицеловства и ловли дичи для разведенія—съ 1 февраля по 15 августа; h) воспрещается перевозить и продавать дичь (за исключеніемъ большихъ городовъ, гдѣ устанавливаются для этого особыя правила регистраціи и опломбированія дичи) черезъ 15 дней послѣ наступленія запретнаго для охоты на нее срока; i) въ виду важнаго значенія для Россіи торговли дичью, перевозка таковой, добытой въ законное время и надлежащимъ способомъ зарегистрированной, дозволяется во всякое время года.

Г. Лоръ, предсѣдатель III коммиссіи по вопросу объ охранѣ полезныхъ птицъ, докладывая общему собранію о ходѣ занятій

---

[1]) Вполнѣ соотвѣтствующія аналогичнымъ статьямъ Парижской конвенціи 1902 года для охраны полезныхъ въ с.-хоз. отношеніи птицъ.

заявилъ: „Третья коммиссія ознакомилась съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія съ интереснымъ докладомъ г. Miklòs de Miklòsvár, делегатомъ Венгріи, доказывающимъ, что усилія Института въ этой области увѣнчались успѣхомъ. Этотъ докладъ былъ дополненъ во время засѣданія заслуживающимъ особаго вниманія сообщеніемъ русскаго делегата г. Силантьева, ознакомившаго насъ съ положеніемъ этого вопроса въ Россіи".

Затѣмъ имъ были прочитаны нижеслѣдующія резолюціи, предложенныя постояннымъ комитетомъ и единогласно принятыя общимъ собраніемъ:

I. Общее собраніе удостовѣряетъ съ чувствомъ удовлетворенія, что многія государства признали необходимымъ принять въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ мѣры къ охранѣ полезныхъ птицъ, что свидѣтельствуетъ о реальныхъ результатахъ дѣятельности Института въ этой области.

II. Принимая во вниманіе, что предстоитъ еще много усилій для созданія, согласно пожеланіямъ общаго собранія 1911 года, всеобщей солидарности между разными странами въ дѣлѣ охраны полезныхъ птицъ, общее собраніе поручаетъ постоянному комитету продолжать свою пропаганду среди входящихъ въ соглашеніе правительствъ и представить по этому вопросу докладъ слѣдующему общему собранію.

Выставка охраны природы.—Харьковское О-во Любителей Природы въ интересахъ пропаганды идеи охраны природы организуетъ въ г. Харьковѣ предстоящей осенью выставку охраны природы и надѣется, что всѣ лица, общества и учрежденія, которыя сочувствуютъ этой идеѣ, откликнутся на нее посильнымъ участіемъ.—Задача выставки наглядно показать: I) какъ человѣкъ своей дѣятельностью прямо и косвенно измѣняетъ, искажаетъ и уничтожаетъ природу; II) почему природа должна быть охраняема; III) что дѣлается съ этой цѣлью за границей; IV) что сдѣлано въ Россіи въ томъ же направленіи и что должно быть сдѣлано.—Адресъ для справокъ, разъясненій и присылки экспонатовъ: Харьковъ, Чернышевская, 82, прив.-доценту Валерію Ивановичу Таліеву, предсѣдателю О-ва.

*
* *

Къ свѣдѣнію собирающихъ оологическія коллекціи.—К. И. Скрябинъ, интересуясь патологіей птичьихъ яицъ вообще и куриныхъ въ частности, обращается съ покорнѣйшей просьбой къ лицамъ, собирающимъ оологическія коллекціи, въ случаѣ если имъ попадутся яица съ какими-либо ненормальностями въ формѣ, величинѣ и проч., присылать ихъ ему (за его счетъ) для обработки, послѣ чего они будутъ имъ возвращены владѣльцамъ съ благодарностью. Адресъ К. И. Скрябина: гор. Ауліэата, Сыръ-Дарьинской области, ветеринарному врачу Константину Ивановичу Скрябину.

* * *

Новыя изданія Департамента Земледѣлія.—Департаментомъ Земледѣлія выпущены въ свѣтъ слѣдующія новыя изданія: монографіи завѣдывающаго Бюро по энтомологіи Ученаго Комитета, г. Порчинскаго—1) „Овечій оводъ, его жизнь, свойства, способы борьбы съ нимъ и отношеніе его къ человѣку“ (цѣна 15 к.),—2) „Наши божьи коровки и ихъ хозяйственное значеніе“ (цѣна 20 к.),—3) „Домовая муха, ея значеніе для человѣка и его хозяйства и отношеніе ея къ комнатной мухѣ“ (цѣна 10 к.) и—4) „Насѣкомыя, вредящія хлѣбному зерну въ амбарахъ и складахъ. Жуки, бабочки, клещи“ (цѣна 10 к.); брошюра старшаго спеціалиста департамента по прикладной энтомологіи, г. Васильева—5) „Вредная черепашка и новые методы борьбы съ нею при помощи паразитовъ изъ міра насѣкомыхъ“ (цѣна 10 к.); брошюра старшаго спеціалиста по борьбѣ съ вредителями сельскаго хозяйства г. Шрейнера—6) „Древесница въѣдливая и древоточецъ пахучій, вредъ ихъ въ садоводствѣ и борьба съ ними“ (цѣна 5 к.); монографія г. Якобсона—7) „Термиты, ихъ жизнь, приносимый ими вредъ и способы ихъ уничтоженія“ (цѣна 25 к.) и плакатъ г. Бондарцева—8) „Американская мучнистая роса крыжовника“ (цѣна 5 к.).

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества могутъ получить по 1 экземпляру этихъ изданій безплатно, при чемъ съ просьбами о снабженіи ихъ таковыми имъ надлежитъ обращаться непосредственно къ мѣстному инспектору сельскаго хозяйства, правительственному агроному или завѣдывающему энтомологической станціей, коими эти изданія будутъ предоставляться также и мѣстнымъ казеннымъ или субсидируемымъ казною учебнымъ и опытнымъ и т. п. учрежде-

ніямъ. Прочимъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ, могущимъ содѣйствовать ознакомленію населенія съ ролью термитовъ въ сельскомъ хозяйствѣ и съ мѣрами борьбы съ означенною болѣзнью крыжовника, съ просьбами о высылкѣ этихъ изданій надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія, коимъ такого рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по мѣрѣ возможности.

Библіографія.—Bibliographie.

Враги птицеводства. По личному опыту и наблюденіямъ составилъ П. П. баронъ фонъ-Винклеръ. Безплатное приложеніе къ журналу „Сельскій Хозяинъ“ за 1913 годъ. СПБ. Годъ изданія не обозначенъ. 120 страницъ.

Настоящая книжка представляетъ собою описаніе различныхъ вредныхъ въ птицеводствѣ млекопитающихъ и птицъ а также способовъ и приборовъ для ихъ истребленія. Останавливаться на отдѣлѣ, посвященномъ звѣрямъ, мы, конечно, здѣсь не можемъ. Скажемъ только, что въ разрядъ „вредителей“ птицеводства, подлежащихъ обязательному и безпощадному истребленію, попали всѣ представители Carnivora. Разбора тутъ не дѣлалось: разъ звѣрь принадлежитъ къ „хищнымъ“, стало быть онъ—„вредитель“, а потому истребляйте его! Расчлененія животныхъ съ точки зрѣнія ихъ вредоносности для разведенія птицъ на вредителей постоянныхъ, такъ сказать, систематическихъ, и случайныхъ авторомъ не сдѣлано: волкъ, хорекъ, куницы и маленькія куторы свалены въ одну кучу и всѣ одинаково „повинны смерти“. Насколько это правильно хотя бы только съ точки зрѣнія біологіи этихъ звѣрей, говоритъ, конечно, нечего.

Рекомендація этой неразборчиво-безсмысленной кровожадности особенно бьетъ въ глаза во второмъ отдѣлѣ книги, посвященномъ „вреднымъ“ птицамъ. Ястреба, орлы, соколы, сорокопуты, вороны, сороки, рѣчная скопа, коршуны, луни—„всѣмъ смерть“! Описанія различныхъ, подчасъ самыхъ варварскихъ, капкановъ и ловушекъ сдѣланы съ обстоятельностью, достойною лучшаго примѣненія, и богато иллюстрированы ясными и хорошими рисунками. Но, къ сожалѣнію, кругозоръ автора замкнутъ въ узкомъ горизонтѣ птичника, и расцѣнивать хозяйственное значеніе птицъ иначе, какъ съ точки зрѣнія слишкомъ чадолюбивой и трусливой

насѣдки, онъ не въ состояніи. Что это именно такъ, тому слѣдуютъ пункты. Возьмемъ, напримѣръ, сороку.

Въ обзорѣ птицъ съ хозяйственно-экономической, болѣе широкой, чѣмъ у нашего автора, точки зрѣнія, принадлежащему перу такого натуралиста, какъ А. А. Браунеръ [1]), сорока отнесена къ „полувреднымъ“ птицамъ. И по свидѣтельству нашего автора выходитъ, что весь „вредъ“ отъ сороки исчезаетъ въ птичникѣ, если „не открывать настежъ дверей“ (стр. 109)! Такъ мало нужно сдѣлать, чтобъ избавиться отъ нея. Къ чему же тогда описывать десятки ловушекъ для сорокъ и обрекать ихъ на обязательную смерть?..

Говорить же о сорокопутѣ, какъ о „вредителѣ“, просто смѣшно. А. А. Браунеръ относитъ его къ птицамъ „полезнымъ“ (стр. 6). Впрочемъ и пищуху можно объявить „вредной“ для цыплятъ только потому, что она для нихъ безполезна и безразлична!..

Скопа—„вредитель“ настолько ничтожный, что „объ истребленіи ея нечего и думать“, говоритъ А. А. Браунеръ (стр. 6). Нашъ авторъ, однако, думаетъ иначе!..

Истребленію вороны, какъ очень большого „вредителя“, П. П. баронъ фонъ-Винклеръ отводитъ очень много мѣста и иллюстрируетъ свое изложеніе отвратительными картинками поголовной бойни воронъ, почему-то имъ мягко называемой „охотой“. Чтобы не говорить много, укажемъ автору на обстоятельное изслѣдованіе содержимаго желудковъ воронъ, произведенное І. К. Пачоскимъ [2]). Результаты этого изслѣдованія выражены почтеннымъ изслѣдователемъ въ слѣдующихъ словахъ: „я полагалъ бы возможнымъ рекомендовать воздержаться отъ уничтоженія воронъ, и это тѣмъ болѣе, что ворона (какъ равно и грачъ) имѣетъ немаловажное значеніе въ роли санитара, т.-е. очистителя, поѣдающаго различныя нечистоты“. Надо при этомъ замѣтить, что І. К. Пачоскій очень строго расцѣниваетъ птицъ съ хозяйственно-экономической стороны; поэтому его замѣчаніе приходится почитать весьма вѣскимъ.

Приведенные примѣры мы считаемъ вполнѣ достаточнымъ доказательствомъ того сумбурнаго, въ смыслѣ узкой хозяйственно-

---

[1]) „О вредныхъ и полезныхъ птицахъ Бессарабской губерніи“. Изданіе Бессарабскаго Губернскаго Земства. Кишиневъ, 1912 г. *Авт.*

[2]) І. К. Пачоскій: „Матеріалы по вопросу о сельско-хозяйственномъ значеніи птицъ“ (Изданіе Херсонскаго Губернскаго Земства. Херсонъ, 1909 г.), стр. 32—33. *Авт.*

экономической расцѣнки птицъ, характера, какой носитъ книжка П. П. барона фонъ-Винклера. „Все, что пролетаетъ въ предѣлахъ горизонта курятника, подлежитъ обязательному истребленію“, такъ ее можно смѣло резюмировать. Но вѣдь за предѣлами курятника есть еще міръ, очень большой и стоющій не меньшаго вниманія: это—вся мать-природа. Взаимоотношенія различныхъ группъ животныхъ, существующихъ въ ней, такъ сложны и такъ взаимно переплетаются, а хозяйственное значеніе обреченныхъ нашимъ авторомъ на смерть воронъ и сорокопутовъ въ ней такъ велико и цѣнно, что положительно удивляешься узости кругозора автора и его полному незнакомству съ литературой о сельскохозяйственномъ значеніи птицъ. Если же принять во вниманіе, что послѣдній вопросъ у насъ еще мало разработанъ, то рецензируемую книжку приходится просто признать вредной. Впрочемъ, у насъ все творится странно: одной рукой мы щедро разбрасываемъ воззванія и книжонки à la Берлепшъ, а другой—ставимъ силки и капканы!..

Далѣе, г.г. истребители часто не умѣютъ „различать враговъ отъ друзей“, какъ говоритъ нашъ авторъ, и бьютъ вмѣсто воронъ грачей и т. п. Какъ же тогда квалифицировать книжку?..

Мы уже не говоримъ о томъ, что съ точки зрѣнія элементарной „охраны природы“ и въ интересахъ фаунистики такая безсмысленная и неразборчивая схема истребленія птицъ положительно не допустима.

Книжка снабжена сотней рисунковъ. Какъ и слѣдовало ожидать, рисунки капкановъ, ловушекъ, самострѣловъ и т. п.—ясны и хороши, рисунки птицъ плохи. Нѣкоторые рисунки, изображающіе „трофеи охоты“ (напримѣръ, 10-ый, 11-ый, 84-ый и 85-ый и особенно 86-ой) положительно отвратительны по своему какому-то каннибальски-кровожадному привкусу и абсолютно предосудительны съ педагогической и моральной точки зрѣнія.

Книжка составляетъ приложеніе къ распространенному журналу „Сельскій Хозяинъ“. Когда пойдетъ она гулять по матушкѣ-Руси, не поздоровится пернатому міру вообще. Дѣлу же нашей орнитологической фаунистики она сослужитъ, безъ сомнѣнія, дурную службу. Про нее можно было бы смѣло, перифразируя слова Скалозуба, сказать: „изъять бы книжку всю да сжечь“!

Θ. С. Щербаковъ.

Циркуляръ Коммиссіи по организаціи Инструкторскихъ Курсовъ Птицеводства Департамента Земледѣлія.

Инструкторскіе Курсы Птицеводства учреждены Департаментомъ Земледѣлія въ 1911 году въ цѣляхъ надлежащей подготовки—путемъ основательнаго изученія, теоретическаго и практическаго, связанныхъ съ птицеводствомъ біологическихъ, зоотехническихъ и экономическихъ наукъ—инструкторовъ птицеводства, необходимыхъ правительственнымъ и земскимъ учрежденіямъ для осуществленія мѣропріятій по улучшенію птицеводнаго промысла въ Россіи.

На Курсы принимаются лица, окончившія среднія учебныя заведенія (безъ различія типа: реальныя училища, семинаріи, гимназіи мужскія и женскія, кадетскіе корпусы, институты благородныхъ дѣвицъ и т. п.). Пріемъ на Курсы ограниченный. Желательна рекомендація или ходатайства мѣстныхъ административныхъ или земскихъ учрежденій, управленій Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, инспекторовъ сельскаго хозяйства, спеціалистовъ по животноводству и птицеводству и др. должностныхъ лицъ.—При прочихъ же равныхъ условіяхъ предпочтеніе будетъ отдаваться лицамъ, окончившимъ среднія учебныя заведенія высшаго типа, напримѣръ, 7 классовъ реальнаго училища, а не 6, въ женскихъ гимназіяхъ 8 классовъ, а не 7, и имѣющимъ лучшіе баллы, въ особенности по естественнымъ наукамъ, а также лицамъ, знающимъ иностранные языки, бывшимъ учителямъ и учительницамъ или вообще испытавшимъ уже свои силы въ какой-либо отрасли службы. Возрастъ не ограниченъ. Замужнія на Курсы не принимаются. Курсы не даютъ отсрочки по отбыванію воинской повинности.—Представленіе свидѣтельствъ о политической благонадежности, усердная работа, безупречное поведеніе и самое щепетильное исполненіе всѣхъ распоряженій администра-

ціи Курсовъ и установленныхъ ею порядковъ—непремѣнныя условія принятія на Курсы и прохожденія ихъ.—Довольно обширная программа, а также обиліе демонстративныхъ и практическихъ занятій на Курсахъ исключаютъ всякую возможность заниматься какимъ бы то ни было постороннимъ дѣломъ; слушатели должны быть въ распоряженіи администраціи курсовъ цѣлый день. Присутствіе на лекціяхъ и практическихъ занятіяхъ безусловно обязательно. Экзамены назначаются по мѣрѣ прохожденія отдѣльныхъ предметовъ и производятся весьма строго. Отпусковъ не разрѣшается; рождественскихъ, пасхальныхъ и лѣтнихъ каникулъ нѣтъ.—При такихъ условіяхъ слушатели должны обладать крѣпкимъ здоровьемъ и значительною выносливостью, о чемъ и предупреждаются желающіе поступить.

Занятія на Курсахъ будутъ продолжаться годъ и два мѣсяца, съ 15 сентября или 1 октября 1913 года по 1 или 15 декабря 1914 года.

Преподаваемые на курсахъ предметы могутъ быть раздѣлены на три группы. Въ первую группу входятъ науки біологическія: естественная исторія птицъ (орнитологія), анатомія птицъ, естественная исторія млекопитающихъ съ подробнымъ изученіемъ анатоміи кролика, микроскопическая анатомія, физіологія животныхъ и эмбріологія птицъ и кроликовъ. Вторую группу составляютъ науки зоотехническія. Сюда относятся: общая зоотехнія (общіе законы о разведеніи животныхъ, о кормленіи ихъ, съ подробнымъ изученіемъ примѣняемыхъ въ птицеводствѣ и кролиководствѣ кормовыхъ средствъ), птицеводство, теорія и техника инкубаціи, теорія и техника откормочнаго дѣла, кролиководство, гигіена общая со включеніемъ методики бактеріологическихъ изслѣдованій и частная, примѣнительно къ птицеводству и кролиководству, патологія птицъ и кроликовъ (ученіе о болѣзняхъ и вредителяхъ), сельскохозяйственная архитектура (основы строительнаго искусства примѣнительно къ потребностямъ птицеводства и кролиководства, въ томъ числѣ: знакомство съ строительными матеріалами, съ черченіемъ плановъ и урочнымъ положеніемъ) и сельскохозяйственное счетоводство примѣнительно къ птицеводству и кролиководству. Третья группа охватываетъ экономическія науки и, такъ сказать, инструкторскіе предметы: сельскохозяйственную экономію, ученіе о кооперацiяхъ съ обзоромъ кооперативнаго дѣла въ Россіи и изученіемъ уставовъ кооперативовъ, имѣющихъ связь съ птицеводствомъ или отношеніе къ

нему, сельскохозяйственную географію, холодильное дѣло, птицепромышленность въ Россіи, въ Западной Европѣ и въ Сѣверной Америкѣ, съ обращеніемъ особаго вниманія на рынки нашихъ конкурентовъ и рынки нашего сбыта, ученіе о промысловыхъ птицахъ и звѣряхъ, законовѣдѣніе и общія основанія административнаго права, съ цѣлью дать понятіе слушателямъ объ организаціи правительственныхъ и земскихъ учрежденій въ Россіи, агрономическую помощь населенію, ознакомленіе съ характеромъ дѣятельности спеціалистовъ и инструкторовъ по отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, съ обязанностями будущихъ инструкторовъ по птицеводству, ихъ отчетностью (съ практическими занятіями) и положеніемъ въ ряду состоящаго на правительственной и земской службѣ агрономическаго персонала, технику фотографіи и обозрѣніе литературы по птицеводству и по кооперативному дѣлу.—Въ основу преподаванія на курсахъ положена система репетицій и практическихъ занятій, что необходимо для облегченія усвоенія преподаваемыхъ предметовъ въ короткое время.

Практика по птицеводству проходится на птичникахъ при Богородицкомъ Среднемъ Сельскохозяйственномъ Училищѣ, Тульской губерніи. Въ Петербургѣ слушатели знакомятся съ научными, практическими и торговопромышленными учрежденіями, имѣющими отношеніе къ птицеводству и птицепромышленности. Независимо отъ сего слушатели ежегодно отправляются въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ въ экскурсію для ознакомленія съ постановкою птицепромышленнаго дѣла въ наиболѣе важныхъ въ этомъ отношеніи губерніяхъ Россіи. Въ связи съ демонстраціями и изученіями дѣла на мѣстахъ слушателямъ излагается обзоръ экономическихъ и техническихъ мѣропріятій, необходимыхъ для поднятія птицеводнаго промысла въ Россіи.

Никакой платы за обученіе на Курсахъ не взимается. Слушатели нуждающіеся, но отличающіеся выдающимися успѣхами, могутъ быть назначаемы практикантами Департамента съ содержаніемъ до 40 руб. въ мѣсяцъ, по особымъ ходатайствамъ, въ особенности земскихъ управъ, а равно мѣстныхъ учрежденій и чиновъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

Курсы состоятъ при Сельскохозяйственно-бактеріологической Лабораторіи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія въ С.-Петербургѣ.—Руководство курсами возложено на особую коммиссію въ составѣ: Предсѣдателя, Члена Ученаго Комитета,

Завѣдывающаго сельскохозяйственно-бактеріологическою лабораторіею М. Г. Тартаковскаго и членовъ: состоящихъ при Департаментѣ Земледѣлія старшаго спеціалиста по сельскохозяйственной части А. А. Фриде и спеціалиста по птицеводству М. А. Фриде. Преподавателями курсовъ состоятъ профессоры, доценты и преподаватели различныхъ высшихъ учебныхъ заведеній и спеціалисты по отдѣльнымъ отраслямъ знаній.

При прошеніи о пріемѣ на Курсы прилагаются: 1) свидѣтельство о политической благонадежности, 2) аттестаты или свидѣтельство объ окончаніи средняго учебнаго заведенія, 3) метрическое свидѣтельство, 4) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской повинности или же о припискѣ къ призывному участку и 5) свидѣтельство врача о крѣпкомъ здоровьѣ.—Прошенія слѣдуетъ подавать заблаговременно, не позже 1 іюня.

За всякаго рода справками по дѣламъ Курсовъ надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія (по Отдѣленію V-а) или къ Предсѣдателю Коммиссіи по организаціи Курсовъ (адресъ: С.-Петербургъ, Арсенальная ул., домъ № 1).—Сюда же направляются прошенія о пріемѣ.

Изданія, присланныя въ редакцію.

Éditions parvenus à la rédaction.

V. Bianchi: „Zoologische Ergebnisse der Russischen Expeditionen nach Spitzbergen. Über die in den Jahren 1899—1901 auf Spitzbergen Gesammelten Vögel". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. VII, 1902 г.

В. Бianки: „Орнитологическіе матеріалы экспедиціи для научно-промысловаго изслѣдованія Мурмана 1899—1901". Ibid.

V. Bianchi: „Catalogue of the known species of the Paridae or the family of Tits". Ibid.

В. Бianки: „Матеріалы для орнитофауны Акмолинской области". Ibid.

В. Бianки: „Обзоръ видовъ рода Tetraogallus, Gray". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", 1898 г.

V. Bianchi: „Fundorte der Vögel, die durch die Herren N. A. Dmitriew und A. W. Kachowski in den Jahren 1898—99 in Nordost-Afrika gesammelt wurden". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. VI, 1901 г.

M. Berezowski and V. Bianchi: „Description of two new birds" (Acrocephalus inexpectatus sp. nov. and Oreopneuste davidi sp. nov.) „from Western China". Extrait de l'Annuaire du Mus. Zoolog. de l'Acad. Imp. des Scien. de St.-Pét., 1900.

V. Bianchi and N. Zarudny: „On a new species of Stone-Chat (Saxicola semenowi) from Eastern Persia". Ibid.

V. Bianchi: „Biologische Notizen über die im Sommer 1884 bei Uschaki (Gouvernement Nowgorod) beobachteten Vögel". Aus den „Beiträgen zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens, dritte Folge", besonders abgedruckt. 1888.

В. Л. Біанки: „О наблюденіяхъ надъ жизнью птицъ". Отд. отт. изъ „Прогр. и наставл. для наблюд. и собир. колл. по естеств. ист." Имп. СПБ. Общ. Естествоисп. Изд. 6-ое.

В. Біанки: „Обзоръ формъ рода Ammomanes Cab., сем. Alaudidae". Оттискъ изъ „Извѣстій Имп. Ак. Наукъ", т. XXI, № 4 (ноябрь 1904).

В. Біанки: „Роды Leptopoecile Sewertz. 1873 и Lophobasileus Pleske 1890, отряда Passeriformes". Оттискъ изъ „Извѣстій Имп. Ак. Наукъ", 1905, январь, т. XXII, № 1.

В. Біанки: „Дополнительныя замѣтки о палеарктическихъ жаворонкахъ (Alaudidae). Оттискъ изъ „Извѣстій Имп. Ак. Наукъ", 1905, октябрь, V серія, т. XXIII, № 3.

В. Біанки: „Инструкція для собиранія птицъ, ихъ яицъ и гнѣздъ". Наставленія для собиранія зоологическихъ коллекцій, издаваемыя Зоологическимъ Музеемъ Императорской Академіи Наукъ, V, 1909 г.

В. Біанки: „Замѣтки по орнитологической номенклатурѣ. 1. Къ вопросу о правильномъ латинскомъ родовомъ названіи гагаръ, Urinator Lacépède 1799". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XIV, 1909 г.

В. Біанки: „Reptilia и Amphibia С.-Петербургской губерніи". Ibid.

В. Біанки: „Краткій обзоръ авифауны Командорскихъ острововъ". Ibid.

В. Біанки: „Замѣтки о млекопитающихъ, водящихся въ береговой полосѣ Петергофскаго уѣзда между деревнями Лебяжья и Черная Лахта". Ibid.

В. Біанки: „Первое дополненіе къ списку птицъ С.-Петербургской губерніи 1907 г. и новыя данныя о рѣдкихъ видахъ". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XIII, 1908 г.

В. Біанки: „Списокъ птицъ, собранныхъ г. А. Мольтрехтомъ въ бассейнѣ рѣки Анадыря". Ibid.

В. Біанки: „Формы родовъ Leucosticte Swains. и Fringillauda Hodgs., семейства Fringillidae". Ibid.

В. Біанки: „Формы родовъ Montifringilla Brehm, Pyrgilauda Verr. и Onychospiza Przew. семейства Fringillidae". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XII, 1907 г.

В. Біанки: „Къ вопросу о гнѣздованіи вьюрка, Fringilla montifringilla Linn., въ С.-Петербургской губерніи". Ibid.

В. Бianки: „Данныя о прилетѣ птицъ весною 1907 г. въ окрестностяхъ дер. Лебяжье, Петергофскаго уѣзда, С.-Петербургской губерніи". Ibid.

В. Бianки: „Наши свѣдѣнія о птицахъ Новгородской губерніи". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XV, 1910 г.

В. Бianки: „Научные результаты путешествій Н. М. Пржевальскаго по Центральной Азіи". Отдѣлъ Зоологическій, т. II. Птицы. Выпускъ 4, 1905 г.

В. Д. Андреевъ и *В. Бianки:* „Къ авифаунѣ Устьсысольскаго уѣзда, Вологодской губерніи". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XV, 1910 г.

В. Бianки: „Къ авифаунѣ устья р. Оби и прилежащей части полуострова Я-малъ". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XIV, 1909 г.

В. Бianки: „Списокъ птицъ, собранныхъ Д. К. Глазуновымъ въ С.-Петербургской губерніи и хранящихся въ Зоологическомъ кабинетѣ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета". Ibid.

В. Бianки: „Списокъ птицъ С.-Петербургской губерніи". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XII, 1907 г.

V. Bianchi: „Preliminary review of the Palaearctic and Himalo-Chinese species of the Muscicapidae or family of Elycatchers". Ibid.

В. Бianки: „Къ меланизму у снѣгиря, Pyrrhula pyrrhula Linn.". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XI, 1906 г.

В. Бianки: „Гнѣздованіе чечетки, Aegiothus linaria (Linn.), въ неволѣ". Ibid.

В. Бianки: „Къ вопросу о продолжительности жизни домоваго воробья, Passer domesticus Linn.". Ibid.

В. Бianки: „Galerida cristata (Linn.) въ С.-Петербургской губ.". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. IX, 1904 г.

В. Бianки: „Coccothraustes coccothraustes (Linn.) въ С.-Петербургской губ.". Ibid.

В. Бianки: „Данныя о гнѣздованіи Asio otus (Linn.) въ С.-Петербургской губерніи". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. XI, 1906 г.

В. Бianки: „Предварительная замѣтка о восточно-палеаркти-

ческихъ формахъ рода Alauda Linn.". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. IX, 1904 г.

В. Бianки: „Обзоръ формъ семейства завирушекъ, Accentoridae, ord. Passeriformes". Ibid.

В. Бianки: „Формы рода Dendrocoptes, сем. Picidae". Ibid.

В. Бianки: „Новыя и рѣдкія птицы С.-Петербургской губерніи". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. VIII, 1903 г.

В. Бianки: „Обзоръ видовъ рода Acredula Koch.". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. VII, 1902 г.

V. Bianchi: „Übersicht der Formen der Gattung Ithaginis Wagler". Sonderabdruck aus: „Journal für Ornithologie", Januar-Heft, 1904.

В. Бianки: „Обзоръ формъ рода Ithaginis, Wagler. (Fam. Phasianidae, Galliformes)". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. VIII, 1903 г.

В. Бianки: „Третій экземпляръ Syrnium wilkonskii Menzb.". Оттискъ изъ „Ежегодника Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ", т. VII, 1902 г.

В. Бianки: „Къ орнитофаунѣ Манджуріи". Ibid.

В. Бianки: „Обзоръ формъ родовъ Cryptolopha, Abrornis и Tickellia изъ сем. Silviidae, отр. Passeriformes". „Извѣстія Имп. Ак. Наукъ", 1905, іюнь и сентябрь, V серія, т. XXIII, № 1 и 2.

В. Бianки: „Kaznakowia, gen. nov. и Babax David 1876, роды семейства Crateropodidae, отр. Passeriformes". „Извѣстія Имп. Ак. Наукъ", 1905, іюнь и сентябрь, V серія, т. XXIII, № 1 и 2.

В. Бianки: „Новый видъ фазана, Phasianus süehschanensis sp. nov., изъ нагорной, западной части Китая". „Извѣстія Имп. Ак. Наукъ", 1906, январь и февраль, V серія, т. XXIV, № 1 и 2.

V. Bianchi: „Catalogue of the known species of Alaudidae or family of Larks, with a Table showing the geographical distribution and a Key to the Genera". „Извѣстія Имп. Ак. Наукъ", 1906, іюнь и сентябрь, V серія, т. XXV, № 1 и 2.

В. Бianки: „Ревизія формъ рода Pyrrhula, сем. Fringillidae, ихъ филогенезъ и географическое распространеніе". „Извѣстія Имп. Ак. Наукъ", 1906, октябрь, V серія, т. XXV, № 3.

V. Bianchi: „In defence of natural Genera". „Извѣстія Имп. Ак. Наукъ", 1907.

В. Бianки: „Формы рода Pyrrhospiza Hodgs. 1844, сем. Fringillidae. Ibid.

В. Бianки: „Матеріалы для авифауны Монголіи и восточнаго Тибета. Монголія и Камъ. Труды экспедиціи Имп. Русск. Географ. Общ., совершенной въ 1899—1901 гг. подъ руководствомъ П. К. Козлова". Изд. Имп. Русск. Географ. Общ. Т. V, 1907 г.

В. Л. Бianки: „Птицы", т. I, полутомы 1-ый и 2-ой. Фауна Россіи и сопредѣльныхъ странъ, преимущественно по коллекціямъ Зоолог. Муз. Имп. Ак. Наукъ.

Prof. P. P. Suschkin: „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gedirges und des Urjanchen-Landes". Aus Bull. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 1912. Москва, 1913 г.

Отчетъ о дѣятельности Рыбинскаго Отдѣленія Ярославскаго Естественно-Историческаго Общества за третій годъ его существованія (1911—1912).

Годичные отчеты о дѣятельности Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній и его отдѣленій за 1912 годъ (*Д. М. Россинскій:* „Отчетъ о дѣятельности Отдѣленія Орнитологіи и состоящаго при немъ Кружка Любителей пѣвчей и другой вольной птицы Имп. Русск. О-ва А. Ж. и Р.". *Б. М. Житковъ:* „Отзывъ о сочиненіи Г. И. Полякова «Къ орнитологической фаунѣ Московской губ.», представленномъ на соисканіе преміи имени Великаго Князя Сергѣя Александровича". *С. И. Огневъ:* „Поѣздка въ дельту Волги").

Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. Томъ XLIII, выпускъ 1-ый. Протоколы засѣданій № 7—8, ноябрь—декабрь 1912 г. (*Н. С. Дороватовскій:* „Предварительное сообщеніе о поѣздкѣ съ фаунистической цѣлью въ сѣверо-западное Закавказье". *К. Лауницъ* и *С. Царевскій:* „Предварительное сообщеніе о поѣздкѣ на юго-западное побережье Чернаго моря").

Протоколы Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ Университетѣ. XXI, 1, 2; 1912 г.

Записки Крымскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Природы. Т. II, 1912 г. (*Д. А. Подушкинъ:* „Замѣтки о перелетахъ и гнѣздовьи птицъ въ окрестностяхъ Днѣпровскаго лимана"). Симферополь, 1913 г.

Празднованіе двухсотлѣтней годовщины рожденія М. В. Ломоносова Императорскимъ Московскимъ Университетомъ. Москва, 1912 г.

Revue Française d'Ornithologi Scientifique et Pratique. № 50, 7 Juin 1913.

Труды Гидробіологической станціи на Глубокомъ озерѣ, т. IV. Труды Отдѣла Ихтіологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній, т. VIII, 1912 г.

Пермскій Научно-Промышленный Музей. Краткій отчетъ за 1909 и 1910 года.

Матеріалы по изученію Пермскаго края. Вып. IV. (*П. В. Сюзевъ*: „Необычайно сѣверный залетъ чернаго грифа"). Пермь, 1911 г.

С. А. Бутурлинъ: „Птицы Косогольской экспедиціи Имп. Русскаго Географическаго Общества". Москва, 1913 г. Дневникъ Зоологическаго Отдѣленія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, т. I, № 1.

Н. С. Дороватовскій: „Предварительное сообщеніе о поѣздкѣ съ фаунистической цѣлью въ сѣверо-западное Закавказье" (Оттискъ изъ „Трудовъ Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей", т. XLIII, вып. I, № 6—7, 1912 г.).

Труды Кіевскаго Орнитологическаго Общества имени К. Ѳ. Кесслера, т. I, вып. 1-ый, 1913 г.—Travaux de la Société ornithologique de Kief du nom de K. Th. Kessler, vol. I, livr. 1, 1913.

Протоколы засѣданій Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Варшавскомъ Университетѣ, №№ 1—2, 3 и 4 за 1909 г.; №№ 1—2 и 3—4 за 1910 г.; №№ 1—2 и 3—4 за 1911 г.; №№ 1, 2 и 3 за 1912 г.

Варшавскія Университетскія Извѣстія, вып. IV и V. (*А. П. Райскій*: „Къ орнитологической фаунѣ Оренбургскаго края".) 1913 г.

Записки Императорскаго Харьковскаго Университета, книга 1-ая. за 1913 г.

Записки Императорскаго Харьковскаго Университета. Указатель за 20 лѣтъ (1893—1912).

Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института. Приложенія. 1912 г.

Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института, книга 1-я за 1913 г.

Извѣстія Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. (*В. Штейнфельдъ*: „Къ авифаунѣ Тобольской губерніи".—*И. Шуховъ*: „Весеннія наблюденія у г. Омска"), т. I, вып. 1-ый, 1913 г., Омскъ.

С. А. Бутурлинъ и *А. П. Ивашенцовъ:* „Охота съ камерой. Фотографированіе живой природы". Въ 2-хъ частяхъ. Изданіе редакціи журнала „Наша Охота". С.-Петербургъ, 1913 г. Цѣна 1 р. 50 коп.

Г. В. баронъ *Лоудонъ:* „Весенній прилетъ птицъ въ центрѣ Лифляндской губерніи (1895—1912)". Отд. оттискъ изъ журнала „Птицевѣдѣніе и Птицеводство", выпускъ 1-ый, 1913 г.

Э. В. Шарлеманъ: „Замѣтки о куликахъ-песочникахъ (подсем.

Tringinae) окрестностей Кіева". Отд. оттискъ изъ журнала „Птицевѣдѣніе и Птицеводство", выпускъ 2-ой, 1913 г.

Charles R. Keyes: „A history of certain great horned owls". From the Smithsonian report for 1911, pages 395—405 (with plates 1—8), 1912.

Pehr Kalm (1759) and John James Audubon (1831): „The passenger pigeon". From the Smithsonian report for 1911, pages 407—424 (with plate 1, colored), 1912.

A. Mallock, F. R. S.: „Note on the iridescent colors of birds and insects". From the Smithsonian report for 1911, pages 425—432 (with plates 1—3) 1912.

В. Г. баронъ *Лоудонъ:* „Опытное изученіе перелета птицъ кольцеваніемъ, охрана птицъ и организація «Русской Орнитологической Централи» съ біологическими отдѣлами". Оттискъ изъ журнала „Птицевѣдѣніе и Птицеводство", 1913 г., вып. 1-ый.

Работы зоологическаго и зоотомическаго кабинетовъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета и Мурманской Біологической Станціи Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей подъ редакціей В. М. Шимкевича. Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, Отдѣленіе Зоологіи и Физіологіи, т. XLI, вып. 4-ый, № 1, 1912 г.

Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. Т. XLIII, выпускъ 1-ый. Протоколы засѣданій. №№ 4 и 5—6, апрѣль и сентябрь—октябрь 1912 г.

Tadeusz Chrostowski: „Kolekcya ornitologiczna ptaków Paraǹskich". Odbitka ze Sprawozdań z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydzial nauk Matematycznych i Przyrodniczych. Posiedzenie z dnia 7 listopada 1912 r. rok V, zesz. 8.

Журналъ „Птицевѣдѣніе и Птицеводство", выпускъ 1-ый и 2-ой 1913 г.

E. W. Suomalainen: „Ornithologische Beobachtungen während einer Reise nach Lapponia Enontekiensis im Sommer 1909". Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, № 1.

Prof. Dr. J. Thienemann: „Vogelwarte Rossitten". Sonderabdruck aus: Reichenow's. Ornithol. Monatsberichte, Märzheft. 1913.

J. Thienemann: „Von der Vogelwarte Rossitten". Sonderabdruck aus Nr. 51 Bd. 60 der „Deutschen Jäger-Zeitung", 1913.

Prof. Dr. J. Thienemann: „Von der Vogelwarte Rossitten". Sonderabdruck aus Nr. 11 vom. 14. März 1913. „St. Hubertus" Illustr. Jagd-Wochenschrift. Nr. 11 vom 14. März. 1913.

Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, т. XLII, 1911 г.

„Zeitschrift für Oologie und Ornithologie", № 1—Januar, № 2—Februar, № 3/4—März/April, № 5—Mai, 1913.

Отчетъ за 1911 годъ Общества изученія Амурскаго края (Филіальное отдѣленіе Пріамурскаго отдѣла Императорскаго Географическаго Общества).

Извѣстія Общества для изслѣдованія природы Орловской губерніи, вып. 3-ій, 1913 г. (*С. Н. Горбачевъ*: „Весенній пролетъ птицъ и иныя зоофенологическія наблюденія на югѣ Орловскаго уѣзда. 1911 годъ").

Ученыя записки Императорскаго Казанскаго Университета, книга 2-ая (февраль), 3-ья (мартъ), 4-ая (апрѣль), 5-ая (май), 6—7-ая (іюнь—іюль) за 1913 г.

Варшавскія Университетскія Извѣстія, книга 2-ая и 3-ья за 1913 г.

Дневникъ Зоологическаго Отдѣленія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, нов. сер., т. I, № 2. [Протоколы засѣданій отъ 103-го засѣданія (7-го октября 1902 г.) по 158-ое засѣданіе (29-го ноября 1912 г.)], 1913 г.

Алтайскій сборникъ (Изданіе Алтайскаго Подъ-Отдѣла Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества) т. X (*Г. Э. Іоганзенъ*: „Орнитологическіе сборы А. И. Лаврова въ Барнаульскомъ, Бійскомъ и Змѣиногорскомъ уѣздахъ, Томской губ."). 1910 г.

Работы Волжской Біологической Станціи, т. IV, № 2, 3 и 4—5. (Труды Саратовскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей Естествознанія, т. VI, вып. 3, 4 и 5) 1913 г.

Дневникъ Зоологическаго Отдѣленія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, нов. сер., т. I, № 1 (*С. А. Бутурлинъ*: „Птицы Косогольской экспедиціи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества"). 1913 г.

Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift, Haefte III, April, 1913.

Ornithologisches Jahrbuch, Heft 1—2, 1913.

„Природа" (журналъ Николаевскаго Общества Любителей Природы) №№ 1, 2, 3 и 4 за 1913 г.

С. И. Огневъ: „Поѣздка въ дельту Волги" (Докладъ, прочитанный въ засѣданіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи животныхъ и растеній 20 ноября 1912 г.), 1913 г.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, année 1911, № 4 (*Prof. Dr. M. Menzbier*: „Beiträge zur Ornithologie Russlands. I. Zur Frage von der systematischen Bedeutung von *Aquila fulvescens*, Gray").

Предварительныя указанія къ изученію Костромской губерніи въ естественно-историческомъ отношеніи. Изданіе Костромского научнаго общества по изученію края. 1913 г.

Бюллетени Тифлисскаго Общества Любителей Природы. № 1, 1913 г. [*П. Г. Сакварелидзе*: „Замѣтки о птицахъ Горійскаго уѣзда (Тифлисской губ.)“. *К. А. Сатунинъ*: „О птицахъ характерныхъ для степного округа Восточнаго Закавказья“. *Библіографія*: *А. Ляйстеръ*—„К. А. Сатунинъ. О зоогеографическихъ округахъ Кавказскаго края“, „К. А. Сатунинъ. Систематическій каталогъ птицъ Кавказскаго края“ и „К. А. Сатунинъ. Животный міръ Мугани“]. 1913 г.

Bentley Beetham, F. Z. S.: „Of the positions assumed by birds in flight“. From the Smithsonian report for 1911, pages 433—439 (with plates 1—8).

E. W. Nelson: „Descriptions of new genera, species and subspecies of birds from Panama, Colombia and Ecuador“. Smithsonian Miscellaneous Collections, volume 60, number 3, 1912.

A. C. Bent: „A new subspecies of Crossbill from Newfoundland“. Smithsonian Miscellaneous Collections, volume 60, number 15, 1912.

Harry C. Oberholser: „Descriptions of one hundred and four new species and subspecies of birds from the Barussan Islands and Sumatra“. Smithsonian Miscellaneous Collections, volume 60, number 7, 1912.

Harry C. Oberholser: „A revision of the forms of the great blue heron (Ardea herodias Linnaeus)“. No 1939.—From the Proceedings of the United States National Museum, vol. 43, pages 531—559, 1912.

Edgar A. Mearns: „Description of a new African Grass-Warbler of the genus Cisticola“. Smithsonian Miscellaneous Collections, volume 60, number 20, 1913.

E. W. Nelson: „Two new subspecies of birds from the slopes of Mount Pirri, Eastern Panama“. Smithsonian Miscellaneous Collections, volume 60, number 21, 1913.

Е. И. Исполатовъ: „Наблюденія надъ расцвѣтаніемъ растеній въ Бугурусланскомъ уѣздѣ Самарской губерніи въ 1908 г.“. Отд. оттискъ изъ „Трудовъ Ботаническаго Сада Императорскаго Юрьевскаго Университета“.

Е. И. Исполатовъ: „Новыя свѣдѣнія о флорѣ Псковской губерніи“.

Е. И. Исполатовъ: „О памятникахъ природы и старины“. Отд. оттискъ изъ журнала „Лѣсной Духъ“.

Отчетъ Кіевскаго Общества Любителей Природы за 1911 г.

К. В. фонъ-Гейзеръ: „Скелеты. Ознакомленіе съ устройствомъ костной системы позвоночныхъ животныхъ. Подробныя указанія способовъ приготовленія скелетовъ". Изданіе Кіевскаго Общества Любителей Природы, 1912 г.

К. В. фонъ-Гейзеръ: „Виноградная улитка. Руководство по анатоміи улитки съ описаніемъ органовъ тѣла и указаніемъ ихъ физіологическихъ функцій". Изданіе Кіевскаго Общества Любителей Природы, 1912 г.

Журналъ „Энтомологическій Вѣстникъ", т. I, № 2. Кіевъ, 1913 г.

Wilhelm Rüdiger: „Altes und Neues vom Fischadler". Sonderabdruck aus «Helios», Organ des Naturwissenschaftlichen Vereins des Rerierungsbezirkes Frankfurt an der Oder, 27 Band, 1913.

W. Rüdiger: „Fremde Eier im Nest." Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, XXIII, № 5, 1913.

Rapport de M. E. de Miklòs de Miklòsvár (Délégué de la Hongrie) pour l'assemblée générale de 1913 sur le № 2 du programme concernant la protection des oiseaux. (Partie I: Rapport; partie II: Conclusions votées par le Comité Permanent; partie III: Lois concernant la protection des Oiseaux dans quelques pays). Institut International d'Agriculture.

Communication faite par A. A. Silantieff (Délégué de la Russie) sur la question № 2 du programme de l'assemblée générale (protection des oiseaux) (A. La protection des oiseaux en Russie. B. Conclusions) —Thèses du rapport de m. A. A. Silantieff (Délégué de la Russie) au sujet de la protection des oiseaux en Russie.—Institut International d'Agriculture. Quatrième Session. (Mai 1913.)

Rapport de M. M. Laur sur le № 2 du programme concernant la protection des oiseaux. Institut International d'Agriculture. Assemblée Générale.—Quatrième Session.

Поправки.—Berichtigung.

По винѣ типографіи во 2-омъ выпускѣ журнала за текущій годъ допущены слѣдующія опечатки:

	Напечатано:	*Должно быть:*
Содержаніе, 2-я страница:	Кашинъ	Катинъ
Стр. 134, строка 2 снизу:	mai, (a. St.)	Mai (a. St.)
Статья Г. И. Полякова, стр. 188, примѣчаніе:	крачка необычная	крачка—обычная

Вышелъ изъ печати 4 ноября (ст. ст.) 1913 г.—Ausgegeben am 4 November (a. St.) 1913.

Редакторъ-издатель: **Г. И. Поляковъ.** Herausgeber: **G. I. Poljakow.**

Тип. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Москва.

„Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1913 годъ.

Открыта подписка на 1913 годъ на:

ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ.

Продолжается подписка на 1913 годъ (XX годъ изданія) на журналъ, издаваемый Географическимъ Отдѣленіемъ Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи подъ редакціей проф. **Д. Н. Анучина.**

Журналъ **„ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ“** посвященъ разработкѣ вопросовъ общаго землевѣдѣнія и страновѣдѣнія, особенно изученію Россіи. Содержаніе журнала составляется изъ оригинальныхъ изслѣдованій, очерковъ, замѣтокъ путешественниковъ, обзоровъ, историко-географическихъ и критическихъ статей, также переводныхъ статей, мелкихъ извѣстій, географической хроники, библіографіи. Въ программу журнала входятъ также вопросы о преподаваніи географіи, а въ приложеніи къ книжкамъ журнала помѣщаются отдѣльныя оригинальныя и переводныя общедоступныя сочиненія—по вопросамъ землевѣдѣнія и страновѣдѣнія, путешествіямъ и по соприкасающимся съ географіей областямъ знанія.

„Землевѣдѣніе“ выходитъ 4-мя книжками въ годъ, размѣромъ около 10—12 печатныхъ листовъ, съ приложеніемъ картъ, фототипій и рисунковъ въ текстѣ. Цѣна **ШЕСТЬ** рублей въ годъ съ доставкой и пересылкой. Гг. иногородніе благоволятъ обращаться по адресу: **Москва, Географическое Отдѣленіе О. Л. Е., Политехническій музей.**

Полная серія „ЗЕМЛЕВѢДѢНІЯ“, за 19 лѣтъ (1894—1912), безъ 1-й книжки 1894 г., можетъ быть пріобрѣтаема за **95** р., съ подпиской на 1913 г.—за **100** р., а съ 1-й книжкой 1894 г.—за **120** р.

Отдѣльныя изданія Географическаго Отдѣленія: *Ф. Нансенъ.* Среди льдовъ и во мракѣ полярной ночи. Перев. А. А. Крубера, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. Ц. 4 р. *Г. Н. Потанинъ.* Восточные мотивы въ средневѣковомъ европейск. эпосѣ. Ц. 2 р. *З. Гюнтеръ.* Исторія географическихъ открытій и успѣхи научнаго землевѣдѣнія въ XIX в. Перевелъ Л. Д. Синицкаго, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. Ц. 1 р. *Гую Гроте.* По Европейской и Азіатской Турціи. Пер. подъ ред. С. Г. Григорьева. Ц. 1 р. *Геттнеръ.* Европейская Россія. Антропогеогр. этюдъ. Съ 21 карт. въ текстѣ. Пер. Л. Д. Синицкаго. М. 1907 г. Ц. 1 р. *Д. Анучинъ.* Японія и японцы. Съ 30 рис. и карт. 1907 г. Ц. 50 к. *Проф. А. Филиппсонъ.* Средиземье (Область Средиземнаго моря). Съ таблицами (ландшафтами) и картами. Пер. П. А. Бѣльскаго, подъ ред. проф. Д. Н. Анучина. М. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.

Складъ послѣдняго изданія: Т-во Кушнеревъ и К°, Москва, Пименовская ул., свой домъ.

ПРИРОДА.

Открыта подписка на 1913 г. (2-й годъ изданія) на ежемѣсячный популярный естественно-историческій съ иллюстраціями въ текстѣ журналъ для самообразованія. Подъ редакціей проф. *В. А. Вагнера* (Спб.), проф. *Л. В. Писаржевскаго* (Спб.) и препод. В. Ж. К. *Л. А. Тарасевича* (Москва).

Содержаніе: Философія естествознанія. Астрономія. Физика. Химія. Геологія съ палеонтологіей. Минералогія. Общая біологія. Зоологія. Ботаника. Человѣкъ и его мѣсто въ природѣ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Проф. С. В. Аверинцевъ, В. Агафоновъ, проф. П. П. Андрусовъ, проф. В. М. Арнольди, лаб. Г. Ф. Арнольдъ, проф. Н. А. Артемьевъ, проф. Н. П. Боргманъ, проф. П. П. Бахметьевъ (София), А. П. Бахъ (Женева), прив.-доц. А. П. Бачинскій, докт. геогр. Л. С. Бергъ, астр. С. П. Блажко, прив.-доц. В. А. Бородовскій, П. А. Бѣльскій, проф. В. А. Вагнеръ, проф. Ю. П. Вагнеръ, акад. проф. В. П. Вальденъ, проф. Б. Ф. Верюго, акад. проф. В. П. Вернадскій, лаб. В. П. Верховскій, проф. Г. В. Вульфъ, М. П. Гольцсмитъ (Парижъ), проф. А. Г. Гурвичъ, проф. В. Я. Данилевскій, д-ръ П. П. Діатроптовъ, проф. А. С. Догель, В. А. Дубянскій, Е. А. Елачичъ, проф. В. В. Заньяловъ, проф. В. Р. Заленскій, проф. А. А. Ивановъ, проф. В. П. Ипатьевъ, лаб. П. В. Казанецкій, проф. А. В. Клоссовскій, проф. П. К. Кольцовъ, преп. Инж. уч. Т. П. Кравецъ, проф. А. П. Красновъ, проф. П. П. Кузнецовъ, проф. П. М. Кулагинъ, прив.-доц. П. В. Култашевъ, проф. П. С. Курпаковъ, проф. П. П. Лазаревъ, прив.-доц. М. Ю. Лахтинъ, П. П. Лебедевъ, лабор. Г. А. Левитскій, І. Д. Лукашевичъ, д-ръ Е. И. Марциновскій, проф. А. К. Медвѣдевъ, проф. М. А. Мензбиръ, проф. П. Г. Меликовъ, проф. С. П. Метальниковъ, П. А. Морозовъ, проф. Г. Морозовъ, прив.-доц. А. В. Немиловъ, проф. А. В. Нечаевъ, проф. А. М. Никольскій, докт. зоол. М. М. Новиковъ, лаб. А. Г. Огородниковъ, В. Л. Омелянскій, проф. А. В. Павловъ, проф. Л. В. Писаржевскій, проф. В. В. Подвысоцкій, проф. К. Д. Покровскій, Б. Е. Райковъ, А. А. Рихтеръ, А. Рождественскій (Лондонъ), П. А. Рубакинъ, проф. Д. П. Рузскій, Я. В. Самойловъ, проф. А. В. Сапожниковъ, Ю. Ф. Семеновъ, Л. Д. Синицкій, асс. по каѳ. физ. геогр. С. А. Совѣтовъ, препод. С. П. Созоповъ, лаб. Н. Н. Соковнинъ, проф. А. П. Сѣверцевъ, проф. С. М. Танатаръ, д-ръ Л. А. Тарасевичъ, маг. хим. А. А. Титовъ, астрономъ Пулк. обсерв. Г. А. Тиховъ, проф. М. М. Тихвинскій, проф. В. Е. Тищенко, проф. П. А. Умовъ, прив.-доц. А. Е. Ферсманъ, проф. О. Д. Хвольсонъ, преп. А. А. Черновъ, проф. Л. А. Чугаевъ, А. П. Чураковъ, прив.-доц. В. В. Шипчинскій, пр.-доц. П. Ю. Шмидтъ, проф. Е. А. Шульцъ, д-ръ С. М. Щастный, проф. А. П. Щукаревъ, прив.-доц. А. П. Ющенко, преп. А. П. Янцкій, проф. А. П. Ярошкій.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: цѣна въ годъ (съ доставкой и пересылкой) — 5 руб.; на ½ года—3 руб., на три мѣсяца—1 руб. 50 коп., за границу на годъ—7 руб. **Допускается разсрочка:** 3 руб. при подпискѣ и 2 руб. не позже 1 мая.

Подписка на ½ года, 3 мѣсяца и въ разсрочку принимается только въ главной конторѣ (Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11).

Объявленія печатаются въ журналѣ по слѣдующей цѣнѣ: на обложкѣ: 4-я стр.—100 р., ½ стр.—60 р., ¼ стр.—35 р.; 2-я и 3-я стр.—75 р., ½ стр.—40 р., ¼ стр.—25 р.; послѣ текста: стр.—60 р., ½ стр.—35 р., ¼ стр.—20 р.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА: Въ конторѣ журнала „Природа“ (Москва), во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отдѣленіяхъ.

Адресъ главной конторы и редакціи: Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11. Телефонъ № 4-10-81.

БИБЛІОТЕКА-ПРИРОДА (естественно-историческая). Открыта подписка на 1913 годъ.

Ежемѣсячный журналъ, подъ ред. проф. **Л. В. Писаржевскаго.** При ближайшемъ участіи сотрудниковъ журнала „Природа“.

За годъ подписчикамъ будетъ дано 12 книгъ (объемомъ свыше 1200 страницъ обычнаго книжнаго формата), посвященныхъ отдѣльнымъ наиболѣе интереснымъ вопросамъ естествознанія. „Библіотека-Природа“ ставитъ своею задачей популярное изложеніе въ болѣе глубокой и расширенной формѣ тѣхъ естественно-историческихъ вопросовъ, которые разсматриваются въ обычныхъ журнальныхъ статьяхъ лишь въ общихъ чертахъ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА (съ доставкой и пересылкой): за годъ—4 р. ½ года—2 р. 40 к.; 3 мѣс.—1 р. 20 к.; за границу годъ—6 р.

Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подпискѣ и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Основныя начала естествознанія.

Популярная библіотека для самообразованія. Открыта подписка на 1913 годъ. Ежемѣсячный журналъ, подъ ред. проф. **Л. В. Писаржевскаго.** При ближайшемъ участіи сотрудниковъ журнала „Природа".

Библіотека „**Основныя начала естествознанія**" предназначается для лицъ, не получившихъ систематическихъ естественно-историческихъ знаній и желающихъ пополнить этотъ пробѣлъ самообразованіемъ. Въ 1913 году всѣ 12 книгъ библіотеки (свыше 1200 страницъ обычнаго книжнаго формата) будутъ посвящены популярному изложенію основъ наиболѣе важныхъ отдѣловъ естествознанія.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА (съ доставкой и пересылкой): за годъ—4 р.; 1/2 года—2 р. 40 к.; 3 мѣс.—1 р. 20 к.; за границу—6 р.

Допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подпискѣ и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.

Подписка принимается въ конторѣ журнала „Природа", во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отдѣленіяхъ.

Подписка на 1/2 года, 3 мѣсяца и въ разсрочку принимается исключительно главной конторой (**Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11**).

Естествознаніе и Географія.

Открыта подписка на ежемѣсячный научно-популярный и педагогическій журналъ. (Годъ XVIII.) Выходитъ ежемѣсячно, за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (іюня—іюля), книжками въ 5—6 печатныхъ листовъ.

Журналъ **ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія** для фундаментальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній и для учительскихъ библіотекъ учительскихъ институтовъ и семинарій и городскихъ училищъ; **Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ ОДОБРЕНЪ** за всѣ годы существованія и допущенъ на будущее время въ библіотеки подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеній; **Ученымъ Комитетомъ Министерства Торговли и Промышленности РЕКОМЕНДОВАНЪ** въ библіотеки коммерческихъ учебныхъ заведеній.

Журналъ ставитъ себѣ задачей удовлетворять научному интересу читателей въ области естествознанія и географіи, а также способствовать правильной постановкѣ и разработкѣ вопросовъ по преподаванію естествознанія и географіи. Въ журналѣ имѣются отдѣлы: 1) научно-популярныя статьи по всѣмъ отраслямъ естествознанія и географіи, статьи по вопросамъ преподаванія естествознанія теоретическаго и прикладного (садоводство, пчеловодство и т. п.) и географіи; 2) акваріумъ и терраріумъ; 3) библіографія (обзоръ русской и иностранной литературы по естествознанію и географіи); 4) хроника; 5) смѣсь; 6) вопросы и отвѣты по предметамъ программы.

Въ журналѣ были помѣщены статьи: П. Я. Акинфіева, А. П. Артари, проф. П. П. Бахметьева, В. П. Болдырева, Л. П. Бородовскаго, проф. А. Ѳ. Брандта, В. В. Богдавова, проф. В. А. Вагнера, П. Вольногорскаго, П. П. Вакуловскаго, проф. С. П. Глазенапа, М. П. Голенкина, В. П. Граціанова, проф. А. С. Догеля, М. П. Демкова, Л. Н. Елагина, Е. В. Жадовскаго, Б. М. Житкова, В. Р. Заленскаго, проф. Н. Ю. Зографа, П. О. Золотницкаго, А. П. Иванова, проф. Н. Ѳ. Кащенко, Н. М. Квиповича, проф. П. И. Кузнецова, проф. П. А. Каблукова, В. В. Кистяковскаго, проф. П. М. Кулагина, проф. А. Кожевникова, М. А. Кожевниковой, проф. А. П. Краснова, А. Ф. Ляйстера, М. Э. Мендельсона, С. П. Меча, проф. П. В. Насонова, Г. А. Надсона, проф. А. М. Никольскаго, К. Д. Носилова, проф. А. П. Павлова, А. П. Рождественскаго, проф. В. В. Сапожникова, К. А. Сагунина, проф. К. К. Севтъ-Илера, М. М. Сіязова, В. П. Таліева, проф. К. А. Тимирязева, проф. А. А. Тихомирова, П. Р. Фрейберга, проф. П. А. Холодковскаго, проф. В. М. Шимкевича, П. Ю. Шмидта, проф. Я. П. Щелкановцева, проф. А. Эйхенвальда, Э. В. Эриксона и нѣкоторыхъ друг.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доставкою и пересылкою **4** руб. **50** коп., на полгода съ пересылкою и доставкою **2** руб. **50** коп.; за границу **7** руб. За ту же цѣну можно получать журналъ за 1903—1910 гг.; за остальные годы (1896—1902) по **4** руб. за каждый годъ съ пересылкою. Выписывающіе всю серію за первыя 10 лѣтъ платятъ **35** руб. съ перес. Книжки журнала въ отдѣльной продажѣ стоятъ **75** коп. каждая.

Книжные магазины, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и пересылку денегъ только **20** коп. съ каждаго годового полнаго экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается.

При непосредственномъ обращеніи въ контору допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб. 50 коп. и къ 1 іюня 2 руб. Другихъ условій разсрочки не допускается.

Контора редакціи: Москва, Донская ул., д. Данилоной, кв. № 3.

Редакторъ-издатель **М. П. Варавва.**

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ

Императорскаго Казанскаго Университета. Открыта подписка на 1913 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ заключаются: I. Отдѣлъ наукъ. II. Отдѣлъ критики и библіографіи. III. Университетская лѣтопись. IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей, памятники историческіе и литературные, съ научными комментаріями, и памятники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями съ пересылкою **7** руб.

Подписка принимается въ Правленіи Университета.

Редакторъ **А. Піонтковскій.**

Извѣстія Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера.

Открыта подписка на 1913 годъ на двухнедѣльный журналъ. Годъ изданія пятый. (Журналъ жизни сѣвернаго края.) Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца. Задачи и цѣли общества опредѣляютъ и задачи „Извѣстій“.

Программа журнала: Узаконенія. Распоряженія и постановленія правительственныхъ и общественныхъ учрежденій центральныхъ и мѣстныхъ, имѣющія отношенія къ жизни Сѣвера. Текущая дѣятельность Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера. Отдѣльныя статьи и доклады по изученію Сѣвера и выясненію условій его развитія. Обсужденіе предположеній, направленныхъ къ измѣненію условій жизни и производительности Сѣвера. Хроника частной, правительственной, общественной инціативы въ дѣлѣ изученія Сѣвера, развитія его производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя замѣтки и сообщенія о жизни края и ея изученія. Очерки жизни. Сообщенія изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами Сѣвера. Обзоръ литературы о Сѣверѣ. Справочный отдѣлъ. Консультація по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества (отвѣты редакціи). Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: для членовъ Архангельскаго Общества для изученія Русскаго Сѣвера **3** руб. въ годъ; для прочихъ подписчиковъ **4** руб.

Допускается разсрочка по полугодіямъ и по четвертямъ года, при взносѣ денегъ впередъ.

Плата за объявленія на первой страницѣ журнала—**20** коп. за строку петита, на послѣдней—**10** коп.

Подписка на „Извѣстія А. О. И. Р. С.“ принимается во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Имперіи безъ уплаты **15** коп. за переводъ денегъ.

Въ Архангельскѣ подписка и объявленія принимаются: въ Библіотекѣ Общества въ зданіи Городской Думы, въ Городской Публичной библіотекѣ, въ магазинѣ Об-ва Потребителей и въ книжныхъ магазинахъ: Будычевой, Шашковской и Коганъ.

Гг. иногородніе публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по адресу: Архангельскъ, Правленіе Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера.

Рукописи слѣдуетъ направлять по адресу редакціи. Статьи и корреспонденціи оплачиваются по усмотрѣнію редакціи.

Пробные №№ высылаются за 4 семикоп. марки. За перемѣну адреса взимается 4 семикоп. марки.

Издатель **Архангельское Общество изученія Русскаго Сѣвера.**

Редакторъ **В. Ленгауэръ.**

Открыта подписка на 1913 годъ

на выходящій съ конца мая сего года журналъ

ИЗВѢСТІЯ

Общества Изученія Олонецкой губерніи.

Выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.

(По мѣрѣ надобности будутъ помѣщаться иллюстраціи и карты.)

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

Статьи и доклады по изученію края преимущественно въ отношеніи историческомъ, географическомъ, естественно-научномъ, бытовомъ, культурномъ и экономическомъ, а также по выясненію условій его всесторонняго развитія; научные вопросы, связанные съ изученіемъ края въ указанныхъ отношеніяхъ. Текущая дѣятельность Общества изученія Олонецкой губерніи. Хроника правительственной, общественной и частной иниціативы въ дѣлѣ изученія губерніи, развитія ея производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя статьи, замѣтки и сообщенія о жизни края и его изученіи. Обзоръ текущей литературы о краѣ. Указатель литературы по всѣмъ вопросамъ, касающимся края. Справочный отдѣлъ по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества. Отвѣты редакціи. Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА съ 1 мая с. г. до конца года за 8 №№ съ доставкой и пересылкой: для всѣхъ членовъ Общества въ годъ **2 руб.**, для прочихъ подписчиковъ **3** рубля въ годъ. Для желающихъ могутъ быть допущены разсрочки по полугодіямъ и четвертямъ года.

Плата за помѣщеніе объявленій:

впереди текста: 1 стр. **20** руб., $^3/_4$ стр. **15** руб., $^1/_2$ стр. **10** руб., $^1/_4$ стр. **5** руб., $^1/_8$ стр. **3** руб., $^1/_{16}$ стр. **1** руб. **75** коп. за одинъ разъ; позади текста: 1 стр. **15** руб., $^3/_4$ стр. **11** руб., $^1/_2$ стр. **7** руб. **50** коп., $^1/_4$ стр. **3** руб. **75** к., $^1/_8$ стр. **1** руб. **75** коп., $^1/_{16}$ стр. **75** коп. за одинъ разъ. При напечатаніи однихъ и тѣхъ же объявленій 4 раза дѣлается скидка 10%, а 8 разъ—20% съ вышеуказанныхъ цѣнъ. Объявленія на обложкѣ принимаются по особому соглашенію.

Періодическія изданія и объявленія объ нихъ охотно принимаются въ обмѣнъ.

За разсылку при журналѣ отдѣльныхъ приложеній (объявленій, проспектовъ, каталоговъ и проч.) вѣсомъ до 1 лота платится **5** руб. съ тысячи, свыше 1 лота—**3** руб. за каждый лишній лотъ.

Всякаго рода запросы должны снабжаться почтовыми марками или открытками для отвѣта.

Подписка и объявленія въ Петрозаводскѣ принимаются: у гг. членовъ-учредителей О-ва, въ губ. типографіи, въ магазинѣ О-ва Потребителей и въ книжномъ магазинѣ Мазилова, въ Гостиномъ дворѣ.

Гг. иногородніе подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу: **Петрозаводскъ, Правленіе Общества Изученія Олонецкой губ. (По редакціи).**

Доставляемыя въ редакцію статьи должны быть за подписью и съ адресомъ автора. Статьи безъ обозначенія условій, считаются безплатными и могутъ быть оплачены по усмотрѣнію редакціи.

Пробные №№ высылаются за 5 семикоп. марокъ, которыя при подпискѣ засчитываются въ уплату. За перемѣну адреса просимъ высылать 4 семикоп. марки.

Издатель: *О-во Изученія Олон. губ.* Редакторы: *И. И. Благовѣщенскій.* *Горн. инж. Б. Н. Михайловъ.*

БЮЛЛЕТЕНИ

Тифлисскаго Общества Любителей Природы.

Выходятъ по мѣрѣ накопленія матеріала.

Въ 1913 году выйдетъ 2—3 выпуска.

Въ апрѣлѣ вышелъ въ свѣтъ № 1 „Бюллетеней“.

СОДЕРЖАНІЕ:

I. Оригинальныя статьи. (*Фигуровскій И. В.* Фены на Кавказѣ; *Конюшевскій Л. К.* Изъ наблюденій въ карстовой области Сухумскаго округа; *Сербиновъ П. И.* Къ характеристикѣ мѣстообитаній кавказской саламандры; *Сакварелидзе И. Г.* Замѣтки о птицахъ Горійскаго уѣзда (Тифлисской губ.); *Ляйстеръ А. Ф.* Землетрясенія на Кавказѣ осенью 1912 года). II. Изъ кавказской періодической печати. (*Ляйстеръ А. Ф.* Колебанія уровня озера Гокчи; *Сатунинъ К. А.* Куда дѣваются вешнія воды Арарата?; *Виноградовъ-Никитинъ И. З.* Радіоактивныя изслѣдованія Боржомскихъ водъ; *Евангуловъ Г. Г.* Главный комитетъ поощренія туризма на Кавказѣ и его задачи; *Филипповъ М.* Рыбный промыселъ на оз. Палеостромѣ Кут. губ.). III. Мелкія наблюденія, сообщенія и замѣтки. IV. Новое изъ литературы о природѣ Кавказа. V. Изъ хроники восхожденій на вершины Кавказа. VI. Библіографія; VII. Указатель литературы о природѣ Кавказа. VIII. Хроника. IX. Изъ дѣятельности ученыхъ обществъ и кружковъ г. Тифлиса и иногородныхъ Обществъ Любителей природы. X. Изъ текущей жизни Общества. XI. Отчетъ о дѣятельности Тифлисск. Общ. Любит. Прир. за 1907—11 гг. XII. Объявленія.

Тифлисъ. 1913. 124 стр. съ 2 таблицами рисунковъ.

Цѣна 50 коп.

Адресъ редакціи: г. Тифлисъ, Николаевская, № 3. Городская Лабораторія.

Редакторъ **А. Ф. Ляйстеръ.**

Открыта подписка на 1913 годъ

НА ЖУРНАЛЪ

„ПТИЦЕВѢДѢНІЕ и ПТИЦЕВОДСТВО“.

(IV-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Органъ Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній.

Издаваемый при ближайшемъ участіи: В. К. Анфилова, С. А. Бутурлина, Г. С. Деревянко, В. Ч. Дорогостайскаго, В. Г. Дурова, П. Н. Елагина, П. Е. Ефимова, Б. М. Житкова, М. Т. Зароченцева, проф. Д. Н. Кайгородова, А. М. Кириллова, проф. Н. М. Кулагина, К. В. Лаунпцъ, бар. Г. В. Лоудонъ, Н. А. Мосолова, А. И. Ноневича, І. К. Пачоскаго, Ѳ. П. Половинкина, Г. П. Полякова, проф. М. И. Придорогина, П. А. Сатунина, Е. П. Свѣшникова, проф. И. П. Тарнани, кн. С. Н. Урусова, А. С. Хомякова, С. Ф. Фонъ-Штейна, М. В. Эпова и др. лицъ.

Журналъ посвященъ изученію птицъ вообще и русской орнитологіи по преимуществу, а равно домашнему и промысловому птицеводству Россіи.

Орнитологія: научная, экономическая, охотничья, промысловая, прирученныхъ и домашнихъ птицъ, физіологическая, патологическая, статистическая.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

Спеціальныя статьи по указаннымъ отдѣламъ орнитологіи. Обзоръ по орнитологіи русскихъ учрежденій. Орнитологическая библіографія. Смѣсь. Personalia. Вопросы и отвѣты.

Подписная цѣна:

На годъ **4** руб., на полгода **2** руб., отдѣльный номеръ **1** руб.

Выходитъ 4 раза въ годъ: два номера до лѣта и два номера послѣ лѣта.

Срокъ подписки съ 1-го января 1913 года.

Подписка принимается въ редакціи журнала: **Москва, Мясницкая, д. Липгартъ, реальное училище Воскресенскаго**, редакторомъ **Д. М. Россинскимъ.**

Плата за объявленія:

1 страница передъ текстомъ 25 руб., позади текста 15 руб.

$^1/_2$ „ „ „ 13 „ „ „ 8 „

$^1/_4$ „ „ „ 8 „ „ „ 5 „

Редакторъ Предсѣдатель Отдѣленія Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи *Д. М. Россинскій.*

Издатель Отдѣленіе Орнитологіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи.

Der Ornithologische Beobachter.

Monatsberichte für Vogelkunde und Vogelschutz.

Offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz.

Einzige rein ornithologische Fachschrift in der Schweiz. Enthält einen deutschen und einen französischen Teil.

Preis Frs. 5,—jährlich.

Probehefte kostenfrei.—Bestellungen an die Expedition:

Buchdruckerei R. G. Zbinden. Rheinsprung 5, Basel (Schweiz).

ORNITHOLOGISCHES JAHRBUCH.

Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Herausgegeben

von

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.

XXIII Jahrgang.

Das „**Ornithologische Jahrbuch**“ bezweckt ausschliesslich die Pflege der palaearktischen Ornithologie und erscheint in 6 bez. 3 Doppelheften Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von Tafeln erfolgt nach Bedarf. — Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt bei direktem Bezuge für das Inland **10 Kronen**, für das **Ausland 10 Mk. (= 11.75 K) = 12.50 Frks. = 10 sh. = 4.50 Rbl. pränumerando**, im Buchhandel **12 Kronen = 12 Mark**. Volks- u. Mittelschulen erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von **6 Kronen** bez. **6 Mk.** (nur direkt). Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Raume auf dem Umschlage Aufnahme. Beilagen- und Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung. **Probehefte** nur gegen **Rücksendung**.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften zur Besprechung Abonnements, Annonzen und Beilagen bitten wir **an den Herausgeber**, Villa Tännenhof bei Hallein, Salzburg, zu adressieren.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, einziges seit 21 Jahren erscheinendes Fachorgan, herausgegeben von **Vilhelm Rüdiger, Hochzeit i. d. Neumark.** Der Abonnementspreis beträgt für das Jahr bei direkter Zusendung 5 Mk., nach den Ländern des Weltpostvereines 7 Frcs. pränumerando. Die Zeitschrift bringt aus Fachkreisen belehrende und einschlägige Artikel, Brut- und Sammelnotizen, Merkmale schwer zu unterscheidender Eier, Literatur, sowie eine grosse Anzahl Kauf- Verkaufs- und Tausch- Anzeigen.—Probenummern werden auf Wunsch frei zugesendet.

Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift. Im Auftrage der Dänischen ornithologischen Verein herausgegeben von O. Helms. Jährlich erscheint 4 Heften (je 3—4 Bagen), reich illustriert. **Preis des Jahrganges 4 Krone dansk (ca. 2 Rbl.).** Alle für die Redaction bestimmten Zusendungen sind an den Redactör, **O. Helms**, Pejrup, Danemark erbeten.

Памятка экстерна и учащагося.

(Гдѣ и какъ готовиться къ какому-вибудь экзамену?)

С. С. Рѣшетникова, при сотрудничествѣ проф. **К. Ѳ. Жакова** и др.

Цѣна 25 коп., съ пересылкой **50** коп. Можно 3 коп. марками. Наложеннымъ платежомъ не высылается.

Необходимое пособіе для всѣхъ, занимающихся **самообразованіемъ,** для экстерновъ, учащихся, ихъ родителей и учителей.

Брошюра-проспектъ высылается за 10 однокопеечныхъ марокъ.

Смѣлое, Полтавской губ., 139, С. С. Рѣшетникову.—Запишите.

РЫБОЛОВЪ и ОХОТНИКЪ.

Двухнедѣльный иллюстрированный журналъ охоты, рыболовства и рыбоводства. (Годъ изданія V-й.)

Въ 1913 году гг. подписчики получатъ: 24 №№ журнала „Рыболовъ-Охотникъ", посвященнаго рыболовству и рыбоводству, и отъ 12 до 24 №№ журнала „Охотникъ", посвященнаго охотѣ во всѣхъ видахъ и собаководству.

Программа журнала обширная: Законы по охотѣ и рыболовству.—Разсказы, стихотворенія, описанія. — Спеціальныя статьи по охотѣ и рыболовству. — Оружіе, рыболовныя снасти, приманки. — Портреты писателей-охотниковъ и рыболововъ. — Жизнь обществъ.—За границей.—Корреспонденціи.—Отвѣты на вопросы.—Смѣсь.—Карикатуры.

Репродукціи съ фотографій **С. А. Лобовинова.**

Въ журналѣ принимаютъ участіе извѣстные писатели-рыболовы и охотники: Александровъ Л. Д., Генри Бартельсъ, Бялыницкій-Бируля В., Гладковъ Н. Н., Горчаковскій Ал., Диковъ В. П., Дѣдъ, Діанистъ, Евфратовъ П. Н., Комаровъ И. Н., Колмаковъ М. А., Кудряшовъ П. В., Кучинъ П. В., Петровъ П. А., Плещеевъ В. А., Плетеневъ П. Т., Сибилевъ П. В., Скрывченко П. П., баронъ П. Г. Черкасовъ, Яблонскій П. І. и др.

Двѣ доплатныя преміи: 1) „Сборникъ статей по рыбоводству" барона **П. Г. Чернасова** и 2) „Охотничья собака. Руководство по воспитанію, дрессировкѣ и таскѣ охотничьихъ собакъ **Л. Янсона.**

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

безъ премій: на годъ — 2 руб., ½ года — 1 руб. 10 коп. Съ одной преміей (по выбору) на годъ — 2 руб. 50 коп., съ двумя преміями — 3 руб. Пробный № высылается за 7 коп. марку.

Адресъ редакціи: Вятка, Николаевская, д. Берманъ.

Редакторъ-издатель **Ѳ. Куниловъ.** Издатель **А. Блювштейнъ.**

Открыта подписка на 1914 г.

— НА —

„ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ".

„Messager Ornithologique", — „Ornithologische Mitteilungen".

ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Выходитъ въ годъ четыре книжки, объемомъ каждая не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ, двѣ до и двѣ послѣ лѣтняго сезона.

Журналъ имѣетъ цѣлью объединять орнитологическія работы русскихъ ученыхъ и способствовать ознакомленію любителей съ нашей орнитофауной, съ литературой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изученіемъ. Въ журналѣ имѣются слѣдующіе отдѣлы: 1) Статьи и замѣтки по систематикѣ и біологіи птицъ; 2) Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и библіографія; 4) Корреспонденція; 5) Хроника; 6) Заявленія гг. подписчиковъ о взаимномъ обмѣнѣ шкурками, гнѣздами и яйцами птицъ; 7) Вопросы и отвѣты.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: В. Г. Аверинъ, С. Н. Алферакн, В. М. Артоболевскій (предс. Кіевск. Орнит. Общ. им. К. Ѳ. Кесслера), В. Л. Біанки, С. І. Бильневичъ, В. Н. Бостанжогло, А. А. Брауверъ, С. А. Бутурлинъ, А. М. Быковъ, А. А. Бялыницкій-Бируля, Б. С. Вальхъ, М. М. Гермсъ, Г. Л. Граве, К. А. Грове, А. Г. Гржибовскій, К. М. Дерюгинъ (прив.-доц. Имп. С.-Пет. Унив.), Б. А. Домбровскій, В. С. Елпатьевскій (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Б. М. Житковъ (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. Зарудный, Н. А. Зворыкинъ, Г. Э. Іогансенъ, Е. И. Исполатовъ, Д. Н. Кайгородовъ (профес. Лѣсн. Инст.), А. Н. Карамзинъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожевниковъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. Ф. Котсъ, К. В. Лауницъ, Г. В. баронъ Лоудонъ, Р. С. Магницкій, Я. А. Молчановъ, П. В. Нестеровъ, А. М. Никольскій (проф. Имп. Харьк. Унив.), С. И. Огневъ, Бенно Отто, І. К. Пачоскій, В. Д. Пдвсие, Г. И. Поляковъ, Д. М. Россинскій, С. А. Рѣзцовъ, К. А. Сатунинъ, А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскій, Н. А. Смирновъ, П. Ф. Соловьевъ, В. В. Станчинскій, П. П. Сушкинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. И. Сѣницкій, Е. В. Тарасовъ, И. К. Тарнани (профес. Н. Алекс. Инст. С.-Х. и Лѣс.), М. Г. Тартановскій (Завѣд. Сельскохозяйственно-бактеріолог. лабор. Г. У. З. и З.), А. Я. Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ, В. А. Хахловъ, Э. В. Шарлеманъ и др.

— ПОДПИСНАЯ ЦѢНА —

съ пересылкой въ Россіи и за границу: на 1 годъ — 4 руб., на ½ года — 2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб.

Полные годовые комплекты журнала за 1911 и 1912 гг., имѣющіеся въ настоящее время въ небольшомъ числѣ, высылаются по 4 руб. за годъ.

Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка", Московск. губ., имѣніе „Саввино". Телефонъ № 7-51.

Кромѣ конторы редакціи, подписка принимается въ Москвѣ и С.-Петербургѣ въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, Карбасникова и „Новаго Времени".

Редакторъ-издатель Г. И. Поляковъ. Herausgeber G. I. Poljakow.

Тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°. Москва.
1913.



№ 4

ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ


MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

QUATRIEME ANNEE

1913 г.



Отъ Редакціи.

1. Редакція не принимаетъ на себя отвѣтственности за своевременную доставку журнала, если подписка не была адресована непосредственно на ея имя.

2. При сообщеніи адреса подписчиковъ просятъ разборчиво обозначать имя, отчество, фамилію, а также губернію, уѣздъ и ближайшее почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяются Редакціей только въ тѣхъ случаяхъ, если таковыя поступаютъ отъ подписчиковъ не позже полученія ими слѣдующаго номера и съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы.

3. При заявленіи о неполученіи журнала и о перемѣнѣ адреса просятъ прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №. При заявленіи о перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4. Лицъ, обращающихся письменно въ Редакцію съ запросами, для полученія отвѣта просятъ прилагать почтовую марку. На вопросы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5. Наложеннымъ платежомъ выпуски журнала не высылаются.

6. Рукописи, посылаемыя въ Редакцію, должны быть четко написаны, обязательно за полной подписью автора и съ указаніемъ его точнаго адреса. При этомъ авторовъ просятъ писать на одной сторонѣ листа и оставлять поля. Рукописи, посылаемыя въ Редакцію, должны быть снабжены хотя бы самымъ краткимъ авторскимъ резюме на одномъ изъ западно-европейскихъ языковъ. Желательно, чтобы статьи снабжались авторами, кромѣ русскихъ названій, названіями на какомъ-либо западно-европейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя наименованія птицъ въ работахъ были подчеркнуты авторами одинъ разъ. За номенклатуру въ научныхъ статьяхъ отвѣтственность лежитъ на авторахъ.

7. Непринятыя рукописи возвращаются за счетъ авторовъ въ видѣ посылки или подъ заказной бандеролью.

8. Для библіографическихъ отзывовъ просятъ присылать по два экземпляра работъ.

1913 г. Четвертый годъ изданія.—Quatrième année. № 4.

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Орнитологическій Вѣстникъ.

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN.

Выходитъ четыре раза въ годъ: два №№ до и два—послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна: за 1 годъ—4 руб., за 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу—8 р., за 1/2 страницы—4 р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половинною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просятъ адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—aprés le Nouvel an et deux №№—aprés les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle): l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakow, Russie, Chemin de fer Moscou—Nijninovgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savvino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein): jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poljakow, Russland, Postabteilung. «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

1. Замѣтки по орнитологіи Туркестана. (Продолженіе). *Н. А. Зарудный.* 245
2. Къ біологіи оляпки (Cinclus melanogaster Brehm). *С. Г. Штехеръ.* 257
3. Замѣтки о нѣкоторыхъ кавказскихъ птицахъ. *Э. В. Шарлеманъ* . 262
4. Къ распространенію гаичекъ въ Европейской Россіи. Проф. *П. П. Сушкинъ* 266
5. Замѣтка о новой пѣночкѣ изъ Туркестана (Phylloscopus collybita subsindianus subsp. nov.). *Н. А. Зарудный* 269
6. Кедровки въ Кіевской и Черниговской губерніяхъ въ 1913 году. *Э. В. Шарлеманъ* 272
7. Мои ошибки въ вопросѣ о формахъ черноголоваго щегла (Carduelis carduelis) и ихъ исправленіе. *Н. А. Зарудный* 274
8. **Краткія сообщенія:**

— Къ орнитофаунѣ Минской губерніи. *Янушъ Доманевскій.* — Къ орнитофаунѣ Московской губерніи. *Г. И. Поляковъ.* — Еще объ Emberiza jankowskii Tacz. *Ред.* — Красная утка въ С.-Петербургской губерніи. *Ред.*—Къ окольцовыванію птицъ. *Ред.* 287

9. **Орнитофенологическія наблюденія:**

— 4) Имѣніе „Адріаново“, Херсонской губерніи. *Е. А. Куликовскій.* — 5) Окрестности г. Кіева. *Э. В. Шарлеманъ.* — 6) Окрестности города Владиславова, Сувалкской губерніи. *Е. Я. Катинъ.*—7) Имѣніе „Зыпле“, Сувалкской губерніи. *Ю. Ф. Восводзкій.*—8) Имѣніе „Зыковичи“, Виленской губерніи. *Ю. О. М.*—9) Мѣстечко „Ушачь“, Витебской губерніи. *В. П. Жадановскій.*—10) Имѣніе „Милое“, Смоленской губерніи. *В. А. Меландеръ.*—11) Имѣніе „Лизденъ“, Лифляндской губерніи. *Г. В.* баронъ *Лоудонъ.*—12) Имѣніе „Замгофъ“, Лифляндской

губерніи. *М. М. Гермсъ.*—13) Городъ Опочка и его окрестности, Псковской губерніи. *Е. И. Исполатовъ.*—14) Погостъ Корлы, Псковской губерніи. *Я. Н. Никандровъ.*—15) Гатчино, С.-Петербургской губерніи. *В. Р. Дицъ.*—16) Окрестности села „Лахта", С.-Петербургской губерніи. *К. В. Лауницъ.* — 17) Царское Село, С.-Петербургской губерніи. *И. А. Тихомировъ.*—18) Село „Полибино", Самарской губерніи. *А. Н. Карамзинъ.*—19) Бугурусланскій уѣздъ, Самарской губерніи. *В. Д. Пополутовъ.*—20) Село „Атмисъ", Пензенской губерніи. *Г. Д. Смагинъ.*—21) Окрестности г. Нижняго-Новгорода и селъ „Городецъ" и „Бриляково", Нижегородской губерніи. *Н. А. Покровскій.*—22) Село „Сормово", Нижегородской губерніи. *В. И. Малиновскій.* — 23) Имѣніе „Саввино", Московской губерніи. *П. С. Колановъ.*—24) Москва, Сокольники. *Н. Д. Митрофановъ.*—25) Можайскій уѣздъ, Московской губерніи. *С. И. Огневъ.*—26) Дмитровскій уѣздъ, Московской губерніи. *Н. В. Шевалдышевъ.*—27) Вышній Волочекъ, Тверской губерніи. *А. М. Капустинъ* 290

10. **Обзоръ иностранной литературы по орнитологіи.** (Продолженіе). *С. А. Бутурлинъ* 367

11. **Библіографія:**

— Vogelschutzkalender 1914. *Г. А. Кожевниковъ* 371

12. Е. А. Бихнеръ. Некрологъ. *Г. П. Поляковъ* 374

13. **Хроника:**

— Международное совѣщаніе о всемірной охранѣ природы. *Г. А. Кожевниковъ.*—Третья международная выставка птицъ всѣхъ видовъ въ Льежѣ.—Новыя изданія Департамента Земледѣлія 375

14. **Доклады и сообщенія** 381

15. **Экспедиціи, путешествія, экскурсіи, командировки и пр.** . 382

Изданія, присланныя въ редакцію 386

Объявленія.

SUJET. — INHALT.

1. Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan. (Fortsetzung). Von *N. A. Sarudny* 245

2. Zur Biologie der Wasseramsel (Cinclus melanogaster B r e h m). Von *S. G. Stecher* 257

3. Notizen über einige kaukasische Vögel. Von *E. W. Scharleman* . . 262

4. Zur Verbreitung der Sumpfmeisen im Europäischen Russland. Von Prof. *P. P. Suschkin* 266

5. Bemerkung über einen neuen Laubsänger von Turkestan (Phylloscopus collybita subsindianus s u b s p. n o v.). Von *N. A. Sarudny* 269

6. Tannenhäher in dem Kiew'schen und Tschernigow'schen Gouvernement im Jahre 1913. Von *E. W. Scharleman* 272

7. Meine Irrtümer betreffs der Frage von den Formen des schwarzköpfigen Stieglitzes (Carduelis carduelis) und die Verbesserung derselben. Von *N. A. Sarudny* 274

8. **Kurze Mitteilungen** 287

9. **Ornithophenologische Beobachtungen** 290

10. **Rewiew of the foreign Ornithological Literature.** (Continued). By *S. A. Buturlin* 367

11. **Bibliographie** 371

12. Eugène Büchner. Nachruf, von *G. J. Poljakow* 374

13. **Chronik** 375

14. **Rapports et communications** 381

15. **Expéditions, voyages, excursions, etc.** 382

Éditions parvenus à la rédaction 386

Inserate.

Тип. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Москва.
1913.

Замѣтки по орнитологіи Туркестана.

Н. А. Зарудный.

Mitteilungen über die Ornithologie von Turkestan.

Von *N. A. Sarudny.*

(Продолженіе. — Fortsetzung.) [1]).

158. **Erythrospiza githaginea crassirostris** Blyth.

Bucanetes githagineus Licht.—Г. И. Радде: „Орнитологическая фауна Кавказа“, стр. 130, 1884 г.—Н. А. Зарудный: „Орнитологическая фауна Закаспійскаго края“, стр. 270, 1896 г.

Для орнитофауны Туркестана введенъ Г. И. Радде. „Въ началѣ VI 1870 г.“, говоритъ онъ: „близъ вновь устроеннаго тогда лагеря у Красноводска нѣсколько парочекъ летали взадъ и впередъ къ водопою“. Въ качествѣ довольно рѣдкой гнѣздящейся птицы русской части Хорасанскаго участка найденъ мною въ нижней области сѣверныхъ частей Копетъ-дага, именно въ безплодныхъ сухихъ горахъ Заринкевъ, Гокулинъ-дагъ и Хальватъ-дагъ. На Заринкевъ 30. IV. 1892 я нашелъ птенцовъ, покинувшихъ гнѣздо и умѣвшихъ уже перепархивать.

Въ указанныхъ мѣстонахожденіяхъ красноклювый пустынный снѣгирь еще не имѣетъ сѣверныхъ границъ своего распространенія. Во время путешестія въ центральныя части пустыни Кизылъ-Кумъ лѣтомъ 1912 года я нашелъ его довольно обыкновеннымъ на гнѣздовьи въ безплодныхъ, скалистыхъ и въ вы-

[1]) См. „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1913 г., кн. III, стр. 137—150.
S. „Ornithologische Mitteilungen“, 1913, B. III, S. 137—150.

FEB 21

сокой степени маловодныхъ горахъ Аристанъ-бель-тау, Бель-тау, Акъ-тау и Тохта-тау; нѣсколько парочекъ выводило въ каменистыхъ холмахъ около оазиса Тамды. Въ послѣдней мѣстности 3-го іюня киргизами мнѣ было принесено 3 птенчика и яйцо, изъ котораго тутъ же вывелся четвертый птенчикъ. Въ дни съ 1-го по 3-ье іюня въ Тамды, какъ и съ 8-го по 9-ое іюня въ Тохта-тау мы замѣчали выводки отлично летавшихъ молодыхъ, носившихъ вполнѣ и почти вполнѣ развитой первый нарядъ.

„Bucanetes githagineus“ для Туркестана упоминается и Г. В. барономъ Лоудономъ (статья „Meine vierte Reise nach Zentral-Asien und Talysch“ въ „Bericht über den V. Internationalen Ornithologen-Kongress“, Berlin, 1910), который говоритъ (стр. 365), что видѣлъ 6 и 7. III. 1910 около водокачки станціи Анненково [1]) длинный рядъ этихъ птицъ, сидѣвшихъ вмѣстѣ съ „Erythrospiza obsoleta“ на проволокѣ телеграфа въ ожиданіи водопоя. Если видъ птицы опредѣленъ Г. В. барономъ Лоудономъ вѣрно и если здѣсь нѣтъ смѣшенія съ монгольскимъ пустыннымъ снѣгиремъ, чрезвычайно въ этой мѣстности вѣроятнымъ на пролетѣ, то въ данномъ случаѣ мы имѣемъ наблюденіе пролета E. githaginea crassirostris на найденныя мною гнѣздовья въ центральныхъ частяхъ пустыни Кизылъ-Кумъ или на возможныя мѣста гнѣздовья по нижнимъ пустыннымъ зонамъ горнаго хребта Нуръ-ата-дагъ, откуда (именно съ южныхъ склоновъ, верстахъ въ 60-ти къ сѣверу отъ Катта-кургана) мнѣ были доставлены экземпляры, добытые въ концѣ мая и началѣ іюня 1907 года.

Вышеупомянутое яйцо изъ Тамды во всѣхъ отношеніяхъ походило на яйца, описанныя мною изъ Персіи („Экскурсія по Сѣверо-Восточной Персіи и птицы этой страны“, стр. 173).

159. **Chloris chloris turkestanica** Zarud.

Chloris chloris turkestanicus subsp. nov. (N. A. Sarudny: „Ornithologische Monatsberichte“, S. 61—63, 1907).

Н. А. Сѣверцовъ [2]) приводитъ „Chlorospiza chloris“ гнѣздящеюся и зимующею въ III зоологическомъ участкѣ края (Кара-тау; западный Тянь-Шань: Арысъ, Келесъ, Чирчикъ съ ихъ

[1]) Одна изъ ближайшихъ къ Мерву желѣзнодорожныхъ станцій на пути къ Чарджую. *Авт.*

[2]) Н. А. Сѣверцовъ: „Вертикальное и горизонтальное распредѣленіе Туркестанскихъ животныхъ“. *Авт.*

притоками; низовья Сыръ-Дарьи отъ устья Арыса до Аральскаго моря; дельта Сыръ-Дарьи), именно гнѣздящеюся въ 3-мъ поясѣ высоты (Кара-тау и предгорія Тянь-Шаня съ лиственнымъ лѣсомъ; поясъ яблони, урюка, ясени, шелковицы и пр. до 4500 и мѣстами даже до 7—8000, а вообще до 6 тысячъ метровъ) и зимующею во 2-мъ (культурный поясъ, травяныя степи съ пашнями и садами, до 3—4000 метровъ).

Область распространенія туркестанской зеленушки на гнѣздовьи занимаетъ совершенно изолированное положеніе и, насколько это извѣстно до сихъ поръ, отдѣлена широкими пространствами отъ областей, занятыхъ другими формами. Никакихъ зеленушекъ не извѣстно въ Западной Сибири, въ Восточномъ Туркестанѣ и въ Афганистанѣ. Отъ области, населенной закаспійскою C. c. bilkevitschi Zar., она отрѣзывается песками и глинами пустыни Кара-Кумъ; Каспійское и Аральское моря, Усть-Уртъ и Тургайская область очень широкой полосой отдѣляютъ ее отъ C. c. chloris Linn. Европейской Россіи и еще не выясненной формы Кавказа.

Для Семирѣчья туркестанская зеленушка еще не извѣстна совсѣмъ. Въ предѣлахъ Сыръ-Дарьинской области на гнѣздовьи она попадалась мнѣ особенно часто. Здѣсь массами выводится въ садахъ долины Чирчика и Ангрена (въ томъ числѣ и въ садахъ не только окраинъ Ташкента, но даже самыхъ центральныхъ частей этого города). Изъ долины Чирчика по Угаму и Пскему поднимается въ зону лиственнаго лѣса и выше, въ заросли древовиднаго можжевельника (арчи); о распространеніи ея вверхъ по Чаткалу сказать ничего не могу, кромѣ развѣ того, что въ нѣкоторые годы примѣчалась на гнѣздовьи въ Чимганѣ. Гнѣздится въ садахъ Чимкента и Туркестана. Обыкновенная въ садахъ Чиназа она не была обнаружена нами въ лѣсистыхъ тугаяхъ побережья Сыръ-Дарьи во время нашего плаванія внизъ по этой рѣкѣ изъ Чиназа къ Перовску въ 1911 году, но попадалась въ садахъ какъ этого послѣдняго, такъ и выше лежащаго Джулека. Обыкновенна въ садахъ, почти сплошь занимающихъ пространство между Ташкентомъ и станціей Келесъ.

Въ Ферганской области она извѣстна мнѣ, какъ гнѣздящаяся птица садовъ Намангана и Коканда. Въ сѣверной части этой страны я нашелъ ее довольно многочисленною въ бассейнахъ рѣкъ Паша-ата и Итокаръ (по первой между селеніемъ Нанай и ущельемъ Капчегай, выше котораго въ зонѣ ельниковъ она сдѣ-

лалась довольно рѣдкою; по второй—въ урочищѣ Аралъ); здѣсь держалась въ лиственныхъ лѣсахъ, особенно такихъ, къ которымъ была примѣшана арча. Въ южныхъ частяхъ названной области я наблюдалъ ее въ садахъ селеній Исфара и Варухъ, но въ очень небольшомъ числѣ.

Въ Самаркандской области я знаю ее изъ садовъ Самарканда и Ходжента.

Въ предѣлахъ Бухарскихъ владѣній оказалась весьма многочисленной въ арчевникахъ горъ Кухъ-и-Тангъ, какъ на западныхъ склонахъ—около урочища Ходжа-филь, такъ и на восточныхъ—около селенія Кампыръ-тепе. Довольно часто мы наблюдали ее въ лиственныхъ, весьма богатыхъ разнообразными породами (въ томъ числѣ и фруктовыми) лѣсахъ около селеній Хирманджоу и Іолъ, во многихъ мѣстахъ густо покрывающихъ склоны окрестныхъ горъ (въ странѣ Дарвазъ). Въ небольшомъ числѣ примѣчена въ садахъ городовъ Кабадіана и Кулябъ.

Достовѣрно извѣстная область гнѣздованія туркестанской зеленушки такимъ образомъ заключается между широтами Перовска на сѣверѣ и Кабадіана на югѣ и долготами того же Перовска на западѣ и урочищемъ Аралъ (на р. Ітокаръ) на востокѣ. Центры плотнаго населенія разбросаны въ разныхъ мѣстахъ по горамъ и невдалекѣ отъ нихъ. Въ холодное время года громадное большинство зеленушекъ остается въ предѣлахъ гнѣздовой области, спускаясь съ горъ на равнины и предпринимая кочеванія въ болѣе южныя мѣстности. Судя по добычѣ одного экземпляра 28. XI. 1892 на нижнемъ Теджентѣ (Н. А. Зарудный: „Орнитологическая фауна Закаспійскаго края“, стр. 285) и пяти экземпляровъ 2—5. II. 1912 около станціи Анненково (между Мервомъ и Чарджуемъ), возможенъ незначительный пролетъ черезъ пустыню Кара-Кумъ по Теджену и Мургабу въ Афганистанъ.

Въ районѣ наиболѣе частыхъ моихъ экскурсій, именно: подъ Ташкентомъ, въ разныхъ мѣстахъ долинъ Ангрена и Чирчика, по Сыръ-Дарьѣ и около устьевъ этихъ рѣкъ—зеленушка должна считаться вообще обыкновенною зимнею птицею, общая численность которой въ разные годы колеблется довольно сильно; никогда, однако, эта численность не понижается до такой степени, чтобы нашу птичку можно было бы назвать рѣдкою. На основаніи весьма многочисленныхъ своихъ наблюденій я пришелъ къ тому заключенію, что вообще не холода, а обильные, долго не тающіе снѣга вліяютъ на уменьшеніе числа зеленушекъ, заста-

вляя откочевывать ихъ къ югу. Говорю „вообще“ потому, что это уменьшеніе иногда наблюдается и въ случаяхъ совпаденія малоснѣжія съ умѣренностью холоднаго времени года, благодаря болѣе частымъ дождямъ. Въ глухіе зимніе мѣсяцы, а также въ февралѣ, не рѣдко наблюдалъ я зеленушекъ среди тамариксовъ урочища Сардаба въ Голодной степи, иногда въ компаніи съ Fringilla montifringilla или Emberiza leucocephalus, чаще же самостоятельными стаями до 50-ти особей въ каждой. Зимніе экземпляры [1]) доставлялись мнѣ изъ песковъ Кизылъ-Кумъ (со стороны Голодной степи), изъ Джизака, окрестностей города Бухары и селенія Камаръ-Сарая на р. Пянджъ.

Въ вышеуказанномъ районѣ моихъ обычныхъ экскурсій въ первые мѣсяцы года зеленушки особенно часто попадаются на глаза, вообще начиная съ начала второй трети февраля. Подъ Ташкентомъ и въ садахъ этого города онѣ наблюдаются въ великомъ множествѣ уже въ концѣ названнаго мѣсяца, а въ нѣкоторые годы даже раньше: въ первыхъ числахъ второй половины февраля. Примѣрно со средины марта зеленушка сильно уменьшается въ числѣ, отлетая отсюда въ болѣе сѣверныя мѣста гнѣздовья, но оставаясь, какъ было сказано выше, весьма обыкновенной.

Нѣкоторые самцы начинаютъ пѣть уже въ первыхъ числахъ февраля, если только, конечно, стоитъ теплая и ясная погода. У нѣсколькихъ пѣвшихъ самцовъ, убитыхъ подъ Ташкентомъ 19. II. 1910, testiculi были развиты въ полную мѣру. Разгаръ брачнаго пѣнія въ этомъ городѣ и его окрестностяхъ приходится на послѣднія двѣ трети марта и на весь апрѣль, большею частью захватывая и первыя числа мая.

Пѣніе нашей зеленушки, какъ и обыкновенной европейской, незамысловато, болѣе громко и еще менѣе красиво. Поющій самецъ, въ отличіе отъ обыкновенной европейской формы, не такъ охотно играетъ въ воздухѣ и никогда не поднимается на такую значительную высоту. Любимыя лѣтнія мѣстообитанія зеленушки составляютъ мѣстности, изобилующія лиственными лѣсами или садами съ не слишкомъ высокимъ и густымъ травянистымъ подсѣдомъ; для нашей птицы создаются особенно благопріятныя условія, если къ лѣсу въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ примѣшана арча и если лѣсныя заросли чередуются съ болѣе или менѣе открытыми пространствами горныхъ откосовъ.

[1]) Въ ноябрѣ, декабрѣ и январѣ. *Авт.*

Въ Ташкентѣ и его окрестностяхъ гнѣзда закладываются главнымъ образомъ на карагачѣ (вязъ, Ulmus sp.?) [1]. Это одно изъ самыхъ красивыхъ деревьевъ края со стволомъ, достигающимъ у старыхъ экземпляровъ до двухъ аршинъ въ отрубѣ и уже на небольшой высотѣ развивающимъ широкую, густую, развѣсистую крону вѣтвей. Устраиваются они также на яблоневыхъ, грушевыхъ и абрикосовыхъ деревьяхъ, на ивахъ, и, рѣже, на бѣлыхъ акаціяхъ, гледичіяхъ и на пирамидальныхъ тополяхъ. Располагаются на высотѣ отъ одной до четырехъ саженей. Мѣстоположеніе гнѣздъ разнообразно. Одни изъ нихъ помѣщаются на толстыхъ горизонтально распростертыхъ вѣтвяхъ или на вѣтвяхъ, подъ разными углами приподнятыми [2]; другія—въ развилинѣ между 2—3 болѣе или менѣе толстыми вѣтками и отъ нихъ отходящими нѣсколькими тонкими; третьи—въ пазухѣ между главнымъ стволомъ и боковою вѣтвью. Найти гнѣздо въ той чащѣ вѣтвей, какая образуется внутри кронъ карагача, далеко не всегда легко.

Гнѣздо зеленушки представляетъ плотную, нигдѣ не просвѣчивающуюся, толстостѣнную и обыкновенно толстодонную постройку, которая порою кажется громоздкой и неуклюжей. Наружныя части гнѣзда грубо и рыхло сплетены изъ прутиковъ, стебельковъ и корешковъ. Иногда эти части состоятъ изъ нѣсколькихъ слоевъ, свитыхъ и сбитыхъ изъ птичьихъ перьевъ [3] (главнымъ образомъ голубиныхъ и куриныхъ), комковъ ваты и кусочковъ растрепаннаго войлока, при чемъ весь этотъ матеріалъ обвитъ и провитъ сравнительно небольшимъ количествомъ грубыхъ растительныхъ волоконъ, часто перемѣшанныхъ съ тонкими и упругими корешками; въ нѣкоторыхъ гнѣздахъ такого рода наружная поверхность бываетъ на нѣсколько дюймовъ обвита кусками мягкой бечевки. Внутренній слой плотно сбитъ изъ плоскихъ комочковъ войлока, перемѣшаннаго съ конскимъ волосомъ и небольшимъ количествомъ перьевъ. Поверхность лоточка въ изобиліи выстлана конскимъ волосомъ. Часто внутреннія части гнѣздовыхъ стѣнокъ бываютъ выстроены изъ нѣсколькихъ слоевъ, нерѣдко легко отдѣляемыхъ одинъ отъ другого. Въ одномъ изъ найденныхъ въ Ташкентѣ гнѣздъ слои эти располагались въ

---

[1] Очень часто также (внутри города) на садовыхъ арчахъ, еляхъ и соснахъ. *Авт.*

[2] Такія подпираются съ боковъ 3—5 тонкими прутиками. *Авт.*

[3] Въ гнѣздахъ, найденныхъ въ городахъ и пригородахъ. *Авт.*

такомъ порядкѣ (считая по направленію внутрь): 1) нитки, растительныя волокна, перья голубя (въ особенности), куръ и коршуна, тряпочки и комки войлока; 2) тотъ же матеріалъ, но въ верхнихъ частяхъ много полосокъ размочаленнаго луба; 3) комки ваты, пучки собачьей шерсти, перья и куски мягкой бечевки; 4) перья и нѣжныя растительныя волокна. Выстилка лотка состоитъ изъ плотно умятой бараньей шерсти, къ которой подмѣшанъ конскій волосъ; поверхность лотка выстлана конскимъ волосомъ; верхній край этого слоя далеко не доходитъ до гнѣздового отверстія.—Гнѣзда, найденныя мною вдали отъ людского жилья [1]) отличались отъ сейчасъ описанныхъ меньшимъ разнообразіемъ матеріала и отчасти инымъ его составомъ. Наружныя части ихъ, грубо и рыхло выстроенныя изъ болѣе обильныхъ тонкихъ прутиковъ, стебельковъ, размочаленныхъ листьевъ злаковъ и корешковъ, включаютъ комки и отдѣльные стебли зеленаго мха, лишайникъ и полосы луба древовиднаго можжевельника (арчи). Среднія части гнѣздовыхъ стѣнокъ построены изъ тѣхъ же матеріаловъ, но болѣе плотно свитыхъ, съ примѣсью перьевъ дикихъ голубей и каменныхъ куропатокъ, шерсти дикой козы (Capreola sp.?) [2]), винторогаго козла (Capra falconeri) [3]) и мелкаго рогатаго скота. Гнѣздовой лотокъ состоитъ изъ шерсти этого послѣдняго и мягкихъ перьевъ, а его поверхность—изъ конскаго волоса и отдѣльныхъ длинныхъ щетинокъ кабана. Въ одномъ изъ гнѣздъ, найденныхъ въ долинѣ Пскема, эти матеріалы въ лоткѣ отсутствовали; ихъ замѣняли плотно сложенные куски какихъ то листьевъ, покрытые густымъ и короткимъ пухомъ.

Форма гнѣздъ измѣняется отъ глубокополушаровидной до почти строго цилиндрической; послѣдняя встрѣчается рѣдко.

Размѣры гнѣздъ таковы [4]):

	Глубина.	*Высота.*	*Ширина.*	*Діаметръ отверстія.*
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
1). 4. IV. 1907; Ташкентъ .	88	55	110	67
2). 3. IV. 1907; ib.	65	45	98	56
3). 4. VI. 1907; с. Нанай (на р. Пскемъ)	75	50	110	66

[1]) Въ долинѣ Пскема, въ урочищѣ Аралъ и въ горахъ Кухъ-и-Тангъ. *Авт.*

[2]) Гнѣздо съ Арала. *Авт.*

[3]) Гнѣзда изъ Кухъ-и-Тангъ. *Авт.*

[4]) Далеко не всѣхъ, наблюдавшихся мною. *Авт.*

	Глубина.	*Высота.*	*Ширина.*	*Діаметръ отверстія.*
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
4). 10. IV. 1908; Ташкентъ .	72	44	130	67
5). 8. IV. 1908; ib.	67	38	122	64
6). 14. IV. 1908; ib.	65	37	128	65
7). 12. V. 1908; ib.	68	38	125	65
8). 6. IV. 1909; ib.	76	43	119	67
9). Ib.	85	50	115	66
10). Ib.	76	48	98	58
11). 6. VI. 1909; ур. Аралъ .	75	50	100	65
12). Ib.	65	36	115	68
13). 3. IV. 1910; Ташкентъ .	85	60	125	68
14). 6. IV. 1910; ib.	80	58	112	65
15). 12. IV. 1910; ib.	75	50	110	67
16). 18. IV. 1910; ib.	77	38	130	58
17). 12. V. 1910; ур. Ходжа-филь	75	50	95	60
18). 28. III. 1911; Ташкентъ .	72	45	125	65
19). 22. IV. 1912; ib.	68	39	125	68

Валовая кладка яицъ въ Ташкентѣ и его окрестностяхъ совершается въ самыхъ послѣднихъ числахъ марта и главнымъ образомъ въ первыхъ двухъ третяхъ апрѣля. Нѣкоторыя самочки кладутъ рано, такъ какъ 21. IV. 1909 въ городскомъ кладбищенскомъ саду наблюдались уже перепархивающія молодыя. Совершенно законченное жилое гнѣздо, въ которомъ еще не было яицъ, найдено 2. III. 1910.

Въ выше перечисленныхъ гнѣздахъ находилось слѣдующее:

въ 1-омъ, 2-омъ } —по три совершенно свѣжихъ яйца,
„ 3-емъ—пять птенцовъ недѣльнаго возраста,
„ 4-омъ—пять очень сильно насиженныхъ яицъ,
„ 5-омъ—пять совершенно свѣжихъ яицъ,
„ 6-омъ—три совершенно свѣжихъ яйца,
„ 7-омъ—четыре очень сильно насиженныхъ яйца,
„ 8-омъ—пять совершенно свѣжихъ яицъ,
„ 9-омъ—три совершенно свѣжихъ яйца,
„ 10-омъ—четыре свѣжихъ яйца,
„ 11-омъ—четыре чуть насиженныхъ яйца,

Въ 12-омъ—четыре птенца недѣльнаго возраста,
„ 13-омъ—пять совершенно свѣжихъ яицъ,
„ 14-омъ—четыре совершенно свѣжихъ яйца,
„ 15-омъ—четыре только что вылупившихся птенца,
„ 16-омъ, „ 17-омъ } —по пяти совершенно свѣжихъ яицъ,
„ 18-омъ—три совершенно свѣжихъ яйца и
„ 19-омъ—пять чуть насиженныхъ яицъ.

[1]Число яицъ полной кладки колеблется между 4 и 5. Судя по моимъ наблюденіямъ, зеленушка эта выводитъ два раза въ лѣто, но далеко не всѣми парочками.

Форма яицъ большею частью раздуто-яйцевидная, рѣже правильно-яйцевидная. Поверхность гладкая, слабо блестящая. Цвѣтъ основного фона почти бѣлый, съ явственною или едва замѣтною зеленоватою или голубовато-зеленоватою примѣсью, равномѣрно распредѣленною по всей поверхности. Въ одной и той же кладкѣ на нѣкоторыхъ яйцахъ эта примѣсь можетъ развиваться сильнѣе, чѣмъ на остальныхъ. Иногда она замѣняется розоватою и притомъ то на всѣхъ яйцахъ кладки, то лишь на нѣкоторыхъ. Къ зеленоватому цвѣту примѣси иногда присоединяется желтоватый оттѣнокъ. Отмѣтины многочисленны, но, несмотря на это, онѣ почти всегда оставляютъ основной фонъ повсюду хорошо виднымъ. Обыкновенно особенно многочисленными являются такъ называемыя глубокія отмѣтины. Эти послѣднія большею частью имѣютъ неправильныя очертанія и представляются тѣнями, пятнами и пятнышками, точками и каракульками (послѣдніе два рода часто отсутствуютъ). Цвѣтъ ихъ или блѣдный коричнево-розоватый, часто переходящій въ сѣровато-лиловатый, или блѣдный сѣровато-коричневый, частью грязно-розоватый. Вокругъ полюса тупого конца яйца или вообще на тупомъ концѣ онѣ частью сливаются другъ съ другомъ. Поверхностныя отмѣтины (пятнышки, точки) имѣютъ кругловатыя формы; лишь немногія изъ нихъ принимаютъ видъ каракулекъ или даже завитушекъ; онѣ сгущены вокругъ полюсовъ тупого конца яйца, или вообще на этомъ концѣ, или вообще на тупой яичной половинѣ. Цвѣтъ ихъ коричневый и красновато-коричневый въ однѣхъ кладкахъ, свѣтло-темно- и черно-коричневый въ другихъ. Нерѣдко края немногихъ изъ этихъ отмѣтинъ постепенно блѣднѣютъ и кажутся расплывчатыми.

Переходя къ размѣрамъ яицъ туркестанской зеленушки, считаю полезнымъ привести цѣлый ихъ рядъ по отдѣльнымъ кладкамъ и частью по №№ измѣренныхъ гнѣздъ.

	Длина.	*Ширина.*	*Длина.*	*Ширина.*
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
1	20,8	15,7	2 20,7	15,4
	20,7	14,9	20,5	14,9
	20,8	14,2	20,4	14,6
4	22,8	15,4	5 20,6	15,5
	22,8	15,6	20,5	14,7
	22,6	15,7	20,6	15
	21,8	15,4	20,8	15,7
	21,8	15,4	20,9	15,6
6	20,6	14,9	7 20,7	14,8
	20,7	14,8	20,6	14,9
	20,4	15,4	20,4	15,3
			20,6	15,4
15.IV.1909; Ташкентъ; (сильно насижены). . .	22,4	15	8 20,5	15,4
	22,4	15,2	20,4	15,3
	22,2	15,3	20,6	14,8
	21,4	15	20,7	14,8
	21,4	15	20,6	15,3
Ib.; (свѣжія). .	22,3	14,9		
	22,3	15,1	9 20,3	14,5
	22,1	15,2	20,4	15,3
	21,3	14,9	20,6	15,3
	21,3	14,9		
10.IV.1910; ib.; (свѣжія) . . .	20,9	15	10 20,7	14,8
	20,8	15,1	20,6	15,4
	20,6	15,5	20,6	14,9
	20,8	15,6	20,7	def.
22.IV.1910; ib.; (чуть насижены).	21,5	15,9	11 20,8	15,7
	21,4	15,9	20,7	14,9
	21,8	15,4	20,8	15,2
	21,7	15,6	21	15,7

		Длина. m.m.	*Ширина.* m.m.		*Длина.* m.m.	*Ширина.* m.m.
15. IV. 1912; ib.; (свѣжія). . . .		22,1	14,7	13	20,7	15,4
		22,1	14,8		20,7	14,9
		22	15		20,5	15,4
					20,7	15,6
					21	15,5
	14	20,7	14,8	16	20,6	15,3
		20,4	15,4		20,6	14,9
		20,5	15,2		20,4	15,5
		20,6	14,9		20,7	14,8
					20,4	15,4
28. IV. 1912; Ташкентъ; (свѣжія).		20,6	14,9	17	20,3	14,5
		20,5	15,2		20,6	15,5
		20,5	15,2		20,8	15,5
					21	15,3
					21,6	15,7
2. V. 1913; ib.; (наканунѣ вылупленія птенцовъ)		20,7	15,6	18	20,5	15,4
		20,6	15,5		20,4	14,6
		20,9	15		20,5	14,9
		20,8	14,9			
7. V. 1913; ib.; (сильно насижены)		20,8	15,1	19	20,2	15,1
		20,7	14,4		20,1	14,3
		20,8	15,4		20,2	14,7
		20,9	15,2		20,5	15,2
		20,5	15,4		20,1	14,4
Ib.; (свѣжія) .		20,2	15,1			
		20,1	15			
		20,3	14,5			
		20,4	14,5			

Пищу взрослыхъ птицъ составляютъ зерна различныхъ растеній и нѣкоторыя ягоды (въ томъ числѣ арчевыя); кормятся онѣ также насѣкомыми, въ особенности жучками и кое-какими мелкими Hymenoptera (по крайней мѣрѣ весною). Для гнѣздо-

выхъ молодыхъ таскаютъ всевозможныхъ насѣкомыхъ и ихъ личинокъ.

Какъ на несомнѣнный фактъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что, начиная съ 1907-го и включительно по 1913 годъ, общая численность какъ мѣстовыхъ, такъ и пролетныхъ зеленушекъ въ Ташкентѣ, его окрестностяхъ и вообще въ долинѣ Чирчика прогрессивно увеличивалась.

Мои матеріалы еще не совсѣмъ достаточны, чтобы толковать о линяніи нашей птицы, а также о ея возрастныхъ и сезонныхъ нарядахъ.

Къ біологіи оляпки (Cinclus melanogaster Brehm).

С. Г. Штехеръ.

Zur Biologie der Wasseramsel (Cinclus melanogaster Brehm).

Von *S. G. Stecher.*

Мои лѣтнія наблюденія касаются оляпокъ восточной части Бирскаго уѣзда, Уфимской губерніи, и я могу сказать, что мною были найдены здѣсь лишь экземпляры Cinclus melanogaster Brehm [1]).

Впервые я встрѣтилъ оляпку въ означенной мѣстности 7-го мая, поднимаясь вверхъ по теченію рѣчки Яманъ-Елги, на ея лѣвомъ берегу, верстахъ въ $2^1/_2$—3-хъ отъ впаденія въ рѣку Уфу, въ устьѣ широкаго, быстраго ручья съ каменистымъ ложемъ. Ручей этотъ беретъ начало почти тутъ же, аршинахъ въ 15-ти отъ берега,

[1]) Вопросъ о распространеніи водяного воробья въ Россіи далеко не разрѣшенъ еще окончательно, и въ литературныхъ данныхъ постоянно встрѣчаются указанія на странность и даже загадочность распространенія этой птички, а сами эти данныя страдаютъ зачастую неполнотой и сбивчивостью. Обычно признается, что для западной части страны обыкновенна форма Cinclus aquaticus, а для восточной Россіи (и центра)—C. melanogaster. Но случаи нахожденія обѣихъ формъ на востокѣ (Уфимская и Оренбургская губерніи) заставляютъ осторожнѣе относиться къ такому категорическому прикрѣпленію одной формы къ западной области, а другой къ восточной. Что касается Уфимской губерніи въ частности, то, какъ уже сказано, въ ней (по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ ея уѣздахъ) наблюдались обѣ формы, но „какая форма живетъ въ области равнинныхъ лѣсовъ губерніи, въ уѣздахъ Бирскомъ и Уфимскомъ—остается неизвѣстнымъ“ (П. П. Сушкинъ: „Птицы Уфимской губерніи“, стр. 281 и слѣд.). *Авт.*

вытекая изъ небольшого углубленія въ видѣ грота. Все ложе ручья хорошо скрыто густыми зарослями ольхи, орѣшника, липы и рябины. По берегамъ его много большихъ камней, покрытыхъ толстымъ слоемъ мха. Подробно осмотрѣвъ мѣстность, я убѣдился, что здѣсь почти на каждомъ сколько-нибудь выдающемся и покрытомъ мхомъ камнѣ было сдѣлано птицами по нѣсколько углубленій, у большинства которыхъ края были выложены мхомъ и старательно выглажены—все попытки устроить гнѣздо, оканчивавшіяся неудачей, благодаря встрѣчавшимся препятствіямъ то въ видѣ толстаго корня, то въ силу небольшой глубины слоя мха и земли, покрывающаго камни.

Есть указанія [1]), что лѣтомъ оляпка очень осторожна и не подпускаетъ къ себѣ даже на близкій выстрѣлъ. Я не могу сказать того же о наблюдавшихся мною экземплярахъ. Наоборотъ, какъ съ весны, такъ и позднѣе лѣтомъ птички подпускали къ себѣ на очень близкое разстояніе, до 10—8 аршинъ, безъ всякаго прикрытія. Сидя за камнемъ или деревомъ, можно хорошо разсмотрѣть, какъ птички быстро перебѣгаютъ по камешкамъ, заходятъ въ воду и по временамъ скрываются подъ ней въ поискахъ водяныхъ насѣкомыхъ. Скрывшись неожиданно подъ водой, оляпка также неожиданно появляется гдѣ-нибудь на камешкѣ выше по теченію рѣки. Для отдыха водяные воробьи выбираютъ какое-нибудь опредѣленное мѣсто, и, насколько я могъ замѣтить, не одно, а два-три. Въ данномъ случаѣ такими мѣстами отдыха служили сваленное у устья ручья дерево и выдавшійся изъ воды камень. Здѣсь оляпки подолгу сидѣли, охорашиваясь и приводя въ порядокъ перышки. Въ это время птичка часто присѣдаетъ и какъ бы подается нѣсколько впередъ, изрѣдка издавая свой характерный крикъ, нѣчто вродѣ „жикъ-жикъ“ или „чикъ-чикъ“ съ глухими нотками. Во время крика присѣданіе становится чаще и сопровождается быстрымъ распусканіемъ крыльевъ внизъ и вбокъ. Иногда оляпка поджимаетъ одну ногу и сидитъ подолгу нахохлившись. При перелетахъ съ мѣста на мѣсто она слѣдуетъ всѣмъ изгибамъ рѣки; летитъ быстро, но не высоко и не далеко.

Мнѣ ни разу не пришлось видѣть, чтобы оляпки добывали кормъ въ непосредственной близости мѣста своего обитанія [2]).

[1]) П. П. Сушкинъ: „Птицы Уфимской губерніи“, стр. 282. *Авт.*

[2]) Возможно, что тутъ сказывается осторожность птичекъ (боязнь обнаружить мѣсто гнѣздовья). *Авт.*

Къ статьѣ С. Г. Штехера—„Къ біологіи оляпки (Cinclus melanogaster Brehm)".



Рис. 1. Мѣсто гнѣздованія олянокъ на рѣчкѣ Яманъ-Елгѣ.



Рис. 2. Мѣсто кормежки олянокъ—каменистая отмель на рѣчкѣ Яманъ-Елгѣ.

Къ статьѣ С. Г. Штехера—„Къ біологіи оляпки (Cinclus melanogaster Brehm)".



Рис. 3. Внутренній видъ гнѣзда оляпки. (Будочка изъ мха спята).



Рис. 4. Гнѣздо оляпки сбоку.

Мѣстъ кормежки было нѣсколько и всѣ они находились въ нѣкоторомъ разстояніи отъ гнѣздовья, хотя, правда, въ небольшомъ. На такое мѣсто кормежки птица перелетаетъ прямо съ насѣста, не останавливаясь. Обычно это—каменистая отмель у берега или посреди рѣчки, поросшая „мать-мачехой“. Шныряя между листьями въ неглубокой водѣ, оляпка клювомъ переворачиваетъ мелкіе камешки, чтобы добыть изъ-подъ нихъ кормъ.

Брачную пѣсенку самца мнѣ удалось слышать впервые 20-го мая. Самецъ пѣлъ, усѣвшись на выдавшемся надъ водой сучкѣ и совершенно не обращалъ вниманія на мое присутствіе. Не мѣшалъ ему и шедшій въ это время проливной дождь съ холоднымъ, сильнымъ вѣтромъ. Оляпку ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать общественной птицей: пара отъ пары селится на значительномъ разстояніи и занимаетъ вполнѣ опредѣленный районъ. Я не встрѣчалъ двухъ паръ ближе, чѣмъ на три версты одна отъ другой, но мѣста обитанія поразительно схожи. Этимъ еще разъ подтверждается наблюденіе, что для своего жилья оляпка требуетъ условій вполнѣ опредѣленныхъ: чистую и быструю воду, каменистые берега, поросшіе болѣе или менѣе густо кустами и деревьями, достаточно хорошо скрывающими все мѣсто гнѣздовья.

Гнѣздо оляпки было найдено мною 29-го мая. Въ немъ оказалось два еще не насиженныхъ яйца чисто-бѣлаго цвѣта. Гнѣздо было устроено на высотѣ около 12 вершковъ отъ поверхности воды, на совершенно отвѣсномъ камнѣ, нѣсколько вдавшемся въ ложе ручья и густо покрытомъ мхомъ сверху. Мохъ толстымъ слоемъ свисалъ и на края камня. Въ этомъ-то свѣсившемся слоѣ мха и было сдѣлано гнѣздо, имѣющее снаружи видъ норы. Надъ „норой“ изъ мха же прилажена будочка, снизу которой имѣется округлое входное отверстіе, діаметръ котораго около 9—10 сант. Внутреннее помѣщеніе шаровидной формы, выстланное стеблями и мелкими корешками; на днѣ его находится лоточекъ слѣдующихъ размѣровъ:

наружный діаметръ	16	сант.
внутренній „	7	„
глубина	5,5	„

Само гнѣздо имѣетъ три слоя. Изъ нихъ наружный сдѣланъ изъ того же матеріала, которымъ выстлана вся внутренность „норы“: изъ тонкихъ корешковъ растеній съ добавленіемъ небольшого количества мха; слѣдующій, средній, слой сплетенъ

изъ сѣна [1]) и въ него кое-гдѣ вплетены сухіе листья тальника; наконецъ, внутренній состоитъ сплошь изъ листьевъ сейчасъ упомянутаго кустарника. На эту настилку и положила самочка два яйца. Ни пуха, ни перьевъ въ гнѣздѣ не было. Снаружи гнѣздо такъ хорошо скрыто между нависшими корнями и травой, а будочка его такъ гармонируетъ съ окружающей обстановкой, что разыскать его можно лишь съ большимъ трудомъ.

Дальнѣйшія наблюденія (съ 29-го мая по 10-ое іюня) въ означенной мѣстности убѣдили меня, что по какимъ-то причинамъ птички бросили найденное мною гнѣздо, можетъ быть даже раньше того времени, когда я его нашелъ. Кладка не заканчивалась, яйца продолжали оставаться холодными и самочки съ нихъ я ни разу не согналъ, а между тѣмъ самца встрѣчалъ здѣсь же всякій разъ съ пищей въ клювѣ, что указывало на существованіе гдѣ-нибудь другого гнѣзда. Я принялся за поиски, разсчитывая, что самецъ самъ укажетъ мнѣ его, принося пищу для самки и молодыхъ, если они уже вывелись. И дѣйствительно, именно это помогло мнѣ 12-го іюня найти второе гнѣздо, устроенное въ самомъ истокѣ ручья, представлявшемъ изъ себя гротъ аршина въ $1^1/_2$ глубины и до 5 четвертей высоты. Гнѣздо это было свито въ щели между камней. Осмотръ его при помощи электрическаго фонарика [2]) показалъ, что сдѣлано оно на скорую руку: будка изъ мха отсутствовала [3]); лоточекъ представлялъ просто кучку сѣнной трухи, сухихъ стебельковъ и корешковъ—никакихъ слоевъ, никакой старательности въ отдѣлкѣ. Въ гнѣздѣ этомъ оказалось три вполнѣ насиженныхъ яйца и одинъ только что выклюнувшійся голый птенецъ. Какъ видно, въ данномъ случаѣ фактъ постройки новаго гнѣзда и вторичной кладки не отразился нисколько на числѣ яицъ [4]).

Самочка сидитъ въ гнѣздѣ настолько крѣпко, что надо какъ слѣдуетъ пошумѣть, постучать у самаго гнѣзда палкой, чтобы заставить ее слетѣть. Самецъ во время высиживанія находится неподалеку и носитъ для самки кормъ. Изрѣдка, обычно около полудня, и самка покидаетъ гнѣздо, и тогда птички вмѣстѣ отпра-

---

[1]) На противоположномъ берегу рѣки находился стогъ прошлогодняго сѣна. *Авт.*

[2]) Въ гротѣ было совершенно темно. *Авт.*

[3]) Возможно потому, что въ ней въ этомъ случаѣ не было надобности: гнѣздо, помѣщавшееся въ гротѣ, и такъ было совершенно скрыто отъ глазъ. *Авт.*

[4]) Нормальная кладка оляпки—4 яйца. *Авт.*

вляются на свои излюбленныя мѣста кормежки, но не надолго. Неоднократно я замѣчалъ, что если оляпки улетали кормиться вмѣстѣ, то и возвращались всегда вмѣстѣ же. При возвращеніи самецъ какъ бы старался усадить самку въ гнѣздо, если она почему-либо сама не забиралась туда сразу съ прилета: онъ бѣгалъ тогда вокругъ нея, хлопалъ крыльями и присѣдалъ, издавая все время особый крикъ, какъ мнѣ показалось, — часть своей брачной пѣсенки. Одинъ самецъ никогда не подлетаетъ къ гнѣзду сразу, а, опустившись около него въ 3—4-хъ саженяхъ, остающееся разстояніе перебѣгаетъ по камешкамъ, при чемъ часто останавливается и озирается во всѣ стороны, внимательно прислушиваясь и приглядываясь ко всему. Подбѣжавъ къ гнѣзду аршина на полтора, онъ издаетъ свой обычный крикъ и только окончательно удостовѣрившись, что ниоткуда не грозитъ опасность, впархиваетъ въ гнѣздо.

Дальше въ моихъ наблюденіяхъ наступаетъ перерывъ, вызванный болѣзнью. Когда же 1-го іюля мнѣ удалось снова посѣтить знакомый ручей, то оляпокъ на немъ уже не было. Позднѣе мнѣ нерѣдко случалось бывать какъ на мѣстахъ ихъ гнѣздованія, такъ и проходить по рѣчкѣ Яманъ-Елгѣ, забираясь иногда далеко вверхъ по ея теченію, но, несмотря на это, оляпка была замѣчена здѣсь мною только разъ, именно: около 25-го іюля я встрѣтилъ одну старую птицу верстахъ въ 7—8 отъ устья названной рѣчки.

Зимуютъ ли оляпки въ изслѣдованномъ мною районѣ, лично мнѣ убѣдиться не пришлось, но одинъ изъ мѣстныхъ охотниковъ увѣрялъ меня, что видалъ здѣсь этихъ птичекъ зимой; держались онѣ, по его словамъ, на быстрыхъ мѣстахъ рѣки, не замерзающихъ даже въ очень сильные морозы.

Замѣтки о нѣкоторыхъ кавказскихъ птицахъ.

Э. В. Шарлеманъ.

Notizen über einige kaukasische Vögel.

Von *E. W. Scharleman.*

Составляя „Каталогъ коллекцій Кіевскаго Орнитологическаго Общества имени К. Ѳ. Кесслера“, я имѣлъ возможность сравнить нѣкоторые виды птицъ сбора Б. А. Домбровскаго въ Батумской области съ птицами изъ другихъ частей Россійской Имперіи. Предлагаемая замѣтка является результатомъ сравненія кавказскихъ особей просянки съ просянками изъ Юго-Западнаго края и нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ.

Какъ видно изъ приведенныхъ ниже измѣреній, кавказскую просянку невозможно отличить по размѣрамъ отъ европейской. При сравненіи батумскихъ птицъ съ экземплярами изъ Юго-Западнаго края, по возможности въ соотвѣтствующемъ перѣ, я не могъ найти замѣтныхъ отличій и въ окраскѣ оперенія. Такимъ образомъ, мнѣ кажется, правъ E. Hartert [1]), относящій кавказскую просянку къ типичной формѣ, и не правъ С. А. Бутурлинъ, выдѣляющій ее въ мѣстную форму—Miliaria calandra caucasica But. (=minor Radde nec Brhm) [2]).

---

[1]) „Die Vögel der paläarktischen Fauna“, Heft II, S. 166. *Авт.*

[2]) Журналъ „Наша Охота“ за 1909 г., кн. XI, стр. 90. *Авт.*

Значительныя половыя и индивидуальныя колебанія въ размѣрахъ просянокъ изъ Батумской области и Юго-Западнаго края почти тождественны и во всякомъ случаѣ первыхъ нельзя считать болѣе мелкими. Въ своей замѣткѣ о просянкахъ С. А. Бутурлинъ [1]) даетъ въ среднемъ нѣсколько бо́льшія размѣры, нежели мои для европейскихъ и центрально-азіатскихъ особей (крыло 98—103½, хвостъ 74—81 m.m.), и приблизительно сходныя съ моими для кавказскихъ. Первыхъ въ распоряженіи С. А. Бутурлина, судя по цитированной замѣткѣ, было 5 экземпляровъ (Сѣверная Италія, Польша, Тянь-Шань) [2]), вторыхъ—6 экземпляровъ (Кутаисъ, Ахалцыхъ, Ленкорань и Геокъ-Тапа) [3]).

Относительно Miliaria calandra var. minor Radde (= caucasica Buturl.) можно сказать слѣдующее.

По свидѣтельству Radde [4]), изъ 18 имѣвшихся въ его распоряженіи просянокъ съ Кавказа было 16 нормальной величины и 2 мелкихъ экземпляра (♂ и ♀). Изъ приведенныхъ авторомъ измѣреній послѣднихъ экземпляровъ видно, что размѣры ♀ не только не малы (крыло—98, хвостъ—73 m.m.), но даже велики и для взрослыхъ самокъ Miliaria calandra calandra (Linn.). Остается, такимъ образомъ, изъ 18 экземпляровъ всего одинъ ♂ нѣсколько меньшей величины, нежели нормальные. Замѣчу, что этотъ самецъ, по свидѣтельству автора, въ обношенномъ лѣтнемъ перѣ. Одинъ на 18—процентъ, мнѣ кажется не достаточный для того, чтобы выдѣлять кавказскую просянку въ мѣстную форму. Самъ Радде, повидимому, былъ далекъ отъ этой мысли и свою просянку онъ считалъ всего лишь типомъ личныхъ измѣненій (var. minor).

Привожу измѣренія (въ миллиметрахъ) 26-ти экземпляровъ Miliaria c. calandra (Linn.) изъ Юго-Западнаго края и Варшавской губерніи и 10-ти—изъ Батумской области.

---

[1]) Loc. cit. *Авт.*

[2]) По свидѣтельству Н. А. Зарудnаго („Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1912 г., кн. III, стр. 209—214), центрально-азіатскія просянки относятся къ формѣ—Miliaria calandra buturlini Johans., отличающейся, между прочимъ, нѣсколько большими размѣрами нѣкоторыхъ своихъ частей. *Авт.*

[3]) Ни полъ, ни возрастъ этихъ птицъ авторомъ не обозначены. *Авт.*

[4]) „Ornis Caucasica“, S. 196. *Авт.*

	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.	Клювъ по ребру.	Длина клюва отъ позади.
♂♂.					
1). Окрестности Кіева; 30. III. 1909	104	78	25	14	9.5
2). Ibid.; мартъ 1908 года	103	75	24	14,2	10
3). Деревня Даниловка, Кіевскій уѣздъ; 30. IV. 1912	101	78	26	14,5	10
4). Ibid.; 26. IV. 1909	100	76	23	13	9
5). Ibid.; 2. XI. 1911	100	79	26	14	9.3
6). Ibid.; 10. XI. 1911	100	78	24	13	9
7). Ibid.; 1. I. 1910	100	75	26	13,5	9
8). Ibid.; 28. IV. 1912	100	78	26	15	10
9). Ibid.; 7. IV. 1912	100	75	24	14	9
10). Ibid.; 23. II. 1912	100	77	25	14	10
11). Ibid.; 28. IV. 1912	98	74	25	13	9
12). Село Хотовъ, Кіевскій уѣздъ; весна 1908 года	98	76	25	14	9
13). Окрестности Кіева; 22. III. 1910	98	77	24	14	9
14). Ibid.; 2. IV. 1911	96	75	24	15	10
15). Деревня Даниловка, Кіевскій уѣздъ; 15. VIII. 1911	96	74	25	13	9
16). Ibid.; 23. II. 1912	96	73	25	12	9,2
17). Окрестности Кіева; 26. IV. 1912	95	69	25	13,5	9
18). Ковельскій уѣздъ, Волынская губернія; 7. I. 1913	95	78	24,5	14	9
♀♀.					
19). Кутновскій уѣздъ, Варшавская губернія; 27. XII. 1911	93	73	24	13	9
20). Село Хотовъ, Кіевскій уѣздъ; весна 1908 года	93	69	24	13	9,5
21). Литинскій уѣздъ, Подольская губернія; 30. IV. 1909	92	70	24	14	9
22). Кутновскій уѣздъ, Варшавская губернія; 28. XII. 1911	91	71	23	12,5	8

	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.	Клювъ по ребру.	Длина клюва отъ ноздри.
♀♀.					
23). Деревня Даниловка, Кіевскій уѣздъ; 23. II. 1912	90	71	23,5	11	9
24). Ibid.; 24. II. 1912	89	69	24	11,5	8,5
25). Ibid.; 24. II. 1912	88	68	23	11	8,5
26). Ibid.; 15. VIII. 1911; semiad.	91	71	25	13	9,5
♂♂.					
27). Село Чуруксу, Батумская область; 14. VI. 1910	102	81	25	15	10
28). Ibid.; 30. V. 1910	100	75	25	13	9
29). Ibid.; 3. VI. 1909	96	75	25	14	9,5
♀♀.					
30). Ibid.; 25. VI. 1910	93	71	24	13.5	9,5
31). Ibid.; 14. VI. 1910	92	71	23	13	9
32). Ibid.; 7. VI. 1909	92	76	23	14	9
33). Ibid.; 6. VI. 1909	90	71	23	13	9
34). Ibid.; 4. VI. 1909	90	70	23	13	9
35). Ibid.; 28. VII. 1910; semiad.	94	68	23	14	9,5
36). Ibid.; 18. VIII. 1910; „	87	65	24	13	9

Къ распространенію гаичекъ въ Европейской Россіи.

Проф. *П. П. Сушкинъ.*

Zur Verbreitung der Sumpfmeisen im Europäischen Russland.

Von Prof. *P. P. Suschkin.*

Penthestes palustris L., какъ выяснилось изъ пересмотра матеріаловъ моей коллекціи, гнѣздится въ Тульской губерніи и центральныхъ частяхъ Уфимской. Въ Тульской губерніи птенецъ, вполнѣ выросшій, но еще въ гнѣздовомъ перѣ, добытъ 16. VI. 1890 (ст. стиля) въ дубовомъ лѣсу („засѣкѣ") у деревни Бобровки, Веневскаго уѣзда. Въ Уфимской губерніи птенцы добыты 6. VI. 1891 (ст. стиля) у селенія „Благовѣщенскій заводъ" (въ 25 верстахъ отъ Уфы внизъ по Бѣлой), въ осиновомъ порѣчномъ лѣсу, и затѣмъ 5 экземпляровъ добыты въ первой половинѣ октября того же года у деревни Дурасово (граница Уфимскаго и Белебеевскаго уѣздовъ), у деревни Михайловки (Уфимскаго уѣзда) и въ окрестностяхъ Уфы. Отмѣчу, что неподалеку отъ „Благовѣщенскаго завода", у деревни Ангосякъ, Бирскаго уѣзда, найдена на гнѣздовьи P. atricapillus borealis Selys и что осенью подъ Уфою P. palustris и P. atricapillus borealis встрѣчались при одинаковыхъ условіяхъ [1]).

[1]) Въ моихъ статьяхъ „Птицы Тульской губерніи" (1891 годъ) и „Птицы Уфимской губерніи" (1897 годъ) я ошибочно отнесъ эти экземпляры къ P. atricapillus borealis. Остальныя наблюденія, помѣщенныя въ названныхъ работахъ подъ этою рубрикой, относятся къ настоящей P. borealis. Изъ экземпляровъ коллекціи, перечисленныхъ въ „Птицахъ Уфимской губерніи" подъ рубрикой P. borealis, къ P. palustris относятся №№ 7, 8, 10, 12, 14, 15 и 16.

P. palustris изъ Тульской губерніи относится повидимому къ подвиду stagnatilis, насколько это возможно установить по молодой птицѣ. Уфимскіе экземпляры наиболѣе близки къ stagnatilis, но въ то же время отличаются отъ бывшаго у меня въ рукахъ сравнительнаго матеріала (двѣ птицы изъ подъ Харькова, одинъ экземпляръ изъ Босніи и одинъ экземпляръ изъ западной Венгріи; послѣдніе два экземпляра были любезно присланы мнѣ Э. Хартертомъ именно какъ весьма типичные stagnatilis). У уфимскихъ птицъ бѣлая окраска боковъ шеи ярче, болѣе чистая, особенно по границѣ съ черной шапочкой; горловое пятно у большинства крупнѣе. Я не рѣшаюсь, однако, установить новую форму на основаніи этихъ признаковъ, такъ какъ недостаточно знакомъ съ варіаціями stagnatilis.

P. atricapillus borealis видимо гнѣздится къ югу до окрестностей Боброва, Воронежской губерніи. Парочка взрослыхъ птицъ была добыта 18. VI. 1888 отъ выводка, въ нестаромъ дубовомъ лѣсу нагорнаго берега рѣки Битюга, въ 7 верстахъ ниже Боброва.

Примѣчаніе. Хорошій признакъ для различенія P. palustris отъ P. atricapillus даетъ окраска большихъ кроющихъ крыла. У P. atricapillus (провѣрено на подвидахъ borealis, baicalensis. suschkini, restrictus) оба опахала окрашены въ темный буровато-сѣрый (пыльно-сѣрый) цвѣтъ; по краю наружнаго опахала и по вершинѣ пера идетъ свѣтлый ободокъ, того же цвѣта, какъ окраска спины, шириною около 1 m.m., размытый, но ясно отличающійся отъ темной остальной части пера. У palustris (провѣрено на: dresseri, stagnatilis, brevirostris, crassirostris) большія кроющія окрашены равномѣрнѣе и свѣтлѣе, свѣтлый ободокъ на наружномъ опахалѣ не выдѣляется. Эти отличія одинаково хорошо видны какъ на свѣжемъ опереніи взрослыхъ птицъ, такъ и въ сильно изношенномъ нарядѣ, и въ птенцовомъ опереніи,—когда различіе въ блескѣ шапочки неуловимо.

P. palustris brütet im Gouv. Tula, Kreis Wenjew, und im Centralteil des Gouv. Ufa. Die Glanzkopfmeise aus dem Gouv. Tula gehört wahrscheinlich der Subsp. stagnatilis, soweit es nach dem erbeuteten jungen Vogel festzustellen ist. Die Exemplare aus dem Gouv. Ufa stehen der Subsp. stagnatilis am nächsten, unterscheiden sich aber (Vergleichsmaterial allerdings nur 4 Exemplare, aus Charkow, Ungarn, Bosnien) durch reinere weisse Färbung der Halsseiten.

P. atricapillus borealis brütet noch in den Eichenwäldern nahe der Stadt Bobrow, Gouv. Woronesch.

Bemerkung. P. palustris und P. atricapillus lassen sich u. a. durch die Färbung der grossen Flügeloberdecken unterscheiden. Bei atricapillus sind diese Federn an beiden Fahnen dunkel staubgrau, an der Aussenfahne und an der Spitze deutlich hell gesäumt; bei palustris sind diese Federn überhaupt lichter; ohne helleren Saum an der Aussenfahne. Diese Merkmale sind auch im abgetragenen Gefieder der alten, wie auch im Nestgefieder stichhaltig, wenn der übliche Unterschiedsmerkmal—die Färbung der Kopfplatte—nicht verwendbar ist.

Замѣтка о новой пѣночкѣ изъ Туркестана (Phylloscopus collybita subsindianus subsp. nov.).

Н. А. Зарудный.

Bemerkung über einen neuen Laubsänger von Turkestan (Phylloscopus collybita subsindianus subsp. nov.).

Von *N. A. Sarudny.*

Въ коллекціи, собранной С. М. Алексѣевымъ въ 1911 году въ Бухарскихъ владѣніяхъ, былъ мною осмотрѣнъ интересный экземпляръ пѣночки, не поддавшійся опредѣленію. Это—старый самецъ, добытый въ серединѣ іюня на южныхъ отрогахъ Дарвазскаго хребта въ Кулябскомъ бекствѣ. По размѣрамъ онъ напрашивался на сравненіе съ Phylloscopus collybita tristis Blyth. и P. c. sindianus Brooks, по пластикѣ крыла—на сравненіе съ P. c. sindianus и P. neglectus Hume, по цвѣту оперенія—на сравненіе частью съ P. c. tristis, частью съ P. neglectus.

Отъ P. c. tristis [1]) онъ отличался болѣе блѣднымъ и сѣроватымъ оттѣнкомъ бураго цвѣта верхней стороны, большею блѣдностью нижней стороны, присутствіемъ на этой послѣдней, именно на груди и передней части брюха, явственнаго желтаго налета и, наконецъ, громаднымъ по длинѣ и ширинѣ первымъ маховымъ.

Отъ P. c. sindianus разнился сравнительно яркой желтой окраской нижнихъ кроющихъ крыла и подмышечныхъ, желтизной на перьяхъ вершины голени, *присутствіемъ уже изрядно стершихся, но все же хорошо замѣтныхъ зеленоватыхъ каймъ на верхнихъ кроющихъ крыла и въ основныхъ половинахъ заднихъ маховыхъ* [2]), *замѣтной желтизной на груди и передней части брюха.*

---

[1]) Осмотрѣна мною болѣе чѣмъ въ 200 экземплярахъ изъ Туркестана. *Авт.*

[2]) По E. Hartert'y („Die Vögel der paläarktischen Fauna", S. 505), зеленый оттѣнокъ у P. sindianus отсутствуетъ. *Авт.*

Сближаясь съ P. neglectus въ отношеніи окраски верхней и отчасти нижней стороны, а также пластики крыла,—онъ рѣзко отъ нея отличался болѣе крупной величиной, желтизной вершинъ голеней, зеленоватостью на верхней сторонѣ крыла и несравненно большею интенсивностью желтаго цвѣта на нижнихъ кроющихъ крыла и подмышечныхъ.

Размѣры этого экземпляра слѣдующіе: клювъ: отъ угла рта—12,5, отъ передняго края ноздри—6,5; крыло—60; хвостъ—52; плюсна (сзади, отъ пяточнаго сочлененія до основанія задняго пальца)—19 m.m..

Клювъ такой же формы, какъ у P. c. tristis. Цвѣтъ его черно-бурый съ желтоватымъ основаніемъ нижней челюсти. Ноги буро-черныя, почти черныя, съ желто-бурыми подошвами пальцевъ.

Отношеніе маховыхъ: 4=5=3 немного>6>7>8>9>2>... *Длина 1-го маха превышаетъ длину половины 2-го на 1,5 m.m..*

Опредѣляя орнитологическую коллекцію, собранную Г. С. Кочубеемъ минувшимъ лѣтомъ въ Туркестанѣ, я нашелъ въ ней одинъ экземпляръ пѣночки, несомнѣнно относящійся къ этой же формѣ. Добытъ онъ 7. VIII около селенія Дараутъ-курганъ на южныхъ склонахъ хребта Алайскаго. Это—молодая птица въ вполнѣ развитомъ первомъ нарядѣ, съ пробивающимися въ разныхъ мѣстахъ и отчасти уже выросшими перьями первой осени. Какъ видно по этимъ перьямъ, окраска ея верхней стороны должна быть блѣднѣе и сѣрѣе, чѣмъ у P. c. tristis въ первую осень ея жизни. Всѣ верхнія кроющія крыла и малые махи съ буро-оливково-зеленоватыми каймами перьевъ, какъ гнѣздовыхъ, такъ и перво-осенніхъ (каймы большихъ маховыхъ и рулей оливково-сѣроваты) [1]. По Ф. Д. Плеске („Ornithographia Rossica“, S. 275), у P. c. tristis въ гнѣздовомъ опереніи эти каймы *весьма интенсивнаго золотисто-оливковаго цвѣта.* Нижнія кроющія крыла, подмышечныя и перья вершинъ голеней, яркаго желтаго цвѣта въ первомъ нарядѣ, такими же остаются послѣ линянія, т.-е. какъ у P. c. tristis, но не у P. c. sindianus. Нижняя сторона, какъ видно по пробивающимся и уже пробившимся перьямъ первой осени, должна быть болѣе блѣдной, чѣмъ у P. c. tristis, а ея бѣлый цвѣтъ болѣе чистымъ. Грудь въ старыхъ и молодыхъ перьяхъ покрыта желтоватымъ налетомъ, чего не бываетъ у P. c. tristis и P. c. sindianus, но часто наблюдается у P. neglectus.

---

[1]) Махи и рули у молодыхъ пѣночекъ осенью не смѣняются. *Авт.*

Размѣры его слѣдующіе: клювъ—11,3 и 5,6; крыло—57,7; хвостъ—51,3; плюсна 18,6 m.m..

Клювъ и ноги развѣ чуть немного блѣднѣе, чѣмъ у взрослаго.

Отношеніе маховыхъ: 4=5 чуть>3 чуть>6>7>8>9 чуть>2>... Первое маховое очень длинно и широко. Его длина превышаетъ половину длины 2-го маха на одинъ миллиметръ.

Такимъ образомъ оказывается, что въ горахъ Памиро-Алайской группы водится пѣночка, которая при сходствѣ съ P. c. tristis, P. c. sindianus и, въ меньшей степени, съ P. neglectus,—ни за одну изъ нихъ не можетъ быть принята. Отличительные ея признаки ясны изъ предшествующаго изложенія. Обозначаю ее названіемъ Phylloscopus collybita subsindianus.

Примѣчаніе.—Oates (The F. of British India, Birds, vol. I, p. 403), отличающій P. sindianus, говоритъ, что P. tristis лѣтуетъ въ высокихъ частяхъ Гималаевъ въ Кашмирѣ. Возможно, что за P. tristis была имъ принята сейчасъ описанная форма съ присущими ей, какъ и настоящей P. tristis, зеленоватостью на верхней сторонѣ крыла и сильнымъ развитіемъ желтаго цвѣта на нижнихъ кроющихъ крыла, на подмышечныхъ и на перьяхъ вершины голени.

Настоящая P. sindianus для предѣловъ Туркестанскаго края лично мнѣ не извѣстна. Ф. Д. Плеске (l. c., S. 286—289) говоритъ въ томъ смыслѣ, что имѣются лишь предположенія о ея здѣсь гнѣздованіи и высказываетъ глубокое убѣжденіе въ томъ, что именно къ ней относятся предположенія Н. А. Сѣверцова о гнѣздованіи P. tristis въ Туркестанѣ. Затѣмъ Ф. Д. Плеске упоминаетъ о двухъ экземплярахъ P. sindianus Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, мѣстонахожденія которыхъ и до настоящаго момента стоятъ еще совершенно особнякомъ. Первый изъ нихъ добытъ г. Абакумовымъ въ Копалѣ (6.X. 1848), а второй убитъ Н. А. Сѣверцовымъ въ Киргизской степи, около Аще-сая (10. IX. 1857). Такъ какъ Ф. Д. Плеске слилъ съ P. sindianus совершенно другой видъ—P. lorenzii Lorenz, то вопросъ о точности опредѣленія этихъ двухъ экземпляровъ становится сомнительнымъ, а для меня лично возникаетъ еще мысль о принадлежности ихъ къ P. tristis, среди представителей которой попадаются темноокрашенныя особи съ сочетаніемъ тупокрылости и очень сильнымъ поблѣднѣніемъ желтаго цвѣта на нижнихъ кроющихъ крыла и его сгибѣ [1]).

Что касается до P. tristis, то по крайней мѣрѣ въ Ферганѣ и Памиро-Алайской системѣ она на гнѣздовьи навѣрное не встрѣчается.



[1]) Въ статьѣ моей „Verzeichnis der Vögel Persiens“ („Journal für Ornithologie“, IV, 1911) P. sindianus показана пролетною для сѣверной и южной частей Хорасанскаго участка. Это опечатка. Въ Персіи она извѣстна только на зимовьѣ и только въ участкѣ Белючистанскомъ. Въ P. sindianus „Stolzmann'a („Contrib. à l'Ornithol. de la Transcaspie“ въ «Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moskou», 1892, № 3) отъ III. 1891 года изъ Мерва слѣдуетъ видѣть, конечно, P. neglectus. *Авт.*

Кедровки въ Кіевской и Черниговской губерніяхъ въ 1913 году.

Э. В. Шарлеманъ.

Tannenhäher in dem Kiew'schen und Tschernigow'schen Gouvernement im Jahre 1913.

E. W. Scharleman.

Нынѣшній налетъ кедровокъ въ наши мѣста былъ значительно менѣе интенсивенъ, чѣмъ въ 1911 году.—Судя по двумъ добытымъ экземплярамъ, и на этотъ разъ въ налетѣ участвовала сибирская форма—Nucifraga caryocatactes macrorhynchus Brehm.

Первыя особи кедровокъ были замѣчены въ окрестностяхъ Кіева и въ ближайшихъ къ нему частяхъ Черниговской губерніи еще въ первой трети сентября.—12. IX мною наблюдалась одиночная птица въ Кіевѣ, въ Царскомъ саду.—14. IX тоже одиночная кедровка была замѣчена въ поймѣ Днѣпра, въ ивовыхъ зарослях Труханова острова (окрестности Кіева).—Около 20. IX А. Ф. Гасманъ добылъ одинъ экземпляръ Nucifraga caryocatactes macrorhynchus Brehm. на опушкѣ Кіево-Межеворскаго казеннаго лѣса, вблизи озера Имшаного (Кіевскій уѣздъ).—20. IX П. А. Езерскій наблюдалъ четырехъ кедровокъ на окраинѣ Кіева, въ своей усадьбѣ по Кирилловской улицѣ; птицы сидѣли на вершинѣ стога сѣна; насколько удалось разсмотрѣть, онѣ извлекали изъ сѣна какихъ-то насѣкомыхъ.—22. IX вблизи Кіева Э. Л. Свидерскій добылъ кедровку, перелетавшую черезъ Днѣпръ съ черниговскаго берега на кіевскій; птица эта

оказалась взрослой самкой Nucifraga caryocatactes macrorhynchus Brehm (поступила въ Музей Кіевскаго Орнитологическаго Общества). — Въ тотъ же день стайка кедровокъ въ 12 особей наблюдалась въ поймѣ Днѣпра—на опушкѣ Старосельскаго казеннаго лѣса (Остерскій уѣздъ, Черниговской губерніи).—Въ теченіе сентября нѣсколько экземпляровъ кедровки было добыто въ окрестностяхъ деревни Даниловки въ Кіевскомъ уѣздѣ.

Въ желудкѣ птицы, добытой 22. IX, мною обнаружены: остатки жука Geotrupes, головка Notonecta glauca, остатки Corixa, нѣсколько сѣмянъ какого-то растенія, нѣсколько „шариковъ“ (въ діаметрѣ отъ 5 до 10 m.m.) водоросли Nostoc.

Мои ошибки въ вопросѣ о формахъ черноголоваго щегла (Carduelis carduelis) и ихъ исправленіе.

Н. А. Зарудный.

Meine Irrtümer betreffs der Frage von den Formen des schwarzköpfigen Stieglitzes (Carduelis carduelis) und die Verbesserung derselben.

Von *N. A. Sarudny.*

Изученіе новыхъ матеріаловъ по щегламъ группы Carduelis carduelis и сравненіе этихъ матеріаловъ съ уже использованными сборами, заставляя кассировать нѣкоторыя изъ опубликованныхъ мною данныхъ, приводитъ къ невозможности пользоваться не только ими, но и значительною частью остальныхъ. Признаки, казавшіеся постоянными въ длинныхъ серіяхъ экземпляровъ, оказались несостоятельными въ еще болѣе длинныхъ, вмѣстѣ съ чѣмъ признаки, принятые за характерные для одной формы, нашлись существующими у другой, правда, иногда лишь въ личныхъ ея измѣненіяхъ. Это повело къ невѣрнымъ опредѣленіямъ нѣкоторыхъ экземпляровъ, къ смѣшенію формъ и къ невѣрному толкованію ихъ георграфическаго распространенія.

Начну съ южно-каспійскаго щегла. Онъ описанъ мною по *исключительно малымъ и коротконлювымъ* экземплярамъ изъ окрестностей Баку („Carduelis elegans brevirostris ou C. elegans minor“ Zaroudnoï—«Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou», 1889, p. 133). Со временемъ я

далъ его болѣе подробное описаніе („Carduelis minor“ Zaroudnoï—«Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou», 1893, p. 505), основанное на экземплярахъ изъ Астрабадской провинціи Персіи, но ошибочно *взялъ во вниманіе только мелкорослыхъ особей и притомъ такихъ, которыя отличались особенно сильнымъ развитіемъ сѣроватаго оттѣнка.* Вопросъ о принадлежности остальныхъ экземпляровъ къ той или другой формѣ я оставилъ открытымъ. Въ статьѣ своей „Über zwei neue Arten des Stieglitzes (Carduelis) aus Persien“ («Ornithologische Monatsberichte», №3, 1906), я, какъ теперь выясняется, подъ названіемъ „Carduelis carduelis loudoni“ описалъ настоящаго „minor“ = „brevirostris“, а къ „Carduelis carduelis minor“ отнесъ частью настоящаго южно-каспійскаго щегла въ нѣкоторыхъ его измѣненіяхъ, частью, непростительно ошибочно, особую форму, обитающую въ Персіи въ Загросскомъ участкѣ и другихъ мѣстахъ; эта форма еще не имѣетъ названія, и я обозначаю ее теперь, какъ Carduelis carduelis iranensis [1]).

Названіе „C. minor“ должно быть отброшено, такъ какъ уже имѣется въ номенклатурѣ. Если слѣдовать за E. Hartert'омъ („Die Vögel der paläarktischen Fauna“) и соединять въ родѣ Acanthis щегловъ, чижей, коноплянокъ, чечетокъ и т. п., то должно быть отброшено и названіе „brevirostris“, такъ какъ оно также имѣется. Въ такомъ случаѣ за южно-каспійскимъ щегломъ останется названіе C. carduelis loudoni. Считая, что щеглы составляютъ хорошо ограниченный родъ, въ которомъ для вида или формы отсутствуетъ названіе „brevirostris“, я останавливаюсь на немъ.

Южно-каспійскій щеголъ обитаетъ Талышъ, Южно-каспійскій участокъ (Гилянъ, Мазандеранъ, Астрабадъ), участокъ Сѣверо-западный (Казвинъ, Азербейджанъ), участокъ Хорасанскій съ подучасткомъ Атрекскимъ. За типичныя его земли принимаю южный берегъ Каспійскаго моря. Въ холодное время года встрѣчается въ сейчасъ названныхъ странахъ, затѣмъ на равнинахъ Ахалъ-Текке и въ Загросскомъ участкѣ [2]) (перечисленные участки

[1]) Быть можетъ правильнѣе обозначать ее, какъ C. carduelis härmsi Zar. („Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1911 г., стр. 98). Этимъ названіемъ я замѣнилъ „minor“ = „brevirostris“ какъ разъ изъ области, ею занятой. Не дѣлаю этого только потому, что, по смыслу выше упомянутой статьи, C. härmsi можетъ показаться сборною формою. *Авт.*

[2]) Въ этомъ послѣднемъ, повидимому, довольно рѣдко. *Авт.*

входятъ въ составъ Персіи, при чемъ Сѣверо-западный заходитъ въ Закавказье, а Южно-каспійскій и Хорасанскій—въ Закаспійскую область, въ предѣлахъ которой несомнѣнность его гнѣздованія еще не подтверждена).

Сравнительно съ типичнымъ C. carduelis L. и сходными съ нимъ формами изъ губерній С.-Петербургской, Псковской, Московской, Самарской, Оренбургской, Екатеринославской, Полтавской и Харьковской C. carduelis brevirostris является болѣе тусклою не столь ярко окрашенною птицею. Главный ея отличительный признакъ заключается въ болѣе или менѣе густомъ сѣро-буромъ цвѣтѣ спины и плечевыхъ партій, при чемъ этотъ цвѣтъ въ нерѣдкихъ случаяхъ развиваетъ рыжеватый оттѣнокъ, который почти никогда, однако, не бываетъ такимъ яснымъ и сильнымъ, какъ у представителей изъ сейчасъ названныхъ странъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ окраска спины и плечевыхъ партій становится такою же, какъ у C. caniceps orientalis Eversm., т.-е. землисто-сѣрою со слабою буроватою или рыжеватою примѣсью. У C. carduelis L. эти части оперенія рыжевато-бурыя, у C. carduelis volgensis Buturl. [1]) такія же, но болѣе свѣтлыя, у C. carduelis major Tacz. [2]) еще болѣе свѣтлыя. Сѣрой примѣси на этихъ частяхъ у названныхъ формъ, по крайней мѣрѣ въ такой сильной степени выраженія, я ни разу не могъ замѣтить. Темныя отмѣтины на груди и бокахъ брюха не просто охристо-буроваты, какъ у этихъ формъ, а весьма часто имѣютъ ясную сѣроватую примѣсь и почти всегда меньшій рыжій оттѣнокъ и большую буроватость. Непремѣнно надо замѣтить, что C. carduelis brevirostris въ большинствѣ своихъ признаковъ стоитъ ближе къ C. carduelis iranensis, чѣмъ къ C. carduelis L., и что оригинальность окраски его спины и плечевыхъ партій зависитъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ отъ напряженности сѣро-буроватаго, а не рыжевато-бураго цвѣта. Что касается до другихъ отличительныхъ признаковъ, ранѣе мною поставленныхъ на счетъ C. carduelis brevirostris, то они, какъ оказывается теперь, не являются существенными. Ширина красной полосы вокругъ клюва не нѣсколько меньше, а часто нѣсколько больше, чѣмъ у имѣющихся у меня экземпляровъ C. c. carduelis. Ширина черныхъ повод-

---

[1]) Изъ Оренбургской губерніи. *Авт.*

[2]) Изъ Томска, Семирѣчья и окрестностей Ташкента. *Авт.*

ковъ не всегда меньше, чѣмъ у этого послѣдняго, а иногда больше. Узкая черная полоска, окружающая основаніе клюва, не всегда болѣе узка и менѣе черна, а большею частью такая же, какъ у C. c. carduelis. Чернаго цвѣта на верхней сторонѣ головы и на шеѣ не значительно меньше, чѣмъ у C. c. carduelis, а большею частью столько же. Окраска щекъ то такая же, какъ у этого послѣдняго, то, въ не частыхъ случаяхъ, пріобрѣтаетъ сѣроватый оттѣнокъ. Та же цѣна и остальнымъ признакамъ, кромѣ одного: хорошо развитая у C. c. carduelis, C. c. volgensis и C. c. major бѣлая или вообще бѣловатая полоска позади чернаго цвѣта головы и отчасти боковъ шеи, у C. c. brevirostris и въ новомъ матеріалѣ дѣйствительно оказывается менѣе развитой и не столь рѣзко бросающейся въ глаза. Самки описываемой формы отличаются отъ самцовъ болѣе яснымъ выраженіемъ сѣрыхъ оттѣнковъ буроватыхъ цвѣтовъ, меньшимъ распространеніемъ краснаго и чернаго цвѣта на головѣ и тѣмъ, что перышки, прикрывающія основаніе надклювья, не черныя, а лишь черноваты. Размѣры южно-каспійскаго щегла привожу ниже.

Иранскій щеголъ—C. carduelis iranensis—обитаетъ зону дубовыхъ лѣсовъ Загросскаго участка Персіи, сады той горной системы, которая раздѣляетъ равнины, окружающія городъ Кашанъ, отъ Исфаганскаго плато и сады города Исфаганъ. Типичными землями считаю окрестности городовъ Исфаганъ, Кашанъ, Ширазъ, а также окрестности селеній Дехъ-и-Дизъ и Кохрудъ [1]). Въ холодное время года бываетъ и въ другихъ странахъ персидской территоріи, именно въ участкахъ Белючистанскомъ (здѣсь отмѣченъ для южной части), Месопотамскомъ и на побережьи Аравійскаго моря съ Персидскимъ заливомъ. Къ этой формѣ я отношу C. elegans Steph. Blanford'a (Eastern Persia) изъ Кирмана и Фарсистана, а также C. elegans major Tacz. H. Witherby (an Ornithological Journey in Fars, South-west Persia) [2]).

Иранскаго щегла можно смѣшать только съ южно-каспійскимъ. При сравненіи его съ этимъ послѣднимъ прежде всего обращаетъ на себя вниманіе не столь напряженный и болѣе блѣдный *сѣро-буроватый* окрасъ спины и плечевыхъ партій. Та же менѣе напряженная и болѣе блѣдная степень окраса распространяется

---

[1]) Сюда же отношу окрестности селеній Сефидъ-Кухъ и Кале-Барфъ. *Авт.*

[2]) „The Ibis", Octob. 1903. *Авт.*

на охристо-буроватыя отмѣтины груди и боковъ брюха, весьма часто имѣющія ясную сѣроватую примѣсь [1]). Крестецъ въ общемъ болѣе свѣтлый или блѣдный. Въ этомъ отношеніи наша птица приближается до нѣкоторой степени къ C. carduelis major. Въ осеннемъ и зимнемъ нарядахъ бѣлыя отмѣтины на вершинахъ маховыхъ и особенно на вершинахъ внѣшнихъ опахалъ внутреннихъ маховыхъ развиты сильнѣе (также сильнѣе, чѣмъ у C. carduelis, C. carduelis volgensis и C. carduelis major). Самки отличаются отъ самцовъ такими же признаками, какъ у южно-каспійскаго щегла. Размѣры помѣщаю ниже.

Въ статьѣ своей „Verzeichnis der Vögel Persiens“ („Journal für Ornithologie“, IV, 1911) я привожу еще три формы щегла: C. carduelis L., C. carduelis volgensis Buturl. и C. carduelis major Tacz. Послѣдній совершенно справедливо указывается мною, какъ зимняя птица Южно-каспійскаго участка Персіи, но въ спискѣ къ знаку „h“ (зимній), уже не по моей винѣ, не поставлено обозначеніе „rr“ (очень рѣдкій). Что касается до остальныхъ двухъ формъ, то мои о нихъ показанія нуждаются въ существенныхъ измѣненіяхъ. C. carduelis, обозначенный у меня зимнимъ и пролетнымъ для Южно-каспійскаго участка и зимнимъ для Загросскаго, вовсе не представляетъ типичнаго континентально-европейскаго щегла. Южно-каспійскіе, дѣйствительно зимніе и пролетные, экземпляры при болѣе тщательной ревизіи оказываются принадлежащими къ C. carduelis volgensis и особямъ, переходнымъ къ типичной формѣ. Загросскіе же образуютъ, вѣроятно, особую и еще не описанную форму, о которой скажу ниже. C. carduelis volgensis моего списка, зимній и пролетный въ Южно-каспійскомъ участкѣ, представляетъ здѣсь именно такового. Для участковъ Загросскаго и Месопотамскаго онъ приведенъ въ качествѣ зимней птицы, частью на основаніи моихъ наблюденій пролета въ Южно-каспійскомъ участкѣ, частью на предположеніи H. Witherby (въ статьѣ „On a Collection of Birds from Western Persia and Armenia“) [2]), что изслѣдованный имъ экземпляръ самца съ рѣки Дизъ (отъ 11. III) [3]), быть

---

[1]) Величина этихъ отмѣтинъ въ большинствѣ случаевъ менѣе значительна, что сближаетъ иранскаго щегла съ C. carduelis major. *Авт.*

[2]) „The Ibis“, 1907, p. 74—111. *Авт.*

[3]) Новый стиль. *Авт.*

можетъ относится именно къ этой формѣ. Не по моей винѣ знакъ „h“ въ спискѣ не сопровожденъ знакомъ вопроса (корректуры я не держалъ). Сравнивая свои экземпляры C. carduelis (прежней версіи) изъ Загросскаго участка съ новымъ матеріаломъ по типичному C. carduelis изъ Лифляндіи и Псковской губерніи и C. carduelis volgensis изъ Оренбурга, вижу, что это не однѣ и тѣ же птицы. Вижу также, что загросскіе „C. carduelis“ стоятъ всего ближе къ типичнымъ, и думаю, что они весьма близки, если не тождественны, съ сейчасъ упомянутымъ экземпляромъ съ рѣки Дизъ. Сравнительно съ типичными, мои птицы въ среднемъ кажутся нѣсколько болѣе крупными; бурый цвѣтъ спины, плечевыхъ и отмѣтинъ нижней стороны остается или одинаковымъ или по меньшей своей напряженности болѣе яркимъ; этотъ цвѣтъ *либо непосредственно подходитъ къ черному головы и шеи, либо отдѣляется отъ него очень узкой бѣлесоватой полоской, которая не бываетъ такой широкой и чистой, какъ у типичнаго щегла;* у этого послѣдняго она часто бываетъ чисто-бѣлою. Такъ какъ соединеніе моихъ птицъ съ типичными ведетъ къ невѣрнымъ выводамъ относительно распространенія и періодическихъ явленій образа жизни, то я рѣшаюсь выдѣлить ихъ въ качествѣ особой формы подъ названіемъ C. carduelis blanfordi.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ привожу размѣры (въ миллиметрахъ) своихъ экземпляровъ (расположены по степени убыванія длины крыла).

C.c. minor.					C.c. iranensis.				
	Клювъ: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).		*Клювъ*: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).
♂♂.					♂♂.				
1). Кизылъ-Арватъ; 22. II. 1909 . . .	16,5	12,8	82,5	54,3	1). Исфаганъ; 25. XI—10. XII. 1903 . .	15	11,6	82,5	def.
2). Ib.	12,6	9,5	82,5	54	2). Ib.	16,2	12,8	81,6	54
3). Латъ; 22. V. 1904.	15	11,2	82	56,2	3). Ib.	14,4	11,3	81,6	52,2
4). Кизылъ-Арватъ; 22. II. 1909 . . .	16,2	12,8	81,8	56,1	4). Дехъ-и-Дизъ; 6. IV. 1904 . . .	def.	def.	81,6	53,5
5). Кумбашинскъ; 27. I—6. II. 1903 .	14,5	11,2	81,6	56	5). Исфаганъ; 25. XI—10. XII. 1903 . .	16,6	12,7	81,5	52,1
6). Рустемъ-абадъ; 18. V. 1904 . . .	15	11,5	81,4	56,5	6). Ib.	16,2	12,8	81	52,2
7). Кизылъ-Арватъ; 22. II. 1909 . . .	12,6	9,5	81,3	57	7). Ib.	15,2	11,6	80,7	54,3
8). Казвинъ; 11. V. 1904	14,5	11,3	81,3	57	8). Кохрудъ; 26. IV. 1904	def.	def.	80,7	54
9). Кумбашинскъ; 27. I—6. II. 1903 .	13,6	11,2	81,2	56,3	9). Исфаганъ; 25. XI—10. XII. 1903 . .	13,3	12,3	80,6	53,4
10). Виджмену; 14. X. 1903	16,2	12,8	81	52,2	10). Маабедъ; 30. X. 1903	14,4	11,3	80	51,3
11). Теджаръ; 15. X. 1903	15	10,4	79,4	54,6	11). Исфаганъ; 25. XI—10. XII. 1903 . .	14,3	11,2	79,5	53
12). Ib.	15,1	11,5	78,6	54,2	12). Ib.	15,2	11,7	79,5	51
13). Багиръ (около Асхабада); январь 1909 года . . .	def.	def.	78,6	49	13). Дизфулъ; 13—14. III. 1904	15,2	11,7	79,5	51
14). Ib.	13	10,2	78,5	50	14). Маламиръ; 27. XII. 1903	15,5	12	79,5	51,3
15). Астрабадъ; зима 1903—1904 . . .	def.	def.	78	48	15). Кашанъ; 29. IV. 1904	13,4	10,4	79	51,3
16). Ib.	13,5	10	77,8	49,3	16). Дизфулъ; 13—14. III. 1904	13,4	10,4	78,5	52

C.c. blanfordi.					C.c. carduélis.				
	Клювъ: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).		*Клювъ*: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).
♂♂.					♂♂.				
1). Альхорширъ; 15. XII. 1903	16,6	12,8	84	57,5	1). Псковъ; 15. IX. 1905	13,5	10,7	82	55,4
2). Ib.	15	11,6	83,5	57	2). Ib.	14	11,3	82	55,4
3). Ib.	16,5	12,3	83,4	55,2	3). Ib.	13,4	10,2	81,8	55,5
4). Исфаганъ; 25. XI—10. XII. 1903 . .	14,5	11,3	83,2	54,2	4). Замгофъ (Лифл. губ.); 11—12. XI. 1903	14,4	11,2	81,7	54
5). Ib.	14,3	11,3	83,2	56,5	5). Псковъ; 27. IX. 1905	13,4	10	81,5	55
6). Ib.	14,4	11,8	83	54,2	6). Ib.	14	11,2	81,4	54,4
7). Ib.	15,5	12,1	82,2	55,4	7). Замгофъ (Лифл. губ.); 11—12. XI. 1903	12,6	10,5	81,2	55,2
8). Ib.	14	11,2	81,5	52,5	8). Ib.	13,5	10,7	81,2	55
9). Дизфулъ; 13—14. III. 1904	15	11,8	81,4	56,3	9). Ib.	14	11,3	80,5	55,8
10). Исфаганъ; 25. XI—10. XII. 1912 . . .	def.	def.	81,2	54,4	10). Ib.	14,1	11	80,5	55
11). Ib.	14,6	11	81,2	54	11). Ib.	13,4	10,6	80,2	53,4
12). Ib.	14,5	11,3	81	53,3	12). Псковъ; 25. XI. 1905	14	11	80,1	54,3
13). Дизфулъ; 13—14. III. 1904	13,5	10,4	79,6	53	13). Псковъ; 23. XII. 1904	12,7	10,4	79	53,2
					14). Замгофъ; 11. X. 1903	12,8	10,1	78,3	53,5
					15). Псковъ; 23. XII. 1904	14,3	11,1	78	53
					16). Замгофъ; 11. X. 1903	12,6	9,2	76,5	53,7

C.c. minor.	*Клювъ*: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).
♂♂.				
17). Кизылъ-Арватъ; 22. II. 1909 . . .	14	10,8	77,6	51
18). Ib.	13,8	10,2	77,5	50,7
19). Бистегунъ; 15. XII. 1903	12,6	9,5	77,5	50
20). Козлохъ; 14. X. 1903	14,4	11.3	77	52,4
21). Астрабадъ; зима 1893—1894 . . .	def.	def.	76,4	47,8
22). Ib.	12,3	9,9	76	49
23). Дамганъ; 20. X. 1903	12.3	9.9	75,7	50,7
24). Асхабадъ; февраль 1900 года .	13	10,2	75.7	50,2
25). Кумбашинскъ; 27. I—6. II. 1903 .	14	10	75,6	54
26). Ib.	13,5	10	75,4	55
27). Асхабадъ; февраль 1900 года .	14,2	11,2	75.4	55
28). Кизылъ-Арватъ; 22. II. 1909 . . .	13,8	11	75,4	55
29). Астрабадъ; зима 1893—1894 . . .	14,2	11,3	75	48,1
30). Наимъ-абадъ; 18. X. 1903 . . .	13,5	10	73.4	48,8
♀♀.				
1). Рустемъ-абадъ; 8. V. 1904 . . .	13,5	10,2	77	52,4
2). Намрэ; 17. X. 1903.	13	11	76,6	52,3
3). Багиръ; 14. II. 1911.	13,4	10,1	76,6	52,3

C.c. iranensis.	*Клювъ*: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).
♂♂.				
17). Исфаганъ; 1. XII. 1903	15,6	12	78.4	51,5
18). Ib.	12,2	9,7	75,6	50,7
19). Ib.	13	10,2	75,4	50,4
♀♀.				
1). Исфаганъ; 25. XI—10. XII	14,3	11,2	79.5	53
2). Ib.	15	11,7	78	51,5
3). Бистегунъ; 15. XII. 1903	13	10,6	77	51,3

C.c. blanfordi.					C.c. carduelis.				
	Клювъ: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія копчиковой железы).		*Клювъ*: отъ угла рта.	*Клювъ* (отъ передняго края ноздри).	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія копчиковой железы).
					♂♂.				
					17). Порховъ; 7. III. 1905	14	11	76,3	53,2
					18). Ib.	13,4	10,6	76,2	52
♀♀.					♀♀.				
1). Алъхоширъ; 15. XII. 1903	14,1	11,2	79,2	55,2	1). Псковъ; 23. XII. 1904	13,2	9,9	80	55
2). Исфаганъ; 30. XI. 1903	13,7	10,2	79,1	55	2). Порховъ; 7. III. 1905	13,3	9,9	80	52,4
3). Ib.	13,5	10	79,1	54	3). Замгофъ; 4. III. 1903	13,3	10	80	55

C.c. minor.					C.c. iranensis.				
	Клювъ: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія копчиковой железы).		*Клювъ*: отъ угла рта.	*Клювъ*: отъ передняго края ноздри.	*Крыло*.	*Хвостъ* (отъ основанія копчиковой
♀♀.					♀♀.				
4). Кизылъ-Арватъ; февраль 1909 года	13.6	10,2	76,6	54	4). Исфаганъ; 25.XI—10. XII	15,4	12,3	76,5	51
5). Латъ; 22.V. 1904.	14	11.2	75,8	51	5). Тудешкъ; 20.XI. 1903	13,7	10,4	76,5	50
6). Багиръ; 14.II.1909.	13	10,6	75,7	51,3	6). Шустеръ; 21.III. 1904	14,6	10,9	76,4	50
7). Виджмену; 14.X. 1903	13,5	10	75,6	50	7). Исфаганъ; 30.XI. 1903	13,5	10,5	74,4	49
8). Бистегунъ; 15.XII. 1903	13	10	75,6	49	8). Дизфулъ; 13—14. III. 1904	13,2	10,1	74,2	49
9). Багиръ; 14.II.1911.	13	10	75,6	50	9). Ib.	13	9,9	73,3	48
10). Ib.	14,2	11,3	75,6	50	10). Сія-Мансуръ; 8. III. 1904 . . .	13	9,5	73	48
11). Кизылъ-Арватъ; февраль 1909 года	13,5	10,2	75,6	49,3					
12). Кумбашинскъ; 27. I—6. II. 1903 .	12,3	9,8	75	50,5					
13). Исфаганъ; 30.XI. 1903	14,5	10,4	74,5	49,8					
14). Кумбашинскъ; 27. I—6. II. 1903 .	13,6	10,3	73,4	48					
15). Ib.	13,6	10,2	73	49					
16). Астрабадъ; зима 1893—1894 . . .	?	?	70	43					

Примѣчаніе. Нѣкоторыя изъ мѣстонахожденій, приведенныя въ этой таблицѣ, нуждак
Багиръ и Кизылъ-Арватъ—въ Закаспійской области. Всѣ остальныя, исключая русскихъ, распол
въ Шахрудской; Наимъ-абадъ, Маабедъ и Дамганъ — въ Дамганской; Тудешкъ — въ странѣ К
Шустеръ, Дизфулъ и Сія-Мансуръ—въ Арабистанѣ (Хузистанъ); Кохъ-рудъ и Кашанъ—въ централь

C.c. blanfordi.					C.c. cardueliis.				
	Клювъ: отъ угла рта.	*Клювъ:* отъ передняго края ноздри.	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).		*Клювъ:* отъ угла рта.	*Клювъ:* отъ передняго края ноздри.	*Крыло.*	*Хвостъ* (отъ основанія кобчиковой железы).
♀♀.					♀♀.				
). Альхорширъ; 15. XII. 1903	13	10	79	54	4). Замгофъ; 4. III. 1903	13,3	9,8	77,3	54,2
). Кахварокъ; 16. XII. 1903	13,2	19,7	79	52,3	5). Псковъ; 20. XI. 1905	12,9	9,4	77	53,2
). Альхорширъ; 15. XII. 1903	14	11	79	55,2	6). Ib.	13	10	76,8	53,2
). Исфаганъ; 30. XI. 1903	13,5	10	78,4	54	7). Великія Луки; январь 1903 года.	12,8	9,4	76,6	53
). Кахварокъ; 16. XII. 1903	13,3	10	78,3	53	8). Псковъ; 15. IX. 1905	13,2	9,9	76,6	53
). Исфаганъ; 25. XI—10. XII. 1903 . .	13,7	10,2	78	55	9). Ib.	13,3	10	76,5	52
). Кахварокъ; 16. XII. 1903	13	11	77,6	52,3	10). Ib.	12,9	9,4	76,2	52,3
). Альхорширъ; 15. XII. 1903	13	10	77	48	11). Ib.; 23. XII. 1904 .	13,2	9,9	76,2	53
					12). Ib.	12,8	9,4	76	52,2
					13). Ib.	13,3	9,5	76	52
					14). Замгофъ; 7. V. 1903	13,2	9,6	75,5	52

указаніи страны, въ которой располагаются. Именно: Кумбашинскъ — въ Ленкоранскомъ уѣздѣ; я въ Персіи. Астрабадъ, Козлохъ и Виджмену—въ Астрабадской провинціи; Теджаръ и Намрэ— стегунъ—въ Линджанѣ; Кахварохъ—въ Чаръ-Магалэ; Дехъ-и-Дизъ, Маламиръ, Альхорширъ, а также ти Иракъ-Аджеми; Рустемъ-абадъ и Латъ—въ Гилянѣ.

Соотвѣтственно съ новой ревизіей черноголовыхъ щеглокъ моихъ матеріаловъ, слѣдуетъ слѣдующимъ образомъ измѣнить таблицу ихъ распространенія, данную въ вышеупомянутой моей статьѣ „Verzeichnis der Vögel Persiens“.

НАЗВАНІЯ.	Сѣверо-западный участокъ.	Южно-каспійскій участокъ.	Хорасанскій участокъ.			Парапамизскій участокъ.	Сеистанскій участокъ.	Кухистано-керманскій участокъ.	Бѣлючистанскій участокъ.		Побережье Персидскаго залива и Аравійскаго моря.	Загросскій участокъ.	Месопотамскій участокъ.
			Атрекскій подучастокъ.	Сѣверная часть.	Южная часть.				Сѣверная часть.	Южная часть.			
403. Carduelis carduelis blanfordi Zar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	h, n?	h, n?
404. C. carduelis volgensis Buturl.	—	h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
405. C. carduelis major Tacz. . .	—	rrh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
406. C. carduelis brevirostris Zar. .	n	N, h	n, h	n, h	—	—	—	—	—	—	—	rh	—
407. C. carduelis iranensis Zar. .	n, h	—	—	—	—	—	—	—	—	tr, h	h	N, h	h, n?
C. carduelis brevirostris X? C. caniceps	—	—	—	h?, tr?	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Краткія сообщенія.—Kurze Mitteilungen.

Къ орнитофаунѣ Минской губерніи.—27-го іюля 1913 года (нов. стиль) я получилъ отъ графа В. Пусловскаго для просмотра около 20 экземпляровъ болотной дичи, добытой въ Пинскомъ уѣздѣ. Это были бекасы, дупеля и одинъ гаршнепъ, оказавшійся по опредѣленіи взрослымъ самцомъ. На слѣдующее же утро я поѣхалъ на болото, на которомъ были добыты упомянутыя птицы, но, несмотря на весьма тщательные поиски въ теченіе цѣлаго дня, еще гаршнеповъ найти мнѣ не удалось. Такъ какъ пролетные гаршнепы осенью обычно появляются въ нашей мѣстности только въ концѣ сентября, то возможно, что нахожденіе здѣсь этого куличка въ іюлѣ указываетъ на вѣроятность гнѣздованія его въ Пинскомъ уѣздѣ, тѣмъ болѣе, что Тачановскій въ своемъ трудѣ „Ptaki Krajove“ (vol. II, p. 172) упоминаетъ объ извѣстныхъ ему трехъ случаяхъ гнѣздованія Limnocryptes gallinula Linn. въ нашей географической широтѣ (два случая въ Царствѣ Польскомъ и одинъ—въ Полѣсьѣ, въ Ковенскомъ уѣздѣ).

Янушъ Доманевскій.

* * *

Къ орнитофаунѣ Московской губерніи. — Осенью прошлаго (1913) года здѣсь наблюдалось массовое появленіе щура [Pinicola enucleator (Linn.)], о чемъ у меня въ настоящее время имѣются слѣдующія свѣдѣнія: 1) въ октябрѣ въ очень большомъ количествѣ птица эта поступала на продажу по праздникамъ на Московскій птичій рынокъ (на Трубной площади); по словамъ поставщиковъ (птицелововъ-промышленниковъ изъ окрестностей Москвы), щуры, начиная съ первыхъ чиселъ октября, массами держались въ Московскомъ уѣздѣ: въ Измайловскомъ Звѣринцѣ, вблизи села Кунцева, деревень Мазилово и Ромашково, и „Нѣмчи-

новскаго поста" Александровской (Брестской) желѣзной дороги; по свидѣтельству одного крестьянина изъ деревни Ромашково, птицы эти наблюдались здѣсь иногда стаями особей до 300, преимущественно въ сосновыхъ лѣсахъ, чаще всего утромъ, часовъ въ 9—10; во всѣхъ упомянутыхъ мѣстностяхъ онѣ продержались въ такомъ большомъ количествѣ приблизительно до 20-го октября, а затѣмъ начали постепенно уменьшаться въ числѣ и къ концу мѣсяца уже встрѣчались лишь одиночками; птицеловы говорили, что также много щуровъ въ окрестностяхъ Москвы они наблюдали только 11 лѣтъ тому назадъ; 2) въ числѣ трехъ особей (♂ adlt., ♂ juv. и ♀) былъ замѣченъ С. И. Огневымъ 15-го октября въ липовомъ паркѣ дачной мѣстности Кунцево, въ Московскомъ уѣздѣ; птички эти поражали своей непугливостью: С. И. Огневъ довольно долго наблюдалъ ихъ совершенно открыто на разстояніи трехъ шаговъ; 3) 27-го октября и 3-го ноября были замѣчены Л. Г. Поляковымъ (моимъ старшимъ сыномъ) во время охотъ съ гончими въ угодіяхъ деревень Черной и Копнино, въ Богородскомъ уѣздѣ, гдѣ въ теченіе обоихъ дней наблюдалось нѣсколько стаекъ, особей по 5—8, перелетающихъ съ мѣста на мѣсто въ участкахъ нечастаго сосноваго и еловаго лѣса; замѣчу кстати, что щуровъ здѣсь и вообще въ этой части Богородскаго уѣзда за все время изслѣдованій (съ 1909 года) мнѣ пришлось видѣть лишь однажды—22-го октября 1910 года, когда мною и моимъ препараторомъ въ некрупномъ еловомъ лѣсу съ небольшой примѣсью отдѣльныхъ сосенъ, между деревней Дятловкой и селомъ Полтевымъ, были добыты два экземпляра этого вида.

Одновременно со щуромъ во всѣхъ перечисленныхъ выше мѣстностяхъ замѣчалось массовое появленіе свиристеля [Bombycilla garrulus (Linn.)].

О наблюденіи Pinicola enucleator (Linn.) и Bombycilla garrulus (Linn.) въ необычайно большомъ числѣ осенью 1913 года, въ октябрѣ же, я имѣю свѣдѣніе отъ Г. В. барона Лоудонъ изъ имѣнія „Лизденъ" (вблизи Вольмара), Лифляндской губерніи.

Г. И. Поляковъ.

* * *

Еще объ Emberiza jankowskii Tacz.—Въ пополненіе уже приведенныхъ свѣдѣній объ этой загадочной овсянкѣ („Орнитологическій Вѣстникъ" за 1913 годъ, кн. 3-ья, стр. 180) А. И. Черскій въ письмѣ отъ 11. XI. 1913 сообщаетъ намъ между про-

чимъ слѣдующее: „Въ лѣтнюю мою поѣздку на корейскую границу (долина рѣки Туменъ-Ула) мнѣ удалось добыть 9 самцовъ и 1 самку Emberiza jankowskii (недалеко отъ залива Посьета)"; „гнѣздъ по причинѣ крайней осторожности этой птички найти не удалось"; „будущимъ лѣтомъ разсчитываю поѣхать туда спеціально для продолженія наблюденій и отысканія гнѣздъ".

Ред.

* * *

Красная утка въ С.-Петербургской губерніи.—Профессоръ Д. Н. Кайгородовъ въ письмѣ отъ 12. XI. 1913 увѣдомляетъ насъ: „Имѣю честь сообщить о рѣдкомъ случаѣ добычи красной утки (Tadorna rutila Pall.) 3-го октября сего года въ Ямбургскомъ уѣздѣ, С.-Петербургской губерніи (близъ станціи «Млосковицы» Балтійской желѣзной дороги), убитой на мельничной запрудѣ".

Ред.

* * *

Къ окольцовыванію птицъ.—В. Р. Дицъ, ловчій Его Императорскаго Величества, въ письмѣ отъ 15. XI. 1913 сообщаетъ намъ о полученіи имъ отъ профессора I. Thienemann'a изъ Росситтена увѣдомленія, что одинъ изъ окольцованныхъ минувшимъ лѣтомъ въ Гатчино вальдшнеповъ—именно: экземпляръ, отмѣченный 16-го іюля кольцомъ съ № 4629—застрѣленъ 15-го ноября „вблизи Edenbridge (Kent, England)".

Студенческій Кружокъ Любителей Правильной Охоты при С.-Петербургскомъ Лѣсномъ Институтѣ въ письмѣ отъ 23. XI. 1913 сообщаетъ намъ: „нами получено отъ профессора I. Thienemann'a увѣдомленіе, что чирокъ, отмѣченный въ 1912 году 26-го іюня кольцомъ за № 8533 въ охотничьихъ угодіяхъ дачи Кружка „Комарино" Долговскаго лѣсничества, въ Лужскомъ уѣздѣ, С.-Петербургской губерніи, добытъ 18-го октября сего года на Дунаѣ въ Венгріи".

Ред.

Орнитофенологическія наблюденія.

Ornithophenologische Beobachtungen.

(Продолженіе.—Fortsetzung.) [1]).

4.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Евгеній Адольфовичъ Куликовскій.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: имѣніе „Адріяново“, Одесскаго уѣзда, Херсонской губерніи, въ 9-ти верстахъ отъ г. Овидіополя и въ 35-ти отъ г. Одессы.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Скворецъ	Sturnus vulgaris L. *) . .	III	2	—	—	—	—	—	
Дроздъ черный . . .	Merula merula L. . . .	III	7	—	—	—	—	—	
Листъ	Ciconia alba Briss. . .	III	15	—	—	—	—	—	
Удодъ	Upupa epops L.	III	29	—	—	—	—	—	
Зимородокъ	Alcedo ispida L.	III	29	—	—	—	—	—	На берегу рѣчки Барабой.
Ласточка деревенская	Hirundo rustica L. . . .	IV	1	—	—	—	—	—	
Сизоворонка	Coracias garrula L. . .	IV	7	—	—	—	—	—	
Кукушка	Cuculus canorus L. . .	IV	16	—	—	—	—	—	Началось кукованіе.
Перепелъ	Coturnix communis Bonnat.	IV	18	—	—	—	—	—	Первый крикъ.
Иволга	Oriolus galbula L. . . .	IV	22	—	—	—	—	—	Пѣніе.
Щурка золотистая .	Merops apiaster L. . . .	V	8	—	—	—	—	—	

[1]) См. „Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1913 г., кн. III, стр. 182—213.
S. „Ornithologische Mitteilungen“, 1913, B. III, S. 182—213.

*) Съ 18-го по 23-ье марта включительно я провелъ въ Одессѣ. Въ продолженіе этихъ шести дней въ центрѣ города, на Соборной площади, мною наблюдалось множество скворцовъ. Днемъ ихъ не было видно, но къ вечеру они слетались въ громадномъ количествѣ, покрывая всѣ карнизы, выступы и лѣпныя украшенія домовъ. Шумъ и гамъ на улицѣ стоялъ невообразимый. На глазъ птицъ было нѣсколько десятковъ тысячъ, быть можетъ даже тысячъ сто и болѣе.

До 26. I зимы, если не считать небольшихъ кратковременныхъ морозовъ, не было. Сейчасъ въ паркѣ зеленая свѣжая травка. Въ 11 час. 30 мин. утра на солнцѣ + 12,5° R. На стѣнахъ, обращенныхъ на югъ, а также на древесныхъ стволахъ появились клопы Pyrrhocoris apterus L.—28. I появились клопы Lygaeus equestris L.

Въ началѣ февраля начались морозы.—23. II утромъ на солнцѣ + 20° R. Рѣчка Барабой очистилась отъ льда. Цвѣтетъ Veronica polita Fr.—26. II начались полевыя работы.

1. III цвѣтутъ Veronica triphyllos L. и Holosteum umbellatum L. Появились божьи коровки (Coccinella septempunctata L.).—2. III снѣгъ съ полей сошелъ, только мѣстами лежитъ еще въ глубокихъ затѣненныхъ канавахъ. Полевыя работы повсюду.—3. III цвѣтутъ крупка (Draba verna L.), репяшокъ (Ceratocephalus orthoceras DC.), Crocus variegatus Hoppe et Hornsch.—7. III цвѣтутъ Gagea sp.? Въ паркѣ найденъ ужъ (Tropidonotus natrix Boie).—9. III цвѣтутъ вязъ (Ulmus pedunculata Foug.) и Scilla bifolia L.—12. III цвѣтетъ Ficaria ranunculoides Roth.—14. III въ паркѣ летаютъ бабочки (Vanessa io L. и Pieris sp.?). Цвѣтетъ Androsace elongata L.—15. III начинаютъ зеленѣть кусты крыжевника (Ribes Grossularia L.); цвѣтетъ Lamium purpureum L.—25. III цвѣтутъ Capsella Bursa pastoris Moench., Lamium amplexicaule L.—28. III цвѣтетъ Sisymbrium Sophia L.—29. III появились жуки-оленки; цвѣтетъ Thlaspi perfoliatum L.—30. III зеленѣютъ Salix'ы [появленіе зеленой „дымки"].

3. IV цвѣтутъ Androsace maxima L. и мышехвостникъ (Myosurus minimus L.).—5. IV цвѣтетъ ясень (Fraxinus excelsior L.).—6. IV цвѣтутъ серебристый тополь (Populus alba L. fem.), осокорь (Populus nigra L. mas.) и Salix sp.? mas.—10. IV зацвѣла Prunus Mahaleb L.; цвѣтетъ крыжевникъ (Ribes Grossularia L.).—11. IV зацвѣла груша (Pirus communis L.).—14. IV цвѣтутъ Ranunculus oxyspermus M. B., Anthriscus trichosperma Schult., Ornithogalum nutans L. и желтая акація (Caragana arborescens L.).—15. IV цвѣтутъ смородина черная (Ribes nigrum L.), некленъ (Acer campestre L.) и острица (Asperugo procumbens L.).—16. IV цвѣтетъ ласковецъ (Lepidium perfoliatum L.).—18. IV цвѣтутъ вѣничникъ (Lepidium ruderale L.) и Sclerochloa dura P. B.—19. IV зацвѣли барбарисъ (Berberis vulgaris L.) и сирень (Syringa vulgaris L.); цвѣтутъ Hyoscyamus niger L., Lepidium Draba L., Ranunculus repens L., Ranunculus sceleratus L.—22. IV цвѣтетъ Adonis

flammeus Jacq.—24. IV на грядкѣ зацвѣлъ Iris germanica L.—26. IV пойманъ экземпляръ Saturnia pyri Borkh.—28. IV въ паркѣ зацвѣлъ Cytisus Laburnum L.—29. IV въ рѣчкѣ Барабой, въ водѣ и на берегу, на болотѣ, цвѣтетъ Ranunculus aquatilis L.—30. IV зацвѣла айва (Cydonia vulgaris Pers.).

1. V цвѣтутъ Aristolochia Clematitis L. и Vinca herbacea W. K.—6. V въ паркѣ цвѣтетъ Cytisus sessilifolius L.—7. V цвѣтутъ Sambucus nigra L. и Nasturtium austriacum Crantz.—8. V цвѣтутъ березка (Convolvulus arvensis L.) и донникъ желтый (Melilotus officinalis Desr.).—9. V сирень (Syringa vulgaris L.) начинаетъ отцвѣтать. Зацвѣла Anchusa officinalis L.—12. V гроза.—13. V зацвѣла бѣлая акація (Robinia Pseudacacia L.) и шиповникъ (Rosa).—15. V зацвѣлъ Butomus umbellatus L.—17. V въ паркѣ цвѣтетъ Colutea arborescens L.—23. V во время грозы шелъ градъ, продолжавшійся минуты двѣ.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Эдуардъ Вильгельмовичъ Шарлеманъ. Кіевъ, Крестьянскій земельный Банкъ.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: окрестности города Кіева.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Дербникъ	Aesalon aesalon	I	10	—	—	—	—	—	
Королекъ	Regulus regulus (Linn.)	—	—	—	II	10	—	—	Зимовали.—7.IV наблюдались послѣднія пролетныя особи. Парочка была замѣчена на гнѣздовьи.
Пуночка	Plectrophanes nivalis (Linn.)	—	—	—	II	10	—	—	Вънезначительномъ количествѣ зимовали. — 10. II наблюдались послѣднія особи.
Жаворонокъ полярный	Otocorys alpestris (Linn.)	—	—	—	II	10	—	—	Зимовали. — 10. III наблюдался послѣдній экземпляръ.
Овсянка тростниковая	Emberiza schoeniclus Linn.	II	10	стайки въ 10—15 особей	III	послѣдняя треть	—	—	Одиночныя особи зимовали.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Зябликъ	Fringilla coelebs Linn. .	II	10	около 100 особей	III	10	—	—	Первая стая, состоящая преимущественно изъ самцовъ, держалась недолго и чуть ли не на слѣдующій день скрылась. Между 11. II и первыми числами марта не наблюдались.
Клинтухъ	Columba oenas Linn. .	II	22	4	—	—	—	—	
Жаворонокъ полевой	Alauda arvensis Linn. .	II	23	4	III	3	—	СВ	
Гуменникъ пашенный.	Melanonyx segetum (Gm.).	II	24	стая	—	—	—	СВВ	
Грачъ	Trypanocorax frugilegus (Linn.)	—	—	тысячная стая	II	26	—	С	Въ незначительномъ количествѣ зимовали [1]). Вечеромъ 4. V наблюдались запоздавшія стаи особей по 30.
Чечетка	Acanthis linaria (Linn.) .	—	—	—	—	—	—	—	Зимою не наблюдались. 26. II былъ замѣченъ одиночный экземпляръ.

[1]) Главная масса грачей, зимующихъ обыкновенно у насъ, въ теплую зиму 1912—13 года не дошла до нашихъ мѣстъ.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Трясогузка бѣлая .	Motacilla alba Linn. . .	II	28	—	III	средина	—	—	
Зимнякъ	Archibuteo lagopus (Gm.).	II	28	—	—	—	—	—	
Чибисъ	Vanellus vanellus (Linn.).	II	28	2	—	—	—	СВ	
Кряква	Anas boschas Linn. . .	II	—	—	—	—	—	—	Наблюдались въ концѣ февраля.
Свіязь	Mareca penelope Linn. .	II	—	—	—	—	—	—	
Чирокъ-свистунокъ .	Nettion crecca (Linn.) .	II	—	—	—	—	—	—	
Чернеть хохлатая . .	Fuligula fuligula (Linn.) .	II	—	—	—	—	—	—	
Гоголь	Clangula clangula (Linn.).	II	—	—	—	—	—	—	
Лутокъ	Mergus albellus (Linn.) .	II	—	—	—	—	—	—	
Крохаль большой .	Merganser merganser (L.).	II	—	—	—	—	—	—	
„ длинноносый.	„ serrator (Linn.).	II	—	—	—	—	—	—	
Аистъ бѣлый	Ciconia ciconia (Linn.) .	III	—	—	—	—	—	—	
Синица длиннохвостая	Acredula caudata (Linn.).	—	—	—	III	въ началѣ	—	—	Зимовали.
Скворецъ	Sturnus vulgaris sophiae Bianchi.	III	3	2	III	17	—	—	Пролетныя стаи встрѣчались еще въ срединѣ апрѣля.
Жаворонокъ лѣсной.	Lullula arborea (Linn.) .	III	3	—	III	10	—	—	Пѣли.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Конекъ луговой . .	Anthus pratensis Linn. .	III	3	2	—	—	—	—	
Дроздъ-деряба . . .	Turdus viscivorus Linn. .	III	3	2	III	10	—	—	Одинъ экземпляръ наблюдался зимой.
Жаворонокъ степной.	Melanocorypha calandra (Linn.)	III	5	нѣсколько	—	—	—	—	Наблюдались вблизи д. Даниловки, Кіевскаго уѣзда. Нѣсколько паръ остались гнѣздиться.
Дроздъ пѣвчій . . .	Turdus musicus (Linn.) .	III	5	—	III	10	—	—	7. IV еще наблюдались пролетныя стаи (особей до 10).
„ черный . . .	Merula merula (Linn.) .	III	5	—	III	10	—	—	
Зорянка	Erithacus rubecula (Linn.)	III	5	—	III	20	—	—	
Травникъ	Totanus calidris (Linn.)	III	9	1	IV	первая половина	—	—	
Дубоносъ	Coccothraustes coccothraustes (Linn.) . . .	—	—	—	III	10	—	—	Въ незначительномъ количествѣ зимовали.
Снѣгирь	Pyrrhula pyrrhula (Linn.).	—	—	—	III	10	—	—	Въ большомъ количествѣ зимовали.— 10.III наблюдались послѣднія особи и стайки.
Дроздъ-бѣлобровикъ.	Turdus iliacus (Linn.) .	III	10	стаи	—	—	—	—	
Завирушка	Prunella modularis (Linn.).	III	10	—	II	17	около 25 дней	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Чайка обыкновенная.	Chroicocephalus ridibundus (Linn.)	—	—	стаями до 10 особей	III	10	—	—	
Синица-московка . .	Periparus ater (Linn.) . .	—	—	—	—	—	—	—	Зимовали.—10.III наблюдались послѣднія пролетныя особи.
Ганчка болотная	Poecile palustris palustris (Linn.)	III	10	—	—	—	—	—	Въ небольшомъ количествѣ остались гнѣздиться.
Синица хохлатая	Lophophanes cristatus (Linn.)	—	—	—	—	—	—	—	Зимовали—10. III наблюдались послѣдніе пролетные экземпляры. Въ небольшомъ числѣ остались на гнѣздовьи.
Бекасъ	Gallinago gallinago (Linn.).	III	10	—	—	—	—	—	
Вальдшнепъ	Scolopax rusticola (Linn.).	III	10	—	—	—	—	—	
Шилохвость	Dafila acuta (Linn.) . .	—	—	—	III	10	—	—	
Чирокъ-трескунокъ . .	Querquedula querquedula (Linn.)	—	—	—	III	10	—	—	
Чернеть красноголовая	Aythya ferina (Linn.) .	—	—	—	III	10	—	—	Нѣсколько особей этого вида наблюдались и въ іюнѣ.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Цапля сѣрая	Ardea cinerea Linn. . .	III	10	4	—	—	—	—	
Поганка большая . .	Colymbus cristatus (Linn.).	III	10	2	IV	во второй половинѣ	—	—	
Журавль обыкновенный	Grus grus Linn.	III	13	стая особей въ 20-ть	III	14	около 30 дней	СВ	14. III птицы летѣли ночью.
Чернеть морская . .	Fuligula marila (Linn.) .	III	въ срединѣ	—	IV	—	—	—	
Варакушка	Cyanecula suecica (Linn.).	III	во второй половинѣ	—	IV	7	—	—	7. IV были добыты обѣ формы варакушки.
„	„ suecica cyanecula (Wolf.)	III		—	IV	7	—	—	
Дроздъ-рябинникъ .	Turdus pilaris Linn. . .	—	—	—	III	17	—	—	Зимою, противъ обыкновенія, не наблюдались.—7. IV были замѣчены послѣднія пролетныя особи.
Куликъ-чернышъ . .	Helodromas ochropus (L.).	III	17	—	—	—	—	—	
Погонышъ	Porzana porzana (Linn.) .	III	17	—	—	—	—	—	
Сарычъ рыжій . . .	Buteo desertorum vulpinus Licht.	III	17	1	—	—	—	—	
Куликъ-сорока . . .	Haematopus ostralegus borysthenicus Charl. .	III	19	1	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Вьюрокъ	Fringilla montifringilla Linn.	—	—	—	—	—	—	—	Въ незначительномъ количествѣ зимовали.—21. III наблюдалась послѣдняя особь.
Трясогузка желтогрудая	Budytes flava flava (Linn.).	III	22	—	IV	въ первой трети	—	—	24. III появилась въ окрестностяхъ д. Даниловки, Кіевскаго уѣзда.
Пѣночка-теньковка .	Phylloscopus collybita Linn.	III	22	—	—	—	—	—	
Ремезъ	Remiza pendulina (Linn.).	III	24	—	IV	12	—	—	
Сорокопутъ сѣверный.	Lanius excubitor major Pall. (=rapax Brhm) .	—	—	—	—	—	—	—	Зимою большіе сорокопуты были рѣдки. — 24.III былъ добытъ одинъ экземпляръ.
Каменка	Saxicola oenanthe (Linn.).	III	24	—	—	—	—	—	
Удодъ	Upupa epops Linn. . . .	III	24	—	—	—	—	—	
Ласточка деревенская.	Hirundo rustica Linn. .	III	25	3	—	—	—	—	
Зуекъ малый	Aegialitis dubia (Scop.) .	III	25	1	—	—	—	—	
Лысуха	Fulica atra Linn. . . .	III	25	—	—	—	—	—	
Пустельга	Tinnunculus tinnunculus (Linn.)	III	25	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Лунь полевой . . .	Strigiceps cyaneus (Linn.).	III	25	—	—	—	—	—	
Орелъ-карликъ темный	Aquila pennata minuta Brehm.	III	25	2	—	—	—	—	
Выпь большая . . .	Botaurus stellaris (Linn.).	III	25	—	—	—	—	—	Слышалъ крикъ.
Пѣночка-весничка .	Phylloscopus trochilus Linn.	III	27	—	—	—	—	—	
Кроншнепъ большой.	Numenius arquatus (Linn.).	III	29	стая	—	—	—	СВ	29. III птицы летѣли ночью. Въ іюнѣ кроншнепы наблюдались отдѣльными особями и стайками.
Гаичка сѣверная . .	Poecile atricapillus borealis (Sel.)	—	—	—	—	—	—	—	Зимовали.—31. III наблюдались послѣднія пролетныя особи. Въ небольшомъ количествѣ остались на гнѣздовьи.
Свиристель	Ampelis garrulus Linn. .	—	—	—	—	—	—	—	Зимою не наблюдались.—31. III была замѣчена стая этихъ птицъ особей въ 30-ть.
Перевозчикъ	Tringoides hypoleucus (Linn.)	III	31	—	—	—	—	—	
Турухтанъ	Pavoncella pugnax (Linn.).	III	31	стая	IV	во второй половинѣ	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Коршунъ черный . .	Milvus migrans (Bodd.) .	III	31	—	—	—	—	—	
Сизоворонка	Coracias garrula Linn. .	IV	4	1	IV	23	—	—	23. IV наблюдалась стаями особей по 5-ти.
Вертишейка	Jynx torquilla Linn. . .	IV	4	—	IV	7	—	—	4. IV въ первый разъ былъ услышанъ крикъ этой птицы.—7. IV крикъ былъ слышенъ повсюду.
Поганка ушастая . .	Colymbus nigricollis(Brhm)	IV	4	стайка въ 5 особей	—	—	—	—	
Мухоловка - бѣлошейка	Muscicapa collaris Bechst.	IV	5	—	—	—	—	—	
Лунь камышевый . .	Circus aeruginosus (Linn.).	IV	6	нѣсколько особей	—	—	—	—	
Камышевка-барсучекъ	Calamodus schoenobaenus (Linn.)	IV	6	—	IV	12	—	—	
Конекъ лѣсной : .	Anthus trivialis (Linn.) .	IV	7	—	IV	во-второй третп	—	—	
Мухоловка-пеструшка	Muscicapa atricapilla (L.).	IV	7	—	—	—	—	—	
Славка-завирушка .	Sylvia curruca (Linn.) .	IV	7	1	IV	въ срединѣ	—	—	Въ небольшомъ числѣ осталась гнѣздиться.
Чеканъ луговой . .	Pratincola rubetra (Linn.).	—	—	—	IV	7	—	—	
Горихвостка	Ruticilla phoenicurus (L.).	IV	7	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Чеглокъ	Hypotriorchis subbuteo (Linn.)	IV	7	—	—	—	—	—	
Чижъ	Chrysomitris spinus (L.) .	—	—	—	—	—	—	—	Въ незначительномъ количествѣ зимовали.—7.IV еще наблюдались пролетныя стайки.
Камышница	Gallinula chloropus (L.) .	IV	въ первой трети	—	—	—	—	—	
Соловей	Luscinia luscinia (Linn.) .	IV	10	—	IV	въ послѣдней трети	—	—	10. IV первый разъ слышалъ пѣніе.
Ласточка городская.	Chelidon urbica (Linn.) .	—	—	—	IV	10	—	—	Въ нынѣшнемъ году прилетъ ласточекъ нѣсколько запоздалъ; 10. IV онѣ появились сразу въ большомъ количествѣ.
Широконоска . . .	Spatula clypeata (Linn.) .	IV	10	—	—	—	—	—	
Кукушка	Cuculus canorus (Linn.) .	IV	11	—	—	—	—	—	Куkованіе.
Ласточка береговая .	Riparia riparia (Linn.) .	IV	12	—	—	—	—	—	
Крачка черная . . .	Hydrochelidon nigra (L.) .	IV	12	одиночныя особи	V	въ началѣ	—	—	
Кобчикъ	Erythropus vespertinus (Linn.)	IV	12	—	—	—	43 дня	—	
Славка-черноголовка.	Sylvia atricapilla (Linn.) .	IV	14	—	IV	15	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой оролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Пѣночка садовая . .	Hypolais hypolais (Linn.).	IV	въ срединѣ	—	—	—	—	—	
Казарка бѣлолобая, малая	Anser finmarchicus Gunn.	IV	въ срединѣ	—	—	—	—	—	
Гагара чернозобая .	Urinator arcticus Linn. .	IV	въ срединѣ	1	—	—	—	—	
Камышевка соловьиная	Potamodus luscinioides (Savi)	IV	15	1	IV	21	—	—	21. IV на пруду (площадью въ 96 десятинъ) пѣло болѣе 10-ти самцовъ.
Скопа	Pandion haliaëtos (Linn.).	IV	15	6	—	—	—	—	
Пѣночка-желтобровка	Phylloscopus sibilatrix Bechst.	IV	16	—	—	—	—	—	Всюду въ лѣсу слышалось пѣніе.
Камышевка дроздовидная	Acrocephalus arundinaceus (Linn.)	—	—	—	IV	16	—	—	Слышалъ пѣніе.
Горлица	Turtur turtur Linn. . . .	IV	16	—	IV	23	—	—	
Иволга	Oriolus galbula Linn. . .	IV	18	—	IV	23	—	—	18. IV встрѣчались ♂♂ по-одиночкѣ.
Конекъ краснозобый.	Anthus cervinus (Pall.) .	IV	18	1	—	—	—	—	
Сорокопутъ чернолобый	Lanius minor Gm. . . .	IV	18	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Сорокопутъ-жуланъ.	Enneoctonus collyrio (L.).	IV	18	—	—	—	—	—	
Стрижъ башенный .	Cypselus apus (Linn.) .	IV	18	2	V	3	—	—	
Улитъ большой . .	Glottis nebularius (Gunn.)	—	—	—	IV	18	—	—	Особи этого вида наблюдались и въ іюнѣ.
Фифи	Totanus glareola (Gm.) .	—	—	—	IV	18	—	—	
Мухоловъ малый . .	Siphia parva Bechst. . .	IV	20	—	—	—	—	—	17. IV птицы эти наблюдались въ окрестностяхъ д. Даниловки, Кіевскаго уѣзда.
Мухоловка сѣрая . .	Muscicapa grisola (Linn.).	IV	21	—	—	—	—	—	
Камышевка тростниковая	Acrocephalus streperus Vieill.	IV	21	—	—	—	—	—	Одиночные поющіе экземпляры обоихъ видовъ наблюдались на пруду и его берегахъ.
Камышевка болотная.	Acrocephalus palustris Bechst.	IV	21	—	—	—	—	—	
Крачка рѣчная . . .	Sterna fluviatilis Naum. .	IV	22	—	V	въ началѣ	—	—	
Клуша	Larus fuscus Linn. . . .	IV	22—23	стаи особей въ 5—7	—	—	—	—	Въ іюнѣ наблюдалась стая этихъ птицъ особей въ 7, а также попадались и одиночные экземпляры.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Овсянка садовая . .	Emberiza hortulana Linn.	IV	23	одиночные экземпляры	IV	28	—	—	Всюду на лѣсныхъ порубахъ слышалось пѣніе ♂♂.
Коростель	Crex crex (Linn.) . . .	IV	23	—	—	—	—	—	Слышалъ крикъ.
Камышевка рѣчная .	Potamodus fluviatilis Wolf.	IV	29	—	—	—	—	—	
Славка сѣрая . . .	Sylvia communis Lath. .	IV	29	—	—	—	—	—	
Крачка малая . . .	Sterna minuta Pall. . . .	IV	30	—	V	въ первой половинѣ	—	—	
Славка садовая . .	Sylvia hortensis Lath. .	IV	въ концѣ	—	—	—	—	—	
Перепелъ	Coturnix coturnix (Linn.).	IV	въ концѣ	—	—	—	—	—	
Славка ястребиная .	Sylvia nisoria (Bechst.) .	V	1	—	—	—	—	—	
Куликъ-воробейчикъ.	Limonites temmincki (Leisl.)	V	1	1	—	—	—	—	

Въ зиму 1912—13 года ледоставъ Днѣпра у Кіева наблюдался 15-го января. Зима была малоснѣжная; большихъ морозовъ не было.—27. I найденъ первый цвѣточекъ мать-мачехи (Tussilago Farfara L.). Вскорѣ выпалъ снѣгъ, наступили морозы и цвѣтеніе мать-мачехи прекратилось.

21. II мать-мачеха въ полномъ цвѣту.

1. III наблюдались первыя бабочки крапивницы и крушинницы (Vanessa urticae и Rhadocera rhamni).—2. III вскрылся Днѣпръ (на 25 дней раньше нормальнаго); пылитъ лещина (Corylus Avellana); появилась первая летучая мышь.—3. III бутоны на сонъ-травѣ (Pulsatilla Patens); въ гнѣздѣ ворона (Corvus corax) яица.—7. III зацвѣтаетъ сонъ-трава.—10. III зарослн ивы (Salix alba) подернулись зеленой дымкой; появились шмели, ящерицы (Lacerta agilis exigua Eichw.) и бабочки-траурницы (Vanessa antiopa).—12. III сѣрыя лягушки (Rana temporaria) начали метать икру.

14. IV распускается и зацвѣтаетъ дубъ; зацвѣтаетъ земляника. 17. IV цвѣтетъ яблоня и рябина; зацвѣтаетъ сирень; наблюдались первыя цвѣты ландыша.—23. IV зацвѣла дрема (Lychnis) и двулистный майникъ; молодые вороны (Corvus corax) покинули гнѣзда.—28. IV зацвѣлъ барбарисъ.

1. V зацвѣлъ боярышникъ; молодые воробьи (Passer domesticus) и сѣрыя вороны (Corvus cornix) покинули гнѣзда.—5. V во ржи первые васильки.—10. V первые цвѣты бѣлой акаціи.—14. V по лугамъ начали кочевать большими стаями молодые скворцы; зацвѣли любка (ночная фіалка) и водяная лилія (Nymphaea alba).—20. V бѣлая акація въ полномъ цвѣту.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Евграфъ Яковлевичъ Катинъ. Владиславовъ, Сувалкской губерніи.
Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: окрестности города Владиславова, Сувалкской губерніи, и село Благословенство на р. Нѣманѣ, въ 30 верстахъ отъ Прусской границы.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Жаворонокъ полевой.	Alauda arvensis L. . . .	II	20		III	1—3	—	СВ	
Скворецъ	Sturnus intermedius Praz.	II	24	одиночные экземпляры	II	28—29	—	ВСВ	Пролетныя стаи наблюдались до конца марта.
Чибисъ	Vanellus vanellus L. . .	II	24		III	2—8	—	ВСВ	
Гусь	Melanonyx segetum Gmel.	II	25	—	III	1—5	—	ВСВ	
Кряква	Anas boschas L. . . .	II	25	—	—	—	—	—	
Чайка большая . . .	Larus glaucus Brünn. . .	II	27	одиночные экземпляры	—	—	—	совскрытіемъ Нѣмана—вверхъ по теченію, на В; соспаденіемъ воды—на З.	Съ 27. II по 3. III объ формы чайки встрѣчались одиночными экземплярами.
„ серебристая .	„ argentatus Brünn. .	II	27		—	—	—		
Коноплянка	Linota cannabina L. . .	III	1	массами	—	—	—	—	
Журавль сѣрый . .	Grus grus L.	III	1	стайки	III	25—30	20—25	СВ	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Зябликъ	Fringilla coelebs L. . . .	III	8	одиночные ♂♂	III	24	—	В и ВСВ	
Шилохвость	Dafila acuta L.	III	8	стайка въ 12 особей	—	—	5—10	СВ	
Поганка большая . .	Podiceps cristatus L. . .	III	8	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
Жаворонокъ лѣсной .	Alauda arborea L. . . .	III	9	3	III	17	—	—	
Пустельга	Cerchneis tinnunculus L.	III	9	пара	—	—	—	—	
Дроздъ-рябинникъ .	Turdus pilaris L.	—	—	—	III	9—11	—	СВ	Массовый летъ.
Трясогузка бѣлая .	Motacilla alba L.	III	12	одиночные ♂♂	III	18	—	—	
Аистъ бѣлый	Ciconia alba Briss. . . .	III	12	1	III	28	—	—	
Витютень	Columba palumbus L. .	III	12	стайка въ 10—12 особей	—	—	—	—	
Вальдшнепъ	Scolopax rusticola L. . .	III	13	передовыя особи	III	18	—	—	18. III начали сильно тянуть.
Дроздъ черный . . .	Merula merula L. . . .	III	13	парами	—	—	—	—	
Чеглокъ	Falco subbuteo L. . . .	III	19	парами	—	—	—	—	
Канюкъ бо́льшой . .	Buteo vulgaris Leach. . .	III	19	—	—	—	—	—	
Дроздъ пѣвчій . . .	Turdus musicus L. . . .	III	19	одиночные экземпляры	III	24	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (паловой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Дроздъ-бѣлобровикъ.	Turdus iliacus L. . . .	III	20	стаями	III	27—29	10—15	ВСВ	
Зорянка	Erithacus rubecula L. . .	III	20	—	—	—	—	—	
Пѣночка-теньковка .	Phylloscopus rufus Bechst.	III	20	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
„ весничка .	„ trochilus L. .	III	20	„	III	26	—	—	
Чайка-клуша	Larus fuscus L.	III	22	стаи	III	28	12—15	на В., со спаденіемъ воды въ Нѣманѣ—обратно.	
„ сизая	„ canus L.	III	26	стаи	III	28			
Каменка	Saxicola oenanthe L. . .	III	29	парами	—	—	—	—	
Варакушка	Cyanecula leucocyana Brehm.	IV	5	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
Горихвостка	Ruticilla phoenicurus L.	IV	8	—	—	—	—	—	
Цапля сѣрая	Ardea cinerea L.	IV	12	—	—	—	—	—	
Чекань луговой . .	Pratincola rubetra L. . .	IV	15	парами	IV	18	—	—	
Куликъ-перевозчикъ .	Actitis hypoleucus L. . .	IV	15	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
Вертиголовка	Jynx torquilla L.	IV	16	парами	—	—	—	—	
Ласточка деревенская.	Hirundo rustica L. . . .	IV	17	одиночные экземпляры	IV	20	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (паловой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Пѣночка-трещотка .	Phylloscopus sibilator Bechst.	IV	17	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
Соловей	Daulias philomela Bechst.	IV	18	—	—	—	—	—	
Зуекъ малый	Aegialitis dubia L. . . .	IV	18	стайки въ 3—5 особей	—	—	—	—	
Кукушка	Cuculus canorus L. . .	IV	20	—	—	—	—	—	Куkованіе.
Славка-завирушка .	Sylvia curruca L. . . .	IV	20	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
Трясогузка желтая .	Motacilla flava L. . . .	IV	23	—	—	—	—	—	
Ласточка береговая .	Cotile riparia L.	IV	23	передовыя особи	—	—	—	—	
„ городская .	Chelidon urbica L. . . .	IV	24	стаи		—	—	—	
Сизоворонка	Coracias garrula L. . .	IV	24	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
Мухоловка сѣрая . .	Muscicapa grisola L. . .	IV	24	—	—	—	—	—	
Конекъ луговой . .	Anthus pratensis L. . .	IV	24	стаи	IV	26—28	5—10	СВ	
Пѣночка-пересмѣшка.	Hypolais philomela L. .	IV	24	одиночные экземпляры	IV	30	—	—	
Камышевка-барсучекъ	Acrocephalus schoenobaenus L.	IV	24	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Крачка-мартышка . .	Sterna hirundo L. . . .	IV	25	—	—	—	—	—	
Иволга	Oriolus galbula L. . . .	IV	30	—	—	—	—	—	
Мухоловка-пеструшка	Muscicapa atricapilla L. .	IV	30	—	—	—	—	—	
Славка черноголовая.	Sylvia atricapilla L. . . .	IV	30	—	—	—	—	—	
„ сѣрая	„ cinerea Bechst. .	V	1	—	—	—	—	—	
„ ястребиная .	„ nisoria Bechst. . .	V	2	—	—	—	—	—	
Сорокопутъ-жуланъ.	Lanius collurio L. . . .	V	2	—	—	—	—	—	
Стрижъ черный . .	Cypselus apus L. . . .	V	3	—	—	—	—	—	
Коростель	Crex crex L.	V	4	—	—	—	—	—	По крику.

26. II вскрылся Нѣманъ; разливъ былъ слабый.—29. II Нѣманъ очистился ото льда.
8. III—первая гроза.—21. III у Corvus corax L. и Haliaëtus albicilla выклюнулись птенцы.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Юліанъ Феликсовичъ Воеводзкій.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: имѣніе „Зыпле“ (усадьба лѣсная Новинка), гмина Зыпле, Владиславовскаго уѣзда, Сувалкской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Жаворонокъ	Alauda arvensis	II	7	много	—	—	—	—	
Коршунъ	Milvus regalis	II	19	нѣсколько особей	—	—	—	—	
Чибисъ	Vanellus cristatus . . .	II	23	много	—	—	—	—	
Скворецъ	Sturnus vulgaris	II	23	много	—	—	—	—	
Вальдшнепъ	Scolopax rusticola . . .	III	6	мало	—	—	—	—	
Лебедь	Cygnus olor	III	10	5	—	—	—	ЮВ	
Бекасъ	Scolopax gallinago . . .	III	13	—	—	—	—	—	
Голубь	Columba palumbus . . .	III	20	—	—	—	—	—	
Гусь	Anser sp.?	II	21	18	—	—	—	ЮВ	Встрѣчался стаями особей по 10-ти.
Журавль	Grus cinerea	IV	3	27	—	—	—	ЮВ	
Аистъ	Ciconia alba	IV	6	—	—	—	—	—	
Ласточка	Hirundo rustica	IV	16	—	—	—	—	—	
Соловей	Luscinia philomela . . .	IV	16	—	—	—	—	—	
—	Coracias garrula	V	7	11	—	—	—	3	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Юліанъ Осиповичъ М. [1]).
Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: имѣніе „Зыковичи", Бакштанской волости, Ошмянскаго уѣзда, Виленской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Жаворонокъ полевой.	Alauda arvensis	II	14	5	—	—	—	СВ	
„ лѣсной .	Alauda arborea	II	20	1	—	—	—	—	
Чибисъ	Vanellus cristatus . . .	II	25	5	—	—	—	СЗ	
Гусь	Anser sp.?	II	18	15	—	—	—	СВ	
Аистъ	Ciconia alba	III	21	2	—	—	—	В	
Трясогузка	Motacilla alba	III	21	1	—	—	—	—	
Вальдшнепъ	Scolopax rusticola . . .	III	10	1	—	—	—	—	
Ласточка	Hirundo rustica	IV	14	3	—	—	—	—	

25. III—первая гроза.

[1]) Фамилія неразборчиво написана.

9.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Викторъ Петровичъ Жадановскій.
Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: мѣстечко „Ушачь", Лепельскаго уѣзда, Витебской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Скворецъ	—	III	7	2	—	—	—	—	
Грачъ	—	III	3	стая	—	—	—	—	
Жаворонокъ	—	III	5	1	—	—	—	—	
Аистъ	—	III	22	2	—	—	—	—	
Зябликъ	—	III	28	стая	—	—	—	—	
Утка	—	III	28	2	—	—	—	—	
Ястребъ-голубятникъ.	Astur palumbarius . . .	III	28	1	—	—	—	—	
Коршунъ	—	III	29	1	—	—	—	—	
Рѣполовъ	—	III	29	стаи	—	—	—	—	
Сорокопутъ	—	III	29	1	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: В. А. Меландеръ. Станція Добромино Рязанско-Уральской желѣзной дороги, имѣніе „Милое“.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: имѣніе „Милое“ и его ближайшія окрестности (въ 46—50 верстахъ къ СВВ отъ Смоленска) въ Смоленской губерніи.

Весна 1913 года.

Названіе вида птицы.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Scolopax rusticola Linn. .	III	10	—	—	—	—	—	На тягѣ.
	„ major Gm. . .	IV	6	—	—	—	—	—	Вблизи деревни „Спасское“.
	„ gallinago Briss.	III	20	—	—	—	—	—	
	Limosa melanura Leisl. .	IV	6	1	—	—	—	—	Слышалъ крикъ.
	Totanus ochropus Linn. .	III	26	1	—	—	—	—	
	Numenius arquatus Linn.	III	27	—	—	—	—	—	Около деревни „Спасское“.
	Vanellus cristatus Meyer.	III	5	стайка	—	—	—	—	
	Porzana maruetta Leach.	IV	12	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Anas crecca Linn. . . .	III	27	—	—	—	—	—	Около деревни „Спасское“ добытъ ♂.
	Anas penelope Linn. . .	III	30	одинъ самецъ *)	—	—	—	—	20.IV наблюдалъ стаю этихъ утокъ вмѣстѣ съ Fuligula clangula въ имѣніи „Корыстино“, гдѣ онѣ продержались до начала мая.
	Ciconia alba Linn. . . .	IV	1	1	—	—	—	—	Въ имѣніи „Корыстино“.
	Botaurus stellaris Linn. .	IV	8	—	—	—	—	—	Слышалъ крикъ.
	Tinnunculus alaudarius Briss.	IV	6	1	—	—	—	—	Въ лугахъ имѣнія „Милое“.
	Milvus ater Linn. . . .	IV	8	1	—	—	—	Ю	
	Circus cyaneus Linn. . .	III	8	1	—	—	—	—	

*) Добытъ. *Авт.*

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Scops giu Scop.	IV	26	1	—	—	—	—	26. IV добытъ ♂ въ саду имѣнія „Милое“.
	Asio otus Linn.	III	30	1	—	—	—	—	
	Cuculus canorus Linn. .	IV	11	—	—	—	—	—	Слышалъ кукованіе.
	Jynx torquilla Linn. . .	IV	6	—	—	—	—	—	Слышалъ крикъ.
	Upupa epops Linn. . . .	IV	7	2	—	—	—	—	
	Coracias garrula Linn. .	IV	19	—	—	—	—	—	Въ имѣніи „Холмъ“.
	Caprimulgus europaeus Linn.	IV	16	—	—	—	—	—	Слышалъ крикъ.
	Cypselus apus Linn. . .	—	—	—	—	—	—	—	Первыя птицы наблюдались только послѣ 10-го мая.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Corvus frugilegus Linn. .	II	25	стая	—	—	—	—	На полѣ деревни „Козлово“.
	Alauda arvensis Linn. .	II	27	—	—	—	—	—	Первая пѣсня.
	Sturnus vulgaris Linn. .	III	1	4	—	—	—	—	
	Emberiza schoeniclus L.	IV	6	—	—	—	—	—	
	Muscicapa articapilla Linn.	IV	15	—	—	—	—	—	Пролетъ продолжался до 25—30. IV.
	Fringilla coelebs Linn. .	III	7	—	—	—	—	—	
	„ montifringilla Briss.	IV	8	8	—	—	—	—	8. IV наблюдалась послѣдняя пролетная стайка въ 8 особей.
	Hirundo rustica Linn. . .	IV	6	1	IV	15	—	—	
	Chelidon urbica Linn. .	IV	15	—	—	—	—	—	
	Muscicapa grisola Linn. .	IV	22	—	—	—	—	—	
	Motacilla alba Linn. . .	III	11	1	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Motacilla flava Linn. . .	IV	6	нѣсколько стаекъ	—	—	—	—	
	Anthus arboreus Linn.	III	12	—	—	—	—	—	Пѣніе.
	„ pratensis Linn. .	IV	6	много	—	—	—	—	
	Lanius collurio Linn. . .	IV	30	—	—	—	—	—	Наблюдался самецъ.
	Troglodytes parvulus Linn.	III	11	—	—	—	—	—	На зиму исчезаютъ.
	Oriolus galbula Linn. . .	IV	20	—	—	—	—	—	Слышалъ крикъ.
	Acrocephalus phragmitis Bechst.	IV	12	1	—	—	—	—	У деревни „Спасское“.
	Acrocephalus dumetorum Blyth.	IV	28	1	—	—	—	—	
	Phylloscopus trochilus L.	IV	6	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Phylloscopus collybita L.	IV	6	—	—	—	—	—	
	„ sibilatrix Bechst.	IV	15	нѣсколько самцовъ	—	—	—	—	
	Sylvia atricapilla Linn. .	IV	15	1	—	—	—	—	
	„ curruca Linn.	IV	22	1	—	—	—	—	Добытъ самецъ.
	Hypolais icterina Vieill. .	V	1	1	—	—	—	—	
	Erithacus leucocyanus Brehm.	IV	29	пара	—	—	—	—	
	Erithacus philomela Bechst.	IV	15	1	—	—	—	—	
	Accentor modularis Linn.	IV	8	1	—	—	—	—	
	Ruticilla phoenicurus Linn.	IV	9	1	—	—	—	—	
	Saxicola oenanthe Linn. .	IV	8	1	—	—	—	—	
	Pratincola rubetra Linn. .	IV	12	—	—	—	—	—	
	Turdus viscivorus Linn. .	III	3	—	—	—	—	—	Слышалъ пѣніе.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Гаральдъ Викторовичъ баронъ Лоудонъ. Вольмаръ, Лифляндской губерніи, имѣніе „Лизденъ“.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: имѣніе „Лизденъ“, прихода Буртнекъ, Вольмарскаго уѣзда, Лифляндской губерніи (77 метровъ надъ уровнемъ океана, на водораздѣлѣ рѣки „Аа“ и Буртнекскаго озера).

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (массовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	*) Poecile atricapillus borealis Sel.	II	20	—	—	—	—	—	Особи Poecile atricapillus borealis зимою всѣ откочевываютъ къ югу; P. palustris остается здѣсь, но только въ небольшомъ числѣ.
	*) Poecile palustris palustris Linn.	II	20	—	III	9	—	—	
	*) Periparus ater schwederi Loud. & Tschusi .	II	20	—	—	—	—	—	
	*) Aegithalos caudatus caudatus Linn.	II	20	—	—	—	—	—	
	*) Regulus regulus regulus Linn.	II	20	—	—	—	—	—	

*) Уже два-три дня какъ начали кочевать стайками, направляясь на сѣверъ. *Авт.*

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	*) Certhia familiaris familiaris Linn.	II	20	—	—	—	—	—	
	Corvus cornix cornix. .	—	—	—	II	21	—	—	
	Alauda arvensis arvensis .	II	22	—	III	1	—	В	31. III наблюдалъ стаю особей въ 100, летящую на западъ.
	Chloris chloris chloris .	II	24	—	—	—	—	—	
	Sturnus poltoratzkii intermedius	II	24	—	III	5	—	—	
	Acanthis cannabina cannabina Linn.	—	—	—	III	1	—	—	
	Frugilegus frugilegus. . .	—	—	—	III	1	—	—	
	Passerina nivalis nivalis L.	—	—	—	III	3	—	—	
	Turdus pilaris pilaris . .	III	3	стайка въ 6 особей	—	—	—	—	
	Vanellus vanellus . . .	—	—	—	III	3	—	—	
	Fringilla coelebs	III	5	2 самца	III	9	—	—	7. III наблюдалъ большую стайку.

*) Уже два-три дня какъ начали кочевать стайками, направляясь на сѣверъ. *Авт.*

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Lullula arborea arborea .	III	7	—	III	9	—	—	
	Carduelis carduelis . . .	III	7	парами	—	—	—	—	
	Troglodytes troglodytes troglodytes	III	10	1	III	20	—	—	
	Turdus philomelus (musicus)	III	12	1	III	20	—	—	
	Turdus viscivorus viscivorus	III	12	—	—	—	—	—	
	Acanthis spinus spinus .	III	13	стайка	—	—	—	—	
	Anser sp.?	III	12	стайка	—	—	—	СВ	
	Grus grus	III	12	стайка	IV	7	—	СВ	7. IV наблюдалось нѣсколько большихъ стай, тянувшихъ на сѣверъ.
	Motacilla alba	III	16	1	III	20	—	—	
	Anas boschas	III	16	—	—	—	—	—	Въ окрестностяхъ наблюдалась раньше.
	Cygnus musicus	—	—	—	III	16	—	—	
	Circus cineraceus . . .	III	19	1	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Scolopax rusticola . . .	III	19	много	—	—	—	—	
	Erithacus rubecula rubecula	III	19	много	—	—	—	—	
	Columba palumbus . . .	III	20	♂ и ♀	—	—	—	—	
	Saxicola oenanthe . . .	III	20	—	IV	12	—	—	
	Anthus pratensis	III	20	немного	III	26	—	—	
	Phylloscopus collybita collybita	III	28	—	IV	9	—	—	
	Columba oenas	IV	5	парочка	—	—	—	—	
	Anthus arboreus	IV	9	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
	Phylloscopus trochilus .	IV	11	масса	—	—	—	—	
	Glaucion clangula . . .	IV	12	пара	—	—	—	—	12. IV наблюдались ♂ и ♀ на пруду въ имѣніи; на большихъ озерахъ встрѣчался гораздо раньше.
	Actitis hypoleucus . . .	IV	12	—	—	—	—	—	
	Anser cinereus	IV	12	большая стая	—	—	—	В	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Larus canus	IV	12	масса	—	—	—	—	
	Numenius arquatus . . .	IV	12	—	—	—	—	—	
	Hirundo rustica	IV	13	2	—	—	—	—	
	Pratincola rubetra . .	IV	13	—	—	—	—	—	
	Ciconia alba *)	IV	13	—	—	—	—	—	Въ окрестностяхъ наблюдался раньше.
	Jynx torquilla	IV	14	—	—	—	—	—	
	Hirundo urbica	IV	16	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
	Hypotriorchis subbuteo .	IV	16	пара	—	—	—	—	
	Cuculus canorus	IV	16	1	—	—	—	—	
	Phylloscopus sibilatrix .	IV	17	—	—	—	—	—	Пѣніе.
	Phoenicurus phoenicurus.	IV	17	—	—	—	—	—	
	Tinnunculus alaudarius .	IV	18	—	—	—	—	—	
	Muscicapa atricapilla . .	IV	19	—	—	—	—	—	

*) Уже нѣсколько лѣтъ какъ здѣсь не гнѣздится. *Авт.*

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Erythropus vespertinus .	IV	19	1	—	—	—	—	Раньше этотъ видъ мною здѣсь никогда не наблюдался.
	Caprimulgus europaeus.	IV	20	—	—	—	—	—	Утромъ.
	Budytes flava borealis . .	IV	21	—	—	—	—	—	Часто, на лугахъ.
	Sylvia atricapilla	IV	25	—	—	—	—	—	
	Muscicapa striata . . .	IV	28	—	—	—	—	—	
	Sylvia borin borin . . .	IV	29	—	—	—	—	—	
	„ curruca curruca .	IV	30	—	—	—	—	—	
	Oriolus oriolus	V	3	—	—	—	—	—	
	Luscinia luscinia (philomela)	IV	16	—	—	—	—	—	Въ окрестностяхъ.
	Coracias garrula	IV	21	—	—	—	—	—	
	Hypolais hypolais	V	5	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Cotile riparia	V	5	много	—	—	—	—	
	Cypselus apus	V	5	—	—	—	—	—	
	Coturnix coturnix . . .	V	8	1	—	—	—	—	Вечеромъ.
	Crex crex	V	8	—	—	—	—	—	
	Lanius collurio	V	14	—	—	—	—	—	

Весна была ранняя, но теплая погода довольно часто прерывалась холодами.

30. III наступилъ перерывъ въ прилетѣ птицъ; выпало много снѣга; ночной морозъ доходилъ до -3^0 R. — 31. III было все покрыто снѣгомъ; прилетѣвшія птицы скрылись; вечеромъ температура -2^0 R. *).

1. IV опять шелъ снѣгъ; температура $+1$—2^0 R.; около полудня показались проталины.—Съ 23 по 25 IV по ночамъ были сильные морозы, уничтожившіе массу листьевъ и побѣговъ.

*) До этого дня на Salix были цвѣты, на крыжевникѣ—листя; ольха пылила.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Михаилъ Михайловичъ Гермсъ. Нустаго, Лифляндской губерніи, имѣніе „Замгофъ“.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: имѣніе „Замгофъ“, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Sturnus vulgaris . . .	III	1	2	III	9	—	—	
	Alauda arvensis . . .	III	2	—	—	—	—	—	
	Fringilla coelebs	III	9	—	—	—	—	—	
	Lullula arborea	III	13	—	—	—	—	—	
	Anthus pratensis	III	14	—	—	—	—	—	
	Columba oenas	III	17	—	—	—	—	—	
	„ palumbus . . .	III	17	—	—	—	—	—	
	Motacilla alba	III	21	—	—	—	—	—	
	Erithacus rubecula . . .	III	22	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Phylloscopus collybita . .	III	22	—	—	—	—	—	
	Turdus musicus	III	22	—	—	—	—	—	
	„ iliacus	III	22	—	—	—	—	—	
	Falco tinnunculus . .	III	23	—	—	—	—	—	
	Colymbus arcticus . . .	III	29	—	—	—	—	—	
	Saxicola oenanthe . . .	IV	5	—	—	—	—	—	
	Anthus trivialis	IV	12	—	—	—	—	—	
	Phylloscopus trochilus . .	IV	12	—	—	—	—	—	
	Pratincola rubetra . . .	IV	18	—	—	—	—	—	
	Budytes flava	IV	19	—	—	—	—	—	
	„ borealis	IV	19	—	—	—	—	—	
	Phylloscopus sibilatrix . .	IV	20	—	—	—	—	—	
	Chelidon urbica	IV	20	2	V	3	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Cuculus canorus	IV	17	—	—	—	—	—	
	Hirundo rustica	IV	19	1	V	3	—	—	
	Sylvia cinerea	IV	25	—	—	—	—	—	
	„ atricapilla	IV	26	—	—	—	—	—	
	Muscicapa atricapilla . .	IV	26	—	—	—	—	—	
	„ grisola . . .	IV	26	—	—	—	—	—	
	Hypolais icterina	IV	28	—	—	—	—	—	
	Cotile riparia	V	3	—	—	—	—	—	
	Luscinia philomela . . .	V	4	—	—	—	—	—	
	Oriolus galbula	V	6	—	—	—	—	—	
	Cypselus apus	V	6	5	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Евгеній Ивановичъ Исполатовъ. Лѣсничій Опочецкаго лѣсничества. Городъ Опочка, Псковской губерніи.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: г. Опочка и его окрестности, Псковская губернія.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Скворецъ	—	II	23	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
Грачъ	Trypanocorax frugilegus .	II	26	нѣсколько	—	—	—	—	
Жаворонокъ полевой.	Alauda arvensis	III	1	нѣсколько	—	—	—	—	
Конопляпка	Acanthis cannabina . . .	III	5	одиночные экземпляры	—	—	—	—	
Трясогузка бѣлая .	Motacilla alba	III	10	»	—	—	—	—	
Овсянка болотная .	Emberiza schoeniclus . .	III	10	»	—	—	—	—	
Жаворонокъ лѣсной.	Lullula arborea Linn. . .	III	10	нѣсколько	—	—	—	—	
Зябликъ	Fringilla coelebs	III	14	—	—	—	—	—	Слышно пѣніе.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчена?	Мѣсяцъ.	Число.			
Свиристель	Ampelis garrulus	III	18	1	—	—	—	—	
Деряба	Turdus viscivorus . . .	III	20	нѣсколько	—	—	—	—	Пѣніе.
Малиновка	Erithacus rubecula . . .	III	24	—	—	—	—	—	Пѣніе.
Апстъ	Ciconia alba	III	30	пара	—	—	—	—	Была замѣчена въ 8-ми верстахъ отъ города Опочки.
Пѣночка	Phylloscopus trochilus .	IV	9	—	—	—	—	—	Пѣніе.
Перевозчикъ	Actitis hypoleucus . . .	IV	13	1	—	—	—	—	
Мухоловка сѣрая . .	Butalis grisola	IV	21	одиночные экземпляры	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Яковъ Никандровичъ Никандровъ.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: погостъ Корлы, Логазовской волости, Псковскаго уѣзда, на берегу Псковскаго (Талабскаго) озера, близъ устья рѣки Великой.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Скворецъ	—	II	23	немного	III	3	—	СЗ	
Жаворонокъ полевой.	—	II	25	стайка	III	3	—	СЗ	
Зябликъ	—	II	27	1	III	3	—	СЗ	
Рѣполовъ	—	II	27	стайка	III	3	—	СЗ	
Чибисъ	—	III	5	немного	III	13	—	СЗЗ	
Кряква	—	III	5	пара	III	11	—	СЗЗ	
Грачъ	—	—	—	много	III	6	—	СЗ	
Пупочка	—	—	—	много	III	9	14	СЗ	
Чайка сизая	Larus canus	III	9	пара	III	12	—	СЗЗ	
Гусь	—	III	10	1	III	17	15	СЗ, ЮВ и Ю	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета:	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Овсянка тростниковая	—	III	10	1	III	14	—	ССЗ	
Дроздъ-рябинникъ .	—	III	10	пара	—	—	—	СЗ	
Поползень	—	III	10	пара	—	—	—	СЗ	
Трясогузка бѣлая .	—	III	13	1	III	17	—	СЗ	
Конекъ луговой . .	—	III	13	1	III	14	—	ССЗ	
Бекасъ	—	III	13	2	III	21	—	СЗ	
Свіязь	—	III	13	стайка	III	21	30	СЗ	
Лебедь-клікунъ . .	—	III	13	немного	—	—	7	СЗ	
Гоголь	—	III	13	немного	—	—	10	СЗ	
Варакушка	—	III	19	1	—	—	—	ЮВ и Ю	
Вальдшнепъ	—	III	19	4	—	—	—	ЮВЮ	На тягѣ.
Дроздъ бѣлобровый.	—	—	—	много	III	21	—	СЗ	
Чирокъ-свистунокъ .	—	—	—	много	III	21	—	СЗ	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчена?	Мѣсяцъ.	Число.			
Шилохвость	—	—	—	много	III	21	—	СЗ	
Куликъ-травникъ . .	—	III	21	1	—	—	—	СЗ	
Журавль	—	III	21	немного	III	30	—	СЗ	
Утка сѣрая	—	III	23	1	—	—	—	С	
Выпь	—	III	23	1	—	—	—	С	
Лунь луговой . . .	—	III	23	1	—	—	—	С	
Куликъ-чернозобикъ.	Tringa alpina	III	23	1	—	—	—	С	
Чирокъ-трескунокъ .	—	III	23	стайка	—	—	—	СЗ	
Кроншнепъ большой.	—	IV	2	1	—	—	—	С	
Чайка малая	Larus minutus	IV	3	много	—	—	—	В	
Гаршнепъ	—	IV	3	—	—	—	—	В	Токъ.
Погонышъ	—	IV	4	много	—	—	—	Ю	
Лунь полевой . . .	—	IV	5	много	—	—	—	ЮВ	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Лунь камышевый . .	—	IV	5	много	—	—	—	ЮВ	
Чернеть морская . .	—	IV	6	много	—	—	—	С и ЮЗ	
Широконоска . . .	—	IV	7	много	—	—	—	ЮЗ	
Пѣночка-теньковка .	—	IV	7	мало	IV	11	—	ЮЗ	
Чеканъ-каменка . .	—	IV	8	—	IV	11	—	ЮЗ	
Аистъ	—	IV	9	много	—	—	—	Ю	На гнѣздахъ.
Чемга	—	IV	10	много	—	—	—	Ю	
Лысуха	—	IV	10	много	—	—	—	Ю	
Пѣночка-весничка .	—	IV	11	мало	IV	26	—	Ю и С	
Кроншнепъ малый .	—	IV	11	—	—	—	—	Ю	
Малиновка красногрудая	—	IV	12	много	—	—	—	СЗ	
Ласточка деревенская.	—	IV	15	мало	IV	26	—	ЮЗ	
Трясогузка желтая .	—	IV	17	много	—	—	—	СЗ	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Ласточка городская .	—	IV	18	1	IV	26	—	ЮЗ	
„ береговая .	—	IV	18	—	IV	26	—	ЮЗ и С	
Мухоловка-пеструшка	—	IV	20	—	—	—	—	С	
Конекъ лѣсной . . .	—	IV	22	много	—	—	—	С	
Горихвостка	—	IV	22	1	—	—	—	С	
Турухтанъ	—	IV	18	мало	IV	26	—	ЮЗ и С	
Сивоворонка	—	V	1	1	—	—	—	ЮВ	
Дроздъ пѣвчій . . .	—	V	1	много	—	—	—	ЮВ	
Пѣночка-желтобровка	—	V	1	много	—	—	—	ЮВ	
Кукушка	—	V	1	много	—	—	—	ЮВ	
Куликъ-галстучникъ.	—	V	1	много	—	—	—	ЮВ	
Соловей	—	V	3	мало	V	6	—	ЮЗ	
Камышевка-барсучекъ	—	V	3	мало	V	6	—	ЮЗ	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Щеврица полевая .	Anthus campestris . . .	V	3	мало	—	—	—	ЮЗ	
Стрижъ	—	V	3	1	V	5	—	ЮЗ	
Славка сѣрая . . .	—	V	5	много	—	—	—	ЮЗ	
„ черноголовая.	—	V	5	много	—	—	—	ЮЗ	
Крачка черная . . .	—	V	5	много	V	6	—	ЮЗ	
„ мартышка . .	—	—	—	много	V	6	—	ЮЗ	
Куликъ-чернышъ . .	—	V	3	1	—	—	—	ЮЗ	
Камышевка дроздовидная	—	V	6	немного	—	—	—	ЮЗ	
Куликъ-грязовикъ .	—	V	6	немного	—	—	—	ЮЗ	Крикъ: юли, юли.
Иволга	—	V	6	немного	—	—	—	ЮЗ	
Коростель	—	V	14	много	—	—	—	СЗ	
Чечевица	—	V	17	много	—	—	—	Ю	
Камышевка садовая .	—	V	19	много	—	—	—	СЗ	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Владиміръ Робертовичъ Диць (ловчій Его Величества). Г. Гатчино, С.-Петербургской губерніи.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: городъ Гатчино, С.-Петербургской губерніи, Царскосельскаго уѣзда; Императорская Охота.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	—	III	1	—	—	—	—	—	
Подорожникъ . . .	Emberiza nivalis	—	—	200 особей	III	4	—	З	
Жаворонокъ	Alauda arvensis	III	7	—	III	12	—	З	
Скворецъ	Sturnus vulgaris	III	9	—	—	—	—	З	
Трясогузка	Motacilla alba	III	11	—	—	—	—	ЮЗ	
Зябликъ	Fringilla coelebs	III	12	—	III	16	—	СЗ	
Чибисъ	Vanellus cristatus . . .	III	18	—	—	—	—	ЮЗ	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Дроздъ пѣвчій . . .	Turdus musicus	III	20	—	—	—	—	ЮЗ	
Бекасъ	Scolopax gallinago . . .	III	23	—	—	—	—	З	
Вальдшнепъ	„ rusticola . . .	III	24	—	III	28	—	СЗ	
Горлинка	Turtur communis . . .	III	25	—	—	—	—	СЗ	
Куликъ-чернышъ . .	Totanus ochropus . . .	IV	8	—	—	—	—	Ю	
Кукушка	Cuculus canorus	IV	18	—	—	—	—	СЗ	Кукованіе.
Соловей	Erithacus philomela . .	V	5	—	V	6	—	ЮЗ	
Горихвостка	Ruticilla phoenicurus . .	V	5	—	V	6	—	ЮЗ	
Славка	Sylvia hortensis	V	5	—	V	6	—	ЮЗ	
Стрижъ	Cypselus apus	V	6	—	—	—	—	ЮЗ	
Иволга	Oriolus galbula	V	8	—	—	—	—	ЮЗ	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Константинъ Владиміровичъ Лаушицъ. С.-Петербургъ. Имп. Университетъ, Зоологическій кабинетъ.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: окрестности села „Лахта", С.-Петербургскаго уѣзда. Село расположено на сѣверномъ берегу Финскаго залива, въ 10-ти верстахъ отъ г. С.-Петербурга.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	Trypanocorax frugilegus L	—	—	—	III	4	—	—	Появились сразу массами.
Жаворонокъ полевой.	Alauda arvensis Linn. .	III	11	8	III	13	—	—	
Скворецъ	Sturnus sophiae Bianch..	III	16	2	III	20	—	—	
Трясогузка бѣлая .	Motacilla alba Linn. . .	III	18	2	III	20	—	—	
Лебедь-кликунъ . .	Cygnus musicus Linn. .	III	18	3	IV	1	около 20 дней	—	
„ малый . . .	„ bewicki Yarr. .	III	18	7	IV	7	—	—	
Гусь сѣрый	Anser anser Linn. . . .	III	20	16	IV	7	около 25 дней	—	Послѣднія особи наблюдались 16. IV.
Кряква	Anas boschas Linn. . .	III	24	4	III	30	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Казарка черная . .	Branta bernicla Linn. . .	—	—	28 особей; 4 стаи	III	26	—	—	
Вальдшнепъ	Scolopax rusticola Linn. .	IV	1	1	—	—	—	—	Не гнѣздится и на пролетѣ встрѣчается случайно.
Клинтухъ	Columba oenas Linn. . .	IV	7	2	IV	11	около 10 дней	—	
Коноплянка	Cannabina cannabina Linn.	IV	7	3	IV	18	—	—	
Кроншнепъ	Numenius arquatus Linn.	IV	11	6	IV	19	—	—	19. IV наблюдалось много стай особей по 100 и больше.
Турухтанъ	Pavoncella pugnax Linn. .	IV	11	1	IV	30	—	—	Пролетъ былъ очень слабый.
Пѣночка-весничка .	Phylloscopus trochilus L.	IV	14	2	—	—	—	—	
Горихвостка	Ruticilla phoenicurus Linn.	IV	19	1 ♂	IV	24	—	—	
Травникъ	Totanus calidris Linn. .	IV	20	2	—	—	—	—	
Ласточка-касатка . .	Hirundo rustica Linn. .	—	—	—	IV	20	—	—	
Плиска темноголовая.	Budytes flava borealis Sund.	IV	12	2	IV	20	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (авловой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Ласточка-воронокъ .	Chelidon urbica Linn. .	IV	23	2	V	5	—	—	
Камышевка-барсучекъ	Acrocephalus phragmitis Bechst.	IV	30	5	V	2	—	—	
Кукушка	Cuculus canorus Linn. .	—	—	—	V	4	—	—	Закуковали сразу въ большомъ числѣ.
Куликъ-чернозобикъ .	Pelidna alpina Linn. . .	—	—	—	V	5	—	—	
Чайка малая	Hydrocoloeus minutus Pall.	V	5	7	—	—	—	—	
Мухоловка сѣрая . .	Muscicapa grisola Linn. .	V	5	6	V	9	—	—	
Куликъ-чернышъ . .	Helodromas ochropus L. .	—	—	—	V	6	—	—	
Фифи	Totanus glareola Gm. . .	—	—	—	V	6	—	—	
Пѣночка-трещетка .	Phylloscopus sibilatrix Bechst.	V	1	1	V	6	—	—	
Мухоловка-пеструшка.	Muscicapa atricapilla Linn.	V	6	1	V	9	—	—	
Стрижъ	Cypselus apus Linn. . .	V	7	5	—	—	—	—	
Славка-мельничекъ .	Sylvia curruca Linn. . .	—	—	—	V	2	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Пѣночка-пересмѣшка.	Hypolais hypolais Linn. .	V	3	2	—	—	—	—	
Славка-смородинка .	Sylvia simplex Lath. . .	V	6	1	V	7	—	—	
Чечевица	Carpodacus erythrinus Pall.	—	—	—	V	9	—	—	
Пуночка	Plectrophenax nivalis Linn.	—	—	—	III	14	—	—	
Чибисъ	Vanellus vanellus Linn. .	III	18	4	—	—	—	—	
Дроздъ-рябинникъ .	Turdus pilaris Linn. . .	III	19	1	III	22	—	—	
Зябликъ	Fringilla coelebs Linn. .	III	22	6	III	30	—	—	
Чирокъ-свистунокъ .	Nettion crecca Linn. . .	—	—	—	III	20	—	—	
Гоголь	Fuligula clangula Linn. .	III	22	9	III	26	—	—	
Журавль	Grus grus Linn.	III	21	1	III	26	—	—	
Гусь	Anser sp.?	III	22	21	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: И. А. Тихомировъ. Царское Село, С.-Петербургской губерніи, Новая деревня, 28.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: Новая деревня; Царское село, С.-Петербургской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Corvus frugilegus	II	24	3	II	25—26	—	—	
	Sturnus vulgaris . . .	III	1	2	III	5—7	—	—	
	Alauda arvensis	III	4	1	—	—	—	—	
	Cygnus musicus	III	3	стайка въ 3 особи	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Александръ Николаевичъ Карамзинъ. Село Полибино, Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: село Полибино, на рѣкѣ Мочегаѣ; Бугурусланскій уѣздъ, Самарская губернія.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	Corvus frugilegus . . .	II	25	—	III	27	—	В	Сразу появились въ большомъ количествѣ.
Скворецъ	Sturnus vulgaris	III	13	10	—	—	—	В	
Цапля сѣрая	Ardea cinerea	III	15	1	—	—	—	В	
Сова ушастая . . .	Asio otus	III	15	1	—	—	—	—	
Коноплянка	Acanthis linaria	III	18	1	—	—	—	—	
Пигалица	Vanellus cristatus . . .	III	20	4	IV	2	—	СВ и В	
Жаворонокъ полевой.	Alauda arvensis	III	24	6	III	26	—	ВСВ и В	
Зябликъ	Fringilla coelebs	III	24	5	IV	1	—	В	
Зеленушка	Chloris chloris	III	26	3	—	—	—	В	
Гусь	Anser sp.?	III	24	стая	IV	4	—	В	4. IV наблюдалось много стай.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Зимнякъ	Archibuteo pallidus . . .	III	27	1	—	—	—	B	
Пустельга	Tinnunculus alaudarius .	III	27	1	—	—	—	B	
Орелъ-могильникъ .	Aquila heliaca	III	27	1	IV	3	—	C	
Орланъ-бѣлохвостъ .	Haliaëtus albicilla . . .	III	27	1	—	—	—	C	
Лунь полевой . . .	Circus cyaneus	III	28	1	—	—	—	CB	
Овсянка черноголовая	Emberiza schoeniclus . .	III	28	стая	—	—	—	—	
Журавль	Grus cinerea	III	28	1	—	—	—	—	
Чайка обыкновенная.	Larus ridibundus	III	30	3	IV	3	—	B	
Подорликъ	Aquila clanga	III	31	1	—	—	—	CB	
Сарычъ рыжій . . .	Buteo vulpinus	IV	1	2	IV	4	—	CB	
Лунь степной . . .	Circus macrurus	IV	1	1 ♂	IV	4	—	CB	
Трясогузка бѣлая .	Motacilla alba	IV	1	15	—	—	—	—	
Клинтухъ	Columba oenas	IV	1	3	—	—	—	CB	
Улитъ-чернышъ . .	Totanus ochropus . . .	IV	1	1	—	—	—	—	
Гоголь	Fuligula clangula . . .	IV	1	4	IV	3	—	B	
Перепелятникъ . . .	Accipiter nisus	IV	1	1	—	—	—	B	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Коршунъ	Milvus ater	IV	2	1	—	—	—	ССВ	
Дроздъ-рябинникъ .	Turdus pilaris	IV	2	1	—	—	—	В	
Шилохвость	Anas acuta	IV	2	1 ♂	IV	3	—	СВ	Наблюдался массовый летъ.
Чайка сизая	Larus canus	IV	2	2	IV	3	—	В	
Крахаль-лутокъ . .	Mergus albellus	IV	3	4	—	—	—	—	
Лунь камышевый . .	Circus aeruginosus . . .	IV	2	1	—	—	—	В	
Удодъ	Upupa epops	IV	4	1	—	—	—	В	
Вальдшнепъ	Scolopax rusticola . . .	IV	4	1	—	—	—	—	
Каменка	Saxicola oenanthe . . .	IV	6	2	—	—	—	—	
Соколъ-балобанъ . .	Hierofalco saker Gm. . .	IV	8	1	—	—	—	—	
Сова болотная . . .	Asio accipitrinus	IV	8	1	—	—	—	—	
Стрепетъ	Otis tetrax	IV	9	1	—	—	—	—	
Дудакъ	Otis tarda	IV	9	2	—	—	—	—	
Пѣночка-теньковка .	Phylloscopus collybita .	IV	10	много	—	—	—	—	
Поганка большая . .	Podiceps cristatus Linn. .	IV	14	1	—	—	—	—	
Варакушка	Erithacus suecicus . . .	IV	14	1	IV	15	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Горихвостка	Ruticilla phoenicurus . .	IV	15	2	IV	18	—	—	
Щеврица лѣсная . .	Anthus arboreus	IV	15	2	—	—	—	—	
Мухоловка пестрая .	Muscicapa atricapilla . .	IV	15	3	IV	18	—	—	
Жаворонокъ лѣсной .	Alauda arborea	IV	15	1	—	—	—	—	
Ласточка деревенская.	Hirundo rustica	IV	16	1	IV	23	—	ЮЗ	
Щеврица луговая .	Anthus pratensis	—	—	—	IV	19	—	—	
Чеканъ луговой . .	Pratincola rubetra . . .	IV	23	2	IV	24	—	—	
Кобчикъ	Erythropus vespertinus .	IV	23	много	—	—	—	СВ и В	
Сизоворонка	Coracias garrula	IV	23	1	—	—	—	—	
Трясогузка желтая .	Motacilla flava	IV	24	2	—	—	—	—	
„ полевая .	„ campestris . .	IV	24	4	—	—	—	—	
Дубровникъ	Emberiza hortulana . . .	IV	24	1	—	—	—	—	
Соловей	Erithacus philomela . .	IV	24	1	—	—	—	—	Запѣлъ.
Кукушка	Cuculus canorus	IV	24	—	—	—	—	—	Закуковала.
Горлица	Turtur auritus	IV	27	4	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Василій Дмитріевичъ Пополутовъ.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: собственный хуторъ, Пилюгинской волости, Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ жительныхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	—	II	26	—	II	28	—	съ Ю на С.	
Скворецъ	—	III	14	1	III	23	—	—	
Жаворонокъ	—	III	21	—	III	23	—	—	
Дроздъ	—	III	24	2	—	—	—	—	
Чибисъ	—	III	27	1	—	—	—	—	
Кроншнепъ	—	IV	2	1	—	—	—	—	
Журавль	—	IV	2	5	—	—	—	—	
Утка	—	IV	3	18	—	—	—	—	
Гусь	—	IV	—	—	—	—	—	—	
Вальдшнепъ	—	IV	10	—	IV	12	—	—	
Кукушка	—	IV	23	—	—	—	—	—	
Ласточка	—	IV	23	—	—	—	—	—	
Перепелъ	—	IV	26	1	—	—	—	—	
Иволга	—	IV	30	—	—	—	—	—	
Горлинка	—	IV	30	—	—	—	—	—	
Соловей	—	V	4	2	—	—	—	—	
Малиновка	—	V	9	—	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Г. Д. Смагинъ. Село Атмисъ, Нижне-Ломовскаго уѣзда, Пензенской губерніи.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: село Атмисъ, Нижне-Ломовскаго уѣзда, Пензенской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	—	II	18	—	—	—	—	—	
Жаворонокъ	—	III	9	—	—	—	—	—	
Скворецъ	—	III	10	—	—	—	—	—	
Гусь	—	III	17	—	—	—	—	—	
Трясогузка рѣчная .	—	III	20	—	—	—	—	—	
Малиновка	—	III	21	—	—	—	—	—	
Пустельга	—	III	23—24	—	—	—	—	—	
Коршунъ	—	III	23—24	—	—	—	—	—	
Дроздъ	—	III	25	—	—	—	—	—	
Соловей	—	III	28	—	—	—	—	—	Первая пѣсня.
Пѣночка	—	IV	8	—	—	—	—	—	
Ласточка-касатка . .	—	IV	10	—	—	—	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчено?	Мѣсяцъ.	Число.			
Славка-говорушка .	—	IV	15	—	—	—	—	—	
Сорокопутъ-жуланъ .	—	IV	15	—	—	—	—	—	
Иволга	—	V	1	—	—	—	—	—	Первый крикъ.
Мухоловка - лоцманчикъ	—	V	1	—	—	—	—	—	
Стрижъ	—	V	12	—	—	—	—	—	
Кукушка	—	V	13	—	—	—	—	—	Куkованіе.

Въ апрѣлѣ теплая погода простояла до 20-го числа. — 22—24. IV температура понизилась до—8° R.; выпалъ снѣгъ толщиною въ четверть.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Николай Александровичъ Покровскій. Нижній Новгородъ, Ошарская, 35.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: окрестности г. Нижняго Новгорода и селъ „Городецъ“ и „Бриляково“, Балахнинскаго уѣзда, Нижегородской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Larus ridibundus Linn. .	III	20	—	—	—	—	—	По сообщенію, 17. III въ окрестностяхъ Нижняго Новгорода наблюдались 2 особи.
	Scolopax rusticola Linn. .	III	30	—	—	—	—	—	Окрестности Нижняго Новгорода.
	„ gallinago Briss. .	V	8	—	—	—	—	—	Въ окрестностяхъ „Городца“ токъ.
	Tringa minuta Leisl. . .	V	9	—	—	—	—	—	Окрестности Нижняго Новгорода.
	Limosa melanura Leisl. .	IV	12	—	—	—	—	—	Окрестности „Городца“.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Totanus pugnax Briss. .	IV	28	стайка особей въ 10	—	—	—	—	Въ окрестностяхъ „Городца“ наблюдались стайки: 8.V—въ 15-ть и 9.V — въ 40 особей.
	Haematopus ostralegus Briss.	IV	16	—	—	—	—	—	Окрестности „Брилякова“.
	Vanellus cristatus Meyer.	III	17	—	—	—	—	—	Окрестности Нижняго Новгорода.
	Crex pratensis Bechst. .	V	8	—	—	—	—	—	Крикъ. Окрестности „Городца“.
	Porzana maruetta Leach.	IV	28	—	—	—	—	—	По крику. Окрестности „Городца“.
	Anas crecca Linn. . . .	III	31	—	—	—	—	—	Окрестности Нижняго Новгорода.
	Botaurus stellaris Linn. .	V	8	—	—	—	—	—	Окрестности „Городца“.
	Syrnium aluco Linn. . .	III	3	—	—	—	—	—	3-го и 16-го III наблюдалась въ садахъ Нижняго Новгорода.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ днях) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Cypselus apus Linn. . .	IV	29	—	—	—	—	—	Окрестности Нижняго Новгорода.
	Alauda arvensis Linn. . .	III	6	стайка въ 3 особи	—	—	—	—	12. III наблюдалась стайка особей въ 12.
	Corvus frugilegus Linn. .	III	28	5	—	—	—	—	Наблюдались и 27.III (по сообщенію).
	Sturnus vulgaris Linn. .	III	20	нѣсколько стаекъ	—	—	—	—	Окрестности Нижняго Новгорода.
	Plectrophanes nivalis Linn.	III	17	1 ♂	—	—	—	—	»
	Emberiza schoeniclus Linn.	III	25	1	—	—	—	—	»
	„ hortulana Briss.	V	14	—	—	—	—	—	»
	„ aureola Pall. . .	V	25	много	—	—	—	—	»
	Acanthis cannabina Linn.	III	20	—	—	—	—	—	»
	Fringilla coelebs Linn. .	III	18	1	III	20	—	—	»
	Carduelis elegans Steph.	III	10	стайка особей въ 12-ть	—	—	—	—	»
	Chloris chloris Briss. . .	III	23	—	—	—	—	—	»
	Muscicapa atricapilla Linn.	IV	30	много	—	—	—	—	»

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (переловыя) особи?			Когда наблюдались массами (наловой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Anthus cervinus Pall. . .	IV	16	нѣсколько	—	—	—	—	16. IV и 8. V было замѣчено нѣсколько экземпляровъ въ окрестностяхъ „Брилякова"; 9. V наблюдался самецъ у „Городца", а 14. V—самка въ окрестностяхъ Нижняго Новгорода.
	Motacilla alba Linn. . .	III	20	—	—	—	—	—	Окрестности Нижняго Новгорода.
	Locustella locustella Lath.	V	12	—	—	—	—	—	„
	Erithacus philomela Bechst.	IV	28	—	—	—	—	—	Окрестности „Городца".
	„ suecicus Linn. .	V	28	—	—	—	—	—	„
	„ wolfii Brehm. .	V	9	—	—	—	—	—	Окрестности Нижняго Новгорода.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Василій Ивановичъ Малинѣвскій.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: село „Сормово“, Больше-Козинской волости, Балахнинскаго уѣзда, Нижегородской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	—	III	3	много	—	—	—	—	На гнѣздахъ.
Жаворонокъ	—	III	12	нѣсколько	—	—	—	—	
Пигалица	—	III	12	1	—	—	—	—	
Зябликъ	—	III	13	1	—	—	—	—	
Коноплянка	—	III	13	1	—	—	—	—	
Трясогузка бѣлая .	—	III	19	1	—	—	—	—	
Овсянка болотная .	—	III	21	—	—	—	—	—	
Скворецъ	—	III	24	нѣсколько	—	—	—	—	
Пѣночка-теньковка .	—	IV	5	1	—	—	—	—	
„ обыкновенная	—	IV	11	—	—	—	—	—	
Варакушка	—	IV	11	—	—	—	—	—	
Стрижъ	—	V	5	много	—	—	—	—	
Ласточка деревенская.	—	V	6	—	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Павелъ Савельевичъ Колгановъ (егерь). Почт. отд. „Обираловка“, Московской губерніи, им. „Саввино“.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: имѣніе „Саввино“ и его ближайшія окрестности; Богородскій уѣздъ, Московской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	—	III	5	2	III	11	—	—	
Зябликъ	—	III	7	4	III	13	—	—	
Жаворонокъ	Alauda arvensis L. . . .	III	6	2	III	10	—	—	
Скворецъ	—	III	10	2	III	17	—	—	
Юла	Lullula arborea (L.) . .	III	11	3	III	16	—	—	
Чибисъ	—	III	11	2	III	29	—	—	
Трясогузка бѣлая .	—	III	20	1	III	29	—	—	
Дроздъ-деряба . . .	—	III	20	1	III	27	—	—	
„ рябинникъ .	—	III	23	2	III	29	—	—	
Зорянка	—	III	24	1	III	28	—	—	
Крапивникъ	—	III	30	2	IV	19	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Соловей	—	IV	2	1	IV	25	—	—	
Рѣполовъ	—	IV	4	1	IV	16	—	—	
Конекъ лѣсной . .	—	IV	5	2	IV	12	—	—	
Славка сѣрая . . .	—	IV	9	2	IV	19	—	—	
Пѣночка-весничка .	—	IV	16	1	IV	21	—	—	
Мухоловка	Muscicapa atricapilla L. .	IV	16	1	IV	21	—	—	
Трясогузка желтая .	Budytes flava (L.) . . .	IV	21	4	IV	24	—	—	
Конекъ луговой . .	—	IV	21	3	IV	28	—	—	
Иволга	—	IV	27	1	V	5	—	—	
Вертишейка	—	V	5	1	V	16	—	—	
Стрижъ	—	—	—	—	V	5	—	—	
Ласточка деревенская.	—	—	—	—	V	14	—	—	
„ городская .	—	—	—	—	V	16	—	—	
Коростель	—	V	15	1	V	27	—	—	По крику.
Курочка водяная . .	Gallinula chloropus L. .	V	17	—	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Николай Дмитріевичъ Митрофановъ. С. Редикоръ, Чердынскій уѣздъ, Пермской губерніи.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: Москва, Сокольники.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (пер. довыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	Corvus frugilegus Linn. .	—	—	—	III	4	—	—	
Пищуха	Certhia familiaris Linn. .	III	18	стайка особей въ 30	—	—	—	на СВ	
Сорокопутъ-жуланъ .	Lanius collurio Linn. . .	III	19	1 ♂	—	—	—	—	У прудика.
Дроздъ черный . .	Turdus merula Linn. . .	III	24	6	—	—	—	—	На опушкѣ.
Коршунъ	Milvus ater Gmel. . . .	—	—	—	III	27	—	—	Въ большомъ количествѣ у старыхъ своихъ гнѣздовій.
Трясогузка бѣлая .	Motacilla alba Linn. . .	—	—	—	IV	1	—	—	Отдѣльными экземплярами и парами у прудиковъ.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Сергѣй Ивановичъ Огневъ. Москва. Имп. Университетъ, Зоологическій Музей.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: Тесовскій удѣльный лѣсъ; Можайскій уѣздъ, Московской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Muscicapa parva Bechst.	IV	8	—	—	—	—	—	Сильное пѣніе.
	Phylloscopus collybita Vieill.	IV	8	—	—	—	—	—	»
	Fringilla montifringilla L.	IV	11	2 (♂ и ♀)	—	—	—	—	
	Pandion haliaëtus Linn. .	IV	11	1	—	—	—	—	Летала надъ рѣкой Москвой и ловила рыбу.
	Caprimulgus europaeus L.	IV	12	1	—	—	—	—	Слабое пѣніе.
	Muscicapa atricapilla Linn.	IV	13	2	IV	16	—	—	Начали пѣть.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
	Aquila naevia Meyer. . .	IV	13	8	—	—	—	—	13. IV — интенсивный пролетъ.—14. IV видѣлъ пару, вѣроятно ♂ и ♀; сильно кричали.
	Anthus cervinus Pall. . .	IV	13	3	—	—	—	—	Слабый пролетъ.
	„ pratensis Linn. .	IV	13	около 10 особей	—	—	—	—	
	Cuculus canorus Linn. .	IV	14	1	—	—	—	—	Слабое кукованіе (утромъ и подъ вечеръ).
	Phylloscopus trochilus L.	IV	14—15	1	—	—	—	—	Пѣла.
	Jynx torquilla Linn. . . .	IV	15	—	—	—	—	—	Слышалъ крики.
	Ruticilla phoenicurus L.	IV	16	1	—	—	—	—	

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Николай Викторовичъ Шевалдышевъ.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: усадьба на краю г. Сергіевскаго Посада и находящійся въ 2-хъ верстахъ отъ усадьбы на ЮЮЗ лѣсъ съ окружающими его полемъ и подлѣскомъ; Дмитровскій уѣздъ Московской губерніи.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	Corvus frugilegus Linn. .	II	25	1	III	3—5	—	ССВ	
Жаворонокъ полевой.	Alauda arvensis Linn. .	III	17	мало	III	19	—	ССВ	
Дроздъ-рябинникъ .	Turdus pilaris Linn. . .	III	19	1	—	—	—	ССВ	
Гусь	—	III	—	—	III	20	—	СВ	
Зябликъ	Fringilla coelebs Linn. .	III	22	1	III	26	—	ССВ	2. IV замѣчена первая самка. Валовой пролетъ наблюдался по 5. IV.
Скворецъ	Sturnus vulgaris Linn. .	III	21	1 ♂	III	24—25	—	ССВ	
Трясогузка бѣлая .	Motacilla alba Linn. . .	III	29	1 ♂	IV	1—2	—	ССВ	
Пѣночка-теньковка .	Phylloscopus rufus Bechst.	IV	9	1	IV	11	—	—	

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Малиновка	Erithacus rubecula Linn. .	—	—	1 ♂	IV	1—8	—	—	
Конекъ лѣсной . . .	Anthus trivialis Linn. . .	—	—	1 ♂	IV	1—9	—	—	
Журавль	Grus cinerea Bechst. . .	IV	5	—	—	—	—	C	
Трясогузка желтая .	Motacilla flava Linn. . .	IV	12—13	1 ♂	IV	16	—	—	
Пѣночка-желтобровка	Phylloscopus sibilatrix Bechst.	IV	12—13	1 ♂	IV	16	—	—	
Мухоловка-пеструшка	Muscicapa atricapilla Linn.	IV	23	1—2	—	—	—	—	
Горихвостка	Ruticilla phoenicurus L.	IV	15	1 ♂	—	—	—	—	23. IV наблюдалась первая самка.
Ласточка деревенская.	Hirundo rustica Linn. . .	V	4	стайка	—	—	2	C	
„ городская .	Chelidon urbica Linn. .	V	4	стайка	—	—	2	C	
Славка садовая . .	Sylvia hortensis Bechst. .	V	4	1—2	—	—	—	—	

24. II вороны (Corvus cornix L.) начали ломать прутья для постройки гнѣзда. Температура днемъ + 2°, ночью + 1° R. — 26. II температура колеблется отъ + 0,5 до + 1.5° R.

Съ начала марта стоитъ теплая погода при господствующемъ западномъ вѣтрѣ, но пасмурная. Въ ночь на 12. III шелъ сильный дождь.—13. III господствуетъ сѣверный вѣтеръ; наступили заморозки; по утрамъ температура доходитъ до — 10° R.—16. III вѣтеръ перемѣнился на западный, заморозки незначительны.—18. III на солнцѣ температура послѣ полудня + 12° R. Образовался крѣпкій настъ.—19. III утромъ видѣлъ бабочку-крапивницу, долго сидѣвшую на солнцѣ на снѣгу.—18 и 19. III видѣлъ много большихъ тускло-темныхъ мухъ, сидѣвшихъ на солнечной сторонѣ дома (этихъ же мухъ я видѣлъ уже 10. III, но еще довольно сонныхъ). Появилось много небольшихъ проталинъ.—20. III температура днемъ болѣе + 16° R.—21. III въ это же время температура выше + 20° R.—25. III—большія проталины.—28. III—гроза и градъ; вечеромъ температура + 10° R.—29. III снѣгъ съ полей сошелъ совсѣмъ, но лежитъ еще по откосамъ овраговъ; немного его и въ лѣсу.—30. III идетъ мокрый снѣгъ; температура утромъ + + 1,5° R., въ полдень + 10° R.—31. III ночью выпалъ снѣгъ, оставшійся мѣстами до 8 часовъ утра.—Съ 28-го по 31-ое марта преобладалъ юго-западный вѣтеръ.

2. IV стоитъ жаркая, лѣтняя погода; вечеромъ температура свыше + 10° R.—5. IV снѣгъ встрѣчается лишь изрѣдка пятнами въ лѣсу, да держится еще на южныхъ откосахъ лѣсныхъ овраговъ. Въ саду распускается береза. Въ казенномъ лѣсу наблюдалъ парочку гаичекъ за устройствомъ гнѣзда.—9. IV погода стоитъ лѣтняя при довольно сильномъ восточномъ или юго-восточномъ вѣтрѣ. — 12. IV вѣтеръ измѣнился на юго-западный.—15. IV утромъ шелъ дождь. Деревья уже опушились молодой листвой. Вечеромъ летали майскіе жуки.—16. IV утромъ температура — 1° R., днемъ свыше + 10° R. и вечеромъ + 7° R.; сѣверо-западный вѣтеръ къ вечеру усиливается.—Съ 17-го апрѣля наступили холода съ заморозками по утрамъ и вечерамъ, продержавшіеся до конца мѣсяца; лишь дня два было тепло.—22. IV выпалъ снѣгъ глубиною болѣе вершка, который держался до вечера 23-го числа.

1. V опять выпалъ снѣгъ при температурѣ + 2° R., пролежавшій мѣстами до середины слѣдующаго дня.—3. V тепло.

Имя, отчество, фамилія и постоянный адресъ наблюдателя: Антонъ Михайловичъ Капусткинъ. Г. Вышній Волочекъ, Тверской губерніи.

Мѣстонахожденіе наблюдательной станціи: близъ станціи Вышній Волочекъ Николаевской желѣзной дороги.

Весна 1913 года.

НАЗВАНІЕ ВИДА ПТИЦЫ.		Когда наблюдались первыя (передовыя) особи?			Когда наблюдались массами (валовой пролетъ)?		Какова продолжительность (въ дняхъ) пролета?	Направленіе пролета.	Примѣчанія.
Русское.	Научное (латинское).	Мѣсяцъ.	Число.	Въ какомъ количествѣ замѣчены?	Мѣсяцъ.	Число.			
Грачъ	—	—	—	30	III	9	—	—	
Утка	—	III	9	10	—	—	1	С	
Скворецъ	—	III	11	1	—	—	—	—	
Жаворонокъ	—	III	—	—	III	14	—	—	

Обзоръ иностранной литературы по орнитологіи.

С. А. Бутурлинъ.

Rewiew of the foreign ornithological Literature.

By *S. A. Buturlin.*

(Продолженіе.—Continued) [1]).

Henry E. Dresser: „Eggs of the Birds of Europe". [Генри Е. Дрессеръ: „Яйца птицъ Европы"].

Авторъ роскошной „Исторіи птицъ Европы" въ концѣ 1910 года закончилъ, наконецъ, начатый еще въ 1905 году большой трудъ о яйцахъ птицъ Европы. Работа эта, изданная авторомъ въ Лондонѣ (London, E. C., Cannon Street, 110), составляетъ два тома большого квартоваго формата съ XX + 838 страницъ текста и 106 цвѣтныхъ таблицъ съ массой фигуръ (нерѣдко до 48 фигуръ на одной таблицѣ). Цѣна всей работы безъ переплета, въ 24-хъ двойныхъ выпускахъ, 12 гиней—около ста двадцати рублей на наши деньги.

Цвѣтныя таблицы яицъ въ большинствѣ случаевъ превосходны. Особенностью ихъ является то, что яйца воспроизведены безъ посредничества художника, акварельные оригиналы котораго неизбѣжно субъективны и до извѣстной степени схематизированы. Дрессеровскія же таблицы являются точной копіей самихъ

---

[1]) См. „Орнитологическій Вѣстникъ" за 1912 г., кн. II, стр. 172—184.

объектовъ, такъ какъ получены онѣ извѣстнымъ процессомъ трехцвѣтнаго фотографированія. Дрессеръ путемъ опытовъ подбиралъ сначала наиболѣе выгодный оттѣнокъ фона, на которомъ яйца даннаго типа выходили бы наиболѣе ясно и естественно; окрашивалъ въ найденный тонъ воскъ и наливалъ его ровнымъ слоемъ въ мелкій открытый ящикъ надлежащаго формата, послѣ чего, выбравъ для каждаго даннаго вида нѣсколько наиболѣе типичныхъ, красивыхъ и разнообразныхъ по окраскѣ яицъ, слегка подогрѣвалъ ихъ на свѣчкѣ той стороной, на которой имѣется выпускное отверстіе, надпись и тому подобное,—и затѣмъ накладывалъ на воскъ, налѣпляя такимъ образомъ нужное количество рядовъ. Такая восковая „страница“ съ настоящими яйцами фотографировалась три раза черезъ три соотвѣтствующіе свѣтофильтра въ натуральную величину и съ каждой фотографіи приготовлялось клише для одной изъ трехъ основныхъ красокъ: желтой, красной и синей. Подбирая тщательно соотвѣтствующіе каждому типу окраски оттѣнки этихъ основныхъ цвѣтовъ и внимательно слѣдя за полнымъ совпаденіемъ всѣхъ трехъ клише при послѣдовательномъ наложеніи ихъ, Дрессеру удалось добиться превосходныхъ по естественности окраски результатовъ. Полная же рельефность изображеній и натуральность свѣто-тѣни (пластичность) получилась, какъ прямой результатъ фотографированія самыхъ объектовъ, а не рисованыхъ копій. Такимъ образомъ, напримѣръ, фигура 15-ая дополнительной таблицы A изображаетъ не *вообще* яйцо малаго кроншнепа (Numenius tenuirostris), но именно *то самое* яйцо этой птицы, которое найдено было въ Тобольской губерніи близъ города Тары 2-го іюня 1909 года (нов. стиля) В. Е. Ушаковымъ [1]).

Къ каждой таблицѣ приложено объясненіе, въ которомъ для каждой фигуры дается видовое названіе птицы, мѣсто и время добычи изображеннаго яйца и имя коллектора.

Хотя работа и названа „Яйца птицъ Европы“, но на самомъ дѣлѣ она даетъ больше, такъ какъ обнимаетъ всѣхъ птицъ западной части Палеарктики, т.-е. Европы, Сѣверной Африки и Юго-Западной Азіи, включая Персію и частью нашъ Закаспійскій край. Изображаются въ ней яйца и тѣхъ птицъ, которыя для этого района вносятся въ списки лишь въ качествѣ случайно

[1]) Яйцо это было послано В. Е. Ушаковымъ Дрессеру. *Авт.*

залетныхъ. Такъ какъ значительный процентъ такихъ залетныхъ гостей—птицы Сибири иногда даже крайняго востока ея, [въ родѣ розовой чайки (Rhodostethia rosea), рыжаго дрозда (Turdus naumanni), кулика-дутыша (Tringa maculata) и мн. др.]—то это, съ точки зрѣнія русскаго читателя, только увеличиваетъ интересъ работы. Такимъ образомъ всего перечисляетъ Дрессеръ свыше семисотъ пятидесяти *видовъ* птицъ (подвиды, какъ извѣстно, Дрессеръ признаетъ крайне неохотно).

Во время печатанія работы Дрессеръ тщательно слѣдилъ за новыми открытіями, такъ что могъ помѣстить хорошія серіи яицъ краснозобика (Tringa subarquata), исландскаго песочника (T. canutus) и песчанки (Calidris leucophaea) сбора Русской Полярной Экспедиціи и даже недавно найденныя О. Бамбергомъ въ Сѣверной Монголіи яйца краснозобаго дрозда (Turdus ruficollis).

Текстъ книги составленъ по такому плану. Сначала дается англійское и научное имя, затѣмъ—ссылка на описаніе и изображеніе самой птицы, обыкновенно въ „Исторіи Европейскихъ птицъ“ и въ „Руководствѣ по Палеарктическимъ птицамъ“ самого Дрессера; далѣе — довольно подробный перечень изображеній яицъ этого вида въ прежнихъ капитальныхъ изданіяхъ: Тинемана, Бедеккера, Хевитсона, Зибома и др.; затѣмъ—списокъ мѣстныхъ названій на разныхъ европейскихъ языкахъ, включая русскій. Далѣе излагается географическое распространеніе птицы, при чемъ особенно обстоятельно описывается область гнѣздованія, при томъ не только въ предѣлахъ западной части Палеарктики, но въ полномъ объемѣ распространенія даннаго вида. Общій обзоръ нравовъ и повадокъ птицы дается вкратцѣ, но на образъ жизни въ брачное время и на гнѣздованіе обращено надлежащее вниманіе. Наконецъ, описывается гнѣздо, послѣ чего приводятся описаніе яицъ, ихъ размѣры и вѣсъ. Въ весьма многихъ случаяхъ дается фотографія гнѣзда, обыкновенно съ яйцами, при чемъ указывается, гдѣ и кѣмъ снята фотографія.

Хотя, какъ уже замѣчено, Дрессеръ избѣгаетъ формальнаго признанія подвидовъ, однако въ статьяхъ, посвященныхъ видамъ, распадающимся на подвиды, фактъ этотъ обыкновенно признается авторомъ и подвиды поименовываются съ указаніемъ ихъ обитанія, а въ случаѣ надобности отмѣчаются и особенности ихъ яицъ.

Текстъ книги является не только сводкой уже существующей

литературы, но содержитъ и не мало новаго матеріала, сообщаемаго изъ разныхъ мѣстъ многочисленными корреспондентами автора. Въ частности, составляя для этой работы Дрессера обзоры распространенія птицъ въ предѣлахъ Россійской Имперіи и вообще въ сѣверной половинѣ Азіи, я включалъ туда еще не опубликованные результаты своихъ поѣздокъ въ Якутскую область и Томскую губернію и своихъ изслѣдованій матеріала сибирскихъ музеевъ, а также и данныя моихъ корреспондентовъ, почему въ отношеніи границъ распространенія птицъ Россіи, въ особенности Сибири, въ книгѣ Дрессера есть много свѣдѣній, которыхъ нельзя найти въ другихъ работахъ.

Главный же интересъ книги, конечно, все-таки въ превосходныхъ, натуральныхъ и фотографически точныхъ цвѣтныхъ изображеніяхъ большого количества яицъ, тщательно опредѣленныхъ и съ полными данными о ихъ происхожденіи. Общаго числа фигуръ яицъ я не подсчитывалъ, но ихъ должно быть около двухъ тысячъ. За спеціальную работу такого большого объема, такъ прекрасно изданную и иллюстрированную, назначенная цѣна не можетъ считаться очень высокой.

(Продолженіе слѣдуетъ.—To be continued.)

Библіографія.—Bibliographie.

Vogelschutzkalender 1914. Herausgegeben vom Bund für Vogelschutz, Abtheilung Berlin.

„Календарь", посвященный защитѣ птицъ—новость въ литературѣ, что отмѣчаютъ прежде всего издатели въ своемъ предисловіи. Но надо сознаться, что при словѣ „календарь" натуралистъ невольно готовъ предъявить къ изданію нѣсколько иныя требованія, чѣмъ тѣ, которыя они осуществляютъ. Ожидаешь, что издатели воспользуются календарной формой для того, чтобы болѣе или менѣе широко затронуть вопросы о періодическихъ явленіяхъ въ жизни птицъ, о срокахъ охоты и т. п. Ничего подобнаго мы въ этомъ изданіи не находимъ. Сопровожденіемъ къ календарю въ истинномъ смыслѣ этого слова являются стишки, приложенные къ каждому листку „мѣсяцеслова",—стишки наивно сентиментальные и не всегда даже имѣющіе прямое отношеніе къ данному мѣсяцу. Остальная часть книжки есть сборникъ статей, касающихся вопроса о защитѣ птицъ. Нѣкоторыя изъ нихъ носятъ характеръ проповѣди этого дѣла, нѣкоторыя посвящены болѣе спеціальнымъ вопросамъ изъ той же области или носятъ справочный характеръ, а нѣкоторыя представляютъ собою нѣчто въ родѣ разсказовъ для дѣтей.

Изъ болѣе серьезныхъ статей справочнаго характера наибольшаго вниманія заслуживаетъ статья д-ра Клозе (Берлинъ) подъ заглавіемъ „Правовое положеніе птичьяго міра въ Пруссіи" («Ueber die rechtliche Stellung der Vogelwelt in Preussen»). Здѣсь имѣются интересныя справки относительно германскаго законодательства по вопросу объ охранѣ птицъ. Для всѣхъ германскихъ государствъ дѣйствуетъ охраняющій птицъ законъ 30 мая 1908 года (das Reichsvogelschutzgesetz vom 30 Mai 1908). Въ

отличіе отъ нашего законодательства, въ Германіи законъ охотничій и законъ объ охранѣ птицъ суть разные законы, въ разное время изданные, при чемъ охотничьи законы носятъ *мѣстный* характеръ (по отдѣльнымъ государствамъ, входящимъ въ составъ Имперіи), а защитный законъ для птицъ является общеимперскимъ. Въ Пруссіи охота регулируется охотничьимъ закономъ 15 іюля 1907 года (Tagdordnung, vom 15 Juli 1907). Наличность двухъ отдѣльныхъ законодательствъ создаетъ нѣкоторую сложность, но служитъ яснымъ показателемъ того, что наши сосѣди относятся внимательнѣе къ вопросамъ охраны птицъ, чѣмъ мы.

Между прочимъ, надо отмѣтить, что и признаваемыя „вредными“ птицы пользуются нѣкоторой долей покровительства: во-первыхъ, и ихъ запрещено ловить петлями, а, во-вторыхъ, ловля ихъ, а также уничтоженіе яицъ и птенцовъ дозволены только владѣльцамъ или арендаторамъ даннаго участка, а не всякому желающему. Такимъ образомъ въ Германіи нѣтъ *ни одной* птицы, которую можно было истреблять всякому желающему и гдѣ угодно. Авторъ критикуетъ нѣкоторыя статьи существующихъ законоположеній и предлагаетъ поправки, но входить въ изложеніе этого вопроса, а также отличій германскихъ законовъ отъ нашихъ значило бы выйти за предѣлы рецензіи.

Одна изъ статей „Календаря“ посвящена описанію третьяго нѣмецкаго съѣзда по вопросамъ охраны птицъ, происходившаго въ Гамбургѣ. Предыдущіе съѣзды происходили въ Берлинѣ и Штуттгартѣ. Уже сама наличность такихъ съѣздовъ показываетъ, насколько широко поставлено дѣло охраны птицъ въ Германіи.

Двѣ статьи посвящены вопросу о спеціальной защитѣ тѣхъ птицъ, которыя особенно цѣнимы въ качествѣ дамскихъ украшеній, а потому подвергаются особому преслѣдованію—райскихъ птицъ и бѣлыхъ цапель. Нѣмецкіе авторы проповѣдуютъ запретительные законы противъ торговли птичьими перьями, указывая на то, что подобные законы уже существуютъ въ Англіи, Австраліи и Соединенныхъ Штатахъ, при чемъ Англія приняла мѣры противъ вывоза перьевъ изъ колоній, а Австралія и Соединенные Штаты—противъ ввоза.

Статья извѣстнаго популяризатора Вильгельма Бёльше подъ заглавіемъ „Мысли о райскихъ птицахъ“ представляетъ собою талантливо написанный очеркъ общаго характера, въ которомъ авторъ весьма ярко оттѣняетъ то значеніе, которое имѣютъ произведенія природы, столь замѣчательныя, какъ райскія птицы. Желая

убѣдить невоспріимчивую къ пониманію природы публику, что исчезновеніе райскихъ птицъ съ лица земли будетъ большой бѣдой, Бѣльше уподобляетъ это тому, какъ если бы исчезла съ лица земли Сикстинская мадонна и штукъ двѣсти другихъ выдающихся произведеній искусства. Я бы прибавилъ еще къ этому, что копіи и фотографіи возмѣщаютъ въ бо̀льшей степени исчезновеніе произведеній искусства, чѣмъ музейскіе препараты и чучела исчезновеніе *живыхъ* существъ. Въ томъ, что безвозвратно перестала существовать не внѣшняя форма, а своеобразное сочетаніе живыхъ силъ, и притомъ сочетаніе не индивидуальное, а видовое, есть нѣчто глубоко трагическое, и грустно, что многіе не сознаютъ этого трагизма...

Одна изъ статей „Календаря“ имѣетъ цѣлью популяризацію среди дѣтей вопроса о кольцеваніи птицъ. Разумѣется, авторъ предостерегаетъ юныхъ читателей, что не слѣдуетъ убивать птицу для того, чтобы добыть съ нея кольцо, а надо довольствоваться тѣми случаями, когда найдешь мертвую птицу съ кольцомъ. Конечно, наивно думать, чтобы такія крайне рѣдкія находки могли имѣть серьезное практическое значеніе, но, съ другой стороны, нельзя же, проповѣдуя охрану птицъ, рекомендовать ловить и стрѣлять ихъ ради добычи колецъ...

Нѣкоторыя статьи „Календаря“ имѣютъ характеръ наивныхъ разсказовъ для дѣтей, наиболѣе крупныя изъ которыхъ подъ заглавіемъ: „Помогите намъ противъ злыхъ дѣтей!“ изображаетъ засѣданіе птицъ съ рѣчами и протоколомъ. Наличность подобныхъ статей и многочисленныхъ стихотвореній, а также отсутствіе чисто зоологическихъ данныхъ о періодическихъ явленіяхъ и вообще весь характеръ статей показываютъ, что составители и издатели имѣли прежде всего въ виду возможно широкое распространеніе книжки и что они сознаютъ, что болѣе или менѣе научная зоологія способна отпугнуть отъ книжки большую публику. Проповѣдь охраны птицъ и распространеніе этой проповѣди наиболѣе удобными пріемами—вотъ девизъ книжки, который вполнѣ послѣдовательно осуществленъ. Вѣроятно, изданіе будетъ имѣть въ Германіи успѣхъ. Для русскихъ читателей, интересующихся вопросомъ объ охранѣ птицъ, книжка дастъ не мало справочнаго матеріала.

Г. А. Кожевниковъ.

†

Е. А. Бихнеръ.

Eugène Büchner. Nachruf, von G. J. Poljakow.

18-го марта прошлаго (1913) года, на 52-мъ году жизни скончался Евгеній Александровичъ Бихнеръ, горячо привѣтствовавшій въ свое время появленіе въ свѣтъ нашего журнала—перваго періодическаго изданія въ Россіи, посвященнаго спеціально орнитологіи—и затѣмъ въ теченіе трехъ лѣтъ всячески способствовавшій его распространенію.

Покойный извѣстенъ главнымъ образомъ своими печатными трудами по обработкѣ млекопитающихъ (грызуновъ и частью хищныхъ), собранныхъ Н. М. Пржевальскимъ въ Центральной Азіи, но въ началѣ своей научной дѣятельности онъ не былъ чуждъ и орнитологіи: собралъ и обработалъ птицъ С.-Петербургской губерніи [1]) и въ 1891 году участвовалъ въ качествѣ делегата Императорской Академіи Наукъ на 2-омъ Международномъ Орнитологическомъ Конгрессѣ, о трудахъ котораго имъ былъ представленъ затѣмъ весьма обстоятельный отчетъ [2]).

Въ послѣдніе годы Е. А. составлялъ „Россійскую Зоологическую библіографію“ (Bibliographia Zoologica Rossica) и еще наканунѣ смерти подготовлялъ къ печати очередной томъ этой большой работы.

Г. И. Поляковъ.



[1]) „Птицы С.-Петербургской губерніи. Матеріалы, литература и критика“. Т. XIV Трудовъ СПБ. Общества Естествоиспытателей, 1884 г.—Работа эта въ свое время была удостоена преміи.

[2]) „Отчетъ о Второмъ Международномъ Орнитологическомъ Конгрессѣ въ Будапештѣ“, 1892 г.

Хроника.—Chronik.

Международное совѣщаніе о всемірной охранѣ природы.—Съ 4 по 6 ноября включительно прошлаго (1913) года въ Бернѣ происходили засѣданія международнаго совѣщанія по вопросамъ охраны природы. Починъ этому дѣлу былъ положенъ въ 1910 году на международномъ зоологическомъ конгрессѣ въ Грацѣ (Австрія) швейцарскимъ зоологомъ Павломъ Саразиномъ, извѣстнымъ путешественникомъ по Цейлону и авторомъ ряда спеціальныхъ изслѣдованій по зоологіи и антропологіи. На конгрессѣ Саразинъ сдѣлалъ обширный докладъ „О всемірной охранѣ природы", въ которомъ указалъ, что, въ виду все болѣе и болѣе угрожающей опасности опустошенія природы хищническимъ отношеніемъ къ ней человѣка, необходимо подумать о международныхъ мѣрахъ къ охранѣ нѣкоторыхъ видовъ и о вмѣшательствѣ въ такіе промыслы, какъ, напримѣръ, китобойный, добыча перьевъ рѣдкихъ птицъ для украшеній и т. п. Докладъ Саразина [1]) былъ принятъ конгрессомъ въ общемъ вполнѣ сочувственно и тогда же, во время самаго конгресса, былъ составленъ предварительный комитетъ изъ 14 человѣкъ (по одному отъ каждаго государства) подъ предсѣдательствомъ П. Саразина. Этотъ комитетъ имѣлъ совѣщаніе во время самаго конгресса, а затѣмъ было поручено предсѣдателю вести черезъ посредство швейцарскаго министерства иностранныхъ дѣлъ переписку съ правительствами всѣхъ государствъ для организаціи международнаго совѣщанія.

Международныя сношенія потребовали много времени и, наконецъ, лишь черезъ три года послѣ конгресса въ Грацѣ было назначено совѣщаніе въ Бернѣ.

---

[1]) Paul Sarasin, Ueber Weltnaturschutz. Verhandlungen des VIII Internationalen Zoologen-Kongresses zu Graz 15—20 August 1910. Jena, 1912.

Восемнадцать государствъ прислали на это совѣщаніе своихъ представителей: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Великобританія, Венгрія, Германія, Голландія, Данія, Испанія, Италія, Норвегія, Португалія, Россія, Соединенные Штаты Америки, Франція, Швейцарія и Швеція. Далеко не всѣ государства прислали въ качествѣ своихъ делегатовъ представителей ученаго міра, нѣкоторыя поручили свое представительство дипломатамъ. Изъ ученыхъ были: Конвентцъ, ботаникъ, завѣдующій прусскимъ правительственнымъ учрежденіемъ по охранѣ памятниковъ природы; Жильсонъ, директоръ королевскаго естественно-историческаго музея въ Брюсселѣ; Массаръ, профессоръ ботаники изъ Брюсселя; Юнгерсенъ, профессоръ зоологіи изъ Стокгольма, Перрье, директоръ Музея Естественной Исторіи въ Парижѣ; Бувье, профессоръ того же музея; Вилль, профессоръ ботаники изъ Христіаніи; зоологъ Удемансъ изъ Голландіи; Бородинъ, ботаникъ-академикъ изъ Петербурга; Кожевниковъ, профессоръ зоологіи изъ Москвы; Ленберсъ, профессоръ изъ Стокгольма; зоологъ Саразинъ изъ Базеля и профессоръ зоологіи Штудеръ изъ Берна. Засѣданія происходили подъ предсѣдательствомъ Л. Форрера, члена союзнаго совѣта Швейцарской республики, въ роскошномъ зданіи союзнаго совѣта. Техническая сторона засѣданій была обставлена блестяще. Во время самаго хода совѣщанія, которое длилось всего три дня, появилось въ печати много матеріаловъ по совѣщанію, а иногда среди дня уже было отпечатано то, что говорилось утромъ. Совѣщаніе носило освѣдомительный и организаціонный характеръ. Въ началѣ П. Саразинъ прочиталъ весьма обширный докладъ, уже отпечатанный къ началу совѣщанія, подъ заглавіемъ: „О задачахъ всемірной охраны природы“. Въ этомъ докладѣ [1]) онъ нарисовалъ весьма яркую картину истребленія нѣкоторыхъ животныхъ человѣкомъ, при чемъ особенно подчеркивалъ ту мысль, что преслѣдованіе животныхъ человѣкомъ становится для нихъ особенно гибельнымъ въ томъ случаѣ, если въ дѣло замѣшанъ капиталъ. Такъ, классическій примѣръ истребленія нѣсколькихъ милліоновъ бизоновъ въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія (въ томъ числѣ трехъ милліоновъ въ теченіе одного 1876 года!) явился результатомъ дѣятельности акціонерной компаніи для добычи кожи; истребленіе китовъ есть дѣло акціонерныхъ предпріятій, равно какъ и введеніе въ моду эгретокъ, перьевъ рай-

[1]) Paul Sarasin, Ueber die Aufgaben des Weltnaturschutzes. Basel, 1913.

ской птицы и т. п. есть тоже дѣло крупныхъ промышленниковъ. Саразинъ привелъ весьма богатый подборъ фактовъ истребленія звѣрей и птицъ. Что касается спеціально птицъ, то онъ довольно подробно остановился на истребленіи ихъ въ цѣляхъ украшенія дамскихъ прическъ и шляпъ. Насколько велико количество добываемыхъ для этихъ цѣлей птицъ, можно судить по тому, что лишь изъ одной голландской части Новой Гвинеи было вывезено въ 1910 году птичьихъ шкурокъ на сумму около 634 тысячъ франковъ.

Проповѣдь среди женщинъ о томъ, чтобы онѣ добровольно отказались отъ жестокой моды, не достигаетъ желательныхъ результатовъ, и вотъ за послѣдніе годы состоялись въ нѣкоторыхъ странахъ законодательныя постановленія, имѣющія цѣлью охрану экзотическихъ птицъ. Починъ въ этомъ отношеніи сдѣлала Великобританія, запретивши ввозъ шкурокъ экзотическихъ птицъ въ Англію и вывозъ ихъ изъ Индіи. Затѣмъ вышло законодательное запрещеніе вывоза птичьихъ шкурокъ и перьевъ изъ Австраліи, а также ввоза ихъ въ страну. Въ англійской части Новой Гвинеи съ мая 1911 года находятся подъ спеціальной защитой райскія птицы, вѣнценосные голуби (Goura coronata Flem.) и нѣкоторые другіе виды птицъ. Въ этомъ году къ этимъ мѣропріятіямъ присоединилась и нѣмецкая часть Новой Гвинеи, и лишь голландская ея часть осталась не примкнувшей къ этому движенію въ пользу райской птицы. Въ прошломъ (1913) году Соединенные Штаты Америки издали законъ, по которому запрещенъ ввозъ въ страну всякаго рода перьевъ, кромѣ перьевъ домашней птицы. Всѣ эти мѣропріятія показываютъ, насколько серьезно смотрятъ на необходимость защиты птицъ въ нѣкоторыхъ странахъ.

Къ сожалѣнію, законодатель модъ, Парижъ, не предпринимаетъ ничего серьезнаго въ этомъ отношеніи. На Бернскомъ совѣщаніи выяснилось между прочимъ, что въ Парижѣ вопросъ о борьбѣ съ модой на птичьи перья ставится очень остро. Съ одной стороны, несомнѣнно, что эта мода, двинутая въ свѣтъ стараніями промышленниковъ, сильно подорвала исконный парижскій промыселъ изготовленія цвѣтовъ, оставивъ безъ работы, по словамъ академика Перрье, около 30.000 цвѣточницъ. Съ другой стороны, представители фирмъ, занимающихся торговлею перьями, составили цѣлую комиссію для защиты своихъ интересовъ (Commission Intersyndicale pour la défense des Industries de la Plume

pour Modes et Parures) и представили на Бернское международное совѣщаніе докладную записку, въ которой просили принять во вниманіе интересы промышленности, около которой кормятся на всемъ земномъ шарѣ нѣсколько сотъ тысячъ человѣкъ. Въ этой запискѣ между прочимъ проводится та мысль, что вовсе не въ интересахъ промышленности доводить рѣдкіе виды до истребленія и представители этой промышленности будутъ привѣтствовать охранительные законы, но протестуютъ противъ полнаго запрещенія торговли перьями.

Въ засѣданіяхъ совѣщанія послѣ доклада Саразина представители отдѣльныхъ государствъ сдѣлали краткія сообщенія относительно положенія объ охранѣ природы въ ихъ странахъ. Изъ этихъ сообщеній было видно, что въ настоящее время движеніе въ пользу этой охраны замѣтно разрастается и захватываетъ новыя страны. Наиболѣе прочно поставлено это дѣло въ Пруссіи, гдѣ стараніями Конвентца работаетъ цѣлое правительственное учрежденіе—„Amtliche Stelle für Naturdenkmalpflege“ (Berlin, Grunewaldstrasse), вѣдающее спеціально охрану „памятниковъ природы“ (выраженіе, пущенное въ ходъ Конвентцомъ). Въ Пруссіи по характеру страны нельзя устраивать крупныхъ „заповѣдниковъ“ и приходится хлопотать объ очень маленькихъ участкахъ, а часто объ отдѣльныхъ группахъ или даже экземплярахъ деревьевъ, объ отдѣльныхъ крупныхъ валунахъ и т. п. Дѣло опроса, собиранія свѣдѣній и ихъ регистраціи поставлено Конвентцомъ образцово и всякій попавшій въ его учрежденіе можетъ быстро и легко навести справку по любому вопросу, касающемуся охраны природы.

Швейцарія года три тому назадъ устроила заповѣдникъ въ 200 кв. килом. въ Энгадинской долинѣ стараніями „Швейцарскаго союза для охраны природы“, насчитывающаго въ своей средѣ 25.000 членовъ, вносящихъ ежегодно по одному франку. Этотъ заповѣдникъ, „Швейцарскій національный паркъ“, особенно интересенъ тѣмъ, что въ немъ проведенъ принципъ „полной неприкосновенности“, полнаго невмѣшательства человѣка въ жизнь природы.

Относительно Россіи академикъ И. П. Бородинъ представилъ краткія данныя о только что возникшемъ у насъ движеніи въ пользу охраны природы и о современномъ положеніи этого вопроса, а пишущій эти строки сообщилъ нѣкоторыя данныя относительно новаго законопроекта объ охотѣ, который въ редакціи думской комиссіи даетъ очень много для дѣла охраны природы.

Бернское совѣщаніе не было уполномочено входить къ правительствамъ съ какими-либо конкретными предложеніями. Послѣ обмѣна мыслями относительно возможности международныхъ мѣръ по охранѣ природы и относительно того, въ какомъ отношеніи должна быть національная охрана по отношенію къ международной (при чемъ преобладающее стремленіе было въ томъ направленіи, чтобы дѣло національной охраны не сталкивалось съ международнымъ вмѣшательствомъ), было приступлено къ организаціонной работѣ, къ выработкѣ положеній о „Совѣщательной Комиссіи для международной охраны природы" (Commission permanente pour la Protection internationale de la Nature). Было постановлено, что каждое государство или автономная колонія (Канада, Австралія) будетъ представлена двумя уполномоченными, но при желаніи свои два голоса на будущихъ съѣздахъ Комиссіи государство можетъ передавать одному делегату. Мѣстопребываніе Комиссіи въ Базелѣ, гдѣ живетъ Саразинъ, выбранный ея предсѣдателемъ. Задачи Комиссіи слѣдующія: собираніе и классификація всѣхъ данныхъ, касающихся международной охраны природы, и ихъ опубликованіе; пропаганда въ интересахъ международной охраны природы. Комиссія будетъ считаться открытой, когда всѣ государства, подписавшія актъ о ея учрежденіи (Acte de fondation), назначатъ своихъ уполномоченныхъ. Присутствующимъ уполномоченнымъ Бернскаго совѣщанія было предоставлено право называть кандидатовъ въ постоянные члены Комиссіи, при чемъ нѣкоторые назвали самихъ себя. Русскіе уполномоченные отъ этого воздержались, рѣшивши предоставить въ этомъ дѣлѣ починъ „Природоохранительной Комиссіи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества".

Г. А. Кожевниковъ.

Въ декабрѣ прошлаго (1913) года должна была состояться въ Льежѣ *третья международная выставка птицъ всѣхъ видовъ*, организуемая Льежскимъ орнитологическихъ обществомъ. Всѣ нужныя свѣдѣнія можно было получать отъ секретаря упомянутаго общества—M. Ch. De Neeff, 46 rue des Mineurs, Herstal.

Новыя изданія Департамента Земледѣлія.—Департаментомъ Земледѣлія выпущены въ свѣтъ брошюры: 1) спеціалиста по прикладной энтомологіи г. Уварова—„Борьба съ саранчевыми въ Ставропольской губерніи въ 1907—1912 г.г." (цѣна 10 коп.) и 2) спеціалиста по прикладной энтомологіи г. Васильева—„Бѣлый малярійный комаръ и новыя данныя о нахожденіи и зимовкѣ лѣсного малярійнаго комара въ Туркестанскомъ краѣ" (цѣна 10 к.).

Учебнымъ заведеніямъ, сельскохозяйственнымъ обществамъ и ссудо-сберегательнымъ и кредитнымъ товариществамъ, при коихъ имѣются сельскохозяйственныя библіотеки, а также прочимъ учрежденіямъ, могущимъ содѣйствовать ознакомленію населенія съ названными насѣкомыми и съ дѣломъ борьбы съ саранчевыми, съ просьбами о безплатной высылкѣ этихъ изданій надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія.

Доклады и сообщенія.—Rapports et communications.

Общество Изученія Смоленской губерніи.

13-го января 1913 г.

В. В. Станчинскій: „Фауна птицъ Смоленской губ. и ея вѣроятное происхожденіе".

* * *

Харьковское Общество Любителей Природы.

27-го апрѣля 1913 г.

Б. С. Вальхъ сдѣлалъ сообщеніе о птицахъ Екатеринославской губерніи.

* * *

Русскій Орнитологическій Комитетъ Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній.

28-го ноября 1913 г.

Проф. *Г. А. Кожевниковъ*: „Нѣкоторые вопросы охраны птицъ (изъ впечатлѣній заграничной командировки)".

Г. В. баронъ *Лоудонъ*: „Объ организаціи авифенологическихъ станцій въ европейской Россіи".

Г. И. Поляковъ: „О новыхъ условіяхъ на отдачу въ аренду подъ охоту казенныхъ дачъ".

Г. В. баронъ *Лоудонъ*: „Необходимость съѣзда орнитологовъ".

Экспедиціи, путешествія, экскурсіи, командировки и пр.

Expéditions, voyages, excursions, etc.

Экспедиція въ Сѣверную Монголію.—Экспедиція эта была предпринята княземъ Д. Э. Ухтомскимъ лѣтомъ минувшаго (1913) года на моторной лодкѣ съ цѣлью выясненія судоходности монгольскихъ рѣкъ. Изслѣдователь предполагалъ изъ Байкала пройти по рѣкѣ Селенгѣ и ея притокамъ и затѣмъ въ истоки Енисея для изслѣдованія Бей-кема и Хуа-кема. Попутно предполагалось производить изслѣдованія археологическія, этнографическія и отчасти естественно-историческія.

* * *

Экспедиція на Канинъ полуостровъ. — Въ началѣ августа 1913 года возвратился въ Москву С. Г. Григорьевъ, командированный Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ для изслѣдованія полуострова Канина. Экспедиція изъ г. Мезени поднялась на лодкѣ до устья рѣки Чижа, откуда на оленяхъ прошла среднюю часть Канина между Бѣлымъ моремъ и Чешской губой до Канинскаго камня, на который вышла восточнѣе истоковъ рѣки Рыбной, затѣмъ—вдоль этого хребта до мыса Тонкого (сѣверная оконечность полуострова). На обозначенномъ сейчасъ пути слѣдованія экспедиціей была сдѣлана маршрутная съемка и производились метеорологическія, геологическія и біологическія наблюденія и сборъ коллекцій животныхъ (главнымъ образомъ птицъ), растеній и горныхъ породъ.

* * *

Лѣтомъ 1913 года Г. Л. Граве былъ командированъ Обществомъ Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи въ Архангельскую губернію для сбора зоологическихъ коллекцій. Съ этой цѣлью экскурсантомъ были посѣщены съ 17-го іюня по 24-ое іюля: становища Рында и Пахта на Мурманскомъ берегу, окрестности города Колы, Рыбачій полуостровъ, Аіновы острова, губа Вайда, Печенгскій заливъ, Вардэ, рѣка Тулома, Нотозеро и Кандалакша. Свой краткій отчетъ Обществу Г. Л. Граве заканчиваетъ слѣдующимъ описаніемъ посѣщенныхъ имъ птичьяго базара и одного изъ Аіновыхъ острововъ: „На Рыбачьемъ полуостровѣ недалеко отъ мыса Цыпъ-Наволока по направленію къ мысу Сергѣеву на самомъ берегу, который падаетъ въ море почти отвѣсной скалой, устроилась колонія птицъ. Берегъ здѣсь настолько крутъ, что пристать къ нему во время волненія на карбасѣ почти невозможно. Мы подходили при тихой погодѣ и то съ нѣкоторыми затрудненіями нашли мѣсто, куда можно было бы вытащить шлюпку. Снявшіеся съ мѣстъ первыми при нашемъ приближеніи бакланы и чистики расположились на волнахъ моря далеко отъ берега; они нѣсколько разъ возвращались обратно, но сейчасъ же вновь улетали. Среди другихъ птицъ также началось волненіе и нѣкоторыя изъ нихъ съ крикомъ носилась надъ нашими головами. Всѣ выступы и карнизы были заняты гнѣздами. На камняхъ у самаго обрѣза моря валялось много птичьихъ труповъ, была масса помету, благодаря чему здѣсь почва была богато удобрена и вездѣ, гдѣ нашла себѣ мѣсто растительность, она развилась роскошно. Почти вся скала была занята гнѣздами Rissa tridactyla, затѣмъ по количеству слѣдуетъ Uria troile. Гнѣзда ихъ были расположены ближе къ вершинѣ. Баклановъ и чистиковъ было сравнительно мало. У моевокъ птенцы были съ отрастающими махами. По свѣдѣніямъ, которыя мнѣ удалось добыть въ Александровскѣ и у поморовъ, здѣсь чайки, кайры и вообще обитатели птичьихъ базаровъ не служатъ промысломъ".

„Мнѣ удалось побывать только на одномъ изъ двухъ Аіновыхъ острововъ. Острова другъ отъ друга находятся верстахъ въ 2-хъ. Оба одного и того же строенія. Берега ихъ низки, поверхность покрыта торфяникомъ и богатой травяной растительностью. На одномъ изъ нихъ, на меньшемъ, помѣщаются двѣ небольшія избушки. Птичье населеніе острова, на которомъ я былъ, насколько мнѣ удалось выяснить, состоитъ изъ Somateria mol-

lissima и Fratercula arctica. На небольшихъ озерахъ видѣлъ Colymbus septentrionalis, Fuligula glacialis и большое количество Phalaropus hyperboreus. Здѣсь добылъ одинъ экземпляръ Alca torda. Гага утятъ своихъ уже вывела въ морс, только въ двухъ гнѣздахъ я видѣлъ въ одномъ два, въ другомъ три утенка, только что вылупившихся. Въ нѣкоторыхъ гнѣздахъ Fratercula arctica были птенцы, въ другихъ сильно насиженныя яйца. Colymbus septentrionalis, Fuligula glacialis и Phalaropus hyperboreus плавали по озерамъ выводками. Кромѣ того, много мѣста на островѣ было занято гнѣздами чаекъ, преимущественно Sterna macrura и Larus canus. Другихъ чаекъ опредѣлить мнѣ не удалось. Гнѣзда чаекъ были расположены недалеко другъ отъ друга и всѣ были наполнены яйцами въ различной стадіи насиживанія. Изъ разговора съ отцомъ Іоанафаномъ, настоятелемъ Печенгскаго монастыря, я узналъ слѣдующее: въ 1913 году гагачьихъ гнѣздъ на островахъ было на учетѣ 2060, изъ нихъ выбрано $1^1/_2$ пуда пуха. Пухъ очищается монахами отъ сора и въ такомъ видѣ продается въ большей части другимъ сѣвернымъ монастырямъ по 10 р. за фунтъ. Пухъ выбирается изъ гнѣздъ обычно уже послѣ того, какъ выводки уходятъ въ море. Это бываетъ чаще около 23-го іюня, а въ прошедшемъ (1913) году было только 1-го іюля. Яйца никуда не продаются, но ими въ маломъ количествѣ пользуются только для себя монахи, живущіе на островахъ. Надъ островами установлена около шести лѣтъ тому назадъ охрана. Съ этой цѣлью тамъ живутъ три монаха. За послѣдніе годы количество гагачьихъ гнѣздъ увеличивается. Но это увеличеніе было бы замѣтнѣе, если бы охрана была дѣйствительнѣе. Монахи не въ силахъ воспрепятствовать поморамъ истреблять гагъ, а со стороны русскихъ законовъ и администраціи, какъ жалуется о. Іоанафанъ, помощи нѣтъ. Гагъ истребляютъ поморы, идущіе мимо острововъ въ океанъ на промыслы; истребляютъ ихъ и шведы (этимъ именемъ на Мурманѣ принято называть финновъ-колонистовъ), но эти послѣдніе, по выраженію настоятеля, совѣстливѣе“.

Птицъ Г. Л. Граве было собрано всего 52 экземпляра, именно:

Fratercula arctica L.	2	Rissa tridactyla L.	1
Uria troile L.	4	Larus canus L.	1
Alca torda L.	1	Sterna macrura Naum.	2
Stercorarius crepidatus J. Gm.	1	Tringa minuta Leisl.	1

Tringa temmincki Leisl. 2
Lagopus albus Gm. 2
Fuligula clangula L. 3
Anas crecca L. 1
„ penelope L. 1
Lithofalco aesalon Briss. 1
Picus tridactylus L. 1
Garrulus infaustus L. 2
Plectrophanes lapponicus L. 1
Tringa alpina L. 2
Strepsilas interpres L. 2
Totanus pugnax Briss. 1
Totanus glareola L. 2
Totanus glottis L. 1
Numenius phaeopus L. 1
Haematopus ostralegus Briss. . . . 1
Charadrius hiaticula L. 2
„ pluvialis L. 1
Emberiza schoeniclus L. 2
Pinicola enucleator L. 2
Fringilla montifringilla Briss. 2
Ampelis garrulus L. 2
Anthus pratensis Briss. 2
Motacilla alba L. 1
Poecile cincta Bodd. 1

Изданія, присланныя въ редакцію.

Éditions parvenus à la rédaction.

Извѣстія Кавказскаго Музея, 1905 г., т. II, вып. 1, 2—4.

Ibid., 1907 г., т. III, вып. 1 [*А. М. Кобылинъ:* „Интересныя орнитологическія находки на Кавказѣ“.—*С. А. Бутурлинъ:* „Замѣтки о группахъ бѣлоспинныхъ дятловъ и каменныхъ поползней“.—*С. А. Бутурлинъ:* „Кавказскій и Туркестанскій жуланы. Lanius (Enneoctonus) kobylini Buturl. et L. (E.) loudoni sp. n.“] и 2—3.

Ibid., 1908 г., т. IV, вып. 1—2 *(Р. Г. Шмидтъ:* „Весенняя экскурсія въ Сѣверо-Восточное Закавказье въ 1906 году“) и 4 *(А. М. Кобылинъ:* „Матеріалы для орнитофауны Кавказскаго края. Кутаисская губернія“).

Ibid., 1909 г., т. IV, вып. 3 и 4.

Ibid., 1910 г., т. V, вып. 1, 2—3 [*П. В. Нестеровъ:* „Матеріалы для орнитофауны Батумской области. (Юго-Западное Закавказье).—*К. А. Сатунинъ* „Къ орнитологіи Батумской области“] и 4.

Ibid., 1912 г., т. VI, вып. 1; т. VII, вып. 1 *(К. А. Сатунинъ:* „О зоогеографическихъ округахъ Кавказскаго края“).

Ibid., 1913 г., т. VII, вып. 2 [*В. Б. Баньковскій:* „Къ систематикѣ русскихъ представителей рода Scops Savigny“ (1809)].

А. А. Бируля: „Матеріалы по систематикѣ и географическому распространенію млекопитающихъ. IV. Таблица для опредѣленія родовъ сем. Viverridae по краніологическимъ признакамъ“ (Оттискъ изъ „Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ“, т. XVIII, 1913 г.).

Ежегодникъ Естественно-историческаго Музея Полтавскаго Губернскаго Земства, 1912 г., № 1 *(В. Г. Аверинъ:* „Отчетъ объ экскурсіи съ орнитологической цѣлью лѣтомъ 1912 г. въ Полтавской губерніи“.—*Н. Гавриленко* и *Н. Николаевъ:* „О нѣкоторыхъ рѣдкихъ птицахъ Полтавской губ.“).

Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, 1913 г., т. XLIV, выпускъ 1-ый. Протоколы засѣданій, №№ 1 и 2—3.

Ibid., 1912 г., т. XLII, выпускъ 2-ой, часть 2-ая, Отдѣленіе Зоологіи и Физіологіи.

Протоколы засѣданій Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Варшавскомъ Университетѣ, 1913 г., № 4.

Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ", 1913 г., т. XVIII, № 1 (*П. В. Нестеровъ* и *Я. И. Никандровъ:* „Прилетъ, пролетъ и гнѣздованіе птицъ въ окрестностяхъ г. Пскова". — *фонъ-Викъ:* „Маршрутъ экспедиціи Императорской Академіи Наукъ для сбора зоологическихъ коллекцій въ Ассамѣ").

Фауна Россіи и сопредѣльныхъ странъ, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, т. III, выпускъ 1. Насѣкомыя полужесткокрылыя (Insecta Hemiptera) В. Ѳ. Ошанина.

„Ornithologische Monatsberichte", 1913, №№ 1—12.

П. В. Нестеровъ: „Истребленіе чомги (Colymbus cristatus)".

П. В. Нестеровъ и *Я. И. Никандровъ:* „Прилетъ, пролетъ и гнѣздованіе птицъ въ окрестностяхъ города Пскова". Оттискъ изъ Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, 1913 г., т. XVIII.

„Ornithologisches Jahrbuch", 1913, Heft 3—4.

Ученыя записки Императорскаго Казанскаго Университета, 1913 г., книги 8, 9 и 10.

„Птицевѣдѣніе и Птицеводство", 1913 г., выпускъ 3-ій.

Fauna Mosquensis. Опытъ описанія фауны Московской губерніи. Т. I. Млекопитающія. *С. И. Огнева.* Часть первая. Chiroptera, Insectivora, Rodentia.

„Ornithologische Beobachter", 1913, Heft 7, 8, 9, 10, 11 und 12.

Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія, 1913 г., т. XXXII, выпускъ 1 (*З. О. Мостовенко:* „Фенологическія явленія въ Екатеринбургѣ въ 1891—1911 г.") и 2 [*Л. Круликовскій:* „Къ свѣдѣніямъ о птицахъ южныхъ уѣздовъ Вятской губерніи". — *Л. П. Соломирскій:* „Списокъ случайныхъ разновидностей (полнаго или частичнаго альбинизма, а также меланизма и разныхъ другихъ анормальностей) въ орнитологической коллекціи Екатеринбургскаго Музея"].

Протоколы Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ Университетѣ, 1913 г., XXI, 3 и 4.

Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Института, 1913 г., книги 2, 3 и 4.

Записки Императорскаго Харьковскаго Университета, 1913 г., книга 2 и 3.

Записки Приамурскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, 1912 г., т. VIII, выпуски 1-й и 2-ой.

Варшавскія Университетскія Извѣстія, 1913 г., VI и VII (*А. П. Райскій:* „Къ орнитологической фаунѣ Оренбургскаго края").

А. А. Бируля: „Зоологическіе результаты русскихъ экспедицій на Шпицбергенъ. Біологическія наблюденія надъ птицами Шпицбергена". Оттискъ изъ Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, 1910 г., т. XV.

А. А. Бируля: Матеріалы по систематикѣ и географическому распространенію млекопитающихъ. III. Carnivora, собранныя Н. А. Зарудnымъ въ Персіи въ 1896, 1898, 1900—1901 и 1903—1904 г.г.". Оттискъ изъ Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, 1912 г., т. XVII.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, 1912 г., №№ 5—6; 1913 г., № 1.

„Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift", 1913, Haefte IV.

А. А. Бируля: „Очерки изъ жизни птицъ полярнаго побережья Сибири". Научные результаты Русской Полярной Экспедиціи въ 1900—1903 г.г., подъ начальствомъ барона Э. В. Толя. Отдѣлъ Е. Зоологія. Т. I, вып. 2-ой; 1907 г.

Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, 1912 г., т. XVII, № 3—4 (*Б. М. Житковъ:* „Птицы полуострова Ямала".—*В. Л. Біанки:* „Одичалыя куры на сѣверѣ Европейской Россіи".—*В. Л. Біанки:* „Anser brachyrrhynchus Baillon, новый для русской фауны видъ".—*В. Л. Біанки:* „Второе дополненіе къ списку птицъ С.-Петербургской губ.").

Отчетъ Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера за 1912 годъ.

„Школьныя Экскурсіи и Школьный Музей", книжка 5-ая за 1913 годъ (*А. А. Браунеръ:* „Наблюденія надъ жизнью тиркуши").

Бюллетени Харьковскаго Общества Любителей Природы, № 2, № 3 (*И. С. Филиппишинъ:* „Общественная охрана полезныхъ птицъ"), № 4 [*Г. Смашинъ:* „Грачъ (Corvus frugilegus), зимующій въ Пензенской губерніи".—*Хроника* (мѣстный отдѣлъ): объ осеннемъ пролетѣ] за 1913 г.

„Природа", журналъ Николаевскаго Общества Любителей Природы, №№ 5, 6, 7 и 8 (*Л. Гармашевъ:* „Перелетъ птицъ"—*Б. Токаревъ:* „Кольцеваніе—какъ лучшій способъ наблюденія за птицами") за 1913 г.

Извѣстія Общества Изученія Олонецкой губерніи, №№ 1 (Результаты промысловой охоты въ 1912 году въ Олонецкой губерніи), 2—3, 4 и 5—6 за 1913 г.

Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей, выпуски 1 и 2—3 за 1913 г.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, № 6/7, 1913.

Б. М. Житковъ: „Полуостровъ Ямалъ". Отд. оттискъ изъ т. XLIX „Записокъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества", 1913 г.

Русская библіографія по естествознанію и математикѣ, составленная состоящимъ при Императорской Академіи Наукъ С.-Петербургскимъ Бюро международной библіографіи, т. IV (1905) и т. V (1906).

N. Sarudny und M. Härms: „Bemerkungen über einige Vögel Persiens". Sonderabdruck aus: Journal für Ornithologie, Oktoberheft 1913.

А. Ѳ. Котсъ: „Пути и цѣли эволюціоннаго ученія въ отраженіи біологическихъ музеевъ". Часть 1, 1913 г.

J. Thienemann: „Vogelwarte Rossitten". [Beringter Storch (Ciconia ciconia) am Horste]. Sonderabdruck aus: Reichenow's Ornithol. Monatsberichte, Septemberheft, 1913.

Prof. Dr. J. Thienemann: „XII. Jahresbericht (1912) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft". I Teil. (Journal für Ornithologie, LXI. Jahrg. 1913, Sonderheft 2).

Отчетъ Ярославскаго Естественно-историческаго Общества съ 1908 по 1913 г.

Записки Императорскаго Новороссійскаго Университета физико-математическаго факультета, выпускъ III, 1913 г.

„Любитель Природы" за 1913 г., № 7—8 [*А. Серебровскій:* „Фенологическія наблюденія въ окрестностяхъ дер. Кислинки (Торховской волости, Тульскаго уѣзда). Весна 1913 г.".—*Д. Детяревъ:* „Бываетъ ли у птицъ обморокъ?"—„Размѣры птицъ и климатъ"].

J. H. Gurney, F. Z. S.: „The gannet. A bird with a history". 1913.

А. М. Никольскій: „Пресмыкающіяся и земноводныя Кавказа". Изданіе Кавказскаго Музея, 1913 г.

Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, книжка XXXVI, вып. 2, 1913 г.

Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, LVI, 1913.

Вышелъ изъ печати 18 января ст. ст. 1914 г.—Ausgegeben am 18 Januar (a. St.) 1914.

Редакторъ-издатель: **Г. И. Поляковъ.** Herausgeber: **G. I. Poljakow.**

Тип. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Москва.

Открыта подписка на 1913 годъ на богато иллюстрированный журналъ охоты и рыболовства.

VI-й годъ. **„Семья Охотниковъ“** VI-й годъ.

Выходитъ два раза въ мѣсяцъ.

24 №№ 4 р. 50 к. Допускается подписка по четвертямъ года и по полугодіямъ (1 руб. 25 коп. и 2 р. 50 коп.).

Въ журналѣ принимаютъ участіе лучшія силы Охотничьей Литературы.

Программа журнала: Охота. Важнѣйшіе законы и распоряженія правительства, касающіеся охоты. — Изящная беллетристика. — Воспоминанія о былыхъ охотахъ.— Описаніе различныхъ способовъ охоты.—Спеціальныя статьи по ружейной техникѣ (новѣйшія изобрѣтенія въ области ружейной техники), орнитологіи, дичеразведенію, собаководству. — Обзоръ выстановъ, поленыхъ испытаній, садокъ. — Обзоръ охотничьихъ журналовъ.—Сообщенія изъ жизни охотничьихъ Обществъ и Кружковъ.— Охотничья хроника.—Корреспонденціи.—Отвѣты на вопросы читателей.

Рыболовство. Законы и распоряженія правительства, касающіеся рыболовства.— Беллетристика.—Наши прѣсноводныя рыбы: ихъ описаніе и способы ловли (съ рис.).— Спортивное уженье.—Сборка снастей: удилища, крючки, лески и т. д. (съ рис.).— Приманки и прикормки.—Полезные совѣты и указанія. — Новѣйшія изобрѣтенія въ области рыболовной техники.

Практическія статьи по сел.-хоз. и любительскому рыбоводству.— Искусственное разведеніе рыбы въ прудахъ.—Акклиматизація рыбъ, ихъ болѣзни и лѣченіе. — Новости по рыбоводству.—Корреспонденціи.

Ветеринарнымъ отдѣломъ завѣдуютъ: П. М. Пловайскій (Ветеринарный врачъ Моск. О-ва Охоты имени Императ. Александра II) и Я. А. Тоболкинъ (Ветеринарный врачъ Императорскаго О-ва правильной Охоты).

Отдѣломъ рыболовства завѣдуетъ П. Н. Комаровъ.

Подписчики журнала получатъ безплатную Премію „Лѣчебникъ собакъ“, составл. Ветерин. врач. Московск. О-ва Охоты имени Импер. Александра II—П. М. Иловайскимъ. Книга будетъ разсыл. при журн., начиная съ 3-го №, по 1 печатному листу въ 16 страницъ.

Лица, внесшія деньги частями, получатъ указанную премію при послѣднемъ взносѣ.

Подписка принимается въ редакціи: Москва, Сокольники, Камеръ-Коллежскій валъ, домъ 4, кв. 6 (временный адресъ), въ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина (Неглинный пр.) и Н. П. Карбасникова (Моховая), въ магазинѣ рыболовныхъ принадлежностей Т-го Дома „С. А. Малиновскій“ (Рождественка) и во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи.

Редакторъ-Издатель **Влад. Сатинскій.**

ЕЖЕГОДНИКЪ

по Геологіи и Минералогіи Россіи.

Программа: I. Оригинальныя статьи и замѣтки. II. Систематическіе указатели литературы. III. Систематическіе обзоры литературы. IV. Рефераты. V. Извѣстія объ экспедиціяхъ, экскурсіяхъ и пр. VI. Личныя извѣстія. VII. Разныя извѣстія. VIII. Музеи и коллекціи.

Въ программу журнала входятъ: 1) Минералогія и Кристаллографія, 2) Петрографія, 3) Палеонтологія, 4) Гео-ботаника, 5) Гео-зоологія, 6) Физическая Геологія, 7) Гидрологія, 8) Историческая Геологія, 9) Доисторическая Археологія (камен. вѣкъ), 10) Прикладная Геологія, Горное Дѣло, полезныя ископаемыя, 11) Почвовѣдѣніе, 12) Техника изслѣдованій, 13) Популяризація и учебныя пособія, 14) Біографіи и некрологи и 15) Библіографія.

„Ежегодникъ“ печатается на русскомъ и параллельно на французскомъ или нѣмецкомъ языкахъ.

Выходитъ ежемѣсячно, исключая двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (10 выпусковъ въ годъ, каждый выпускъ объемомъ въ пять печатныхъ листовъ).

Редакціонный годъ съ 1 апрѣля по 1 апрѣля.

Подписная цѣна за годъ съ пересылкой—6 рублей въ Россіи, за границу—15 марокъ = 20 франковъ.

Подписка принимается въ Редакціи (г. Ново-Александрія, Люблинской губ.) и въ книжныхъ магазинахъ: Эггерса, Суворина, Риккера, Карбасникова, Оглоблина, Іогансона и во всѣхъ др.

Плата за объявленія—на всѣхъ европейскихъ языкахъ—за одинъ разъ: за страницу (in 4^0) 40 рублей, за $^1/_2$ страницы 20 рублей, за $^1/_4$ страницы 10 рублей, за $^1/_8$ стр. 5 рублей.

Редакторъ-издатель **Н. І. Криштафовичъ.**

Открыта подписка на 1914 г.

— НА —

„ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ".

„Messager Ornithologique". — „Ornithologische Mitteilungen".

ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Выходитъ въ годъ четыре книжки, объемомъ каждая не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ, двѣ до и двѣ послѣ лѣтняго сезона.

Журналъ имѣетъ цѣлью объединять орнитологическія работы русскихъ ученыхъ и способствовать ознакомленію любителей съ нашей орнитофауной, съ литературой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изученіемъ. Въ журналѣ имѣются слѣдующіе отдѣлы: 1) Статьи и замѣтки по систематикѣ и біологіи птицъ; 2) Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и библіографія; 4) Корреспонденціи; 5) Хроника; 6) Заявленія гг. подписчиковъ о взаимномъ обмѣнѣ шкурками, гнѣздами и яйцами птицъ; 7) Вопросы и отвѣты.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: В. Г. Аверинъ, С. Н. Алфераки, В. М. Артоболевскій (предс. Кіевск. Орнит. Общ. им. К. Ѳ. Кесслера), В. Л. Біанки, С. І. Бильквичъ, В. Н. Бостанжогло, А. А. Браунеръ, С. А. Бутурлинъ, А. М. Быковъ, А. А. Бялыницкій-Бируля, Б. С. Вальхъ, М. М. Гермсъ, Г. Л. Грава, К. А. Грёве, А. Г. Гржибовскій, К. М. Дерюгинъ (прив.-доц. Имп. С.-Пет. Унив.), Б. А. Домбровскій, В. С. Елпатьевскій (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Б. М. Житковъ (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. Зарудный, Н. А. Зворыкинъ, Г. Э. Іоганзенъ, Е. И. Исполатовъ, Д. Н. Кайгородовъ (профес. Лѣсн. Инст.), А. Н. Карамзинъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожевниковъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. Ф. Котсъ, К. В. Лауницъ, Г. В. баронъ Лоудонъ, Р. С. Магницкій, Л. А. Молчановъ, П. В. Нестеровъ, А. М. Никольскій (проф. Имп. Харьк. Унив.), С. И. Огневъ, Бенно Отто, І. К. Пачоскій, Ѳ. Д. Плеске, Г. И. Поляковъ, Д. М. Россинскій, С. А. Рѣзцовъ, К. А. Сатунинъ, А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскій, Н. А. Смирновъ, П. Ф. Соловьевъ, В. В. Станчинскій, П. П. Сушкинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. И. Сѣницкій, Е. В. Тарасовъ, И. К. Тарнани (профес. Н. Аленс. Инст. С.-Х. и Лѣс.), М. Г. Тартаковскій (Завѣд. Сельскохозяйственно-бактеріолог. лабор. Г. У. З. и З.), А. Я. Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ, В. А. Хахловъ, Э. В. Шарлеманъ и др.

— ПОДПИСНАЯ ЦѢНА —

съ пересылкой въ Россіи и за границу: на 1 годъ — 4 руб., на ½ года — 2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб.

Полные годовые комплекты журнала за 1911 и 1912 гг., имѣющіеся въ настоящее время въ небольшомъ числѣ, высылаются по 4 руб. за годъ.

Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка", Московск. губ., имѣніе „Саввино". Телефонъ № 7-51.

Кромѣ конторы редакціи, подписка принимается въ Москвѣ и С.-Петербургѣ въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, Карбасникова и „Новаго Времени".

Редакторъ-издатель **Г. И. Поляковъ.** — Herausgeber **G. I. Poljakow.**

Тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°, Москва.
1913.